





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1784/0/2







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1784/D/2






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1784/D/2




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1784/5/2




1726 (8)


























EX LIBRIS  
D<sup>r</sup>.ERNST DARMSTAEDTER



# PEDANII DIOSCORIDIS

ANAZARBEI DE MEDICINALI MATERIA LIBRI SEX, IOANNE RVELLIO SVESSIO-

nensi interprete. Singulis cum stirpium, tum animantium historijs, ad naturæ æmulationem expressis imaginibus, seu uiuis picturis, ultra millecarium numerum adiectis: non sine multiplici peregrinatione, sumptu maximo, studio atque diligentia singulari, ex diuersis regionibus conquisitis. Additis etiam Annotationibus siue Scholijs bre-

uissimis quidem, quæ tamen de medicinali materia omnem controuersiam facile tollant. Per GVALTHE

RVM H. RYFF, Argentinum,

Medicum, & Chirurgum,

Omnia ex doctissimorum uirorum lucubrationibus iamprimum concinnata, & in lucem ædita.

Cum Indice quintuplici, copiosissimo: quorum primus omnium ferè simplicium, quibus passim utuntur Medici, nomenclaturas Græcas:

alter Latinas: tertius Officinis, Herbarijs, & Arabum fami-

liæ uulgares: quartus Germanicas: quintus Galli-

cas, miro ordine complectitur.

ACCESSERE IN EVNDEM AVTOREM

Scholia noua, cum nomenclaturis Græcis, Latinis, Hebraicis & Ger-

manicis, IOANNE LONICERO autore.



Cum Gratia & Priuilegio Imperiali.

FRANC. Apud Chr. Egnolphum.





# CLARISSIMO AC PRVDEN-

TISSIMO SENATVI FRANCOFVRDIANO, GVAL-

therus H. Ryff, Argentinus, Medicus, & Chir-  
urgus, S. D. P.



VVM SVMMVS RERVVM OPIFEX DEVS, HOMI-  
ni nihil præstabilius mente, ratione atq; intelligentia dede-  
rit, mirum uideri non debet, si nonnulli & ij quidem sapi-  
entissimi uiri, tantum studij, laboris ac uigiliarū contulerint  
ad eam partem excolendam & informandam, qua sola et re-  
liquis animātibus & ipsis hominibus antecellerent. Quan-  
Pitagoricus Epicharmus tantopere est admiratus, ut hanc  
unam dominam atq; reginam, lucem lumēq; uitæ diceret,  
ac huius olius nobis demandatā curam, quum alia tum stupida tum cæca cēseret:  
Nōs, inquit, ὁρῶμεν & νοῦς ἀκούει, & δὲ ἀλλὰ κωφὰ ἢ τυφλὰ: in hac tamen ipsa ratioe uel  
animo expoliendo, non eandem uidentur pleriq; propositam habuisse uiam, aut  
adeundam tendisse finem, Nam fuerunt apud priscos philosophos, atq; etiam-  
num sunt, qui cognitionem contemplationemq; naturæ ita consecrati sunt, ut e-  
tiam in a consensescere & iucundum & pulchrum existimauerint, quorum ego  
institutum, Clarissimi atq; Amplissimi uiri, etsi improbandum non suscepi (q̃  
hoc interm agere quā turpi ocio sese dedere maluerint) nunquam tamen tanti  
feci, ut non potius mancum quodammodo, atq; uix dum inchoatum iudicauerim  
si nullarum actio adiuncta consequutaq; fuisset, & quū sapientiam (nimirum  
qua diuinarum humanarumq; continetur scientia) ut rem maximam admirari so-  
leo, tunc eam partem quæ nobis à communitate dicta, profert officia, longè præ-  
stantissimam putauī. Eam, inquam, quæ in hac generis humani domestica consu-  
etudine, societati ac hominū tuendis commodis illustrior apparere solet, qua uel  
sola agioscamus necesse est, nos nobis ipsis non tantum natos, sed patriæ, sed a-  
micis. Summoq; conatu enitendum nobis, ut ē nostris studijs ad proximum q̃  
uberrimis redundet fructus. Id cū ita sit, facile in animum induco meū, equiores  
rerū aut maiores maximi facere mecum præclarissimum tum artiū tum faculta-  
tum oīm, quibus mens atq; ipsa ratio expoliuntur, Medicinæ studiū, atque id sa-  
lutiferum per necessariumq; præ cæteris humanæ salutis iudicare, maximè cū  
cogitaerint, qua parte rerum humanarum medica facultas existat, & quæ neces-  
sitas eius disciplinæ sit, atque utilitas, quæ propè id uinculum te net quo homo  
qua celestis, & qua terrenus est, copulatur. Item qua in usum & commercium  
rerum extra se positarū utiliter et salubriter exit. Nec enim (ut corporea taceam)  
diutius cœlestis hic spiritus & consuetudinem sui præbere nobis potest, postq̃  
à molulo naturæ discessit corpus, nec afferre præsidij quæ extrā sunt ope Me-  
dici salutifera destitutus quicquam potest. Credo igitur si uel mens rectè sese re-  
putet, uel quæ mente carent consilijs humanis uti possent, nihil tam enixè flagi-  
tetur: quā eius rei domesticam facultatem, usum atque conditionem, cuius be-  
nefici frui omnibus istis naturæ muneribus licet. Quid enim admirabilius q̃  
cū morborum & sanitatis uis penitissimè intra ipsa corporis uiscera peragatur:  
Medicum ingressum mente dispicere, decernere, ueniētem morbum præ sagire,  
ingrūntem auertere: superantem mitigare, reprimere, tollere: eum qui animam  
agebit, quem desperabant amici, uelut ab orco, breui spacio reuocare? Ut mihi  
præcarissimè dixisse uidetur sapientissimus Poeta τὰ πρὸς ἀνὴρ πολλὰν ἀνίστασθαι ἄλ-  
λωρ. Et uox diuina unī artium omnium clarissimum testimonium, non abs re ex-  
hibuisse uidetur: Honorandum medicum, necessitati hominū creatum. Sed iam  
ueran spectemus utilitatem. Primum enim quæ disciplina uel animi tenebras,



## EPISTOLA

uel incommoda eius corporis omnia, uel mentis nebulas discutere melius po-  
 test. Denique, quod uerè præclarum est, quæ disciplina ad mentis incommoda,  
 quæ omnia à corpore sunt extirpanda, propius unquam penetrauit. Quæ eius  
 domicilij, in quo animus noster residet, unde sese comparat, unde nores in-  
 duit, per quod ueluti portas, omnis notitiarum lux uenit, tanquàm aedilicium quidam  
 curandi potestatem habet summam. Certe iucundissima sanitati si corpus uniuersum,  
 eadem & nitidissima reginæ menti, & ad omnem usum accommodatissima ue-  
 luti aulam inhabitandam parabit: aut si id mauis, instructam adesse genus nego-  
 ciorum officinam menti suppetet, quæ quidem res quos post se fructus trahat,  
 difficile explicatu. Videre hic mihi uideor uirtutum & philosophiæ totius  
 partem. Certe enim compositum pulchrè ad naturæ fragilitatem corporis (cuius  
 rei facultas uel nusquam, uel penes medicum est) mentis tranquillitas consequi-  
 tur oportet. Quæ quid aliud est, quàm ille quem omnium uirtutum congressu que-  
 rimus, felix mentis status. Cæterum quæ corpus magis spectare uidetur Me-  
 dicina uitæ & rerum omnium condimentum præbet, sine quo nihil iucundum,  
 nec preciosum, nec admirabile, nihil denique gratum esse in uita quicquam potest.  
 Quid magnifica te domus iuuat, quid splendida suppellex, quid aureæ uelut, quid  
 aurum ipsum congestum? si inopem te, egenum miserabiliter destituit. Imo ni-  
 hil obstat prorsus, quin ista omnia quibus, cum abundè suppetant, frui non potes,  
 supplicia sint & cruciatus. Quid potentia? quid amplitudo? etiam si sufficiant,  
 uenerentur omnes? si te morbus sic lecto affixum tenet, sic omnem potentiam im-  
 potentiam reddit, ut istam autoritatem tuam uniuersam commutare cum uno sa-  
 nitatis momèto ardentissimè cupias. Quid animus ipse uirtutibus licet pulcher-  
 rimis & innumerabilibus præditus intra foedum, morbidum, & pestilens domi-  
 cilium conclusus, uel sublime conari, uel solatij cæterarum spectaculo halere po-  
 test? Ergo ueluti nox quædam, & caligo densissima morbus, optima hominis bo-  
 na obscurat, contegit, & apparere non sinit. quæ reddita sanitas, uelut è magna  
 tempestate iucundissimus solis aspectus, inenarrabili affectu omnia reducit. Ve-  
 rectè uox illa & sapienter iudicet, ut quæ nullo precio æstimabilem esse sanitatem  
 dicit, quam tum mortales intelligunt esse ueram cum morbos experiuntur, dis-  
 cuntque in illius sinu bonarum rerum omnium usum & fructum & gratiam con-  
 stare. Hæc autem omnino se ita habere, nemo est, arbitror, tam planè nullius  
 iudicij, qui non uideat & agnoscat, & merito artis huius præstantiam tum mira-  
 cula necessario admiretur, uel summa eius beneficia erga mortales unice omen-  
 det, ac inde conatum illorum optimum, studium atque sedulitatem, qui artem hanc  
 præclarissimam primo diuinitus acceptam ratione atque ingenio excoluerunt, no-  
 bisque quoquomodo absoluendam tradiderunt, magnificat: atque hos denique di-  
 is similes summis laudibus efferendos, & per maximis honoribus dignos esse cen-  
 seat, qui hanc diuinam artem illustrando, prouehendo, ornando, atque ab omni  
 iniuria uindicando, omnem, quod aiunt, lapidem mouere tentent. Ceterum cum præ-  
 clarissimam hanc artem, quam solam libero ingenio excolendo dignam iudica-  
 mus esse, duarum rerum cognitione potissimum constare in confesso sit, subiecti  
 scilicet, atque eorum quibus ueluti instrumentis utitur, quorum cognitionem  
 tam necessariam esse scimus. Medico, ut sine hac dextrè medicari, aut medi-  
 cinæ fructibus uberrimis frui nemo queat. Sunt autem ea quæ simplicia medica-  
 menta uocamus, uerbi gratia, quæ terra rerum benigna parens ædit, stirpes, ani-  
 malia & metallica, harumque uariarum partes. Cum uero harum rerum exactam at-  
 que rectam cognitionem Medico adeo necessariam hætenus turbarint tan mi-  
 serè quorundam tam pertinaces lites, perpetuæque discordiæ, atque contendendi li-  
 bidō (barbarorum errores crassissimos tacere lubet) ut hinc ipsam demum præcla-  
 ram medendi artem de incertitudine atque inconstantia non parum notandam, an-  
 san ali-



## DEDICATORIA.

sam aliquem haud leuē, imprudentiores accipere possent. Hanc fortunā miseri  
 nos, huic tam intolerabili malo, cū latius indies serpere uideremus, resistendū pu  
 tauimus, atq; Medicinæ nobilissimæ alūnæ nostræ chariss, cui hac parte maxime  
 fuit iniuriæ, suppetias ferre, atq; dignis copijs succurrere cū omnino statuisse  
 mus, Pedanij Dioscoridis Anazarbei tanq; Coryphei palmāq; ferentis, qui u  
 nicē huic malo, tanq; alter Aesculapius siue Apollo mederi posset, de Medicina  
 li materia libros sex in manus sumpsimus; hoc enim foelicius medicam mate  
 riā nemo tractauit, ut Medicorum princeps Galenus testatur. Quis em̄ de sim  
 plicibus medicamentis ab antiquis tum Græcis tum Latinis uaria scripta extent,  
 non infœliciter exarata, tamen *ὑπὸ ἀπείροισιν ἀνθρώποις*. Quare hunc tanquam  
 limpidissimum fontem, ex quo harum rerum cognitionem ueram rectamq; uni  
 cē petendam hauriedamq; esse censent uno ore omnes docti Medici, præ cæte  
 ris omnibus puriorē, magisq; fide dignū delegimus in hunc commētariolum si  
 ue scholia aut annotationes breuissimas quidem, quibus tamen omnis de simpli  
 ci medicina siue medicinali materia, controuersia facile tollitur, ut hæc Medici  
 næ pars pristino suo candori restitueretur, cudere instituiamus, ac locos aliquot re  
 purgare, et quod summē necessarium putauimus, hætenus uero nulli tentatum,  
 cū stirpiū tum animalium, quorum hic autor meminit, aut alioqui in re Medi  
 ca usus increbuit, uitas imagines singulis capitibus adijcere curauimus ad naturę  
 æmulationē quā artificiosissimē expressas, quibus clarior dilucidiorq; fieret Di  
 oscoridis lectio, ut quæ iamdiu caligine obducta fuerat, iamdiuq; obcurata ali  
 quid lucis reciperet, atq; adeo altius infigeret aīo ea quę nudis uerbis exponit  
 historia, artificiosa pictura. Hanc uerō prouinciā, si rem attentius exactiusq;  
 perpendimus, non satis scio an humeris nostris parem assumpserimus, id tamen  
 audendum censuimus, ubi hoc animaduertimus futurum gratum plerisque stu  
 diosorum, persuasum enim habebam si quid lucis huic auctori accederet hoc no  
 stro labore, atque hac parte scilicet in re herbaria, rectaq; atq; exacta Medici  
 nalis materiæ cognitione, Medicinæ præclarissimum studium aliquid subsidij  
 caperet, id enim ab omnibus naturæ rerum studiosis expecti. Quamuis me  
 non lateret uiros cū singulari tum exactissima doctrina in hac re summum stu  
 dium impendisse, in quorum albo Hermolaus Barbarus, Marcellus Virgilius,  
 Leoniceus, Manardus, Ruellius, Jac. Syluius, Anth. Musa, & ex nostris his  
 nullo modo inferiores Cornarius, Cordus uterque, pater & filius, Brunfelsius,  
 mihi olim præceptor charissimus, plurimumq; obseruandus, & Hieronimus  
 Tragus homo in dijudicandis, explorandis, examinandisq; simplicium maxi  
 mē stirpiū differentijs extra omnem (quod de Cicerone dictum est) ingenij ale  
 am positus, post quorum luculentas conceptiones rem paulo auctiorem facere  
 institui, nec id fore citra communem utilitatem putans. Quamuis sciam non de  
 futuros, qui uel argumentum, uel me hominem naris (ut sic dixerō) obesæ in  
 cessent. Hi profecto sunt qui in omnes sibi iudiciū sumunt, qui lingua pruriētes  
 nimis quam licenter in alienam irruere famam nulla non hora permittunt sibi,  
 etiam si sæpe uelut alba deprehenduntur linea. Qui uelut scorpionis ictu, opti  
 mum quenque lancinarunt, ac fistulato uulnere (ut Hieronimi utar uerbis) uia  
 aperuerint, mox latius ueneni pestiferā uim fundūt. Atra, ut Plinius inquit, ceu  
 serpentum eorum lingua, uenenum uibrat, rabesq; animi contrectata omnia  
 adurit, culpantium omnia, ac dirarum alitu mmodō tenebris quoque & ipsarum  
 noctiū quieti inuidentes, gemitu, quę sola uox eorum est, ut inauspicatorum ani  
 mantū uice obuij quoque uetent agere aut prodesse uitæ, nec ullum tamen abo  
 minati spiritus precium nouere, q̄ odisse, culpāre atque carpere omnia. Quorum  
 ego uirulentiam, dum pestilenti spiritu optimum quenque afflatum uolunt, im  
 prudentiorem putauī, quā ut eis respōdendum haberem. Bonorum tantum  
 ego



ego iudicium reformido, quibus utinam ipsis ita libeat exporrecta fronte hunc  
nostrum laborem excipere, ut nullius odio aut offensione adducti ad scribendum  
accessimus. Quod uero nostram lucubrationem uestro nomini dicendam,  
nuncupandamque percensui, Clarissimi Prudentissimique uiri, in causa fuit incre-  
dibilis uestra uirtus, uitæ integritas, & eruditio singularis, summa denique om-  
nibus in rebus prudentia, unde uestra Respub. uirtute honesta, religione ac pi-  
etate integra, iure ac legibus æqua, opibus firma, copijs locuples, & gloria sem-  
per ampla fuerit, nec me parum denique commouit, aduersus bonos, studiosos  
atque eruditos uiros cum amorum beneuolentia singularis ut uestri nominis fa-  
mæque atque dignitatis splendoribus hic labor noster illustratus, uestris auspicijs  
semper tutus, meæ quoque erga uos obseruantie perenne monumentum, non  
longis tantum seculorum spatijs, uerum omnino si fieri possit, in uersis naturæ  
legibus sempiterni & continentis æui diuturnitate donatus uiuat, floreat eluces-  
cat. Vos igitur amplissimi prudentissimique uiri pro uestra humanitate  
munusculum huiusmodi benignè (ut soletis) suscipiatis, putetis-  
que omnem meam operam, studium, industriam, quicquid  
est in me uel ingenij uel uirium, uestre am-  
plitudini esse paratissimū. Fran-  
coforti ad Mœnum,  
prid. Cal. Septem. Ann. Do.  
M.D.XL.III.



GRÆCORVM NO  
minum huius operis  
index.

A  
Αβρότονον 210  
αγαρικόμ 195  
αγνος 67  
αγριελα 69  
αγριοκάραμ 93  
αγροα 300  
αδιδαντος 351  
αγιλωπα 132  
αγειρος 53  
αγιλωπ 352  
αγιόκερος 137  
αίρεα 137  
ακανθα 205  
ακανθα λευκή 292  
ακανθος 205  
ακινος 210  
ακονιτορ 325  
ακορομ 2  
ακτή 373  
ακαλήφι 333  
αλόγ 207  
αλυσορ 249  
αμαρεάκορ 219  
αμμι 232  
αμοργι 70  
αμπελος αγρία 381  
αμπελος ημερομ 381  
αμπελος λευκή 376  
αμυγδάλη 86  
αναγαλλίς 190  
ανδράχνη 151  
ανδρόσαμμορ 285  
ανθορ 219  
ανευώνη 189  
ανησορ 218  
ανθεμεις 277  
ανθύλλις 276  
ανισορ 218  
ανισορ 205  
ανωνίς 205  
αντιζέινον 350  
απαρινη 249  
απιον 81  
αράχνη 115  
αρκτιον 319  
αργόγλοσος 155  
αρεκυθος 50  
αριστολογία 197  
αρεκυθίς 50  
αρόμ 181  
αρτεμισία 261

αζαρόμ 8  
ασκληπιάς 250  
ασκυρόμ 285  
ασηρ αθηκός 345  
ατράκτυλις 151  
ατράφαεις 148  
αφάκη 169  
αχίλλειος 303  
ατίνθιορ 209  
B  
βαλανόςμυρεφική 383  
βαλάνοςμυρεφική 25  
βαλλοτή 255  
βαλσαμέλαιορ 16  
βάρυθρον 51  
βαρύπικρομ 209  
βατράχιορ 183  
βάτος 303.61  
βάτος ιδάος 704  
βατύπικρομ 209  
βολέλλιορ 39  
βήχιερ 261  
βουγλοσος 348  
βούκερος 137  
βούνιορ 347  
βσφθαλμος 278  
βλίτορ 147  
βότρυς 263  
βουβώνιορ 345  
βοννορ 146  
βράθυς 51  
βρυορ 17  
βρύως θαλάσσιορ 336  
βρώμος 132  
γαλέμ 105  
γαλή 105  
γάλλιορ 335  
γεντιανή 197  
γέρας όφείος 101  
γυγίβερι 177  
γυγίδιορ 164  
γνήεντερά 116  
γλεύκιορ 34  
γλήχωρ 213  
γλυκειά 198  
γλυκυρόζιη 198  
γναφάλιορ 265  
γογγύλις 241  
λ  
λάφνη 52  
λαφνίς 52  
λακτυλος 74  
δίος βάλανος 71  
δικόκκος 130  
δίφασκος 202

I N D E X.

δρύς 71  
δρακοντία 181  
E  
ευβοίον καρύα 68  
ευπατόριορ 305  
εζωμορ 165  
ελάτη 29  
ελάτη 74  
ελατινη 305  
ελλέβορος λευκός 357  
ελλέβορος μέλας 357  
ελεισφάκος 215  
ελένιορ 21  
ελιοσελινιορ 233  
ελίχυσορ 312  
ελένη 330  
ελένηκιοσαμπίλος 305  
ελυμος 134  
επιμηλίσ 85  
ερεικη 57  
ερύσιμορ 175  
ερούποα 379  
ερυθρόδανορ 280  
ερυσοκνησέορ 5  
ερυπυλλορ 219  
έχιον 301  
εψημα 385  
Z  
ζεύδαρορ 130  
H  
ηδύσαρορ 273  
ηλεκτρομ 54  
ημεροκαλλίς 267  
ηρύγιορ 207  
ηρυγέωρ 315  
ησωπος 211  
Θ  
θαλασόμελι 387  
θαλκτρομ 336  
θηλύπτερις 377  
θηρία 101  
θρίδαξ 163  
θλάστωι 174  
θύμβρα 218  
θύμος 218  
I  
ιδάια ρίζα 307  
ιεροβατάνη 314  
ικτις 105  
ιδιμ 346  
ιππομάραθρορ 238  
ιππουρις 308  
ιπλόγλωσσορ 349  
ιπποσέλινορ 254  
ιπποφαεις 365

iris 2  
ισάτις 193  
ίξος 71.247  
ίτια 68  
K  
κάγκαμορ 18  
κακαλία 346  
κάλαμος 56  
κάλαμος μυρεφικός 15  
κάλαμος αροματικός 15  
κάναβις 281  
καπνός 341  
κάππαρις 185  
καρδαμαντική 93  
καρδαμμορ 174  
καρδαμμορ 6  
καρορ 628  
καρυον βασιλικόρ 68  
καρυσία 355  
κασία 11  
κασανα 71  
καυκαλίσ 133  
κίγχορ 164  
κίγχορ 133  
κίερος 51  
κίχρις 133  
κίλτικηνάδος 8  
κίενταύριορ τό μέγα 199  
κίενταύρις 300  
κίενταύριορ τό μικρόρ 200  
κίρατίτις 137  
κίρασιον 77  
κίρατία 78  
κίρατωνία 78  
κίρκις 71  
κίρδος σάκτος 127  
κίναμωμορ 12  
κίχώριορ 158  
κίσος 191  
κίληματίς διαφνοίδης 192  
κίλιντοπώδιορ 251  
κίνήκος 379  
κινίδη 333  
κόνκι orientis 193  
κοκκυμνήα 84  
κοκκός βαβικη 308  
κόλιφονία 45  
κολοκύνθη 169  
κολχικόρ 319  
κόμαρος 85  
κορωνόππος 157  
κότινος 69  
κοτύλληλορ 333  
κραταίογονορ 269  
κρανία 83



I N D E X.			
πράμνη	30	μαράθρον	237
κρίνινον	32	μελάνθιον	243
κρίνον ἐρυθρον	254	μελία	53
κρίος	138	μυλίκρατον	386
κρίθνη	129	μυλίστοφυλλον	255
κρίθμον	156	μετώπιον	25
κροκός	29	μεσσίλη	82
κρόμμυον	171	μέσσιλον	ibid.
κύαμος	135	μηδική πόα	169
κυκλάμινος	179	μηκωνό οπός	318
κυνόγλωστον	148	μήγορ ἀδαμαντικόν	4
κυνόσκατος	61	μήκορ κερατίτις	318
κύπαρισσος	49	μήλι	223
κύμιον	229	μήλον	89
κύπειρος	5	μηκόνιον	318
κύπκρος	5	μήκορ κηπαῖον	317
κρότον	166	μήκορ κήροιας	316
κάνειον	317	μηλεα	80
κάνον	46	μήλινον	29
Λ			
λαγώπους	298	μορεα	89
λαμψάνη	146	μυός ὠτη	195
λαπαδόρ ἀγρίον	145	μυκός	329
λάπαθρον κιωάιον	145	μυρίκη	57
λαδυρίς	369	μυρρά	37
λάδυρος	138	μυρρίνη	76
λαίχνη πόα	311	μυρρίς	343
λευκάκκανθα	205	μυρσίνη	76
λευκάκκανθα	277	N	
λεύνκη	53	νάρδον	7
λαγώπυρος	298	νυμφαία	274
λευκόιον	168	νήριον	318
λεπτοκαρυον	68	M	
λίβανος	40	ξανθιον	352
λίβανωτις σεφανωμάτις	241	ξυλοκερατα	78
λίβυστικον	225	ξύρις	299
λίγνυς	47	ξίφυον	298
λιγύστικον	225	O	
λιώνιον	297	ὄα ὄη	84
λίον	137	ὄγχνη	81
λινόσπερμον	ibid.	οἰνάνθη	382
λινόσωσις	179	οἰνάνθη πόα	266
λίθοσπερμον	279	ὄγκυον	166
λόπιον	71	ὀλούατρον	234
λυχνίς σεφανωμάτικη	253	ὀμφάκιον	383
λωτὸν ῥίμα	82	ὀνίσκος	109
λωτός	342	ὄνος	109
λωτός δένδρον	ibid.	ὄνυξ	84
M			
μαδονάις	274	ὄνωις	97
μαδολιον	163	ὄνωις	205
μαλαθροσπερμον	253	ὀπός	243
μαλαχὴ ἀγρία	148	ὀρμινον	273
μαλαχὴ κηπαῖα	148	ὀρίγανον	212
		ὀρινή νάρδον	8
		ὀροβαγχή	166
		ὀρεος	141
		ὄρεα	146
		ὄρεα	60
		ὄρεα	355
		ὄρεα	74
		ὄρεα	81
		ὄρεα	279
		ὄρεα	59
		ὄρεα	223
		ὄρεα	185
		ὄρεα	325
		ὄρεα	133
		ὄρεα	42
		ὄρεα	273
		ὄρεα	306
		ὄρεα	376
		ὄρεα	370
		ὄρεα	369
		ὄρεα	330
		ὄρεα	68
		ὄρεα	241
		ὄρεα	296
		ὄρεα	314
		ὄρεα	340
		ὄρεα	222
		ὄρεα	47
		ὄρεα	86
		ὄρεα	133
		ὄρεα	368
		ὄρεα	42
		ὄρεα	52
		ὄρεα	293
		ὄρεα	352
		ὄρεα	337
		ὄρεα	292
		ὄρεα	291
		ὄρεα	109
		ὄρεα	378
		ὄρεα	71
		ὄρεα	55
		ὄρεα	377
		ὄρεα	239
		ὄρεα	128
		ὄρεα	144
		ὄρεα	63
		ὄρεα	75
		ὄρεα	71
		ὄρεα	245
		ὄρεα	219
		ὄρεα	133
		ὄρεα	151
		ὄρεα	159
		ὄρεα	146
		ὄρεα	60
		ὄρεα	355
		ὄρεα	74
		ὄρεα	81
		ὄρεα	279
		ὄρεα	59
		ὄρεα	223
		ὄρεα	185
		ὄρεα	325
		ὄρεα	133
		ὄρεα	42
		ὄρεα	273
		ὄρεα	306
		ὄρεα	376
		ὄρεα	370
		ὄρεα	369
		ὄρεα	330
		ὄρεα	68
		ὄρεα	241
		ὄρεα	296
		ὄρεα	314
		ὄρεα	340
		ὄρεα	222
		ὄρεα	47
		ὄρεα	86
		ὄρεα	133
		ὄρεα	368
		ὄρεα	42
		ὄρεα	52
		ὄρεα	293
		ὄρεα	352
		ὄρεα	337
		ὄρεα	292
		ὄρεα	291
		ὄρεα	109
		ὄρεα	378
		ὄρεα	71
		ὄρεα	55
		ὄρεα	377
		ὄρεα	239
		ὄρεα	128
		ὄρεα	144
		ὄρεα	63
		ὄρεα	75
		ὄρεα	71
		ὄρεα	245
		ὄρεα	219
		ὄρεα	133
		ὄρεα	151
		ὄρεα	159
		ὄρεα	146
		ὄρεα	60
		ὄρεα	355
		ὄρεα	74
		ὄρεα	81
		ὄρεα	279
		ὄρεα	59
		ὄρεα	223
		ὄρεα	185
		ὄρεα	325
		ὄρεα	133
		ὄρεα	42
		ὄρεα	273
		ὄρεα	306
		ὄρεα	376
		ὄρεα	370
		ὄρεα	369
		ὄρεα	330
		ὄρεα	68
		ὄρεα	241
		ὄρεα	296
		ὄρεα	314
		ὄρεα	340
		ὄρεα	222
		ὄρεα	47
		ὄρεα	86
		ὄρεα	133
		ὄρεα	368
		ὄρεα	42
		ὄρεα	52
		ὄρεα	293
		ὄρεα	352
		ὄρεα	337
		ὄρεα	292
		ὄρεα	291
		ὄρεα	109
		ὄρεα	378
		ὄρεα	71
		ὄρεα	55
		ὄρεα	377
		ὄρεα	239
		ὄρεα	128
		ὄρεα	144
		ὄρεα	63
		ὄρεα	75
		ὄρεα	71
		ὄρεα	245
		ὄρεα	219
		ὄρεα	133
		ὄρεα	151
		ὄρεα	159
		ὄρεα	146
		ὄρεα	60
		ὄρεα	355
		ὄρεα	74
		ὄρεα	81
		ὄρεα	279
		ὄρεα	59
		ὄρεα	223
		ὄρεα	185
		ὄρεα	325
		ὄρεα	133
		ὄρεα	42
		ὄρεα	273
		ὄρεα	306
		ὄρεα	376
		ὄρεα	370
		ὄρεα	369
		ὄρεα	330
		ὄρεα	68
		ὄρεα	241
		ὄρεα	296
		ὄρεα	314
		ὄρεα	340
		ὄρεα	222
		ὄρεα	47
		ὄρεα	86
		ὄρεα	133
		ὄρεα	368
		ὄρεα	42
		ὄρεα	52
		ὄρεα	293
		ὄρεα	352
		ὄρεα	337
		ὄρεα	292
		ὄρεα	291
		ὄρεα	109
		ὄρεα	378
		ὄρεα	71
		ὄρεα	55
		ὄρεα	377
		ὄρεα	239
		ὄρεα	128
		ὄρεα	144
		ὄρεα	63
		ὄρεα	75
		ὄρεα	71
		ὄρεα	245
		ὄρεα	219
		ὄρεα	133
		ὄρεα	151
		ὄρεα	159
		ὄρεα	146
		ὄρεα	60
		ὄρεα	355
		ὄρεα	74
		ὄρεα	81
		ὄρεα	279
		ὄρεα	59
		ὄρεα	223
		ὄρεα	185
		ὄρεα	325
		ὄρεα	133
		ὄρεα	42
		ὄρεα	273
		ὄρεα	306
		ὄρεα	376
		ὄρεα	370
		ὄρεα	369
		ὄρεα	330
		ὄρεα	68
		ὄρεα	241
		ὄρεα	296
		ὄρεα	314
		ὄρεα	340
		ὄρεα	222
		ὄρεα	47
		ὄρεα	86
		ὄρεα	133
		ὄρεα	368
		ὄρεα	42
		ὄρεα	52
		ὄρεα	293
		ὄρεα	352
		ὄρεα	337
		ὄρεα	292
		ὄρεα	291
		ὄρεα	109
		ὄρεα	378
		ὄρεα	71
		ὄρεα	55
		ὄρεα	377
		ὄρεα	239
		ὄρεα	128
		ὄρεα	144
		ὄρεα	63
		ὄρεα	75
		ὄρεα	71
		ὄρεα	245
		ὄρεα	219
		ὄρεα	133
		ὄρεα	151
		ὄρεα	159
		ὄρεα	146
		ὄρεα	60
		ὄρεα	355
		ὄρεα	74
		ὄρεα	81
		ὄρεα	279
		ὄρεα	59
		ὄρεα	223
		ὄρεα	185
		ὄρεα	325
		ὄρεα	133
		ὄρεα	42
		ὄρεα	273
		ὄρεα	306
		ὄρεα	376
		ὄρεα	370
		ὄρεα	369
		ὄρεα	330
		ὄρεα	68
		ὄρεα	241
		ὄρεα	296
		ὄρεα	314
		ὄρεα	340
		ὄρεα	222
		ὄρεα	47
		ὄρεα	86
		ὄρεα	133
		ὄρεα	368
		ὄρεα	42
		ὄρεα	52
		ὄρεα	293
		ὄρεα	352
		ὄρεα	337
		ὄρεα	292
		ὄρεα	291
		ὄρεα	109
		ὄρεα	378
		ὄρεα	71
		ὄρεα	55
		ὄρεα	377
		ὄρεα	239
		ὄρεα	128
		ὄρεα	144
		ὄρεα	63
		ὄρεα	75
		ὄρεα	71
		ὄρεα	245
		ὄρεα	219
		ὄρεα	133
		ὄρεα	151
		ὄρεα	159
		ὄρεα	146
		ὄρεα	60
		ὄρεα	355
		ὄρεα	74
		ὄρεα	81
		ὄρεα	279
		ὄρεα	59
		ὄρεα	223
		ὄρεα	185
		ὄρεα	325
		ὄρεα	133
		ὄρεα	42
		ὄρεα	273
		ὄρεα	306
		ὄρεα	376
		ὄρεα	370
		ὄρεα	369
		ὄρεα	3



ὑδρόσμου 216  
ὑδρογρυγός 366  
ὑδρομελι 386  
ὑδροπέπερος 177  
ὑδροπέλιον 235  
ὑδρόκυμα 319  
ὑπερίκον 285  
ὑσσοπον 119

φακός ἐσιόμενος 140  
φκγός 71  
φίλυρα 61  
φλόμος 339  
φοίνιξ 74  
φύλορες 61  
φού 9  
φύκος θαλάσσιος 337  
φύλον 10  
φύλον ἰνδικόν ibidem  
φύλον μαλακῶδες ibi.

χ 372  
χαμαίς 252  
χαμαίς 347  
χαμαίς 201  
χαμαίς 277  
χαμαίς 237  
χελιδόνιον 191  
χελιδόνιον μικρόν 192  
χόνδρος 128  
χρυσόγονον 312  
χρυσάνθεμον 277

ψύλλιον 320

# LATINORVM NO menclationum Index.

A  
Abrothnum 31  
Absinthium 203  
Absinthium marinum 109  
Acacalis 58  
Acanos 221  
Acantha 205  
Acanthium 204  
Acanthus 205  
Acatia 66  
Acetum 387  
Acetum mulfum 388  
Achillea 303  
Acidamuria 389  
Acinos 220  
Aconitum 425.325  
Acorus palustris 2

INDEX  
Acorum 2  
Acutaspina 60  
Adiantum 350  
Adeps 120  
Adarces 415  
Adonium 50  
Aegilops 352  
Aeris squamma 399  
Acrugo 400  
Aethiopicalea 69  
Aethiopia 339  
Aes ulsum 397  
Agricum 194  
Ageratum 313  
Agallochum 17  
Aluga 286  
Aizoon 332  
Alauda 112  
Albucum 182  
Albaspina 206  
Alcea 282  
Alcionium 415  
Alec 107  
Alica 135  
Allium 171  
Allium sylvestre ibid.  
Alypum 374  
Aloc 207  
Alisma 284  
Alyssum 249  
Alfinc 330  
Altercus 319  
Alibea 281  
Alumen 410  
Alus 294  
Amaracus 277  
Amaracum 219  
Amaracum 34  
Ambrosia 262  
Amaratus lutea & pur. 312  
Amygdala 85  
Amylum 136  
Anmi 231  
Anomum 13  
Anmomacum 246  
Ampeloprason 170  
Amurca 69  
Anagallis 189  
Anagallis aquatica 189  
Anagyris 283  
Anchusa 299  
Androsaces 274  
Androsenum 286  
Anemones 288

Anethum 2  
Anisum 227  
Anthemis 276  
Anonis 205  
Anthera 65  
Anthyllis 276  
Antirrhinum 350  
Aparine 248  
Aphace 169  
Aphrodisia 2  
Aptastrum 255  
Apium palustre 233  
Apium hortense 333  
Apium rusticum 235  
Apium vulgare 233  
Apios 373  
Apocynum 328  
Apollinaris 319  
Aqua 986  
Aqua malsa 386  
Arabis 175  
Araneus 115  
Arbutus 64  
Arction 339  
Arcturus 340  
Areni 107  
Argemiflora 406.428  
Argenti recrementum 406  
Argemum 406.429  
Aris 181  
Arisarum 181  
Aristolochia 197  
Arnoglossa 154  
Arthemisia 261  
Armum 181  
Arundo 56  
Asarum 8  
Asclepias 250  
Ascyron 285  
Aselli 109  
Asini ungula 111  
Asinum iecur 110  
Asius lapis 417  
Asphaltos 47  
Asphaltus 16  
Asplenium 274  
Asiria mala 80  
Astragalus 314  
Astodelus 182  
Asparagz 153  
Athera 131  
Atramentum librar. 421  
Atrament. futorii 407  
Atramentum rubrum 409

Atracilis 210  
Atriplex 148  
Aucna 131  
Auriculamuris 192  
Auripigmentum 109.429  
B  
Bacca Syriaca 82  
Bacharis 221  
Balaustrum 75  
Ballote 254  
Balsamum 15  
Barbula hirci 167  
Barbus 104  
Batus 61  
Becbium 268  
Bellium 39 Beta 151  
Betonica 288  
Bitumen 47  
Blatta pifirumaria 109  
Blutum ibid. m  
Boleti 39  
Boopes 197  
Botrys 263  
Brabyla 203  
Brassica Crispa 149  
Brassica marina 151  
Brassica seculis 149  
Brassica sylvestris 150  
Britannica 289  
Bromos 132  
Bryon 16.311  
Bucurmon 350  
Eufo 106  
Buglossum 248  
Bulbus uomitorius 283  
Buccina 95  
Bunium 347  
Bunium 148  
Bupbthalmum 287  
Buprestes 114.425  
Butyrum 118  
Butyri fuligo ibid. C  
Cacalia 348  
Cachrys 240  
Cadmia 396  
Calaminiha 217  
Calamus aromaticus 2  
Calamus odoratus 14  
Calcifraga 375  
Callitricheon 351  
Calx 425.414  
Cancamum 18  
Cancer marinus 59  
Cancro ibid. m  
Cande



I N D E X.			
Candelaria	339	Charta	56
Candelaregis	ibidem	Chelidonium	191
Cannabis	282	Chelidonium minus	191
Cantharides	114.424	Chamaedaphne	556
Capnos	341	Chamaelea	372
Capnos chelidonia	198	Chameleo niger	201
Capnos phragmitis	198	Chiliophyllum	335
Capus	112	Chamaepitys	286
Cardamantica	93	Chironium Panaces	224
Capparis	185	Chrysanthemon	314
Capra ungula	111	Chr socolla	404
Cardamir	156	Chrysocome	311
Cardamomum	5	Chrysogonum	312
Cardamomum nigrum	6	Chrysolachanon	148
Carduus	202	Cyanus	405
Carduus suarius	201	Cicade	112
Ceries	55	Cicer	138
Cannabum	228	Cicerbita	158
Carota	238	Cici	366
Carpasifuccus	426	Cichorea sylvestris	159
Carpesium Galeni	355	Cichoreum	158
Carpobalsamum	16	Cyclaminus	178
Carum	218	Cicuta	126.426
Casus	118	Cydonea	79
Casia	10	Ciborium	139
Castanea	71	Cimices lectularij	107
Castoris testes	164	Cinara	202
Catanance	550	Cinnabaris	406
Caucalis	164	Cinamomum	11
Cedrus	51	Cynocrambe	328.380
Celtis	82	Cynoglossum	348
Ceneaurium magnum	198	Cynosbatus	61
Ceneaurium minus	199	Cynosorchis	269
Cepegethium	171	Cynosrhoda	61
Cepa	170	Cyperus Babylonius	5
Cepaea	283	Cyphi	13
Cera	127	Cyperus Indicus	5
Cerasia	77	Cypyrus	ibidem
Cerasum	ibidem	Cyprum	61
Cerasus	ibidem	Circea	265
Ceruinum cornu	113	Cirsium	344
Cerix	96	Cistus	62
Cerusa	404.428	Cytinus	75
Chalcanthum	407	Cytisus	342
Chalcis	115	Citraria	255
Chalcitis	408	Citria	80
Chamae	96	Citromala	ibidem
Chamaecyparissus	49	Clematis	292
Chamecissus	347	Clymenum	295
Chamaedrys	252	Clinopodium	251
Chameleuce	343	Cnicus	378
Chameleon albus	200	Coagulum	119.102
Chamefice	570	Coccum gnidium	371
Chamomilla sativa	276	Coccus baphica	308
Chamomilla vulgaris ibi.		Coccum infectorium ibid.	
		Cochlea marina	97
		Coeruleus	405
		Colchicum	329
		Colocasia	139
		Colocynthis	373
		Colophonia	45
		Concha 95. Cochlea	97
		Concha margaritifera	98
		Cochlea terrestres	97
		Comarus	85
		Condrylla	159
		Conyza	266
		Coccum	46
		Corallium	416
		Coriandrum	231.426
		Coria ueterament.	121
		Coris	286
		Cornicis pes	157
		Cornus	83
		Cornus sylvestris ibidem	
		Coronopus	157
		Cortex thuris	41
		Costus 15. Cotonea	78
		Cothona	107
		Crambe	144.149
		Cretanus	156
		Crimmon	130
		Criihumum	156
		Crocodilium	201
		Crocodilus terrestris	115
		Crocum	19
		Cratogeomum	268
		Creticum seseli	226
		Crocognagma	33
		Cucurbita	160
		Cucurbita sylvestris	373
		Cucumer satinus	161
		Cucumis marinus	161
		Cuminu Alexandrinu	331
		Cuminum sylvestre	230
		Cuminum satinum	229
		Cuniculus	102
		Cunila	218
		Cupressus	48
		Cupressi fructus	49
		Curmi	130
		Curatio comunis in omnes	
		ictus uirulentos	437
		Cutiones	109
		D	
		Daphnides	356
		Daucum	238
		Delphinium	238
		Dioecoon	130
		Distamnium	213
		Diphryges	489
		Dipsacum	202
		Diptarmice	178
		Domestica nobis	430
		Doricium	322.425
		Draba	175
		Draco marinus	100
		Dracunculus	179.101
		Dracunculus palust.	179
		Dulcis radix	198
		E	
		Ebenus	63
		Ebur 113. Echinus	94
		Echion sylvestre & dome	
		sticum	300
		Elaphoboscum	236
		Elatinum	29.304
		Elatium	360
		Elenium	12
		Eleomeli	224
		Elcofelinum	34
		Elichrysium	312
		Empetrum	375
		Ephemerum	350.425
		Epimedium	298
		Epimelis	82.95
		Epimetron	298
		Epipactis	342
		Epithymum	574.218
		Equisetum	308
		Equorum lichenes,	112
		Erica	57
		Ericinum	95
		Erimaccus	94
		Erinus	392
		Eryngum	206
		Erysimon	175
		Erysisceptiu	4
		Erihrodanum	280
		Eruca	165.114
		Euphorbium	245
		Eupatorium	34
		Eruca pinorum	114
		Eruum	140
		F	
		Faba	138
		Faba Aegyptia	139
		Faba Græca	82
		Faba Syria	ibidem
		Fax	414
		Fagus	70
		Far	133
		Farrago	132
		Farinacrasior	130
		Ferula	241
		Festula	



# INDEX

Festuca	352	Goace	107	Hyppuris	291.	Ladanum	62
Fiber	104	Gobius	107	Hirudo	429	Lagopyros	298
Fici.	90	Gordylion	227	Hirundinaria	192	Lagopus	297
Fidicula	351	Gramen	302	Hirundo	113	Lampsana	146
Filicula	377	Gramen parnassi	302	Hissopum	110	Lanaria	339
Filix	367	Gramen gnidium	371	Histrix	94	Lanaria herba	178
Flos aris	399	Grossi	91	Holostium	295	Lanarum medicina	118
Flos salis.	413	Gummi Iuniperi	50	Hordeum	129	Lana succida	118
Foeniculum	237	Gypsum.	415.428	Hordeum Cantherinū	129	Lapathum	145
Foeniculum erraticū	238	H.		Horminum satium et syl		Lapis Armen.	405
Foenogracum	36	Hematites	417	uest.	272	Lappa	351
Foliatum	36	Halica	13	Hyoscyamus	426	Larix	45
Folium Indici.	10	Halicacabus	321	I.		Lasfer	243
Folium Malobathri	10	Halicastrum	133	Iasminum	36	Lasferpitium.	243
Fontalis	337	Halimus	59	Iberis	93	Lathyrus	369
Fraxinus	52	Halme	107	Ildaea Radix	907	Laurus	52
Fucus marinus	336	Hammoniacum	246	Iecinera	111	Laurus Alexandrina	355
Fuligo	47	Harmala.	222	Ilex	70	349.354	
Fuligo pictoria	421	Harundo	55	Indicum	405	Ledon	62
Fuligo liquidæ picis	46	Hastula regia	182	Intestina terra	116	Lemniaterra	407
Fumaria	341	Hedera	190	Inula	21	Lens	139
Fungus	29.428	Hedichcolum	34	Itybus	169	Lens palustris	331
Finum	124	Hediosmus	216	Intybum olus	159	Lenticula	140
G.		Hedipnois	232	Intibus	168	Lentiscus	43
Gagates	418	Hedysaron	273	Inturis	185	Leontopetalum	251
Galbanum	245	Helenium	31	Iouis glans	71	Leontopodium	349
Gale	105	Heliotropium	380	Ipio	175	Lepidium	93.186
Galiopsis	334	Helix	191	Iris	fol.1	Lepidium minus	93
Galerita	112	Helxine	330	Iris Africana	2	Leporina herba	298
Galion	335	Helxine maius et mi.	304	Iris illirica	eodem	Lepus marinus	102.429
Galla	71	Hemionitis	276	Iris Macedonica	2	Leucacantha.	206
Gallina	112	Hepatitis	306	Irinum spissamentum	33	Leucas	253
Gallus	112	Hepatorium	306	Isatis	193	Leucoium album	268
Garum	107	Heptaphyllon	306	Isopyrum	345	Leucoium luteum	267
Geminalis	273	Herba muralis	330	Iuglandes	87	Leucoium purpureū	267
Ge. ista	362	Herba sacra	314	Iuncus	350	Leucoium Theophr.	268
Genitale Cerui.	109	Hemerocallis	267	Iuncus odoratus	14	Leucomenides	107
Gentiana	196	Hemodactylus	319	Iuncus quadrangulus	5	Libanotis	240
Geranium	263	Hyacinthus	315	Iuncus rotundus	14	Libanotis coronaria	241
Gethium	171	Hyberis	186.93	Iuncus triangularis	5	Libysticum	225
Gingiberis	177	Hydropiper	177	Iuniperus	50	Lichen	310
Gingidium	163	Hieraceum	232	Iunonia rosa.	254	Lichenes equorum	111
Gith	242	Hyotianus	319	Ius Galli ueteris	107	Lychnis	353
Githago	243	Hypocoum	319	Ius piscium	107	Lycium	65
Gladiolus	298	Hypericum	285	Ixia	427	Lycostonum	325
Glans	70.352	Hippo	95	L.		Lycopsis	300
Glans Sardinia	71	Hippocampus	104.95	Labrusca	381	Lygos	67
Gans unguentaria	193	Hypocistis	62	Labrum Veneris	202	Ligusticum	224
Glastum	133	Hippoglossum	549	Lac. 117. Lac coagu.	428	Lingua bubula	348
Glastum sylvestre	193	Hippophaes	365	Lactuca	162	Lingua canina	348
Glaucium.	247	Hippophæstum	365	Lactuca excaulis siue		Lignum Indicum	63
Gleucium	34	Hippomarathrum	237	sefalis	162	Lignorum marcor	55
Glutinum	247	Hippolapathum	146	Lactuca laticaulis	163	Lignum Sanctum	63
Glutinum piscium	24	Hippopotamus	104	Lactuca sylvestris	163	Ligustrum	61
Gnaphalium	264	Hippocelinum	235	Lada	62	Lilium album	254
						L.	
						Lilium	



I N D E X.			
Lilium rubens	254	Melilotus	219
Lilium sylvestre	267	Melopepo	162
Limnæon	199	Memecylon	85
Limonium	297	Mendesium	35
Linoxosus	379	Mentha	215
Lysimachia purpurea et lutea	290	Meon	4
Lithargyros	403	Mercurialis	379
Lithospermou	279	Mespilus	82
Locuste	113	Metopium	35
Locusta marina	99	Meum	4
Lolium	135	Meum Athamanticū ibi.	
Lonchitis aspera	180	Metallica omnia	396
Lotus arbor	82	Myes	96
Lotus Aegyptia	343	Myagrū	344
Lotus sylvestris	342	Milium	133
Lotus urbana	341	Milium Indicum	134
Lucernula	257	Millefoliū Stratiotes	337
Lupinecur	111	Millepeda	109
Lupini	140	Mylocion	109
Lutra	104	Myrrha	37
M			
Macer	54	Myrrhis	347
Mala	78	Myrica	56
Malabathrinum	36	Myrobalanus	363
Malabathrum	10	Mirtus	76
Mala Cydonia	78	Misy	408
Mala Epirotica	78	Mituli	96
Malope	148	Mixa	243
Malua	147	Moly	223
Malua agrestis	281	Molybdena	402
Malum punicum	75	Morion Theophrasti	321
Meconium	427	Morum	89
Melheraclia	426	Morus	88
Mene	107	Mullus	103
Mandragoras	323, 427	Mulsū	385
Manna thuris	41	Murex	96
Marathrum	237	Muria	413
Marasit aris	417	Mus	116
Marina	390	Mus araneus	116
Marinus cehinus	94	Muscus	16
Marinus muscus	336	Muscus arborum	17
Marubialtrum	255	Mustela	105
Marrubium	256	Musteum	34
Marum	220	Mustum	385
Mastiche	44	N	
Medica	168, 80	Naphtha	48
Medium	298	Napus bunias	143
Megalinum	34	Narcaphtum	17
Mel	126	Narcissus	357
Melampyrum	344	Nardinum	34
Melanteria	418, 409	Nardum	6
Melanthium	242	Nardum Celticum	6
Melimela	76	Nardum Gallicum	7
Melissa	355	Nardus Germanica	211
		Nardum Indicum	6
		Nardum montanum	8
		Nardum Syriacum	6
		Nasturtium	173
		Nasturtium agreste	93
		Nastur. babylonici	175
		Nasturtiū orientale	175
		Nasturtiū sylvestre	174
		Nepetha	217
		Nerium	318
		Nitrum	413
		Nymphaea	273
		Notæ eorum qui à uenē natis demorsū sunt	415
		Nuces auellanae	
		Nux iuglans	87
		Nux picea	42
		Nux pinea	46
		Nux pini	42
		O	
		Ocimasitrum	301, 221
		Ocimoides	31
		Ocinum	166
		Odoratus iuncus	14
		Oenanthe	166
		Oenochora	344
		Oenomeli	385
		Oesipum	119
		Oleaster	86, 22
		Olcomel	24
		Oleum	21
		Oleum album	22
		Oleum Anethinum	31
		Oleum Amygdalinum	24
		Oleum Balamomum	25
		Oleum Cinamomum	35
		Oleum Cicinum oleū	24
		Oleum Cydoniorum	29
		Oleum Cyprinum	33
		Oleum Cnicum	25
		Oleum Crocinum	32
		Oleum cennanthinum	29
		Oleum Hyosciaminū	25
		Oleum Laurinum	26
		Oleum Lentiscinum	27
		Oleum lilinum	31
		Oleum Mastichinum	27
		Oleum melanth.	25
		Oleum Melinum	29
		Oleum metopium	24
		Oleum Myrteum	26
		Oleum narcissinum	32
		Oleum in nucibus	25
		Oleum Ociminum	30
		Oleum picatum	46
		Oleum Raphanicum	25
		Oleum Sampsuchinū	30
		Oleum Sesaminum	25
		Oleum sylvestris oliuæ	228
		Oleum Sinapis	250
		Oleum Suisinum	32
		Oleum Telsinum	30
		Olyra	131
		Omphacium	382
		Omphacinum oleum	28
		Onagra	344
		Onyx	96
		Ononide	205
		Onosma	273
		Opium	317
		Opobalsamum	16
		Opos Cyrenaicus	244
		Opos Medicus	244
		Oreoselinon	215
		Orchis	169
		Oriza	132
		Origanum	112
		Ornithogalum	167
		Orobanchæ	166
		Orobrychis	284
		Osiris	353
		Ossifragus	112
		Othonna	192
		Ouorū natura	112
		Oxalis	145
		Oxalme	389
		Oxiacantha	60
		Opylapathon	145
		Oxymeli	388
		Oxys	259
		Oxytriphylon	259
		P	
		Peonia form. et mæ.	278
			179
		Palimpissa	47
		Palurus	59
		Palma	73
		Palma elate	74
		Paludapium	233
		Palustris rana	429
		Panaces	223
		Panaces Asclepij	214
		Pancration	184
		Panicum	134
		Papauer Ceratites	318
		Papa. Cornicula.	327, 318
		Papauer erraticum	316
		Papauer satium	316
		Papyrus	56
		Pardalianches	525
		Paronichia	311
		Parthenium	277
		Pastinaca Gallica satia	225
		Pasti	

Pasti



I N D E X.			
<i>Pastinaca Gallica sylue-</i>		<i>Plantago minor</i>	164
<i>stris</i>	222	<i>Platanus</i>	52
<i>Pastinaca marina</i>	105	<i>Plumbago</i>	402
<i>Pastinaca vulgaris</i>	225	<i>Plumbum elotum</i>	401
<i>Pentaphyllon</i>	306	<i>Plumbum ulsum</i>	401
<i>Pelamides</i>	107	<i>Polemonia</i>	292
<i>Pelecinus</i>	273	<i>Policarpon</i>	269
<i>Pepo</i>	161	<i>Polycnemum</i>	251
<i>Peplis</i>	369	<i>Polycriton</i>	269
<i>Perdicia</i>	330	<i>Poligala</i>	351
<i>Peristereon</i>	303	<i>Polygonatum</i>	291
<i>Persea</i>	92	<i>Polygonum</i>	290
<i>Pes leporis</i>	298	<i>Politrychon Apulei</i>	351
<i>Persica</i>	80	<i>Polipodium</i>	377
<i>Petasites</i>	340	<i>Polium</i>	259
<i>Petroselinum</i>	233	<i>Poliam montanum</i>	287
<i>Picea</i>	42	<i>Pompholix</i>	397
<i>Picinum oleum</i>	46	<i>Pompilus</i>	107
<i>Pinorum cruce</i>	242	<i>Pomica nux</i>	88
<i>Peucedanum</i>	241	<i>Populus alba</i>	53
<i>Pienocomum</i>	373	<i>Populus nigra</i>	53
<i>Pinguedo</i>	120	<i>Porphyra</i>	95
<i>Pinus</i>	42	<i>Porruncapitatum</i>	169
<i>Piper</i>	176	<i>Porruncetium</i>	170
<i>Pyra</i>	81	<i>Portulaca</i>	151
<i>Pircthrum</i>	239	<i>Potamogeton</i>	337
<i>Pyrethrum Sylvestre</i>	239	<i>Poterium</i>	202
<i>Pissaphaltum</i>	48	<i>Prenestina nux</i>	68
<i>Pissanehum</i>	46	<i>Propolis</i>	127
<i>Pisselaon</i>	ibid.	<i>Propopion</i>	349
<i>Pistacia</i>	86	<i>Protropum uinum</i>	385
<i>Pistolochia</i>	195	<i>Prana sylvestria</i>	56
<i>Pitynum</i>	45	<i>Prunus</i>	84
<i>Pituisa</i>	375	<i>Pseudomelanchium</i>	243
<i>Pituitaria</i>	361	<i>Pseudodictamnium</i>	214
<i>Pix arida</i>	47	<i>Pseudonardus</i>	211
<i>Pix liquida</i>	49	<i>Psyllium</i>	319. 426
<i>Phalangium</i>	257	<i>Psittatia</i>	86
<i>Phalaris</i>	279	<i>Waga</i>	295
<i>Phaselus</i>	140	<i>Parmica</i>	178
<i>Philyra</i>	61	<i>Pulegium</i>	212
<i>Philirea</i>	ibid.	<i>Pulmones</i>	109
<i>Phyllitis</i>	257	<i>Pulmo marinus</i>	109
<i>Phyllum</i>	269	<i>Pulmo uulpis</i>	109
<i>Physema</i>	45	<i>Purpura</i>	35
<i>Phyteuma</i>	349	<i>Pumex</i>	411
<i>Phoenix</i>	307	<i>Pyrates</i>	417
<i>Phleos</i>	296		
<i>Phrycte</i>	45	<i>Quercula</i>	253
<i>Phu</i>	9	<i>Quercus</i>	70
<i>Pyrum sylvestre</i>	82		
<i>Pixiacantha</i>	66		
<i>Plantago aquatica</i>	284	<i>Rabiosi canis signa,</i>	
<i>Plantago Italica</i>	284	<i>demorforu ab eo</i>	434
<i>Plantago maior</i>	154	<i>Radicula</i>	178
		<i>Radix</i>	143
		<i>Rana</i>	106
		<i>Ranunculus</i>	137
		<i>Raphanus sylvestris</i>	144
		<i>Rapum</i>	141
		<i>Rapum sylvestre</i>	142
		<i>Remedia demorforu a ca</i>	
		<i>ne rabioso</i>	434
		<i>Remedia peculiaria uiru</i>	
		<i>lentorum ictu</i>	438
		<i>Refina abietina</i>	44
		<i>Refina Cyparissina</i>	45
		<i>Refina Laricea</i>	44
		<i>Refina lentiscina</i>	ibid.
		<i>Refina pinea</i>	45
		<i>Refina Strobilina</i>	45
		<i>Rhamnus</i>	58
		<i>Rhaponticum</i>	195
		<i>Rhodia radix</i>	307
		<i>Rhodaphne</i>	328
		<i>Rhododendrum ibidem</i>	
		<i>Rhus 71 Ricinus</i>	363
		<i>Robus</i>	123
		<i>Rosa</i>	64
		<i>Rosarum flos</i>	65
		<i>Rosei pastilli</i>	65
		<i>Rosa sylvestris</i>	61
		<i>Rosaceum</i>	28
		<i>Rosmarinus</i>	240
		<i>Rosmarinu coronat.</i>	240
		<i>Rotundus iuncus</i>	14
		<i>Rubeta</i>	280
		<i>Rubigo ferri</i>	401
		<i>Rumex</i>	405
		<i>Rubia</i>	429
		<i>Rubrica fabrilis</i>	407
		<i>Rubrica Synopica</i>	406
		<i>Rubus</i>	303
		<i>Rubus canis</i>	60
		<i>Rubus ldeus</i>	304
		<i>Ruscus</i>	354
		<i>Ruta</i>	221
			S
		<i>Sabina</i>	50
		<i>Sabinus</i>	372
		<i>Sagapenum</i>	244
		<i>Sal</i>	412
		<i>Salamandra</i>	114. 425
		<i>Salinaris</i>	239
		<i>Salix</i>	68
		<i>Salina</i>	214
		<i>Salugo piscium</i>	107
		<i>Sambucus</i>	371
		<i>Sansuchum</i>	219
		<i>Sandaracha</i>	410. 429
		<i>Sanguinaria</i>	290
		<i>Sanguis taurinus</i>	428
		<i>Sanguis</i>	123
		<i>Sarcocolla</i>	246
		<i>Sardonia herba</i>	426
		<i>Satyrinum</i>	270
		<i>Satyrinu basilicum mas</i>	
		<i>foemina</i>	270
		<i>Satureia</i>	218
		<i>Sauina</i>	50
		<i>Scamonia</i>	370
		<i>Scandix</i>	163
		<i>Schmides</i>	43
		<i>Scilla</i>	174
		<i>Scillinum acetum</i>	389
		<i>Scillinum uinum</i>	309
		<i>Schistus lapis</i>	90
		<i>Scincus</i>	115
		<i>Scholopendra</i>	101
		<i>Scordium</i>	260
		<i>Scorodoprasum</i>	172
		<i>Scorpena</i>	100
		<i>Scorpiurus</i>	380
		<i>Scorpio marinus</i>	100
		<i>Scorpio terrestris ibidem</i>	
		<i>Secale</i>	131
		<i>Securidaca</i>	273
		<i>Sedum</i>	332
		<i>Seminalis</i>	291
		<i>Semperuium</i>	332
		<i>Senecio</i>	335
		<i>Senecta anguim</i>	101
		<i>Sepia 103 Septs</i>	115
		<i>Scriphium</i>	210
		<i>Seris</i>	159
		<i>Serpillum</i>	218
		<i>Sertula Campana</i>	219
		<i>Sesama</i>	155
		<i>Sesamoides</i>	359
		<i>Seseli</i>	226
		<i>Selane</i>	107
		<i>Sieyonium</i>	22
		<i>Sycomor</i>	89
		<i>Sideritis</i>	303
		<i>Sil</i>	226
		<i>Silicula</i>	137
		<i>Siligo</i>	131
		<i>Siliqua</i>	137
		<i>Silique</i>	78
		<i>Silurus</i>	106
		<i>Simphytum</i>	294
		<i>Sinapi</i>	173
		<i>Sinapi Alexandrinum</i>	174
		<i>Sinapi Persicum</i>	174
		<i>Sylvestre nar dum</i>	8



# INDEX

<i>Sylvestris olea</i>	58	<i>Tbapla</i>	361	<i>Vina Tamariscina</i>	57	<i>Allium uersinum</i>	171
<i>Sylvestris ruta</i>	222	<i>Thymbra</i>	218	<i>Vininatura</i>	383	<i>Aloe Gallica</i>	197
<i>Sijer</i>	144	<i>Thymbrea</i>	156	<i>Viola alba</i>	167	<i>Altaraxacon</i>	232
<i>Sisymbrium</i>	155.215	<i>Thymelæa</i>	371	<i>Viola matronales</i>	268	<i>Ameos</i>	231
<i>Sisirinchion.</i>	183	<i>Thymoxalme</i>	389	<i>Viola purpurea</i>	345	<i>Amidum</i>	136
<i>Sison</i>	227	<i>Thymum</i>	217	<i>Vipera</i>	101	<i>Amigdala dulces</i>	85
<i>Smarides</i>	106	<i>Thlaspi maius</i>	174	<i>Viscum</i>	247	<i>Amomum semen</i>	227
<i>Smilax aspera</i>	353.	<i>Thrisi</i>	107	<i>Vitex</i>	67	<i>Anehan sylvestre</i>	4
<i>Smilax hortensis</i>	168	<i>Thus</i>	40	<i>Vitis alba</i>	376	<i>Angelica</i>	236
<i>Smilax levis</i>	353	<i>Thuris fuligo</i>	41	<i>Vitis nigra</i>	codem	<i>Anthera</i>	65
<i>Smyrnum</i>	235	<i>Tilia</i>	61	<i>Vitis sylvestris</i>	375	<i>Anth. monium</i>	402
<i>Solanum hortense</i>	321	<i>Tipha</i>	134.205	<i>Vitis uinifera.</i>	381	<i>Apium risus</i>	188
<i>Solanum Marinum</i>	32	<i>Tubimali</i>	366	<i>Viueria</i>	105	<i>Archangelica</i>	354
<i>Solanum somniferum</i>	322	<i>Toxicum</i>	427	<i>Vlmus</i>	54	<i>Aristolochia rotunda</i>	198
<i>Sonchus</i>	157	<i>Tragacantha</i>	206	<i>Vmbilicus ueneris</i>	333	<i>Arthanita</i>	179
<i>Sorba</i>	83	<i>Tragocentrum</i>	308	<i>Vnedo</i>	85	<i>Aleluya</i>	259
<i>Sori</i>	408.409	<i>Tragoriganum</i>	2.12	<i>Vnguentorū cōpositio</i>	27	<i>Amygdala amara</i>	85
<i>Sparganium</i>	299	<i>Trag. s. cerealis</i>	131	<i>Vnguis odoratus</i>	96	<i>Arcocus</i>	203
<i>Spartium</i>	362	<i>Tribulus terrestris</i>	296	<i>Voluta</i>	95	<i>Aspergula</i>	249
<i>Spina alba</i>	202	<i>quaticus</i>	296	<i>Vrccolaris</i>	330	<i>Asphodelus</i>	267
<i>Spina Arabica</i>	202	<i>Trichomanes</i>	351	<i>Vrina</i>	125	<i>Astrantia</i>	234
<i>Spodium</i>	399	<i>Trifolium</i>	358	<i>Vrtica</i>	333	B.	
<i>Spondylium</i>	241	<i>Trifolium album</i>	258	<i>Vua</i>	381	<i>Bacca lauri</i>	52
<i>Spongia</i>	4.6	<i>Trifolium luteum</i>	58	<i>Vua passa</i>	382	<i>Balsamine</i>	355
<i>Spuma maris</i>	415	<i>Trifolium purpureū</i>	258	<i>Vua Tamminia</i>	361	<i>Bardana</i>	540
<i>Spumeum papauer</i>	318	<i>Trimestre</i>	128	X.		<i>Benedicta</i>	512
<i>Stachys.</i>	257	<i>Tripolion</i>	350	<i>Xanthium</i>	361	<i>Been rubrum</i>	263
<i>Stafle</i>	35	<i>Trisago</i>	252	<i>Xylaloes</i>	17	<i>Beben album et rub.</i>	291
<i>Staphilodendros</i>	7	<i>Triticum</i>	128	<i>Xylobasamum</i>	16	<i>Berberis</i>	60
<i>Staphis agria</i>	360	<i>Triticum Gallicum</i>	228	<i>Xilocerata</i>	78	<i>Beta sylvestris</i>	195
<i>Storbe</i>	295	<i>Trixago palustris</i>	260	<i>Xiris</i>	299	<i>Bismalua</i>	281
<i>Stoechas</i>	2.11	<i>Troglodites</i>	63	Z.		<i>Bistorta</i>	290
<i>Stribium</i>	402	<i>Tomentum</i>	265	<i>Zea simplex</i>	130	<i>Blatte bysantie</i>	97
<i>Stipni</i>	402	<i>Tordylion</i>	227	<i>Zizipha</i>	248	<i>Borago</i>	348
<i>Styrax</i>	38	<i>Torpedo</i>	101	<i>Zythum</i>	130	<i>Branca ursina</i>	205
<i>Stratiotes</i>	337	<i>Tubera</i>	167	<i>Zomos</i>	107	<i>Bryonia</i>	376
<i>Strigmenta balnearum</i>	23	<i>Tussilago</i>	261	<i>Zopissa</i>	47	<i>Bruscus</i>	353
<i>Strobilus</i>	203	V.		<i>Appellationum quæ Offi-</i>		<i>Bugia</i>	60
<i>Sturio</i>	106	<i>Vaccinium</i>	315	<i>cinis et herbarijs in</i>		<i>Buglossa</i>	301
<i>Succinum</i>	54	<i>Variagenera uinorū</i>	390	<i>usu sunt, Index.</i>		<i>Buglossa Italica</i>	345
<i>Suillus talus</i>	213	391.353. 394.395.		A.		<i>Buglossa rubea</i>	390
<i>Sulphur</i>	411	<i>Venerca</i>	2	<i>Acacia</i>	66	<i>Bulbus esculentus</i>	182
T.		<i>Veratrum album</i>	356	<i>Accipitrina</i>	209	<i>Bursa pastoris</i>	309
<i>Thaliotrum</i>	336	<i>Veratrum nigrum</i>	358	<i>Acus muscata</i>	264	C.	
<i>Tamariz</i>	56	<i>Verbascum</i>	333	<i>Acus pastoris</i>	264	<i>Cacalia Italica</i>	346
<i>Taxus</i>	327.426	<i>Verabascum sylvest.</i>	338	<i>Acutella</i>	205	<i>Calamus aromaticus</i>	215
<i>Telephium</i>	193	<i>Verbenaca</i>	313	<i>Affodillus</i>	182	<i>Calcatrippa</i>	297
<i>Tellina</i>	96	<i>Verbenaca supina</i>	314	<i>Agnus castus</i>	67	<i>Camedreos</i>	252
<i>Terebinthus</i>	44	<i>Venenata</i>	430	<i>Agresta</i>	387	<i>Camomilla</i>	277
<i>Terra</i>	420	<i>Vermes terreni</i>	116	<i>Agrimonia</i>	305	<i>Caprifolium</i>	206
<i>Terrestris crocodilus</i>	15	<i>Vesicaria</i>	312	<i>Alquaquengi</i>	322	<i>Caput Monachi</i>	232
<i>Terrestris echinus</i>	94	<i>Vetonica</i>	289	<i>Alcea</i>	82	<i>Cardamomum maius</i>	6
<i>Testiculus</i>	269	<i>Vetonica altilis siue Coro</i>		<i>Alhermes</i>	508	<i>Cardamomum minus</i>	6
<i>Teucrion</i>	251	<i>varia</i>	289	<i>Allearia</i>	260	<i>Carpopatum</i>	201
<i>Thalassomeli.</i>	387	<i>Vidus rat. immorsu ca.</i>	435	<i>Allium porrum</i>	172	<i>Carduus benedictus</i>	251

Corpo



I N D E X			
Carpobalsamum	236	Enula campana	21
Carui	228	Epithimum	218, 34
Carthamus	279	Esula rotunda	369
Castia lignea	11	Euficus	258
Castoreum	104	F	
Castrangula	335	Fabalupina	278
Cataputia maior	369	Farfara	261
Cataputia minor	369	Febrifuga	200, 277
Cauda Equina	308	Fel terre	200
Caules	150	Feniculum Romanum	218
Celidonia	191	Foenum Burgundienfe	169
Centum capita	207	Foenum graecum	137
Cetuncularis herba	265	Ficaria	335
Centum nodia	291	Filipendula	266
Centunculum	265	Filius ante patrem	239
Cerefolium	164	Fistici	86
Cervi boleti	167	Fistulapistoris	202
Ceruisia	130	Flammula	186
Ceterach	275	Folium Indum	10
Christi manus	366	Fru mentum Saraceni	133
Christi palma	366	cum	133
Cicutaria	343	Fumus terrae	341
Cyclamen	179	G	
Cymbalaria	333	Galanga	3
Cinamomum	11	Gallitrichum	278
Citrageo	255	Gariophyllata	312
Citrullus	161	Genistella	362
Claretum	286	Grana myrti	76
Creta marina	156	Grana tinctorum	308
Colophonia	407	Granatum	75
Coloquintida	373	Granum paradisi	6
Colubrina	289	Guaiacum	63
Condifi	178	H	
Consolida maior	294	Halicacabus peregrinus	223
Consolida media	314	Hamel	223
Consolida regaf.	231	Hederalis	250
Corago	348	Hedera terrestris	347, 305
Corallina	336	Hepatica	311
Corrigiola	291	Herba fullonū	178
Costus amarus	14	Herba Roberti	264
Costus dulcis	14	Herba Symeonis	282
Cotula fatida	278, 336	Herba tunica	253
Cotula non fatida	178	Herbauenti	188
Crocus	29	Herba ungarica	282
Crocus hortensis	379	Hermodaftilus	329
Cucumer anguinus	336	Hydropiper	188
Cucumer asininus	360	Hippocraucum uiinum	386
Cucumeres	162	Hirundinaria	250
Curcuma	5	Hordeum mundatum	129
D		I	
Daucus Creticus	235	Iarus	181
Dens Leonis	232	Iecur lupi	111
Dentale	96	Illecebra minor	294
Digitalis	333	Imperatoria	236
Diptamus	213, 279	Indicum	293
Draco hortensis	178	Iris florentina	37
E		Iris Germanica	1
Ebur ustum	299	Iua arthetica	287
Ele ni	69	Iua non muscata	276
Endiua	263	Iuube	248
Entale	96	Iusquamum	319
		K	
		Karabe	34
		Keyri	268
		Kermes	308
		Kerua	366
		L	
		Lactuca leporina	193
		Lapatum acutum	145
		Lapis Armenus	405
		Lapis Calaminaris	397
		Lapis lazuli	405
		Lapis stellatus	405
		Lanceola	154
		Lappa	340
		Lappa minor	352
		Lauandula	211
		Laudanum	63
		Laureola	333
		Leetipes	251
		Lens aquatica	331
		Leo terrae	371
		Leporis pallatium	158
		Leuisticum	225
		Lignum aloes	17
		Lingua Ceruina	275
		Lignum sanctum	63
		Ilum couallium	347
		Linaria	353
		Linum syluestre	371
		Liquiritia	148
		Lumbrici	116
		Lunaria Italica	311
		M	
		Macis	34
		Magifrantia	234, 241
		Maiorana	219
		Maiorana Anglica	217
		Mala infana	325
		Maluaufcus	281
		Marrubium album	256
		Marrubium nigrū	255
		Mastichina herba	212
		Mastix	44
		Materfylvia	249, 296
		Matricaria	277
		Memithe	247
		Menta Romana	216
		Menta rubra	156
		Menta Saracenicā	216
		Mezereon	371
		Milium folis	279
		Mille morbia	335
		Millefolium	378
		Millefolium maius	303
		Myrabolani	363
		Mirobalanum	59
		Miralli	76
		Mirtus officinarum	79
		Mumia	47
		Muscus	17
		N	
		Nasturtium aquaticum	167
		Nenuphar	274
		Nigella Damascena	243
		Nigella Romana	248
		Nihil	399
		Nuces Cypressi	49
		Nux indica	87
		Nuxuomica	366
		O	
		Oculi populi	53
		Oleander	318
		Oleum ex scorpionibus	100
		Oleum de Alcantha	33
		Oleum ranarum	106
		Oliuella	371
		Orobium	248
		Ostrucium	234, 248
		P	
		Palma Christi	278
		Panis cuculi	259
		Papauer cornutū	318
		Papauer rubrum	317
		Parietaria	330
		Pallulae	382
		Pedicularis	361
		Perforata	369
		Persicaria	369
		Pes corui	186
		Pes uituli	181
		Pimpinella	234
		Pimpinellahirsuta	254
		Pineae	42
		Pyrethrum syluestre	178
		Pyrola	297
		Pistacia Germanica	86
		Phaseoli	168
		Phroditellorum	182
		Poma amurum	325
		Pomum spinosum	323
		Populgo	261
		Prallium album	256
		Primula ueris	333
		Protentilla	188
		Prunella	294
		Pruna Damascena	84
		Pulegium montanum	251
		Pulmonaria	312
		Pulmo uulpis	109
		Q	
		Quinq; folium	106
		Quinq; neruia	254
		R	
		Raphanus	142







[illegible]



# INDEX

Miel	126	Panis	134	Raine	106	Vermillon	429
Migraine	75	Parietaire	330	Rassafa	100	Viraire noir	359
Millefeule	338	Pasiflores	188	Rassel	269	Viratre blanc	356
Millefeule grande	303	Pas d'afne	261	Raue de lymofin	143	Violette girofflees	268
Millepertuis	285	Pastel delanguedoc	193	Raue de fauoye	144	Veruust	362
Millet	133	Pate de Lyon	251	Reclisse	198	Verbene	33
Mirabile pomum	313	Patellum	220	Refort	144	Vertentroyt.	9
Miraine	263	Pauoit	317	Regalisse	198	Veruaine	9
Mirafole	366	Penofne	279	Reftinge	34	Vineale reuelium	366
Myrrhe	37	Perce pierre	375	Reupontic	199	Viroire	241
Moelle	123	Peret	197	Ris	151	Violette	348
Morgelina	190	Perroquet	208	Rofin	382	Y.	
Mariolaine	219	Perfil	233	Rofins encabatx	382	Xff.abre	327. 416
Moronuolat	350	Perfil	543	Rouce	156	Germanicarum uocum	
Mostarde	373	Peruena	292	Roquette	165	Index.	
Mouron	331	Petit lyferon	codem	Rofagine	328	21.	
Moufferon	329	Petit muguet	535	Rofeau	56	Abetknobloch	172
Muguet	346	Petit chefine	252	Rofes	65	Abrahams baum	67
Mufculi	96	Peuplier.	53	Rofes doultre mer	148	Acker wurzel	3
		Pied de lieure	298	Rofmarin	241	Affolter	248. 71
N.		Pilolet	219	Rofmarinum aculeatum		Aigrefe	383
Nauveau	142	Pymen	263	57		Aigremonten	305
Nenuphar iaune et blanc	274	Pin abre	42	Rouge lif.	254	Alhorn	52
Neprun	58	Pinus aquatica	291	Ruilleure de fer	401	Alant wurzel	21
Nefflier	82	Pifacerra	138	Rue fauuage	223	Alber baum	53
Nigelle poiurette	243	Plaine	52	Rumpe pierre	375	Alepatie	208
Nobilis	109	Plantain	155	S.		Alcesholz	17
Nobilis cruca	175	Poire	82	Saffran	20	Altraun	325
Noyette	88	Poirier	82	Saffran bafard	379	Ammel kom	129
Noy de cypres	49	Pois Ciches	138	Saluunca	8	Anlung	136
Noix de galle	72	Poiurette	243	Sauterelles	112	Amney famen	231
		Polypode	378	Sanuas blanche		Ancken	138
		Poma amorum	325	Saponalis	295	Andorn	256
O.		Pome	80	Sarrieta	218	Angelie	216
Orebanete	300	Pomes de pin	42	Sarrea	218	Anfis	228
Oculus catti	350	Pomier	80	Sauier	51	Apfel baum	80
Ocyelles	289	Pomier de granade	75	Saulge	215. 68	Aeben	42
Oignon	171	Poniceade	258	Sauiniera	51	Aelesbet	83
Oygnon marin	184	Porcelles	152	Secur geon	129	Aefch baum	53
Oliuier fauuage	69	Porrette rouge	147	Scorpena	100	Aefch lauch	171
Orryile dafne	294	Porreta	171	Secur geon	129	Aefch reflin	83
Oreng	81	Potiron	329	Semen	130	Aetrich	372
Orge	129	Pouliot	213	Senecon	137	Anrum	200
Origan	212	Pourcourcau	311	Senegreue	137	R.	
Orme	55	Pouliot fauuage	217	Senec	173	Bach muntz	216
Ortia grefche au piequ		Pourpier	153	T.		Bach pungen	190
te	354	Prunc	84	Tora	25. 325	Balfam trauc	215. 156
Ortiesmortes	534	Prunier	codem	Tamaris	57	Balfam muntz	216
Oruale	273	Pudis	44	Teftic de artichault	203	Bapp	247
		Punaifes	107	Truffla	167	Bappen	131
P.				V.		Bauch weiffen	166
Pain de porceau	179	Q.		Vid dechien	181	Baum ephew	192
Paffure de chameaulx	14	Quinte feule	306	Vigne	381	Baum el	21
Pampalus	117	R.		Vigne blanche	376	Baurren epfich	235
Papauer culum	351	Raffle	174	Vigne fauuage	375	Baurren fenff	174



		Register.			
Beytweel	294	brennender hanen füß	187	Eber wurg	201
Benedicten rosen	279	biennend nessel	334	Entian	197
Benedicten wurzel	312	breyde bletterte wolffs	368	Eren preiß	252.289
Beningen rosen	279	breyde saur ampfer	145	Eyden baum	327
Beer wurg	4	breyde wegrich	155	Eychbaum	71
Beyfuß	261	bromber stud	303	Eichfarren	378
Beren milch	368	briusch	355	Eydechs	115
Beren rappen	205	brust wurg	236	Eysen hart	313
Berg blae	405	buch ampfer	259	Eysen heutte	326
Berg geel	405	büchs baum	71	Eysen kraut	313
Berg minz	216	bucholter	340	Eysen rost	401
Bertram	239	buckhart	148	Elg	209
Besam kraut	174	burgundisch gras	169	Endich	209
Betonien	289	burgundisch hew	169	Endimen	163
Bett	127	burgel kraut	151	Engel sueß	378
Bertlers leug	352	burgelen	152	Eniß	228
Bibenel	234	C		Esch	233
Biber	104	Calmus wurzel	15	Ephew	191
Biber hddlin	192	Caminals hew	14	Ephew on frucht	191
Bier	230	Camillen	277	Eppen	233
Bilsen kraut	319	Capaunen	112	Erbfelen ber	60
Bympernuslin	87	Cardamomlin	6	Erdapfel	139
Bengel kraut	380	Carden benedicten	251	Erduß	167.373
Bynfang	334	Castani	71	Erdpfeimmen	362
Eintran	310	Ceder baum	51	Erdmosen	314
Eyrbaum	82	Chustian wurg	314	Erdrauch	341
Bitter aloes	208	Christ wurg	357	Erd galien	200
Bitter wurg	197	Citraun	80	Esel	109
Blater holz	19	Confolen	314	Ezels hüb	261
Bley	401	Cornelbaum	83	F	
Bley weyß	404	Costenz	212	Farren	377
Blicken	130	Creuzbaum	366	Felrß	282
Blaer augentrost	349	Creuz wurg	336	Fendel	237
Blae violen	346	Cucumeren	162	Fenigreck	137
Blumle von der lieb	312	Cypressen	49	Ferb beer	58
Blüts tröpfle	253	Cypressen nuß	49	Ferb köner	58
Blütwurz	264	Cypressen wolffs milch	368	Feygen	91
Bobzellen	322	D		Feygenbaum	91
Bockes bare	167	Dann hartz	45	Onzeyreig feygen	92
Büchbaum	137	Dannen schwam	195	Feygwargen kraut	192
Bollen	171	Dattel baum	74	Feyß	122
Bonen	139	Dauben tropff	293	Ferber rott	280
borres	405	Dech	402	Fertigfeyt	122
borretsch	348	Deymment	215	Ficht dannen	42
brachen dystel	207	Den gras	291	Finger hüt	39
brande schlang	101	Dennmarck	9	Fisch minz	216
brande lartich	261	Dyll	229	Fisch köner	197
brown betonien	289	Dyrtel Eolben	265	flachs	137
brown fleischblumē	259	Dollkraut	324	flachs kraut	353
brun kressig	156	Döbner eglin	253	flader	372
brun leber kraut	311	Dör	46	fliegen schwamm	329
brunnellen	294	Drauchen wenzel	3	floch kraut	269
brauner Wyfen klee	259	Düffe wurg	335	flor	379
braun violen	263	Dürr wurg	267	floramor	312
braun weydrich	290			forhen	42
bren stein	54			franzosen holz	20
brunwurg	335				
				Frauen dystel	203
				Frauen har	351
				Frauen münz	215
				Frauen röplin	336
				Frembde heydelber	76
				Frembder peterfilien	106
				Frosch	188
				Froschpfeffer	134
				Fuchs schwanz	306
				Funff finger kraut	129
				Fütter gerst	129
				G	
				Galgant wurzel	15
				Gall dyfel	72
				galmei	397
				gamander	258
				garben	339
				garten hyfop	218
				gans blüm	93
				gauch brot	167.269
				gaucheyl	190
				Gauch klee	256
				Gefulten hanen füß	283
				Gefulten violen	346
				Gehöflere ghlayßblü	183
				men	399
				Gebrant arz	54
				Gelb agstein	318
				gelb magfamen	167
				geel Camillen	3
				geel Schwertel	5
				geel wasser liliē	259
				geel weyßen klee	47
				geygen hartz	147
				geitlin	216
				gelbmosen	318
				gelblungen	263
				gelb violen	183
				gelb violen	290
				gelbwald henle	
				gelb weydrich	
				gemöß von baumen	
				groß ampfer	290
				gens bappel	148
				gens distel	158
				genserich	189
				gerolte gersien	129
				grint wurg	210
				gerrel	338.303
				gersien	129
				gesotten hartz	47



# Register.

Gesotten most	385	Hart ham	235	Hundts zung	348	Klein bathengel/weib	
Grackel güt	408	Hartriegel	67	Huff laticch	361	le	303
Grichtwurz	279	Hase	102			Klein bibinel	353
Gilgen	254	Hasen pfötlin	298	J.		Klein blae schwer	
Gilgen Confort		Hatstrang	242			tel	299
	296	Hatwurz	274	Je lenger te lieber		Klein demmarck	9
Gyrgelen	144	Hatz vomn sichten			287 129	Klein epphew	191
Glasß kraut	330		45	Je lenger selieber/		Kleiner hanen füß	
Glasen	316	Hatz von forhen	ibid.	weible	359		188
Gleit	404	Hatz von lerdan		Tigel	95	Klein gest	129
Gleyßblümen	156	nen	ibid.	Tisch	281	Klein hauss wurz	
Glidkraut	303	Hatz vomn dirlin		Tüen	55		332
Glozier	44	baum	ibid.	Tütis	105	Klein hanßwurz weib	
Goltblüm	277	Hartkraut	353	Indianisch Fom		le	309
Golt grundt	247	Hasen ampffer	350		134	Klein meer oder meuß	
Goltwurz	267	Hafel nuss	88	Indich	195	zwibel	185
Gortzen	162	Hafel wurz	9	Indich blae	405	Klein meger kraut	
Gorts gnad	264	Haw hechel	206	Jugher	177		345
Gorts vergess	256	Haut blat	356	Jugrün	292	Klein streich blümen	
Granaten öpfel		Haus	247	Italianisch steyn			362
Graß neglin	299	Hausen blasen	247	Flee	210	Klein vergiß mein	
Grawer augsteyn		Hauswurz	332	Juden apfel	80	nit	349
	397	hechel	95	Juden döcklin	322	Kletten	340
Griechisch bech	47	heyd	57	Juden kirschen	322	Kloster hysep	211
Griess	132	heydelbeer	76	Jundheren gräße	303	Knösler	114
Grielen	109	heyden Fom	166			Knobloch	172
Größt wolffsmilch	368	heyderich	144	A.		Knoblochs kraut	260
Gronfel	152	heydnisch lilien	267	Käß lupp	102 180	Kockel Fern	167 373
Groß Baldrian	9	heßfiant beyrn	113	Kapperen	185	Köl	150
Groß Bathengel		heyligen Geysts	336	Kapperen rosen	316	Korn rosen	316
	252	heylig Creutz holz	17	Kanten kraut	291	Kraen füß	157 264
Großepph	235		109	Karten distel	202	Krafft meel	136
Groß figwarzen		heymichen	330	Kappes kraut	150	Krauff balsam	216
kraut	335	herbst blüm	148	Kay	106	Krimmer beer	50
Groß galgant wur		herbst rosen	216	Kagen Flee	298	Krandy hals	264
gel	3	herz kraut	213	Kagen kraut	9	Krauff deiment	215
Groß garben kraut	303	herz polcy	112	Kagen münz	217	Kressen	174
Groß Waternwurz		heuschreck	132	Kagen sper	206	Kreusbeer	59
	181	himel brot	2	Kagen treublin	309	Kreuzwurz	197
Grög	166	himel schwertel	304	Kagen wadel	291	Krieden	84
Gundelreb	305	hyntperen	133	Kelber kernen	192	Kriess	131
Güt heymrich	149	kirschen	167	Kellers halß	371	Kron englin	368
Grundtheyl	289	kirs brust	114	Kerbel kraut	164	Krott	106
Grundt reben	437	kirs horn	375	Kerfel	164	Krotten dil	336
	305	hohe steinbrech	282	Kerngert	61	Krotten flachs	353
Guldin gunfel	314	hochleuchten	377	Kergen kraut	339	Krotten kraut	263
Guldin widertodt		hohe farzen	372	Resten	71	Krow aug	278
	351	holder	382	Kensch baum	67	Krow dill	ibid.
H.		holz trauben	114	Kicheren	138	Krow radt	285
Haber biez	132	holzwurm	126	Kicher erbes	138	Krow weyssen	136
Haber müß	132	honig	386	Kym	120	Kurbiß	160
Habich kraut	232	honig wasser	179	Kinder bapp	131	Küniglin	102
Habich samen	210	hindisch kraut	331	Kirch hysep	211	Kuchen schell	188
Hacker kraut	188	hüner darm	219	Kirschen	77	Kupffer schlag	398
Hamel Fom	131	hüner föl	331	Kirschbaum	ibid.	Kupfferstein	399
Hamer schlag	399	hündts boden	330	Kleb kraut	249	Kupffer wasser	407
Hannen	112	hündts färbslin	360	Klein Baldrian	9	Kurberbaum	89
Hanff	282			Klein basilien	220		21
Han	112			Klein bathengel	353		
Hanbutten	61						



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1784/D/2



Register:

Saur flec	259	Spanisch grün	ibid.	Türkisch köm	134	Wegweyß	ibid.
Sau wurz	335	Specklilien	296	Tutia	397	Wecher beer	58
Schaffs müle	67	Speyerling	83	V.		Wecholter	50
Schaffthaw	308	Spicant	281	Vebedistel	203	Weyd	193
Schaffrip	388	Spicken narden	7	Veel wurz	200.	Weydblac	405
Scharbachs kraut	303	Spiegel hartz	47	Veld saffran	937	Winden	305 68
Scharlach	273	Spieß ampffer	146	Veld kircher galgant	5	Weinbeer	382
Scharlach beer	308	Spieß glas	402	Veld mören	238	Wein leglin	60
Scharlach blumen	277	Spinn	115	Veld neglin	255	Wein rauten	163 222
Scharck kraut	264. 277	Spiz kletten	152	Venedische Rosen	279	Wein reben	381
Scheltwurz	191	Spiz münz	516	Venedischer Terpens		Weintraub	182
Schiff bech	46	Spiz wegerich	155	tin	45	Weirauch	40
Schifer grien	405	Spör biren	83	Verbrüet küchlin	342	Weinstock	381
Scheiß kraut	380	Splyspettel	293	Vitriol	407	Weyssen	128
Schiffmalter	148	Springende kurbas		Olmer baum	55	Weyssen byer	130
Scheiß milten	380	lin	360	Vnck	101	Weyssen kolt	129
Schlacken	401	Spring kömer	369	Vngwaschen wolke	119	Weiß agsteyn	57
Scaphoni	369	Stall kraut	260	Vnholden kerg	339	Weiß buck	261
Schlaff beerlin	322	Staphis kömer	361	Vorschutz	385	Weiß dipran	279
Schlaff kraut	324	Stechende günst	362	Vorstos	127	Weiß fleisch blumen	
Schlangen balck	101	Stechede palme	355 71	Vns. frauen berstro	335		259
Schlehe dorn	204	Steinfarn	281	Vnser frauen hendt		Weiß haber	132
Schlotten	322	Steinkressen	92	schuch	221	Weiß heyderich	149
Schoßwurz	210	Stein leber kraut	311	Vnser frau münzt	216	Weißer senff	165
Schmalz	122	Stendel kraut	270	Vns. frauen trähen	270	Weiß heyderich	146
Schmalz blüm	313	Streck kraut	350	Vogels kraut	331	Weiß hirtz wurz	236
Schmerwurz	294. 376	Steen kraut	345	Vogel leim	248	Weiß lilien	354
Schmurg wullen	119	Stein kraut	351	Vogels nestier	216 238	Weißnessel	334
Schnecken	98	Stinckend camille	336	Vogels wicken	169	Weiß pfeffer	176
Schwaden	132	Seid	06	W.		Weiß nieß wurz	557
Schwalb	113	Streich kraut	150	Wachs	127	Weiß steynbrech	378
Schwalben wurz	251	Storck schnabel	264	Wald knobloch	172	Weisse violen	268
Schwam	329	Strassburger negle	268	Walhen distel	207	Weiß wald henle	180
Schwarz andorn	235	Strauch	61	Wald lilien	296	Weiß wurz	293
Schwarzbrüst berle		Streich blumen	277	Wald mangolt	297	Welsch beer klaw	105
	243	Streyt	291	Walde mangolt mit		Wesch himpernüss	
Schwarz haber	132	Strobild dorn	203	blaen blümlin	193	lin	86
Schwarz hirtz wurz	240	Süßholz	198	Wald lerd	112	Welsche bonent	168
Schwarz kappen	281	Summer gerst	129	Wald meyster	249	Welscher silb samē	120
Schwarz pfeffer	176	T.		Wald menle	ibid.	Welsch heydel beer	76
Schwarz kömisch	005	Tag vnd nacht	330	Wald reben	291	Welsch kirsē	35
ander	243	Tamarinden	74	Walwurtz	294	Welschnessel	334
Schwarz wurz	394	Tamariscen	57	Wand leuß kraut	299	Welsch schluten	323
Schweins brot	373 179	Tamariscen wein	ibi.	Wangen	108	Welscher steynbrech	
Seckel kraut	309	Tauben süß	188	Wangz kraut	256 216		35
Seeb lumen gelb vnd		Tawb korn	307	Wasser bateng	260	Welsch steyn klee	220
weiß	274	Tawbnessel	334	Wasser eppich	235	Welscher weyssen	129
Seehalden	337	Tawb pfeffer	176	Wasser banen süß	186	Wellstro	339
Seyffen kraut	178	Tausent guldin		Wasser kressen	156	Wermut	209
Senff	172	kraut	200	Wasser linsen	331	Wergstein kraut	206
Sejel	226	Tausent schön	312	Wasser merck	235	Wick dorn	61
Seuen baum	51	Terpentin	44	Wasser nüglin	297	Widerstos	293
Seuen palmen	ibid.	Teschel kraut	309	Wasser pfeffer	177	Wild Calmus	6
Sewbrot	378 179	Thierlin baum	83	Wasser pungen	190	Wilder ölbaum	69
Siben gezezt	259 342	Tiriaks kraut	9	Weber karten	202	Wilder fenchel	218
Sigmars wurz	282	Todten violen	292	Weg distel	200	Wild burck hart	148
Simons wurtzel	ibi.	Tormentil	306	Weg dritt	291	Wild galgant	5
Sonnenwendende wolf		Trauben kraut	262	Weg dorn	297	Wilder hanff	282
milch	368	Treib kömer	369	Weg gras	291	Wilder hasen köl	158
Spangrün	401	Tüncel	130	Weg wart	159	Wilder kerfel	342

Wilt



Register.					
wild f3l	146	wild münz	216	wild salbey	27
wild f3rbslin	360	wild neglin	253	wild senff kraut	146
wild ereffen	93	wild pasteney	226	wild vnzgepflantz rez	
wild moen	316	wilder poley	217	ben	381
wild moeren	164	wilde raut	232	wild wicken	169
wilde mylten	380	wild saffran	379	wilder zitwen	376
			330	winterg: lin	297
				wibel doli	251
				wifel	109
				wisen fumel	228
				wisen wollen	263
				wolffe ben	326

## PEDANII DIOSCORIDIS ANAZARBEI DE

MEDICINALI MATERIA LIBRI PRIMI PRAEFATIO, IO-  
anne Ruellio Sueffionensi interprete.



VANQVAM amicissimè Aree, complures non ueterum modò,  
sed recentiorum quoq; de medicamentorum compositione, uiribus  
atque probatione commentati sunt: nobis tamen nec uanum, nec à  
ratione abhorrentem impetum animi ad hoc opus incessisse, tibi  
ostenderentabimus: quòd eorum nonnulli absolutum nihil ædi-  
derunt, aliq; quàm plurima, quæ auditu percunctando didicerant,  
scriptis tradiderunt. Siquidem Bithynus Iolas & Heraclides Ta-  
rentinus, omissa prorsus herbarum tractatione, rem sane quàm pau-  
cis perstrinxerunt. Neq; uerò omnes illi de metallicis quicquàm re-  
bus aut odorientis memoriæ prodiderunt. Crateus autem herbarius, & Andreas me-  
dicus, qui cæteris diligentius hac in parte uersati uidentur, radices multas apprime uti-  
leis, herbasq; haudquaquam adnotatas, reliquerunt. Veruntamen priscorum subscribe  
re oportet sententijs: quos, etsi pauca ipsis referantur accepta, magnam tamen impendisse  
diligentiam constat. Iunioribus minus assentiendum: è quibus Iulius Cassus, & Nicera-  
tus, & Petronius Niger, & Diodotus, Asclepiadæ omnes, medicinalem materiam uerna-  
culam cognitamq; uulgo, dignam censuerunt quæ ab ipsis literis exactè mandaretur: &  
medicamentorum uires probatèq; cursim complexi, sic nullo experimento eorum esse  
ctus colligentes, inani uerò reddendarum causarum studio uerba fundentes, alia pro alijs  
scriptitando, rem in acruum congeriemq; controuersiarum extulerunt. Siquidem qui in-  
ter eos egregius habetur Niger, euphorbium, nascentis in Italia, chamelææ succum esse cõ-  
tendit: androsæmonq; eandem herbam cum hyperico esse. quinetiam aloën in Iudæa fos-  
silem nasci, & pleraq; his similia exponit, reclamante euidencia, quæ prorsus ueritati re-  
frangantur. Quibus coniectura colligi potest, ea, non oculata fide, sed narratione potius  
ab alijs accepisse. In ordine iisdem ipsi aberrarunt, partim eorum discrepantibus nullaq; co-  
gnatione coniunctas uireis collidentes: partim per elementa literarum scripta in ordi-  
nem digerentes, quòd facilius memoriæ mandarentur, genera & eorum effectus à sua cog-  
nitione diiungentes. Nos uerò ab ineunte, ut ita dicam, iuuenta, iugi desiderio cognoscen-  
dæ materiæ allecti, permultis regionibus peragratis (nec enim nescis nos militarem ui-  
tam exegisse) tuo hortatu commentationem in sex libros contulimus. quod opus tibi dica-  
mus, Aree, animi gratitudine obsequentes, ob eum quonos prosequeris affectum. Etenim  
natura cum in omneis eruditione excultos, tum uerò in eos quibus cum tibi eiusdem artis  
necessitudo intercedit, pronus ad amicitiam esse soles: in nos etiam aliquanto peculiaris.  
Enimuero non paruum præbet tuæ probitatis argumentum, optimi uiri Licinij Bassi sin-  
gularis erga te amicitia: quam unà nobiscum degentes nouimus, cum mutua inter uos be-  
neuolentiam æmulatione dignam intueremur. Admonitum autem te uelim, eosq; qui in  
hocce commentarios incident, ne in uerbis facultatem nostram æstimeris, sed potius adhi-  
bitam rebus cum periticia curam. Etenim plurima uisu ipsi exactissimè cognouimus: quæ  
dam etiam ex ea, de qua inter omnes conuenit, historia, percunctationeq; rerum apud sin-  
gulos uernacularum diligenter accepimus. Dabimus igitur operam, ut differenti ab alijs  
ordine tradito, genera medicinarum uiresq; describantur. Quòd autem necessaria sit me-  
dicamentorum ratio, nemo est fermè qui ignoret. quòd ea & toti coniuncta sit, uniuersisq;  
eius



P R A E F A T I O.

eius partibus efficax administret auxilium. Quare per medicamentorum compositiones atq; misturas, & facta in morbis pericula extendi, & incrementum capessere potest, quam plurimum conferente singulorum medicaminum cognitione. Quinetiam uernaculam familiaremq; materiam complectemur, ut perfecta sit quæ à nobis relinquetur doctrina. Verum imprimis curam impendere oportet, ut suis temporibus singula & demetantur & recodantur. certè pro horum ratione aut ualent uiribus, aut euahido nulloq; munere funguntur. Serena igitur cœli constitutione demetenda sunt. Magni siquidē refert inter colligendum, si uel squalores uel imbres infesti sint: quemadmodum si loca, in quibus prodeunt, cliuosa, & uentis exposita sint & perflata, frigidaq; & aquis carentia: in his enim locis uires eorum longè ualidiores intelliguntur. Contrà, quæ in campestribus, riguis, & opacis, cæterisq; locis à uento silentibus enascuntur, plerumque degenerant, & minus uiribus ualent: multoq; magis, si non suo tempore nec oportune colligantur, aut si per imbecillitatem intabuerint. Neq; ignorandum, sæpe pro peculiari loci natura, aut anni clementia, maturius aut serius adollescere. Nonnulla propria ui, hyeme florent & folia pariunt: quædam bis anno florifera. Quare cui in animo est horum peritiam assequi, necesse est eum prima germinatione solo emergentibus, adultis & senescentibus, adesse. Nam qui pullulanti herbæ duntaxat adstiterit, adultam cognoscere non potest. neq; qui adultam tantum inspexerit, nuper erumpentem noscet. Quo fit, ut propter mutuatam foliorum faciem, caulium proceritates, florum seminisq; magnitudinem, & id genus alias peculiares notas, nonnulli qui olim has rerum uarietates non perspexerunt, magno in errore uersentur. Quæ causa etiam nonnullis scriptoribus imposuit, qui herbas quasdam, uerbi gratia, gramen, quinquifolium, & tussilaginem emittere florem, fructum & caulem, negant. Ergo qui sæpius ad uisendas herbas & earum natales se contulerit, earum cognitionem maximè consequetur. Scire etiamnum conuenit, sola ex herbaceis medicaminibus ueratri genera, nigrum, inquam, & candidum multis edurare annis: reliqua à trimatu inutilia. Quæ uerò fruticosa sunt, si cutitæ chas, trixago, polium, abrotonum, seriphum, absinthium, hyssopum, & alia id genus semine prægnantia demetantur. flores quoq; antea, quam sponte sua decendant: fructus autem, ut maturi decerpantur necesse est: & semina, ubi siccari cœperint, priusquam defluant. Herbarum succus & foliorum elici debet, germinantibus tum primum cauliculis. Lac & lachrymæ excipiantur, inciso per summum adolescentiæ uigorem caule. Radices, & liquamenta, corticesue ut recondantur, eximere conuenit cum herbæ suis folijs exuuntur. Siccantur etiam expurgatæ inibi, locis asperginem non redolentibus: sed quæ luto aut puluere sunt obsitæ, aqua elui debent. Flores & omnia qua iucundum odorem efflant, arculis tiliaceis, nullo situ obductis, reponantur. Nonnunquam charta aut folijs semina, ut perennent, aptè inuoluuntur. Liquidis medicaminibus densior materia, argentea, uitreæ, aut corneæ conuenit. Fictilis etiam, si modò rara non sit, accommodatur: & lignea, præsertim è buxo: sed ænea uasa ocularijs medicamentis liquidisq; & omnibusijs quæ a ceto, pice liquida, aut cedria componuntur. Adipem autem & medullas stagneis uasis recondi conuenit,



# PEDANII DIOSCO

RIDIS ANAZARBEI DE MEDICINALI MA-

TERIA LIBER PRIMVS, IOANNE RVELLIO SVESSIONENSI IN-  
terprete. Singulis stygium historijs, uiuis & ad naturæ æmulationem expressis  
imaginibus seu picturis adiectis: ut ea quæ nudis uerbis exponit historia,  
rectius exprimeret, atq; adeò altius animo infigeret artificiosa pictura.

Additis etiam annotationibus breuissimis quidem, quæ tamen  
omnem controuersiam de medicinali materia facillè tol-  
lunt. Ex doctissimorum uiroꝝ lucubrationibus  
summo studio concinnatæ.

IRIS.

CAPVT I.

Iris Florentina.

Iris Germanica.



**I**RIS à cœlestis arcus similitudine nomen accepit. Folia fert gladio-  
li, sed maiora, latiora, & pinguiora. \*Flores à caule æqualibus inter  
se spacijs distant uarij: siquidem candidi, pallentes, lutei, purpurei, \*Alij legunt  
Flores altera  
aut cœrulei conspiciuntur. quæ diuersi coloris specie, quædam cœle- nis semper  
cauliculis in  
flexi.  
stis arcus imago representari uidetur. Radices subiacent genicula-  
ta, duræ, odoratæ: quæ frustatim dissectæ, in umbra siccantur, & traiectæ lino re-  
conduntur. Melior est Illyrica, & Macedonica: & inter has latissima, quæ pumila

A



## DIOSCORIDIS

\* *alijs feruido*

ferè & densa cōstat radice, frangenti contumax, subrufo colore, gustu amaro\*, odore perquàm sincero, ita ut nullum prorsus situm redoleat. quæ dum tunditur, sternutamenta mouet. Secundum locū habet Africana, candida, gustuq; amara. Teredines in uetustate sentiunt, tunc tamē odoratiores reddi solent. Vis omnibus excafactoria, extenuans, contra tussim efficax. humorum qui agrè reijciuntur crassitiem digerunt. bilem crassamq; pituitam ex hydromelite drachmis septem epotæ purgant. somnum conciliant. lachrymas ciunt. torminibus medentur. Eodem potæ ex aceto auxiliantur serpentium ictibus, lienosis, conuulsis, perfrictionibus, horroribus, & qbus genitura effluit. menses ex uino potæ pellunt. Decoctum earū, scēminarum fotibus utiliter imponitur, ad emolliendos locos, laxandaq; in eis uenarum spiracula. ischiadicis infunditur. fistulas acinus carne expler. Radices ex melle glandis modo subditæ, partus extrahunt. quin etiam coctæ & illitæ, strumas, ueteresq; duritias emolliunt. Sicce quoq; ulcera replent, & cum melle purgant. nudata ossa corpore operiunt. doloribus capitis, cum aceto et rosaceo magna utilitate illinuntur. Admotæ cum albo ueratro & duabus mellis partibus, lentigines & uitia cutis in facie à sole contracta emaculat. pessis, malagmatis, & acopis inseruntur. In uniuersum, magni ad omnia usus.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

**IPIΣ** Græcis. Latinis Iris. Germanis himelschwertel & Violwurty. Gallis des flambes, à foliorum similitudine, quæ flamma linguas referunt, dicta. Quinetiam nonnulli gladiolum appellauerunt eadem ratione: unde in quibusdam Gallie partibus nomen adhuc retinet: uocant enim du glaiz. Officinis proprium nomen retinuit.

**Galen. lib. 1.** Iridis radix laudatior parua, densa, frangi contumax, subruffa, amara, sternutamenta dum tunditur ciens, odorata qualis ex illiride mediterranea Dioscoridi, Galeno, ceteris omnibus prædicatur: ob id eam illiridem uocare consuevit Andromachus. Elige autem in illirica genere odoratiorem: nam **Gal. lib. 6. et** unumquodq; est præstantissimum, quod generis sui odorem habet ualentissimum. Iris autem quæ ex **9. cap. ph. p.** Libya magna Romam affertur, tantum ab illirica differt quantum corpus mortuum à uiuo. Quæ autem **Gal. lib. 1. an** tem in alijs regionibus crescit, non ita multum deficit: unde Iris Gallica alba purgata usurpatur **lib. 8. tidotorum. comp. phar. part.** & hodie passim pro illirica, Florentina nobis obtruditur. **Lib. 9. cap.** Iris coquit, tenuat, calfacit, pituitam crassam & bilem purgat, humorem ex pulmone crassum **ph. p.** expectorat.

## Acorum.

## Caput II.

**A**corum folia iridis habet, angustiora tamen: radices non dissimiles, complicatas, non in rectum sed obliquum actas, & summo cespite sparsas geniculis interceptas, albicantes, gustu acres, odore non ingratis. Optimum est densum, candidum, plenum carie, non exesum, odoratum, cuiusmodi Colchidicum & Galaticum, quod aspletion dicunt. Radici uis calfactoria. Decoctum potu uirum cit. prodest lateris doloribus, & iccinoris atq; thoracis: item torminibus, uulfis, ruptis. lienem absumit. urinæ stillicidio & serpentum ictibus auxiliatur, insidentibus ad muliebres affectus iridis modo utiliter imponitur. oculorum caligines succo discutit. antidotis radix magno usu commiscetur.


### NOMINA ET EXPLICATIO.

**AKOPON** & Aphrodisiam Græci uocant. Aphrodisiam uerò à Venere, quam **Αφροδιττω** uocant, & hos Latini etiam imitati Veneream appellauerunt, & radicem nauticam eò quòd plurimum secus amnes & in aquosis natales suos habeat, licet etiam in alijs locis nascatur: sed primæ habetur. suntq; in prima bonitatis estimatione acori radices, quæ in aquosis nascuntur, auctore Plinio **lib. 25.** Acorus gustu acris, & modicè amaro, odore iucundo, tenui consistencia, calidus, siccus ordine tertio. Is nunc esse uidetur quibusdam Calamus aromaticus, alijs potius Galanga. Quibus repugnât **Actuarius**



Acorum,

Acorum quo hodie Officina falso utuntur.  
Germanis Ackerwurtzel. Geel Schwer-  
tel. Drachen wurzel. Geel  
wasser lilien.



Actuarius in antidoto aurea Alexandri, in qua γαλάνγαν (sic enim cum Arabibus uocat) & mul-  
tis interiectis, acorum, eodem pondere ad finem uero calamum aromaticum diuerso ponde-  
re misceri scribit.

Acorus omnino uerus magnitudine ireos, Galanga maior hodie Officinis. Gallis Galange grösse,  
ou grande Galange, Germanis Groß Galgant Wurtzel dictus. Ignotus tamen quibus ad-  
huc est, eius loco galangam minorem magno successu miscuerint, interdum calamum odor-  
ratur. Qui uero nobis frequens ostenditur, palustris acorus est, & aliqua saltem  
acori species, insipidus, inodorus, substantia crassa, frigidus, siccus, à xiri  
planta aceri diuersissimus: quadripartito tamen sectus, & sole siccatus,  
triennio seruatur: non utendus hic, nisi medicus imperauerit. Ves-  
ti autem prouentus nunc uberrimè, & ubique conuehitur ex  
India, Lusitanorum (ut audio) nauigationibus.



Meum.

Caput III.

\*Alij aniso.



Gall. l. i. anti.

Gale. lib. 9. c.  
p. p. & lib.  
7. simp.

Cyperus.



**M**eon, quod Athamanticum uocant, in Macedonia & Hispania plurimū gignitur, anetho\* folijs & caule simile, sed eo crassius binum fermē cubitorum altitudine attollitur, sparsis in obliquum rectumq; radicibus, lōgis, tenuibus, odoratis, linguā ex calfacientibus. Quæ feruefactæ ex aqua, uel tritæ citra coctionem, præcluserum renum uesicæq; fardæ uitia potu leniunt. urinæ difficultati medentur, stomachi inflationes discutunt. Torminibus, affectæ uulvæ, articulorum doloribus, atque fluxionibus pectoris, tritæ cum melle in eclegmate auxiliantur. sanguinem per menstrua pellunt, defensionibus feruefactæ. infantibus autem illitæ imo uentri, urinas mouent. quod si plus quàm debeat ex his bibatur, caput dolore afficiunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis Μεον ἀθαμαντικόν.

Meu seu Meon Latinis.

Officinis anethum siluestre hodie uocant.

Germanis Eberwurz.

Gallis uulgo feniculus tortuosus dicitur. apud Allobroges montanos, Citrach.

MEUM nobis frequens, Dioscoridis picturam explet, tamen præstantius Macedonicum, aut Hispanicum: sed Athamanticum laudat Andromachus minor in sua Theriace.

Calidum est ordine tertio, sic cum secundo, urinas & menses mouet, ut asarum, sed largo usu cephalalgicum est.

Marcellus Vergilius Florentinus hic perperam & falso legit tum apud Plinium tum apud Dioscoridem: caule folijsq; aniso similibus: cum hæc herba quam hic meon ille meu uocat, caule & folijs anetho similis sit. Et sic etiam meon interpretantur medici recentiores, dicentes id esse agreste anethum.

Cyperus. Cap. III.

**C**yperus, quem aliqui crysiceptrum, ut Caspalathum appellant, folia fert porraceis proxima, sed longiora & exiliora: caulem odorati iunci, cubitalem aut maiorem, angulosum, in cuius acumine minuta folia cum semine exoriuntur: radices, quarum in medicina est usus, cohærentes inter se, oleis oblongis similes, aut rotundæ, nigro colore, suauis odore, amaro gustu. In lacunosis, palustribus & cultis nascitur.

Optima



# LIBER PRIMVS.

Optima est grauissima, densa, fractu contumax, plena & aspera, odoris cum quadam acrimonia iucundi, qualis est Cilicia, Syriaca, & quæ à Cycladibus insulis petitur. Huic calida uis inest. Venarum spiracula laxat, urinam ciet, ad calculos, a quamq; subter cutem utilissimè bibitur, aduersus scorpionum ictus remedio est. perfrictionibus uulvæ, & præclusionibus, fotu prodest pellit menses. Contra ulcera oris, etiam si depascent uorentq; farina eius efficax est. Malagmatis calfacientibus, & unguentorum spissamentis bene adijci solet. Aliud cyperi genus tradunt in India nasci, gingeris effigie, quod manducatum croci uim reddit, gustu amaro sentitur, & illitum præsentem phloethri uim exhibet.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

GRÆCIS κύπερος ἢ κύπερος ὅς δὲ ἐρυσισκηνήσρον.

Cyperus & Cypirus Latinis dicitur.

Officinæ Latinum nomen adhuc retinent.

Germani uocāt Wilde galgen. Veldkircher Galgant, ubi magna copia provenit, etiā locis incultis.

Gallis sonchet & galange sauvage.

Erysscepri nomen etiam peculiare & commune est aspalato & uerbenacæ, à calathis & uirgis. Nam Græci ἐρυσσεπαλῆθρον uocant, & sportam, σκῆπτρον uero sceptrum & uirgam.

Sicq; dicta sunt, eo quod caules & uirgæ ipsorum uirides lentore suo in calathos, sportas, tegetes, & id genus alia texi, & in nexus circumagi possint.

Cyperis seu radix cyperi calefacit, siccatur sine morsu, substringit, incidit, ulcera præhumida cicatrice claudit, calculos frangit, urinam & menses mouet, oris halitum commendat, ut lignum aloës uerum.

Cyperus Indicus inter zingbris radices inuentus, Curcuma Venetijs, in Gallia uulgo terra meri, Galen. libr. 2. comp. ph. p. ta dicitur.

Curcuma.



Cyperus Babilonicus.



Ad odoris gratiam cypirus additur tenuantibus capillos. A figura caulis, iuncus triangularis Plinio: quæ dratus Celso. licet rarò hic quadrangulus: angulosus Dioscoridi, non definito angulorum numero.

Cyperus Babilonicus galanga quibusdam dicitur, uulgaris scilicet ac minor, nam maior acorus esse dicta prius est. Est autem Aëuario, Barbaros in multis imitato, radix subrubra, geniculata, intorta, grauis, sapore acerrimo linguam admodum uellicante, calida, siccater tio gradu, odore & figura quadam cyperi. Coctionem inuat, flatu dissipat, oris halitum commendat, uenerem excitat etiam ore retenta, cerebrum roborat naribus indita, cordis palpitationi prodest. Germanis Galgent wurzel. Gallis galange dicitur.

Scrapio.

## Cardamomum.

## Caput V.

Cardamomum optimum est quod ex Comagene, Armenia, Bosphoroq; deuchitur. In India quoq; & Arabia provenit. Eligi debet plenum, frangenti cõtumax, occlusum, farctumq; quod enim huiusmodi non est, exoletū iudicatur.



## DIOSCORIDIS

Cardamomum.



& gustu acre, subamarum, & odore caput tentans. Excalfactoriam uim habet, porumque ex aqua facit ad comitiales, ischiadicos, tussis, nervorum resolutionem: item ad rupta, uulsa, tormina, latus uentris tineas excutit. Ex uino autem porum, renibus, difficultati urinæ, à scorpione ictis, neque non omnibus uenenum uibrantibus, auxilio est. Cum cortice radice lauri epota drachma calculos comminuit, partus suffitu enecat. Scabiem ex aceto illitum adimit. Et ad unguentorum spissamenta additur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis καρδάμωμον. Officina Latinum nomen retinuerunt. Germanice Cardamomlin, Cardamomum maius, minus uero Paris & Berner nuncupant, quemadmodum & officinae distinguere solent.

Galli mellegette, grains de paradis. Cardamomum minus, maius uero Latino nomine & officinis usitato nominant.

Iacobus Siluius nostra tempestate doctissimus medicus contendit Cardamomum Serapionis utrumque tam maius, quod Granum paradisi & mellegetam uocatum putant plerique, quam minus, nihil habere commune cum uero, id est Dioscoridis & Galeni Cardamomo. Sed Valerius Cordus, eximie eruditiois iuuenis, paternis uestigijs insistens incredibili restauranda medicina studio amoreque signis, contrarium asserit, scilicet nos uerum cardamomum hodie non desiderare, cum Dioscorides fructum frangenti contumacem non semen intellexerit. Habet enim semine quasi in capsulis, unde Græcis capsicon nuncupatur. Vnde apud Galenum legitur: καρδάμωμον ὅθεν τρεῖς γένηται, non quod ab internis purgatum est, & interiore sua parte euacuatur, albo uidelicet eiecto, sed cui exterior cortex capsulae deitactus est, durus & frangenti contumax.

Nardum.



Cardamomum nigrum, lib. 9. comp. ph. part. & antid. & in theriaca ad Pisonem.

Manardus Ferrariensis inter tria Cardamomi genera solam amaritudinem desiderat.

## Nardum. Cap. VI.

Vo nardi genera: unum Indicum, alterum Syriacum appellatur, non quod in Syria proueniat, sed quod montis in quo oritur, pars una ad Syrios, pars altera ad Indos flectitur. Ex hoc Syriaci genere præcipuum est recens & leue, largam gerens comam, flauum colore, perquam odoratum, ac cyperum redolens, breui spica, amaro sapore linguam siccante, quod diu in sua odoris gratia permaneat. Ex Indicis autem nardum quoddam Gangitis uocatur, à fluuio Gange, apud quem enascitur, montem præterfluente, quod genus ob multam loci,




# LIBER PRIMVS.

tam loci, in quo prodit, uliginem, uiribus infirmius est, atq; procerius adolescit, plures ferens spicas ab unica radice comosas, unaq; conuolutas, ac grauiter oleras. Montanum autē odoratius, spica breui ac mutila, odore cypero uicino. ceteras habens Syriaci dotes. Est & genus quoddam cui Sampharitico nomen loci indidit, frutice breui, in magnas se spargens spicas, candidiore interim medio caule, hircorū uirus supra modum redolente, quod improbat. Madefactū uendi solet, quod uitium ex eo deprehenditur, quod candida sit spica, & squalida, nulloq; puluere obsita. Adulteratur stibio cum aqua aut palmeo uino, in spissationis ponderisq; causa inspirato. Intueri autem oportet si lutum radicibus infideat, & incerniculo puluerem excutere, eluendis manibus utilem. Vim habent ex calfactoriam & exiccantem. Vrinam mouent: aluum potu sistunt, uulua profluuiā, saniemq; apposita supprimunt. Nausea ex aqua frigida auxiliantur, & stomachi rofionibus, inflationi, iecinori, regio morbo, renum uitijis. Aquę autem in coctæ foru ad infessum, uulua inflammationibus medentur. ad glabras oculorum genas ualent: siquidem eas ad densiorem pilum reducunt. perfusis humore corporibus insparguntur. Miscentur antidotis, & in fistili non picato ad ocularia medicamenta reconduntur, trita in farinam, & cum uino in pastillos coacta.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Nāpōl & Gracē. Spica nardi, & nardus Latine nominatur. Officinæ Latino nomine uocant. Germanis Edel frembd wolteichende spicken nardi, Latino frē nomine. Gallicē aspic doultre mer. Nardi spica & radix, calida excessu primo, sicca secundo: astringit, subacris, & leuiter amara, ico Gale, lib. 8. simpl. cur et stomachū roborat, sumpta et admota, urinā ciēt, fluxiones intestinorū, capitis, thoracis siccat. Nardus igitur est mista substantiæ et facultatis tū digerentis, tū repellentis, & roborantis. Nardus L. 6. & 8. c. ph. p. præterea uim habet non exiguam coquendi omnes frigidas dispositiones. Ea est multiplex, præstantis, ph. p. Nardum Celticum, sima est Indica, secundo loco Gallica, post Cretica, & quæ apud nos montana ex Cilicia, & nardina herba potius quàm nardus uocatur. Radix L. 9. c. ph. p. nardi indica, & apud nos montana modicè astringit. Nardus indica L. 6. c. ph. p. quanquàm radix est, tamen etiam vāpōlou sēxus, seu cum Actuārio & Hera, lib. 6. compo. pharm. part. in diabesosa vāpōlou sēxus, id est spica nardi, a similitudine formæ cum spica. Tamen Philo in sua antidoto Creticam nardum, uel ut alij eius ænigma interpretantur, Indicam, radiceis salsonomine dici autumat, quoniam spica nardi nuncupatur. Nardus etiam L. 9. c. ph. p. Syriaca usurpatur in arteriace. 12. Andro. sed imbecillior est q̄ Indica. Gale. libr. 7: phar. p. Fugienda nardus quæ ἐκ λυτ & id est, elota dicitur, & eligenda Lib. 1. Anti. quæ quæpæ lingua Barbarorum dicitur. Lib. 1. Anti. Spica uulgaris, odoris & saporis gratiam illam non habet, imò intercoquendum odoris est grauissimi, & agros ledit: estq; uerius pseudonardus, quàm uera nardus. I. Syl.



## Nardum Celticum.

## Caput VII.

Celticum nardum nascitur in Liguria Alpibus, salicunca patrio nomine appellatum, prouenitque in Istria. Exiguè frutificat, & cum radicibus in manuales fasciculos cōponitur. Folia habet oblonga, colore in flauū languido, florem luteum. Cauliculorum & radicum durat us us est, & odoris suauitas. unde pridie fasciculos aqua abluerē expedit, & exempta terra pauito solo atque humenti subiecta charta reponere, postridie repurgare. siquidem utile, cum aceroso alienoque propter humoris uim non excutitur. Adulteratur imposita herba simili, quæ hirculus uocatur, ab odoris grauitate: sed facilis cognitio. nanque herba candidior est, sine cauliculo, minoribus folijs, radice neq; amara, neque odorata, uti uerum nardum est. Itaque radices atque cauliculi, abiectis folijs triti discernuntur, uino



## D I O S C O R I D I S

excipiuntur, digerunturq; in pastillos, & ita fictili nouo diligenter operto, afferuari debent. Laudatur maximè recens, iucundi odoris, radice numerosa coherēs, plenum, nec fragile. Ad eadem quę Syria cum pollet: sed uehementius urinam cit, & stomacho utilius est. Inflammationibus iecinoris, & felle suffusus auxiliatur. Contra stomachi inflationes, cum abfinthij decocto bibitur: itē aduersus lienem, renum & uesicę uitia, & uenenatos ictus, ex uino. Additur in malagmata, potiones, & calfacientia unguenta.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis κελτικὸν νάρδον.

Latinis, qui græcam appellationem imitantur, celticum nardum. Officinis Spica celtica, & nardum Gallicum.

Germanis Marien magdalenen blümlin.

Gallis patrio nomine, ut Dioscor. destradit, Saliunca nominatur.

Gal. lib. cōp. Nardi Gallicę cum radicibus & terra circumdata fasciculum unum cum alijs ad columellas laxas  
ph. tas adhibet Archigenes: astringit enim & digerit nardus Gallica, ambo mediocriter. Nardi Celticę  
lib. 6. c. ph. flores usurpantur apud Galenum in tertio Andromachi medicamento. Nardus autem Gallica seu Galatica, seu Celtica dicitur: nam gentem eandem Gallos, Galatas, & familiarius Celtas appellant.  
lib. 1. antid. In Ligurię Alpibus ea nascitur Dioscoridi. Radice igitur utilior apparet ex initio lib. 8. simpl. spica tamen non inutilis. Laudatur enim recens, leuis, larga coma, spica breui, flaua, odoratissima, cyperum redolente, diuq; in sua odoris gratia permanens, amara, linguam mordens.

### Montanum Nardum. Caput VIII.

**M**ontanum nardum, quod ab aliquibus thylacitis & niris appellatur, in Cilicia & Syria nascitur, furculo & folijs eryngio similibus, minoribus, minimè tamen spinosis asperisq;. Radicibus binis niritur, aut pluribus, nigris, odoratis, ceu hastulę regię, sed longè gracilioribus, & longè minoribus. Neq; caulem, neque fructum, neq; florem profert. Ad eadem ad quę Celticum efficax,

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis ὄρνιν νάρδον.

Latinis montanum nardum dicitur.

Hodie hoc omnino caremus.

### Asarum. Caput IX.

\* Alij densioribus.

\* abūdat hæc clausula.

\* Iustinię, si uidetur abūdare, cū hic autor longè ante Iustinū Cæs. scripserit.



sed plurimum in Ponto, Phrygia, illirico, & Italię Iustinięsi agro.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

ΑΣΑΡΟΝ Græcis. Asarum Latinis.

Officinę genuinum nomen retinuerunt.

Germanis



LIBER PRIMVS:

Germ. hasel wurz. Gallis du cabaret appellatur. sylabarū methatesi. Bachar enim uocabāt olim. Asarum ualet folijs, flore, semine, sed efficacissimū ē si radice, ellebori albi modo purgatoria, Diosc. 1ac. Syl. Galenus tamen in hierapicra etiam asarum recipiente solam aloē purgatoriam uim habere scribit, asarum uerō humores malos ad urinas deducere, uires habere radices acori, sed ualentiores. Foedienda est cū folia mittere incipit, & in sole siccanda (nisi recens utenda sit) quia in umbra si- Gal. lib. 8. cum celeriter trahit & fescit, præcipuē ex locis riguis: ex macris autem & sitientibus (quæ impri- comp. ph. p. & lib. 6. mis amat) minus est putredini obnoxia. simp.

Phu.

Caput

X.

Valeriana.



**P**HU, quod & aliqui syluestre nardum appellant, nascitur in Ponto, folio olu-  
fatri, aut elaphobosci, caule cubitali, aut altiore, læui, cauo, molli, in purpurā  
uergente, geniculis inter cepto, florib. narcisso proximis, maioribus\*, teneris, &  
ex albicāte purpureis: radice superius ad digiti minoris crassitudinē, ex obliquo  
uilloso in nigri ueratri aut iunci odorati modū: capillamentis inuicē cōtextis, fla-  
uescentibus, odoratis, cū quadā odoris grauitate nardū æmulātibus. Excalfacit,  
urinā mouet, si sicca potui def. Decoctū eadem præstare potest, ad lateris etiā dolo-  
rē efficac. mēses cit. antidotis inserit. Adultera radice rusci ammixta: sed malefi-  
ciū deprehendit: quoniā hæc dura est, & frāgenti cōtumax, sine ulla odoris gratia.

Græci φού, Latini Phu, & Nardum syluestrem uocant. Officina illius loco Valeriana utuntur.  
Germani Wild Calmus / Groß Baldrian / & Tircacs Erant appellant. Valerianam autem  
Bagen Erant / Klein Deimareck, & Klein Baldrian.

PHV Dioscoridis, & caterorū Græcorū, nostra Valeriana quā Germani ut diximus Deimareck  
& Baldrian appellant, plurimū exprimit, nisi florū qui in muscario pusilli sunt, magnitudo desidero-  
tur, quare aliā herbā, priorē scilicet, quā Galli simul & Germani maiorem Valerianam nominant ue-  
rum esse Dioscoridis Phu, nemo sane mentis negabit, cū descriptioni per omnia respondeat. Ma-



Folium Indi, quo hodie utitur officina,  
Mauritanis Tembulum appellatum.



**M**alabathrum arbitrantur aliqui esse Indici nardifolium, falsi quadam odoris cognatione, permulta enim nardum olent, quemadmodum phu, asarum, neris, secus autē res se habet. Namq; malabathrum folium sui generis est, quod Indicæ gignit paludes, lentis palustris modo innatans aquis, sine radice. Id collectum statim lino transluitur, & siccatum recoditur. Tradunt siccatis æstiuo feruore aquis, humum aridis fruticibus uri: quod ubi nō euenerit, ne amplius quidē renasci. Laudatur recens, ex candido nigricans, integrum, nec fragile, odore caput feriens, quod diu in suaui odore permaneat, & nardum sapore imitetur, nullo falsi gustu. Infirmum uerō & minutim contusum, præsertim si cariosum uirus olet, uisiosum est. Eadem nardo sortitur uires, sed efficacius omnia præstat. Vrinam uehementius ciet ac stomacho magis prodest malabathri uis. Lippitudinibus inflammationibusq; tritum & in uino feruefactum commodè illinitur, subditum linguae, oris halitum & suauitatem commendat. Vestium quoq; odorem interpositum teruat, & aberosione tuetur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Φύλλον Ἰνδικόν, καὶ φύλλον μαλαβάθρου, & simpliciter φύλλον Græce.

Latinus folium Indum, & folium Malabathri.

Officina amissa & deperdita re nomen genuinum retinuerunt, Germanis negel bletter.

Galli Latinum nomen quemadmodum & Germani uerbum uerbo reddemes, seu let de Inde, & seu let de Malabathre appellant.

Malabathrum sui generis folium, Indicæ nardo, ut odore & sapore, sic uiribus simillimum, sed nardo efficacius. Laudatur recens ex candido nigricans, cum max frangi, integrum, odore uergeto nares feriente, & qui folio semoto persistat. Id nunc desijt, à quo tamen unguentum foliatum diuitibus Romanis mulieribus frequens, est dictum. Desijt & folium Syriacæ arboris Plinio celebratum. In horum locum Mauri inuixerunt folium laurino proximum, sed maius, & neris tribus folium intercurfantibus distinctum, odore iucundo. Primum illud folium Indum dicitur Serapioni: tamē Aëuarii in hedichroo magnate φύλλον Ἰνδικόν, & φύλλον μαλαβάθρου seu diuersa misceat: φύλλον ab his diuersissimū Dioscoridi describitur, uulgo italis folium syluestre dictum. Hermol.

## Casia.

## Caput XII.

**C**asia, cuius complura sunt genera, iuxta odoriferam Arabiā gignitur, crassif corticis sarmento, folijs piperis. Eligenda est fuluescēs, pulchri coloris, coralij amula, perquam angusta, longa, crassa, & fistulosa, gustu mordens, et cum aliquanto feruore adstringēs, aromatica, uinoso odore, cuiusmodi est quæ ab incolis achy appellatur, ab Alexādrīæ negotiatoribus daphnitis. Huic præfertur crassa, purpurea, & nigricans, Zigir cognomine, quæ rosam odore imitatur, præcipui in medicina usus. Secundum locum tenet antedicta. Tertia, cui Muscletico blasio, id est, germi cognoimen est. Reliquæ uiles, & quæ aphemum\* dicitur, nigra, insuauis, cortice tenui, ac rimoso: & quæ darca & citto uocatur barbaro nomine Similior huic est pseudocasia, quam ut explicari possit, quæ gustu coarguitur, cum nec acris, nec odorata sit, hærentemq; medullæ corticem habeat. Inuenitur etiam lata quædam fistula, mollis, leuis, furculosa, quæ antedictæ præfertur. Damnatur candicans, scabra, hircinum uirus redolens, & quæ tenui fistula & scabra cute sit. Vim obtinet calfaciendi, urinam ciendi, siccandi, & leniter astringendi.

\*al. asyphum.



gendi. Conuenit ad medicamenta oculorum, quæ præstandæ claritatis gratia cōcinnantur, & ad malagmata. Lentigines tollit cū melle illita, menses trahit, cōtra uiperarum ictus pota auxiliatur: aduersus intestinas inflammationes omneis, & renum uitia, pota proficit. Fœminis in folio defidentibus, aut suffimētis, prodest ad dilatationē uulvæ. Ea duplo pondere medicamētis mixta, cinamomi uicē supplet, si ipsum defuit: nam eosdem effectus præbet, ad plurima perquam utilis.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Κασία Græcè.

Cassia lignea & aromatica Latine (est autem nostra canella) Officina nomē legitimū retinuerūt. Cassia uerò genere proxima cinamomo est quā ipsa nōnunquam ex amulatione euadit cinamomū, ut totum quidem ueluti exacta arbor, Cassia uideatur: surculi autem in ea quidem cinamomi, ramis cassiæ proximi reperiuntur. Optima cassia in cinamomum degenerat. Vidit enim sepe Galenus cassiæ sublimis & ramosa ac fruticis æmule in magnitudine surculos cinamomi surculis omnino similes, corticis tenuitate, & firmissimis cinamomi notis in odore & gustu deprehensis.

Cassia sepe imponit, nisi sis in diiudicando expertus: pseudocassia enim ueræ est persimilis, sed odore minus est grato, & corticē medullæ adhaerentem habet. Optima autem laudatissima quæ est κασσία ῥοδὶ Gal in theriaca ῥοδὶ, διὸ κασσία, id est, rufa, rosam expirans, & uinum olens, gustum dulcem præferens, fistulosa, & aromatum modo uehementer odora. Cassiæ cortex Actuarius etiam dicitur σούρις τῆς κασσίας idem, Lib. 1. antid. Gal in theriaca ad Pisonē. Cassia Aegyptia idem, in asyneritico Cassia cathartica, id est purgatrix quibusdam dicitur. ἡ σούρις τῆς κασσίας, lib. 1. Antidotorum in compositione theriaces. Cassia σούρις, id est, fistula, & κασσία, id est, rufa dicitur in arteriacis Andromachi: τῶν ῥοδίων uero bis lib. 6. eiusdem. μελαίνια autem in fine Lib. 4. et 7. c. ph. p. lib. 7. bis, & lib. 8. eiusdem. ῥοδὶ ῥοδίων demq; id est, rosam spirans, lib. 8. ἑυλοκασία eadem Actuarius, & Arabum alumnis cassia lignea, Cassiam fistulam cum Andromacho minore ad Galeni atatem omnes theriaca miscbant: hæc autem omnibus nota est, & comparatu facillima. Corticem uerò exteriorem (quem & fistulam dicunt) odoratu & gustatu ualentem habet: quod autem intus est, maxime imbecillum, ob id inutile. Aduersus putria, deleteria, uenena, proxima post cinamomum cassia, quæ optima est, atq; illi cognata ualeat: aromataq; cetera, nardus, iūcus odoratus, calamus, aspalathus, myrrha, crocus, eandem habent facultatem: sed Cinamomum digerit, Cassia uerò & malabathri foliū, & amomum astrictionem participant, Cassia, crocus, costus, amomus, nardus astringunt quidem, sed magis digerunt, præsertim costus. Lib. 3. c. ph. p. Lib. 4. c. ph. p.

## Cinamomum

## Caput XIII.

Cinamomi genera plura, patriū sibi nomen uendi cantia. Præfertur tamē Mosyliticum, quod cassiæ, cui Mosyliti, nomen est, aliquam cōferat effigiem. Sed in eo genere recens, nigrum, ex uiuoso in cinereum uergens, læue, tenuibus ramulis, ac frequentibus nodis cinctum, perquam iucundè olens Optimi ferè indicii, iucundi odoris proprietate cōstat. Inuenitur enim cum optimo, eoq; quod peculiaris est. (\* odor rutæ aut cardamomo proximus). Insuper acre, mordēs, & cū calfactione quadantenus falsum, quod non citò confricanti asperum, aut frianti lanuginosum, leuibus tamen internodijs appareat. Si certior fieri uoles, uellito ab radice surculum, facilis est huiusmodi probatio namq; fragmenta miscellanea quædam esse uidentur. Quæ autem melius spirant, suo halitu cum nares primum consuluntur, olfactum explentia, deterioris dignotionem impediunt. Est etiam num montanum, crassum, pumilum, fuluescens admodum. Tertium à Mosylitico, perquam suauiter olet, nigrum, fruticosum, paucis intercedentibus geniculis. Quartum, fungosum, candicans, aspectu tuberosum, uile, ac friabile, magnam habens radicem, quæ cassiam planè repræsentat. Quintū genus, odore nares feriens, subrufum, & cortice fuluæ cassiæ simile, tangenti firmum, minus neruosum, densa radice firmatum. Iis quæ thuris, cassiæ, myrti, aut amomi odorem spirant, minus suauitatis inest. Deligito scabrum, album, rugosum: at læue, & lignosum circa radicē, ut inutile, rei citò. Est etiam nū simile aliud, cui pseudocinamomo cognomen est, uile, inualidi odoris, solutarumq; uirium. Vocatur etiā Zingiber, cū tamen sit xylo cinamomū, præbens quandā cinamomi faciē. Est autē lignosum cinna

\* Additum uideatur Galeno.



\* Alij parua, cinnamomū, sarmenta longa\* robustaq; ferens, odore lōgē cinamomo inferiore. Sunt qui xylo cinnamomū, à cinamomo genere differre dicant, quod à natura eius abhorreat. Cinamomū omne exalfacit, emollit, & cōcoquit, urinā ciet, tāmēses quāmpartus portū aut ex myrrha impositū pellit, cōtra bestias quæ uirus eia culātur, uenenāq; conuenit. caliginē pupillis oculorū obuerfantē discutit, crassitiem extenuat lētigines & uitia cutis in facie ex melle illitū detergit. cōtra tusses, defluxiones, aquam subtercutem fusam, renum uitia, & urinæ difficultatem efficax est. unguentis preciosis inferi solet. & in summa, magni ad omnia usus. Tritum uino excipitur, umbrāq; siccatur, quod diutius eduret, reconditur. Est & quoddam cinnamomum, quod aliqui pseudocinnamomum appellant, perquā densius atq; crasso sarmento, longē tamen inualidius cinamomo, & odore & gustu.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

## KINNAMOMON Græcis.

Cinamomum Latinis & officinis (est autem uera Græcorum Casia)

Germanice Zimentzöl. Gallice de la Canelle, appellatur.

Ludouicus

Romanus Pa

tricius.

Ga l 7. simp.

Lib 6 c. ph.

p. in diabe

sa.

L. 7. c. ph. p.

L. 8. c. ph. p.

Ibidem.

Gal. li. 1. ant.

Gal. li. 5. ph.

Lib. 1. antid.

Cinamomum arbor lauro folijs & baccis similis, & eius ramorum, non trunci, tertio quoque anno delibratorum cortex.

Cinamomum calidum tertio ordine, siccatur autem & digerit super omnia æquē calida, propter summam essentiae partium tenuitatem: propter hæc dispositionibus scirrhis mederi solet. Idem cum Lib 6 c. ph. clausa corrigit putridas & uenenatas uires ichorum, & humorum, & leibaliū pharmacorum, & ueneni uirulentarum bestiarum. Idem sua facilitate alteratrice & digerente, & odoris gratia, præsidium est non paruum aduersus omnes prauas dispositiones, et casia, & pleraq; alia aromata materia.

Cinamomum quia tenuissimum est partium, uenericuli meatus aperit, quia humores crassi & leni inhaerunt, tenuat & terget, ob id commode hyere miscetur. Cinamoni autem facultas qualis initio adest, integra seruari nequit ad annos triginta, multo minus ad centum, uel etiā ducentos, ut quibusdā uisum est, Cinamomū senij expers putantibus. Nā id seruatum uasculis ligneis ab Imperatoribus uarijs, Traiano, Hadriano, Antonino, Commodo, Seuero, imbecillius tanto est expertius Galenus Seuero the riacen componens, quanto uetustius: contra tanto ualentius, quanto recentius. Nam Seuero Imperatori theriacam parare iussus, qualem Antonino Imperatori parauerat, coactus Cinamomum capere ex Traiani & Hadriani temporibus relictum, cum nondum triginta anni præterissent, multo inualidius expertus est. Arborem enim totam primi generis cinamomi ex Barbaria in scrinio cubitos quatuor & semissem longo ad Antoninum allatam uidit Romæ Galenus, ex eaq; theriacen paratam alijs longē præstantiorē expertus est, ut ea etiam ante duos menses Antonino uti licuerit, non expectata medicamenti coctione.

Cinamomum optimum, ijs qui id crebro uiderunt omnium facillimē dignoscitur: & cum principum cinamomorū sex sine differentiae generales, optimi tamen supra deterrimum insignis est excessus, ut in Casijs, quarum tamen optima parum à prauissimo Cinamomo abest. Id autem Cinamomum est odoratissimum, ac indicibilem quandam odoris gratiam super alia omnia refert, gustatu admodum calidum est non tamen adeo, ut molestē rodat: color illi est lacteus, cū φαιῶ, id est, glutino et cū cyaneo nistus.

Cinamomum quanto Casia sit præstantius, docet Galenus lib. 5. comp. ph. part. in dentifricio: quod si odorum facere uis, misce casiae aut amomi drachmas duas: si regi paras, Cinamomi drachmam unam, ubi non solum casiae pondus duplat, sed etiam mediocribus dicat Cinamomum regibus. Ob id penuria Cinamomi duplum casiae miscendum omnes propemodum ueteres scripserunt, uti quod pondus aliquis robustus ferre consuevit, eo absente ferant duo imbecilli. Quin etiam penuria Cinamomi multum, uti duplum, carpesij miscebat. Cinamomo miscet casiam duplicatam Actu. in pastillo ad ileos. Pseudocinamomum uero est simile, ob id facillē nobis imponit, sed gustu & odore longē est inferius. Xilocinamomum lignosum est, ualida habet uirgulta, nec similem habet suaueolentiam. Cinamomum omnium præstantissimum est cineritium colore, uirgultis gracilibus, nodis frequentibus, odoratum uehementer: idq; odore longē optimo & suauissimo, gustu acri, & admodum mordaci, & quod mansum, πικρὺ χυμῶ, id est, rutam olere uideatur, læue, confringi facile: Addit ibidem ueri cinamomi genera aliquot. Vero igitur Cinamomo nos caremus, nostra autem canella, quā uulgo Zimentzöl, & officina Cinamomum appellant, aut Casia est, aut pseudocinamomi species.

λεπτοκινῶδες ἄλφαρ Actuario pro optimo usurpatur,

Amomum



## Amomum.

## Caput XIII.

**A**momum exigue fruticat, ex ligno se conuoluens in racemi modum, flore ceu candida uiole, paruo. folijs uitis albae similibus. Laudatur quamaxime Armeniacum, fuluo auri colore, ligno subrufo, ualde odorato. Medicum, quoniam in campestribus & aquosis enascitur, infirmius esse constat. Est autem magnum, subuiride, tactu tenerum, frutice uenoso, odore origani. Ponticum uero subrufum, paruū, fragile, racemofum, fructu turgens, & odore nares feriens. Deligito recens, candidum uel subrubrū, quod nec astrictum cohaereat, nec conuoluatur, sed solum diffundatur, seminis plenū, uuis paruis simile, graue odoratum, modò cariem non contraxerit, acre, gustu mordens, simplici colore non euariante. Vim habet calfaciendi, astringendi, exiccandi. Somnum allicit, & illiū fronti, doloris sensum aufert, inflammationes & meliceridas concoquit, discutitq; iuuat quos scorpius percussit, ex ocimo illitum, & podagricis confert, inflammationes oculorum uiscerumq; lenit ex uia

Rosa Hierichuntis.



passa ad uuluarum uitia in pessis, aut in fessionibus utile est, decoctum iecinori, renibus podagræ, potu conuenit. Antidotis immiscetur, & preciosissimis unguentis. Adulteratur herba amomo simili, quæ amomis uocatur, sed sine odore, sine fructu, nascitur in Armenia, flore origani. Quare in huiusmodi probationibus fragmenta fugienda sunt: eligenda autem, quæ ab una radice integros surculos emittunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Amomum uisape Galeno & Acluario ob id dicitur, quod racematum uelut in uia cohereat. Laudatur Amomum Scythicum, lib. 8. comp. ph. part. Non esse uerò rosam Hierichuntis, Hierosolymitanam uulgo dictam (aut hic depictam) aperit conuincit utriusq; historia. Hodie passim desideratur, nam quod ostendunt officinae, inodorum est. Iacobus Syluius scribit se habere fuluum, paruum, oblongum, angulosum, odoris dum fricatur iucundissimi. Li. 8. c. ph. p.

## Costus.

## Caput XV.

**P**racellit Arabicus, candidus, leuis, eximia odoris suauitate. Secundum Id. cum sibi uendicat Indicus, leuis, uber, ut ferula niger. Tertius est Syriacus, grauis, colore buxeus, & odore feriens. Optimus est recens, albus, abundè plenus, densus, aridus, à teredinibus non erofus, sine graueolentia, gustu calidus ac mordens. Vis ei ex calfactoria urinam ciet, menses pellit, uitij quæ uulnam malè habent, tam impòsitū quàm fortū & suffitū auxiliatur. Contra uiperarum morsus sextantem \* bibere prodest: item aduersus pectoris dolores, conuulsa, inflatio, nesq; ex uino & absinthio, uenerem ex mulso stimulat, latas uentris tineas ex aqua pellit, horroribus ex oleo, ante febrium accessiones, & neruorum resolutionibus oblinitur, uitia cutis in facie, cum aqua uel melle illitus, emendat. Additur in antidota & malagmata. Sunt qui admistis helenij Comageni præduris radicibus, adulterent, quod deprehensu facile est, siquidem neq; gustu feruet helenij, neq; ualidum odorem uibrat, ut caput tentare possit.

\* Sextantem, quibusdam abundat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Costus subamarus, modicè astringit, acer adeo & calidus ut ulceret. D. Id. Syl. Lugduno missus à Carolo Paludano (eius urbis iure medico primario, si Hieronymum Bromium nulli traditione secutus)



dum exceperis.) Costus præcellit Arabicus, candidus, levis, eximia odoris gratia recens, abunde plenus, densus, siccus à teredimibus non erosus. Secundus est Indicus, ubi, levis, niger. Tertius Syriacus, grauis, colore buxeus, odore feriens.

Costus Arabum dulcis, & amarus, Græcis indictus, sed λέος & γλυνός Arabas passim imitanti Actuario dicitur in secundo Dialachan, & paulo post in diaromato. Costus autem hortenensis, herba quanguam amara est, fuerit magis piperitis aut Siliquastrum Plinij.

### Odoratus iuncus.

### Caput XVI.

#### Odoratus iuncus.



Gal. lib. 1. an  
tidotorum.

Lib. 8. simp.  
& lib. 6. cōs  
pos. ph. p.

thym: modice calfacit, & modice astringit, est nonnihil tenuium partium, ob id mediocriter digerit, & me liocriter repellit: radix astringentior, flos calidior, urinas ac menses ciet, sumptum & fotu adhibi-  
tum, iccoris, stomachi, uentriculi phlegmonas iuuat, hæmoptoicis, id est, sanguinem screantibus cum  
Lib. 1. antid. alijs prodest. solo odoratus uigore deligitur: nam odoris illius gratia celeriter uanescit.

### Calamus odoratus.

### Caput XVII.

Calamus odoratus in India nascitur, melior est fuluus, densè geniculatus, & qui assulose frangitur, plena araneorum fistula, albicans, lentus in mandendo, & astringens, ac cum aliquanta acrimonia amarus\*. Vrinam potu ciet, quare cum graminis aut apij semine coctus, in aqua subtercutem fusæ morbo, renum uitij, stillicidio urinæ, ruptisq, commodè bibitur, menses & potu & appositu pellit

\* Hæc uox alijs deest.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Σχοινός Græcis dicitur, quamuis omnem iunci speciem hoc nomine significet: at absolute positum, hunc per excellentiam significat.

Iuncus odoratus & rotundus Latinis, ad differentiam palustris.

Camelsbiew Germanis.

Gallis pasture de chameaulx, hoc est, pastum Camelorum nominatur.

Officinis nomine deprauato Squinantum dicitur.

Hippocrates Schœnon hedysmon, ut Galenus libello quem uocabulis Hippocratis dicauit, id est, suauem iuncum nominat.

Σχοινός, id est, iuncus absolute scriptus, iuncus odoratus, Arabicus, Libycus, seu cum Celsorotundus, à triangulari cypero eum separante. Nescio autem qua causa uulgo ἄνθος σχοινὸς dicitur, cum rari flos eius ad nos deferatur, sed herba sepe, eius parte superiore à camelis erosa. Eam enim in Arabia uis copiosissime crescentem, ob id parui pretij, libentissime cameli pascuntur. σχοινάδος Actuarii, uulgi Scœnan-



Calamus odoratus.



pellit, tussi suffitu medetur per se, aut ex resina terebinthina, hausto per arundinem fumo, ad muliebres infusus decoquitur, & clysteribus imponitur. Suffitionibus, malaginisq; odoris gratia commiscetur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Κάλαμος ἀρωματικός Græcis, Dioscor. & Gal. μυρσινός, id est, unguentarius Hippocrati, Arabicus Plutarcho, Alexandrinus Celso.

Officina omnes Calamum aromaticum nominant.

Germanis Calmus wurzel appellatur.

Galli Latinum nomen retinuerunt.

Calidus, siccus, ordine secundo, leuiter astringit, minimum acer est, partium nonnihil tenuium, & medijs uentriculi & hepatis calidis misceri potest, ac menses mouentibus. Gal. lib. 7. Simpl.

## Balsamum. Cap. XVIII.

**B**alsamum, arbor alba uiolæ, lycij, siue pyracanthæ magnitudine cōspicitur. Folium rutæ proximum, longè candidius, perpetuò uirens. In Iudæa solum quadam ualle & Aegypto nascens: his differens modis, scabritia, proceritate, gracilitate. Quod igitur tenui & capillacea coma est, theristum\* uocant, quasi demessile, fortassis quoniam ob gracilitatem facile demetur. Aestiuus sub ortu Canis ardoribus, arbor unguibus ferreis inciditur, manatq; è plaga succus, quem opobalsamum uocant: sed tam exiguo stillatu, ut annis singulis, ne plures quidem quam feni septemue congi cogantur, inibiq; pondus duplo rependitur argento. Succus

Balsamum.



probatio est, ut sit recēs, ualidi odoris, syncerus, non ad acorem uergens, dilui facilis\*, leuis, astringens, ac modicè mordens gustu. Sed uariè uitiatu, multo ab alijs, qui si-  
liquibus terebinthi, cypri, lentisci, balani unguento: tile pene-  
item fusino, metopio, melle, aut Cypria cera liquida, tret.  
quod maleficium facile deprehenditur. Namq; merus in lancam uestem fusus, neq; maculam facit, neq; si eluatur, notam relinquit: uitiatu autem inhæret, & lac instillatus coagulat, quod adulteratus non efficit. Quinetiam syncerus in aqua aut lacte celerrimè liquatur, coloreq; lactescent: uitiatu uerò olei modo in-

naturat, se conuoluens, aut in stellæ modum diffundens. Syncerus senescens crassescit, deteriorq; redditur. Hallucinantur, qui aqua concretum\* pessum ire, & ad imas fidere arbitrantur, postea dissipatum\* supernatare. Eligni genere, quod xylobalsamum uocant, probatur recens farmento tenui, fuluum, odoratum, quadam tenuis opobalsamum spirans. Necessarius etiam seminis erumpit usus, quare eligatur flauum, plenum, grande, ponderosum, mordens gustu, feruens in ore, modicè opobalsamum olens. Adulteratur semine hyperico, simili, quod à Petra oppido defertur. Sed coarguitur magnitudine, inanitate, uirium ignauia, sapore piperis. Efficacissima uis inest succo, & quammaximè calfaciens, abstergit quæ tenebras oculorum pupillis offundunt, medetur per frictionibus uulua, cum rosaceo cerato appositus, menses quoq; secundas, & partus extrahit, horrores illi tu discutit, ulcera sordida expurgat, & cruda concoquit, urinam potu ciet, agrè



spirantibus prodest, datur in lacte contra aconitū haustum, aut serpētium ictus. miscetur acopis, malagmatis, & antidotis. In summa, præcipua autoritas succo, secunda semini, minima ligno. Semen commodè potui datur doloribus lateris, pulmonum uitrijs, tussi, ischradicis, comitialibus, uertiginosis, orthopnoicis, urinae difficultati, torminibus ac serpentum moribus, ad muliebres suffitus perquam utile est, uuluum aperit in deflectionibus balnearum decoctum, & humorem euocat. Lignum easdem habet uires, aliquanto minores, ex aqua potum cruditatibus, torminosis, uulsiis, uenenatorum ictibus opitulatur, urinam cit, ad capitis uulnera cum sicca Iri conuenit, squammas ossium extrahit, & ad unguentorum spissamenta additur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

- Gal. lib. 7. Balsamo planta secundo excessu calida sicca, tenuium partium: & carpobalsamo & xylobalsamo liquor est tenuior, minus tamen calidus quam quidam existimant, tenuitate partium decepti. Sæpe enim expertus sum, non inuisse dispositionem calfactione egentem. Opobalsamo igitur (quod & βαλ. Gal. lib. 2. c. σκευέλαιο uocari dicit Simeon) syncero, dilui facili, leui, astringenti, non acido, linguam modicè mordenti, est præcipua inter has plantæ huius autoritas, & uis efficacissima. Laudatissimum autem ph. p. est Syriacum siue Iudaicum, siue ex Syria palestina, ac præcipue Sigadinum, à loco Palestine, in quo copiosissimum & optimum gignitur. Opobalsamum sit Syriacum, tenue, perspicuum, substantia non crassum, quale in fundum uasis subdere solet, quale item sit uetustate. Opobalsamum uarijs adulteratur modis, ut egre possit, etià ab exercitatisimis cognosci: alias uerò Opobalsami notas ex Dioscoride requiras. hodie propemodum desijt uideri.
- Lib. 1. anti. Carpobalsamum adulterari non potest, si Galeno credimus.

## Aspalathus.

## Caput XIX.

**A**spalathus, alijs erysiceptron, frutex est furculosus, multis spinis horrens, nascitur in Istro, Nisyro, Syria, & Rhodiorum insula, quo ad unguentorum spissamenta pigmentarij utuntur. Optimus est grauis, detracto cortice rubens, aut in purpuram uergens, densus odoratus, gustatu amarus. Est & alterum genus candidum lignosum, sine odore, quod deterius habetur. Vim calfaciendi cum attritione obtinet: unde decoctum cum uino ad terra oris ulcera colluenda conuenit: ad nomas genitalium, & fordida ulcera\* infunditur. subiectum in pecto, partum extrahit, aluum fistit cius decoctum: & sanguinis reiectionem potu cohibet, urinae difficultatem inflationesq; discutit.



\* Alij addunt, ozénas.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

- Ioan. Rucl. Asportatur ad nos aspalathus è Rhodiorū insulis, inde Rhodij ligni appellationē declinauit. Quin Sucf. & de flore fruticeq; toto ad Rhodios negociatores retulimus, qui florem ei rose tribuebant, prædicabantq; humilem arbusculā, fruticēue lignosum, crebris spinis aculeatū. Ea igitur quæ fidei narratione accepimus, & ipsius ligni pericula quæ unusquisq; facere potest, in hanc traxerunt opinionem, ut Rhodium hoc lignum sit idem, quod à ueteribus aspalathus diceretur. Accedunt etià nostræ nimirum sententiæ, qui diligenter hæc scrutari, & singulas notas disquirere uoluerunt.
- Galenus gustu acrem aspalathū astringentemq; deprehendit, cuius iudicio lingua satis subscribit, uide de plura in historia Agalochi.

## Musculus.

## Caput XX.

**B**Ryon, id est, musculus, à quibusdam splachnon appellatur: in cedro arbore, populo alba, & quercu inuenitur. Optimum est cedrinum: proximum populeum; in quo genere candidum & odoratius præstat, nigricans improbatum.

Astrin



## Muscus.



Astringendi uim habet. Decoctum infidentium uuluis utile: unguento balanino, oleisq; inspissandi gratia inferitur: thymiamatum, acoporumq; compositionibus conueniens.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

## BRYON Græcis.

Muscus arborum, canis scilicet uilli, quales in senescente quercu maximè uidemus, Latinis. Officinis & Arabum familie Vinea nominatur.

Germani gemß von baumen/uocant.

Muscus arboreus, non sphalchnon & bryon tantum, sed etiam hypnon ac sphagnum appellatur ab Aetio serm. 12. cap. 4. 4. in oleo gleucino. Item serm. 13. cap. 117. sphagnum siue hypnum habet, ac rur-  
sus cap. 118. eiusdem sermonis quid sit hypnon exponit. ὑπνον, inquit, ὅ ἐστι σπῆλαιον καὶ μικρὸν ὅ ἐστι μύλον ἐν τῇ δαμάσκηνῳ ἢ ῥοδάκηνῳ. hoc est hypni, quæ canalicula est parua, ex arbore Damascena & Rhodacinea exorta, bessem. Quare apparet muscum hunc non tantum supradictis arboribus innasci, sed etiam alijs, uelut hic Aetius Damascenæ & Rhodacineæ dicit, de quibus arboribus suo loco dicitur.


Plinius canos arborum uillos sphagnum appellat.

Hodie aliud genus Musci pharmacopolijs in usu est, qui animalis potius sanguis aut sanies esse à Serapione traditur: uehementer odorifera res, qui tamè tempore Dioscoridis, Galeni, et cæterorum Græcorum incognitus fuit. Aetium tamen eum nouisse putandum est, qui quum alibi, tum serm. 12. cap. 46. in medicamento purgatiuo ex hermodactylis, ἡμῶν λεγόμενον. α. habet, id est, musci siliquam unam, id quod de nullo alio musco intelligi potest.

Est autem et tertium adhuc musci genus, quod item bryon Græcis appellatur, itemq; lichen, sed hic in petris roscidis nascitur in mari, de quo suo loco plura, &c. Vim habet astringentem, inuolidam Nec Gal. lib. 6. de  
enim mulum est frigidum, sed proximè ferme medijs, qui uidelicet & digerendi & emolliendi saculta-  
tis est particeps, maximè quod in Cedrinis lignis reperitur. simpl.

## Agallochum.

## Caput XXI.



Agallochum, lignū est quod ex India atq; Arabia deportatur, thiyæ ligno simile, maculatum, odoratum, gustu astringens, cum quadam amaritudine, cute uerius quàm cortice uestitur, aliquantulum uerficolor. Manditur, aut decocto os colluitur, commendandi halitus gratia. Sudores arcet toto corpori insparsum: pro thure ad suffimenta substituitur: radix epota drachmæ unius pondere, humida stomachi uitia, & imbecillitatem, feruoremq; mulcet, si lateris, iecinorisue dolor excruciat, si dysenterix, aut tormina infestant, ex aqua bibere prodest.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Arborem huius triplicem scribit Ludouicus Rom. Patricius in tractu Indico uideri, Calampat per Iac. Syl. festissimam, Bochor uilissimam, lubam mediam. Xylaloë Aëtio & Actuaria dicitur, id est, lignum a Ludo. Rom. loë arboris non herbæ. Rhodijs nullius est frequens in corollis precarijs. Quod uero ostendunt officinae, uerius est aspalathum acre, & austerum. Gal. lib. 6. simpl. quod aroma apud suos nasci idem Gal. Gal. lib. 6. scribit lib. 8. comp. ph. part. & in Syria & Rhodo Dioscorides: graue, detracto cortice, rubens aut simp. purpurascens, densum, odoratum, amarum, astringens: alterū deterius, cædium, lignosum, inodorum. Lib. 8. com. Verum Agallochum Germani des heyligen kreuzes holz, hoc est, lignum sanctæ crucis appellant: ph. p. Aspalathum uero Paradiß vnd Moes holz.

## Narcaphthum.

## Caput XXII.

Narcaphthum ex India defertur, corticosum, simile sycomori libro, quod iucundi odoris gratia suffitur. Miscetur thymiamatis compositis, constricti-  
onibus uulux suffitu prodest.



Narcaphitum.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Ioan. Rucl.  
Sueß.

Serapio Arabs Nabach uocat. quid sit nondum comperi. Narcaphitum, quod & ab alijs nascaphitum uocatur, olim ex india deportabatur, corticosum natura, & putaminibus arboris mori: Prætermisum à Plinio, ut arbitror consultò, quia incerta esset eius facies, ut aliorum quoq; plurimum, quæ noslro orbi tantum nominib. cognita sunt. Paulus lacaphiti meminit inter ea quæ in magno cyphi, quod cognominant beliacum, adiunguntur, & corticem Piceæ, uel alterius arboris existimat ego lacaphiti cum nascaphiti idem esse reor, & nostro seculo planè ignotum.

Cancamum.

## Caput XXIII.

\*Alij, odori.

**C**ancamum Arabi ciligni lachryma est, myrrha quodammodo similis, uirosi\* gustus, quam ad suffimenta usurpant. Vestes eo ex styrace & myrrha suffiuntur. Vim proditur obtinere extenuandi obelos, si ternum obolorum pondere ex aqua, aut mulso aceto plusculos dies ebibatur: lienosis datur, comitialibus, & suspiriosis, menses cum aqua mulsa pellit, oculorum cicatrices cōfestim emendat: uiño madefactum medetur eorundem hebetudinibus: aduersus gingiuas humore prægnanteis, doloresq; dentium, non aliud efficacius.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis λάρυκα. Cancamum Latini. Officinis Cacca nominatur.

Lachan sepe Aduario dicitur passim, ac præcipue in duplici descriptione dia lachan, ubi scribit λάρυκα λανθαστοῦ ποιοῦ purgatum.

Ioan. Rucl.  
Sueß.  
Dioscor.  
Paul.

Cancamum ex confinio casie cinamumq; deuehitur, sed per Nabatheos & Trogloditas qui consedere ex Nabathæis. Paulus arboris Arabæ odoratam esse lachrymam tradit, myrrha non dissimilem, quæ suffimentis usurpetur. Addit uim obtinere extenuandi præpingues, & obesos. Cæterum non sum nescius, à Barbaris, qui Dioscoridis & Pauli citantur testimonium, id laccā dici, quod Dioscorides & Paulusancamum appellarunt, idemq; plurimis recentiorum Græcorum compositionibus hoc nomine dicatum. An tamen lacca sit Gummi illud quod hodie passim ostendunt Officinæ, de quo agitur. Cancamum, non satis habeo compertum. Quod si genus hoc myrrha referat speciem, tamen uacare mihi uidetur odore, qui possit ad suffimenta dari, sapore uiroso. Adiecere Mauritanii rubram esse laccam, tinctoribus expeditam, roris modo supra surculos arborum insidentem, præsertim mespili, & coalescentem in gummi. Infestores floccorum purpureæ, eam macerant, ut colorem cibus lanæ, & quod remanet in lacca esse dicitur, cum uetus inodorum & fecem potius anchami, quam anchamum aut lacca dēci oporteret. Scito autem tria hoc nomine lacca nuncupari, Vnum est uerum Dioscoridis anchamum. Alterum grana quædam arte facta, quæ Venetijs uirgino parantur, aut cocco, & alijs nonnullis: hac pistores utuntur. Est & tertia lacca, ex qua ruber color fit, qui uulgo carmesinus appellatur, ex his omnis error detegitur &c.

Ant. Mus.  
Br.

Cyphi.

## Caput XXIII.



**C**Yphi thymiamatis compositio est, dicata dijs, quæ abundè Aegyptij sacerdotes utuntur. In antidota misceri solet, suspiriosis datur in potu. Permultæ componendi rationes, quarum una hæc est: Sumito cyperi dimidium sextarium, cum pari baccarum iuniperi adultæ modo: uuæ passæ pinguis, exemptis uinaceis, minas duodecim: resinæ repurgatæ minas quinque: calami & iunci odoratorum, & aspalathi, singulorum minā: myrrhæ duodecim: uini ueteris sextarios nouem, cum duabus mellis minis: uuam passam detractis uinaceis tufam, cum uiño & myrrha subigito: cætera tusa & cribrata adiungito: die uno humorem combibere finito, dein mel coquito, dum sibi glutinis ascescat crassitudinem: eliquatam resinam accuratè permisceto cum reliquis diligenter contritis, & in fistile uas recondito.

NOMI



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Cypheos compositio à Democrate hæc describitur, *saxpidol*, id est, uia pisse pinguisime (à qua cortex & semen totum sint exempta) carnis leuigata probe, terebinthine usta, ana drachmæ Atticæ 24. Myrrhæ, schœnu anthus, seu uinci rotundi, ana drachmæ 12. Cinamomi drachmæ quatuor. Bdellij lachrymæ, spicæ nardi, casie bonæ & puræ, cyperi, baccarum iunperi grandium & pinguium, calami odorati ana drachmæ tres.

Aspalathi drachmæ duæ & dimidia. Croci drachma una Mellis & uini modus mediocris. Bdellium, myrrham, uinum in mortario tere ad mellis liquidi crassitiem, melle superaddito unam cum alijs tere. Omnia ubi erunt leuia, fac cyclos paruos.

His Aegyptij sacerdotes dijs suis propitiandis suffitu utuntur. Sic Rufus uir optimus, & in arte exercitatus, parandum prodidit. Per multæ enim eius compositiones etiam Dioscoridi, quarum unam describit ab hac diuersissimam, tamen quam in antidotâ quoq; misceri ait. Paulus quoq; lib. 7. describit cyphi magnum *ἡλιακόν*, id est, solare dictum, ex rebus 36. confectum: & *σελλωϊκόν*, id est, lunare quod ex rebus 28. constat: utrumque ab hoc maxime differens: tamen etiam ad conciliandos Deos odore grato compositum, & uariis nostris adiuuendum, ut distillationes à capite in partes subiectas concoquat, & grauedine, obstructioneq; nos liberet, & cerebri uentriculos purget, & pestilentibus morbis resistat. Per os etiam cyphi sumitur tum ad hæc, tum ad ea quæ pectori inherere conquenda, nec non ad frigidos hepatis affectus. Miscetur medicamentis præcipue epithematibus & antidotis, quæ inde Cyphoidea uocantur. Paulus lib. 7. Etiam officinis hodie in usu est cypheos compositio sub nomine trochiscorum *kokion*, à uera compositione nō longè diuersa, sed admodū deprauata, Paulus lib. 7.

## Crocum.

## Caput XXV.



**C**ROCUM, optimum in medendi usu Coryceum, recens, & boni coloris, paulum candidi gerens in capreolo, oblongum, omnibus suis partibus constans, non fragile, plenum, à quo detractum est nihil, quod madefactum manus inficit, nec situm redolet, aut cariem sentit, subacre. sin huius generis non est, aut uetus, aut humore perfusum creditur. Secundus locus datur Coryceo, è tractu Lyciæ contermino. Tertius Lycio è monte Olympo. dein x. Aegibus Aetoliæ. Cyrenaicum & Centuripinum inter Sicilicæ omnia uiribus infirmius est. Omnium natura oleracea. Itali tamen ob succi copiam, & coloris uenustatem, tingendis mortarijs dicauerunt. quibus de causis magno uenditur. Vtilissimum in medicina quod antè descripsimus. Adulteratur immisto crocomagmate tuso, atq; etiam sapæ sublitu: contrita, quò pondus adiciatur, simul argenti spuma, aut plumbagine. sed maleficium declarat infidens puluis, præsertim si defrutum in odorando subolet. Theffalus ipsum tantum odoratum esse uoluit\*, *\* Alij, Theffali uolunt.* Alij exitiosum, tribus drachmis ex aqua potis. Proculdubio uim coquendi, emolliendi, atq; substringendi habet. urinam cit. Elegantem colorem præstat. qui ex passo biberint, crapulam non sentient. oculorum fluxiones illitum cum humano lacte, cohibet. additur in potiones, quæ interaneorum causa temperantur. ad uulnæ etiam fedisq; cataplasmata, utiliter inditur. uenerem stimulat. uergentes ad ignem sacrum inflammationes mulcet. auricularijs collectionibus utile. Quò facilius conteratur, in calido fictili sole ficcari oportet, celeriterq; uersari. Vrinam mouet radix ex passo pota. Fit etiam expressis unguenti crocini odoramentis, & in formas digestis, quod crocomagma uocant. Optimū est odoratū, modicè myrrhā olens, graue, nigrū, ligni expers, læue, subamarum\*, quod madefactum croci colorem reddit, guttatūq; uehementer dentes sum. *\* Alij, subru-*



ac linguam inficit, multis durans annis: quale est quod à Syria defertur. Habet suas vires ad delenda quæ caliginem oculis obuersan, turinā cit, calfacit, coquit, & emollit, vires croci proportionem quadam tenus representat, quandoquidem plurimam croci partem sibi crocomagma uendicat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

ΚΡΟΚΟΣ Græcis. Crocus Latinis appellatur.

Officinæ antiquum & genuinum nomen retinuerunt.

Germani Saffran / Ziment / Saffran / ort Saffran / Zamer Saffran.

Galli du Saffran uocant.

Gal. lib. cop. ph. part. 4. 7.8. Lib. 1. antid. Crocus calidus ordine secundo, siccus primo, parum ac mediocriter astringit, qua facultate cor & partes alias roborat, ut suo calore moderato coquit ac digerit, & siccandō modicè dispositiones pectoris phthificas iuuat, putredines corrigit.

Crocus oryzeus à Coryceo antro, in quo nascitur, ueteribus atq; adeò Poëtis præter ceteros celebratus: alijs sanè procerior, nō tamē alijs robore odoris aut diurnitate est præstantior. Eligendus uerò est non procerior, sed odoratissimus, & flauissimus, & longo tempore in suo uigore persistens. Præstantissimum igitur aliquem crocum apto quodam adium loco repositum obserua sepe, ut pernoscas: nam id colorem odoremq; pristinum diu seruabit: Adulterati uerò odor & color celeriter uanescit. Crocus Cilicius etiam laudatur. Nunc passim & in Germania feritur, uerum nullibi uegetior quàm in Viennensi agro.

## Helenium.

## Caput XXVI.



Heleniū folia habet uerbasci angustioris folij, asperiora, oblonga: caulem quibusdam in locis non emittit: radicem subalbidam, interdum subrufam, odoratam, subacrem, uegetam, magnā, ex qua agnatæ propagines liliorū aut ari modo seruntur. Mōtibz in umbrosis, siccoq; solo prouenit. Foditur estate radix, particulatimq; dissecta sic catur. Potū radice decoctum menses et urinas ciet, ipsaq; in eclegmate ex melle prodest tussi, orthopnceæ, ruptis, conuulsis, inflationibus, & serpentium morfibz. In summa ex calfaciēs. Folia ex uino cocta utiliter ischiadicis illinuntur. Helenium stomacho utile in



passo conditum: siquidem salgamarij paululum siccata radicem, mox decoctam, & frigida aqua madefactam, in sapā coniiciunt, & ad usus reconducunt. trita potaq; ad cruentas excretaiones efficax est. Alterum Helenij genus in Aegypto gigni Cra

teuas tradit. herba est cubitalibus ramulis, serpylli modo per humum repentibus, folijs lenticulæ circa ramos, sed longioribus crebrisq; radice pallida, digitū minoris crassitudine, per ima tenui, supernè crassa, cortice nigro. Nascitur in maritimis



maritimis collibusq; Radix una in uino epota, contra serpentium ictus auxiliatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

EAENION Græcis. Helenium, Elenium & inula Latinis.

Officinis Enula campana dicitur. Germani Alant wurzel.

Galli champagne uocant. ἐλένιον λευκόν, καὶ ἰσχυρόν Actuarius appellat.

Elenij radix odorata, subacris, amara, calfacit non primo statim occurſu, ſiccaturq; non exactè ob humorem in ſe recrementitiū, tandem uerò etiam rubrificat, iſchiadas & affectus alios diuturnos ac frigidos: eclegmate cum melle, crassa & lenta ex pulmone & thorace expectorat, ſerpentium morſibus prodeſt. Ex montibus & ſiccò ſolo præſtantior, legitur æſtate, particulatimq; diſſecta ſiccatur, uel melle aut ſaccharo condita ſeruatur.

Omphacinum, oleumq;.

Caput XXVII.



**O**leum quod ex immaturis oliuiſ exprimitur, ad multos uſus rectè ualentibus accommodatiſſimum. omphacinum id appellatur. Præſtat recens, odoratum, quod non mordeat. Tale unguentorum compoſitionibus idoneum intelligitur. Stomacho utile eſt, quod astringat. gingiuas contrahit, dentes firmat, ſi cõtineatur in ore. ſudores cohibet. & quo uetuſtius ac pinguius, eo ad medicamenta aptius eſt. Et, ut reliqua in commune dicantur, omne oleum calfacit. emollit uentrem. à perfrictiõibus corpus tuctur, ipſumq; promptius ad obeunda munera reddit. aluum emollit. ulcerantium uenenorum uires permiſtum hebetat. contra uenena datur, aſſiduè potum redditumq; uomitionibus. ſola uir aluum hemina menſura cum paritſanæ ſucco aut aqua potum. ad tormina. calidum ſimul decocta ruta tribus ſextarijs in potu datur. uentris animalia pellit. idem maximè ilei inteſtini morbo laborantibus inſunditur. uetus magis calfacit & uehementias diſcutit. oculorum claritati ſublutum confert. Si uetuſti non ſit occaſio, in uafe decoquitur ad mellis craſſitudinem, ut uetuſtatem repræſentet.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Oleum propriiſſimo nomine appellatur, quod ex oliuiſ exprimitur. Germanis Baumöl.

Galliſ uerò huyle d'oliue appellatum: maturis quidem dulciſſimum, calidum, moderatè humidum, ſimpl. & lib. uel dum eſt recens, frigidum humidum. ex crudis autem & immaturis omotribes & omphacinam 2.c. ph. gene. quantum astringit, tantum refrigerat: illud ueteratū calidius ſit, & potentius digerit: hoc autem ſi dulceſcit uetuſtate, dulcis uires induit, quas ſapore explorabis. Tenuè eſt purum, translucidum, & cuti aſſuſum eiꝯ modicum, latiſſimè per eā extenditur, continuum ſibi manens, & cito à cute combibitur: idemq; optimū æſtimatur, quale in Italia Sabinum


Oleum habet vim mitigandi & laxandi.

Oleum



## Oleum sylvestris oliuæ.

## Caput XXVIII.



**O**leum quod sylvestres oliuæ fundunt, uehementer adstringit, & ad sanorum usus secundum sibi locum uendicat. In doloribus capitis utiliter pro rosaceo substituitur. sudores arceat. defluentes capillos inhibet. furfures, ulcera capitis manantia, scabiem, leprasque abstergit. tardius canitiem sentiunt, qui eo quotidie perunguntur.

Candidum oleum fit hoc modo: Album colore, nec anniculo uetustius, in nouum fictile oris patuli funditur, centum heminarum mensura, & sub solem media quaque die concha refunditur, ex altoque demittitur, ut assidua deuolutione, ictuque agitata respumet: octaua die fenenum græcum mundum quinquaginta denariorum pondere, calida aqua madefactum donec emollescat, in supradictum oleum deijcitur, ita ne extillet aqua. postea tede præpinguis piceæ, assulatim cæsæ æquale pondus adijcitur, & transactis octo diebus, oleum concha mouetur. Vbi candorem contraxerit, in uas nouum uetere uino affusum recondi debet; substratis fertulæ Campanæ corollis drachmas undecim pendentibus, cum pari iridis pondere: sin minus, rursus soli mandandum, & idem munus obeundum, usque dum inalbefcat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Olea fere Græcis catmōs, dicitur sylvestris olea, fecundior satius, quod fere sylvestres habent, seu cura fertilitatem minuente. Oleum tamen acrius atque magis astringens etc.

Oleum album siue elotum morfu omni caret. Lauandi modum docet Galenus in lib. de comp. ph. gen.

## Sicyonium.

## Caput XXIX;

**S**icyonii componendi ratio hæc est: In lebetem oris lati stanno inductum, funditur olei albi, quod crudæ oliuæ reddiderunt, congius unus, aquæ semicongius. leui id igne coquitur, leniter mouendo. at ubi bis effebuit, & subtracto igne refrixit, innatans oleum cōcha decapulatur, & adiecta noua aqua conferuelcit. & reliquis ut diximus peractis, reponitur. In Sicyonia maxime fieri consuevit, Sicyonii inde accepto cognomine. Calfactoriā ad quendam usque modum uim habet. Fecundum uero uirtutis prodest. fœminæ ad cōmendandum faciei nitorē eo utuntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

1an Cor.  
zuic.

Paul. lib. 3.  
cap. 77.

Aëtius serm.  
9. cap. 27.

Paulus li. 7.  
cap. 20.

Sicyonium oleum maxime in Sicyonia parari scribit Dioscorides, ut patriam appellationē inde habeat, docetque eius faciendi modum ex oleo albo, ita ut dimidium eius aquæ affundatur, cum qua bis effruescat, nulla mentione facta cucumeris, ex quo in octo fiat, & unde alij Sicyonium appellatum putant, ἀπὸ σικκίου uidelicet, hoc est à cucumer appellatione ducta. Paulus namque lib. ca. 3. 77. sic ait αἶμα δὲ κ' ἐνὶ ἡγῆ βλάπτειν ἀπὸ τοῦ ἐνέμενον, καὶ ὁ χυλὸς τοῦ ἐλαττορίου. Ἐπὶ δὲ τοῦ ἀντὶ τοῦ δὲ τῶν σικκίων ἀντὶ τῶν τῶν σικκίων ἐλατορίων. Quibus uerbis Sicyonium oleum ex elaterio, ipso uidelicet cucumeris sylvestris succo, aut eiusdem radicibus componi tradit. Aëtius autem serm. 9. cap. 27. non quidem Sicyonii mentionem facit, sed alias olei in quo sylvestris cucumeris radix sit in octo, καὶ κ' ἐνὶ ἡγῆ, inquit, προεγείσθω ἀπὸ τοῦ σικκίου ἀπὸ τοῦ ἐλαττορίου. Indicauit itaque Aëtius his uerbis Sicyonium simplex, quod ex incōctis oleo radicibus cucumeris sylvestris fiebat, Paulus uero tum compositum Sicyonium, oleum tum quod ex elaterij succo

Paulus li. 7. uidem compositum est, significat, quorum omnium descriptiones Paulus lib. 1. cap. 20. habet. Sicyonium oleum & cicutum, raphaninum, sesaminum, amygdalinum, car. yinum, sinapinum & alia plurima ex fructibus & seminibus expressa & parata rerum, ex quibus extrahuntur & composita Gale. de tuen nuntur naturam sequuntur. Quo pacto autem olea medica et factitia fiant, rerumque uirtutibus insiciantur, da sani. li. 4. nō abs re fuerit adposuisse ex Galeni de sanitate tuenda lib. quarto. Sunt enim qui per infusionem illa tantum



tantum conficiant, sunt & qui per coctionem. Vbi uero per infusionem sunt, res quæ infunduntur, contundi prius debent antequam in oleum iniiciantur, sic enim qualitate & ui sua oleum citius inficiunt, quæ postquam macerate fuerint, quod quadraginta & plurimum dierum spacio fiet, abijciuntur, humidum uero linteo percolatur & usui seruat. Qui uero diuturnam macerationem illam rerum ferre non possunt, eos partim in oleo percoquere coguntur, igni certe lento, qualis prunarum est, quæ tamē nec ipsæ multæ esse debent, partim aqua uiniue tantulum injicere quantum coquendo totum uanescet. Is modus erit, si quadruplum eius aut quintuplum oleum sit. Vinum autem ad affectus podagricos & articulares, aqua uero ad alios utilior est. Et sic cautiore operantur, quo nec iniecta torcantur, nec oleum uestionem odore refrat. Verum qui his magis sunt curiosi, in duplicibus usis coquunt: quod fit cum in lebetē in quo sit aqua feruens, inseritur exiguum uasculum, in quod fundi oleum debet. Ethic commodior loquendi est modus.

## Strigmenta balnearum.

## Caput XXX.



Strigmenta à balneis calfaciunt, molli-  
sunt, discutiunt, ad sedis rimas & condy-  
lomata illinuntur. Illa uero quæ ex palæstris  
puluerem sibi ascuerunt, in sordis speciem  
redacta, articulorum nodos imposita adiu-  
uant. ischiadicis in fotus aut malagmatis lo-  
cum, calida commodè sufficiuntur. derafæ  
gymnasiorum parietibus simulacrisq; for-  
des calfaciunt, tubercula, quæ ægrè ad coctio-  
nem perducuntur, dissipant, desquamatis & ulceribus senum profunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Strigmenta Archigenes γλοιον dixit Dioscorid. & Gale. & alij medici Græci etiam ῥυπρον appel Archigenes  
lare solent. Sunt autem trium generum strigmenta, balnearum, palæstræ, & parietum atque statuarum  
gymnasiorum. Balnearum ex sudore, oleo, & sordibus in balneo defictis ab hominibus constant. Ian. Cor.  
Palæstræ ex eisdem rebus componuntur, accedente insuper puluere, qui partim ab olei illitione lucta zuic.  
turis inspergebatur ac affricabatur, partim à luctantibus in arena mutuo manibus ingestus, itcmque  
ex lucta excitatus, corporibus inherbat. Prior sanè pulvis πῑρος, & Atticis κοῖστος uocabatur Gal. lib. 1. &  
tur, authore Galeno: cuiusq; affricus aliquando solus, aliquando præmissa olei illitione, densandi ac 7. de tuenda  
coroborandi corporis per oleum emolli gratia fiebat, uelut secundo & tertio γλοιον Galenus tra- san.  
dit. Quanquam & ob emendandam gracilitatem, crura puluere conspergere eiusdem operis libro. li. 5. eiusdem  
5. doceat. & affuso oleo confricare, sed ita ut is plus tenuis & pinguis sit, κοῖστος λιπαρὸν appellat, in operis.  
quo uidelicet nihil asperi, neq; acris insit. Extenuant enim magis quam incarnant, qui pumicosa as-  
peritudine, aut nitrosa acredine participant. Quin & refrigerandi & sudoris reprimendi causa  
idem pulvis adhibebatur, qui uim habeat obducendi meatus, refrigerandiq; ac repellendi, uelut 8. Lib. 8. simp.  
simp. ph. Galenus testatur. At uero tertium genus Strigmentorum est parietum atque statuarum in ph.  
Gymnasis, quæ sordes sunt ex oleo magna sui parte constantes, quæ ex materia cui inherent aliquid  
assumunt, uelut eruginem ex statuis æreis. His enim itemq; parietibus oleum quo se oblinebant pale-  
strite, inter illinendum inspergebatur, quanquā etiam statuas quasdam fuisse in gymnasis, itemq;  
uasa ærea quæ oleum ipsum, quo se lustrari obtinerent, continerent, ex Pauli ac Gale-  
ni uerbis apparet. Ait enim Paulus lib. 7. ῥύπος ἀπὸ τοῦ χαλκοῦ ἀνθρακίνου  
ἢ σκευῶν, ἐν οἷς ἀφρονον ἄλλων ἐναπομένει, ἔχει τὴν καὶ τοῦ ἰού, διαφα-  
γνικὸς ἐστὶ καὶ ξυγαντικός μετεῖός καὶ μαλακτικός. ἀπὸ τῆς  
γοῦν φύσεως διαφθορῆς, hoc est: sordes ex æreis statuis ac ua-  
sis, in quibus largum oleum remanet, quod & eruginis  
quippiam contrahit, discussoria sunt, & resiccant  
res moderatè ac mollientes, quare tubercu-  
la cruda discutiunt.

Paulus lib. 7.

Elaomeli



## Elæomeli.

## Caput XXXI.

**I**N Palmyris Syriæ, quod elæomeli uocant, ex quodam caudice manat oleum, melle crassius, sapore dulci. Bilem, cruditatesq; detrahit, sextario cum una aqua hemina dato. sed qui sumpserè, torpescunt, & uiribus deficiuntur. quod minime uereri oportet, uerum crebrò excitare, ne ueterno pressi somnos captent. Fit & oleum è pinguitudine surculorum oleæ. optimum uetus, crassum, pingue, non turbidum, calfacit. Priuatim caliginibus oculorum illinitur. lepras, neruorumq; dolores illitum emendat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Elæomeli uel oleomeli nostro seculo incognitum.

Magno implicamur errore, qui mannâ putant elæomeli ueteribus fuisse, quorum error facile exploditur. Nam elæomeli constat resinæ genus quodâ esse, Palmyris familiare, quod è caudicibus profluebat, perinde quasi apud nos ex annosis Betulis liquor, qui linctus ualde turbat uentrem, sapore dulci.

## Cicinum oleum.

## Caput XXXII.

**C**icinum oleû hoc modo temperatur: Maturi ricini quauoles quâritate torrido sole flaccescunt, & uuarû more instrati tantisper insolâtur, dñ uestiens cortex fractus decidat. carò colligitur, & coniecta in pilam diligenter tunditur. postea in lebetem stanno illitum, qui aquam habeat, demittitur, subie&ocq; igni feruescunt. & ubi insitum prorsus humorem reddiderunt, sublato ab igni uase, in narans oleum concha tollitur & reconditur. Sed in Aegypto, ubi largior increbuit usus, longè secus fieri solet. Nam repurgatos ricinos molæ mandant, & accuratè molitos per sportulam torculò exprimunt. Tum quidem ematuruerunt ricini, cum continentibus orbiculis exuuntur. Ad psoras, & ulcera capitis manantia ualet, prodest sedis inflammationibus. uuluis conuersis atq; præclusis: item indecoris cicatricibus, & aurium doloribus. emplastra efficaciora reddit ad ditum. potu aquam aluo extrahit, uentris animalia pellit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.


Cicinum oleum, est quod ex fructu Ricini, quem Græci *κίς* uocant conficitur, quid autem sit Cicî seu Ricinus, & quæ eius forma, facultas & temperamentum libro. 4. cap. 145. luculenter demonstrabimus. Hoc oleum ut hic Dioscorides tradit, aliter Aegyptij, aliter alij conficiebant. Poterit hodie isdem plane rationibus prari, quamuis eius nullus sit in officinis usus, cum passim nunc in hortis proueniat. Est hoc oleum admodum tenue, ob id ad discutiendum potens.

## Amygdalinum.

## Caput XXXIII.

\* hoc est, Sex  
tarij tres.

**A**mygdalinum oleum, quod aliqui metopium uocant, hoc fit modo: Semodius \* ex amaris nucibus repurgatis siccatisq; in pila ligneo pistillo leniter tunditur in offas, aquæ quæ ferbuerit sextarius adijcitur, & ubi dimidia hora humorem hauserit, uementius quàm antea tunditur, mox tabellis premittitur, & quod digitis hæsit, concha excipitur. Pressis nucibus rursus hemina aquæ inspergitur, & postquam ebib erint, idem opus prosequendum. Singulas heminas reddunt singuli modij. Contra uuluarum dolores, strangulatus, cõuersiones, & eorundem locorû inflammationes efficax est, uitijs renû, calculo sis, difficili urinæ, suspiriosis, lienosisq; proficit. dolores capitis, grauitatem auditus, sonos incertos, tinnitusq; discutit. maculas & uitia cutis tollit è facie, & eam erugat cum melle, radice lilij & Cypria cera aut rosaceâ





rosaceo cerato. & oculorum hebetudines emendat. ulcera capitis manantia & furfures cum uino abstergit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Amygdali summariam considerationem quere infra cap. 139. Μετ' ὧν τοιῶν dicitur oleum amygdalinum propter Galbanum, quod recipit. Vocatur & μετ' ὧν τοιῶν patrio nomine Aegyptiacum quodam unguentum, propter Galbanum nuxtionem. Nam lignum in quo Galbanum aut ut alijs placet Ammoniacum nascitur, Metopion quoque uocatur. Habet prædominatricem amaritudinem, adiuncta quadam uis densandi & uirtute stipica.

## Balaninum.

## Caput XXXIII.

**S**imili modo fit balaninū oleū, qd repurgat maculas, lentigines, uaros, & cicatrices nigras. aluum soluit. stomacho aduersatur. contra aurium dolorem, fonos, & tinnitus auxilio est, cum anserino adipe instillatum. Similis sesamini ratio. Fit etiam enuce iuglande oleum, quod carinum uocant. Eandem uim habet quam balaninum.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Βαλάνιον μυρρὶν, id est, glans unguetaria, Myrobalanus quoque Plinio dicta, ex Barbarica regione allata. Ben Arabibus dicta, hodie frequens, stomacho aduersatur, cum hydromelite pota carnis huius drachma una est uomitoria: cum oxirato autem iecur & lien purgat, cum aceto item (quo maxime gaudet ad agendum) lepras, psoras, lentes, uirilgines, pruritus extergit: lien & hepatis induratio illi nititur cum farina aliqua sicca, ut erui, lolij: lien etiam prodesse scribit Galenus. Carnis huius succo calido utuntur aromatarij: id enim in odorem cum sit, omnibus suscipiendis odoribus est aptissimum, Gal. in ther. ut inspidum saporibus, & coloris expers coloribus. id oleum Balaninum hic Dioscoridi dicitur, ad Pisonem. Oleo expresso quod reliquum est magna terremur & amarū, incidit, terget, contrahit, stipat, ad prædicta etiam efficax, sed minus. id autem uidetur esse μύρο βαλάνιον τριεσμά, id est, expressum, quod cataplasmatibus miscet Galenus.



Sesaminum oleum fit ex semine sesami, de quo lib. 2. cap. 91. Sesa Lib. 11. & li. non non parum in se continet uiscosum & pingue: quare emplasticum 13. metho. & est & emolliens ac modice calidum. Eiusmodi facultatis est quod eo bis li. 9. cōp. fitur oleum: & herba quoque decoctum similem uim habet. In nuce pb. part. iuglande id quod edendo est, oleosum est, & tenue, itaque etiam facile exprimitur: & quo diutius reconditum fuerit, magis tale efficitur. Gal. 1. 8. simp. Quamobrem oleum ex eo inueterato exprimere liceat. Tunc sanè ad modum fit per halitum euaporatoriū. Itaque, quidā eo gangrenas & carbunculos, & eglophas sanant, Gal. 1. 7. simp. ac nonnulli ad neurotrota, hoc est nervorum uulnera utuntur. Ceterū si recens sit, astringens nonnihil qualitate etiam obtinet.

## Hyoscyaminum.

## Caput XXXV.

**H**YOSCYAMINUM sic fit: Semen candidum, recens ac siccum tunditur, & calida aspergitur aqua, ut in amygdalino diximus. dumque insolatur, siccatur, quæ sub manu sunt, partes, cum reliqua massa permisceantur. hoc autem fieri oportet dum nigrescat & grauiter oleat. mox pressum atque excolatum reconditur. Ad aurium dolores efficax est, pestis miscetur. ad emolliendum utile. Fit & ex grano gnidio purgato & tuso. Vis ei aluum soluere potu. Non secus cnicinum oleū temperatur, cui facultas eadem est quæ facta ex gnidio grano, uerum inualidior. Raphaninū ē raphani semine fieri solet, ceterorum more. Phthiriasis mala ualitudine contractas tollit. scabrities cutis in facie emendat. Ad obsonia utuntur Aegyptij. Melanthinum idem quod raphaninum potest. Tritum sinapis semen, & calida aqua madefactum, adiecto postea oleo exprimitur. id ad diurnos dolores efficax est. transfert humores qui in aliqua parte concreuerunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hoc oleum a semine Apollinaris herbe denominatur, quam & hyoscyamium, id est, fabam porcinam appellant, eius historiam & picturam quere lib. 4. cap. 59.

Vnus seminis & per se, & semine expresso stuporem gignit, atque ad comas saniam.



Falluntur qui granū gnidium ē chamelæa nasci autumant, similitudine foliorum decepti ut si sius de  
cemus cum tractabitur eius historia lib. 4. cap. 154.

Oleum ex gnidio grano strictum eandem uim habere quam cicinum Plinius affirmat. Habet hoc o-  
leum magnam uim præter ea quæ à Dioscoride dicuntur, in aluo lenienda, si umbilico admoveatur.

Gal. 1. 2. simp.

cap. 5. & li.

5. sanita. tu.

Gal. 1. 6. sim.

Cicini semen calidum, ordine tertio, purgat pituitam. Officina semen carthami appellant. Oleum  
seminis lac cogit & astrictam aluum soluit, in historia plantæ certius lib. 4. cap. 168. de eo agitur.

Rhaphaninum oleum Galenus ait cicino oleo calidius esse, aliàs  
simile.

Melanthium unde melanthinum oleum, est Gith, & officinarum  
Nigella.

Sinapium oleum fit ex semine madefacto in oleo expressoq; quo  
utuntur ad neruorum rigores, lumborumque & coxendicum perfric-  
tiones.



### Myrteum. Caput XXXVI.

**M**yrtei faciendi ratio est: E myrto nigra syluestri,  
aut satiuā, foliorum mollissima quæq; tusa præ-  
muntur. succo pares omphacini olei portiones adijciuntur, subiectisq; carboni-  
bus inferuescunt donec concoquantur. innatans oleum deraditur. Sed longè fa-  
cilior hæc compositio: Tenera folia contusa coquuntur in oleo & aqua, & quod  
innatat eximitur. Priuatim alij deiecta oleum folia in sole macerant: alij prius  
oleum inspissant malicorio, cupresso, cypero, & iunco odorato. Efficacius est  
amarum gustu, & oleosum, uiride, translucens, & olens myrtum. Astringit &  
indurat. ideo medicamentis miscetur quæ cicatricem obducunt. prodest ulceri-  
bus in capite manantibus, ambustis igni, & papularum eruptionibus. Facit ad  
attrita & furfures, sedis rimas, condylomata, articulos laxatos. corporis sudo-  
res compescit, & omnia quæ adstrictionem inspissationemq; desiderant.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Hodie utimur oleo myrtino in uentris fluxibus: uehementer enim exiccat. Myrti picturam &  
summariam considerationem quere cap. 128.

### Laurinum. Caput XXXVII.

**L**auringum fit hoc modo: Lauri baccæ cum maturæ sunt, in aqua coquuntur:  
liquidem ex obducto cortice quandam pinguitudinem reddunt, quæ mani-  
bus subacta concha excipitur. Alij omphacinum prius oleum cypero, iunco o-  
dorato, & calamo inspissant, deinde tenera lauri folia concoquant. alij etiam bac-  
cas, donec oleum odorem contraxerit. alij styracem & myrtum\* addunt. Optima  
laurus ad id latifolia & montana. Oleum laurinum utilius quò recentius, quò-  
que uiridius colore, amarissimum, & acre. Vis ei excafactoria, emolliens. uena-  
rum spiracula aperit. lassitudines discutit. omnibus neruorum uitij, alborbus,  
destillationibus, aurium doloribus, malis renum frigore contractis, illitum, non  
aliud iuuantius, attamen potum nauseam parit.

\* Alij, myr-  
rham.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Laurinum oleum quidam è baccis exprimunt tantum: alij folijs modo: alij folia & corticem nec  
non styracem addunt aliosq; odores. Excafacit uehementer, & emollit: ita ut ij, qui scabie sca-  
tent, & asperis impetiginibus obidentur, illiti in balneo, persanentur. Sed eo conuenit abstinere, li-  
chenibus & psoris, inflammationem minantibus: in calidis quoq; temperaturis & biliosis: liquidem  
frigidis corporibus, humidis & pituitosis congruit: item ijs, quorum articuli algoribus, aut perfric-  
tione affliguntur: ischiadicis subsidio est: uermes & pediculos enecat, furfures capitis emendat: alo-  
pecias & ophiases corrigit, usus eius in lauachro nitri: postea detergere oportet uino & melle, & fœni-  
graci farina: sed cauendum est, ne capiti dolorem sentienti, laurinum hoc oleum admoveatur.

Lentiscinum



## Lentiscinum.

## Caput XXXVIII.

**S**imilis lentiscini ratio. Nam è maturo fructu temperatur, factis prius spissamentis, ut in laurino diximus, hoc scabiem iumentorum canumq; sanat. utilissimum pellis, acopis, & leprarum medicamentis. sudores cohibet. Nec secus terebinthinum fieri solet. quod refrigerat & astringit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Ginguis ex inflammatione laborantibus optimum pharmacum est oleum lentiscinum caliditate temperatum ore retentum; sit autem recens, nam uetustius tanto recentiore peius est, quanto etate antecellit. Imponatur autem uasculum in quo calsit lentiscinum, in aliud maius uas quod aquam calidam multam complectatur. Maxime opere itaq; inflammationi ginguarum hoc conducit. Nec uerò minus etiam si iuxta aliam quandam partem, tum pelliculæ linguam ambiens cum succingentis totum os, aliquis dolor ob inflammationem oritur, dolorem sedat lentiscinum. Repellit enim citra molestiam & absq; asperitate, quam plerq; austerorum habent, discutiitq; citra mordacitatem, cuius rei inflammationis præcipuus usus existit.

## Mastichinum.

## Caput XXXIX.



**M**astichinum è trita sit mastiche. quod contra omnia uulnæ mala efficax est. mediocriter calfacit, astringit, & emollit. aduersus prominētes stomachi duritias, cœliacorum, dysentericorumq; cruciatus utile. faciem emaculat, & colorem nitidum facit. optimum in Chio insula componitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Resinarum iure præstantissimum est Lentiscina, id est, Mastiche, huius oleum confortat stomachum, nervos, hepar & iuncturas, lenit apostemata dura, & sedat dolores.

Mastixivov & πλῆθος τοῦ & ποικιλώτερον conficit Paulus, simplicissimum scilicet & magis usum. Paulus & græci. Vltimum accipit olei sext. 50. libras elenij 5. xylobalsami lib. 10. schoenanthos lib. 5. cardamomi lib. 7. mastiches lib. 5. xylo mastiches lib. 8. terebinthine lib. 3. comæ absinthij libram unam, uini odorati sext. quinq; aque sextarios decem. Res sicca in uino madescent per tres dies, misceantur oleo & aqua, & coquantur horas sex, & tunc mastiche & terebinthina additur, & exacte commixta & in frigidatâ depurantur. In simplicissimo, pro oleo sesamino Paulus accipit omphacinum, & non nisi untiâ unam mastiches: dicitq; aliquos addere absinthij & styracis ana unciâ unam.

## Vnguentorum compositio.

## Cap. XL.



**D**E ratione unguentorum consequenter tractandum existimauimus, quandoquidem ea in nonnullis corporum uitijis, aut medicamentis mista, aut corpori perfusa, aut naribus obiecta, plurimum prosunt. in quorum probationibus consulerenares oportet, an ea oleant ex quibus temperantur: optimum huicmodi iudicium, quod in quibusdam planè obseruari non potest, propter ea quæ admiscuntur odore cæteris præualentia: ut in amaracino & crocino, telino, & pleriq; alijs, quæ crebra circa hæc meditatione experiri conueniet.



DIOSCORIDIS  
NOMINA ET EXPLICATIO.

Vnguenta quandoque sunt ex floribus, ut Rosaceum, Leucoum, Susinum. Aut ex folijs, ut Myrthum: aut ex radicibus, ut nardinum, &c. Vnguentis porrò ueteres multis modis usi sunt. Ad salubritatem, ut natantes, & lauantes. Ad necessitatem, ut certantes Ceromate ungebantur. Ad luxuriam, ut delicati causa Veneris & mensarum. Græci mixtum unguento uinum bibere non erubescabant, quod dicebatur Myrites. Bathilli populi unguentis madent. Huius luxurie inuentum Persis refertur acceptum. Vnde Horatius: Persicos odi puer apparatus. Eius rei fidem facit scriptum unguentorum laudatissimorum, quod expugnatis Darij castris repperit Alexander. Cyprij quoque Cyziceni, & Corinthij eadem mollitie effœminati sunt. Constat usum unguentorū aliarumque rerū ad delicias repertarum usque ad Iulij Cæsaris tempora Belgis fuisse ignotum. Imperator Belgas fortissimos dicit, quod ad eos non commens, qui quæ ad effœminandos animos pertinent, illuc comportent. Inuasit hic luxus totam paulatim Italiam, adeo ut M. Otho Neroni monstrauerit uestigia pedum unguentis tingi, hisque balnearum parietes quandoque aspersi sunt. Caium quoque principem ferunt unguento solitum lauari. Anno post urbem conditam, 565. P. Lucinius Crassus & Iulius Cæsar censores edixerunt, ne quis uenderet unguenta exotica. L. Plotius, Plotij bis Consulis frater proscriptus à Triumuiris, in Salernitana latebra unguenti odore proditus est. In confesso est Helioabalum imperatorem triclinia quandoque, lectos & porticus omni florum genere strauisse, ut lilij, uiolis, hyacinthis, & narcissis, ac per eos ambulasse, seque unguentis omnium fragrantissimis nudum se penumero perunxisse. Quæ secuti Imperatores propè nullā mollitiem sibi non permiserunt. Quod ego in Romanis principibus, quamuis damnum plurimum, non tamen admodum miror, quum etiam apud eos abiectissimi homunculi, idem sibi indulserint.

Vnguenta hæc ad uoluptatem tantum & suauolentiam inuenta & ad delicias: ad curam uerò corporis non adeo, planè interierunt: etiamsi hodie unguentorum nomine ueniant alia medicamina, quorum usus est ad ulcera & tumores corporis consummandos &c.

Rosaceum.

Caput XLI.



\* alijs, sensim

Rosaceū sic fit: Iunci odorati quinq; libras & bessentū dito, & subactas aqua in uiginti olei libris & quincuncis subinde mouendo, cogito. dūque percolaueris, in olei libras iuginti, & quincuncē, adijcito rosas nō madefactas numero melle, & manibus melle perunctis identidem moueto: inter din\* premens, finito nocte tota macerari, postea exprimito, & ubi recrementum pessum ierit, mutato uase, in craterē melle illitum recondito. Cæterum rosas quæ antea pressæ fuerunt, in labellum demittito, & affusis octo libris & quadrante spissati olei, iterum premito, eritque secundarium oleum. Quod si tertias usque, quartasque perfusiones infundens exprimere uoles, secundarium fiet, tertiarium, & quartarium unguentum. Sed quoties id feceris, uasa melle oblini debent. Si uerò secundam infusionem instituere libet, in expressum oleum, numero pari recentes rosas, nullo humore imbutas iniijcito. manibus melle præmadefactis, agitans premito. & iterum, tertio & quarto. simili modo exprimens facito. totiesque recentes rosas detractis unguibus immittito. fiet enim ita oleum multò ualidius. nam septies oleum rosarum in fusionem admittit, nec amplius. præluin melle perungatur. oleum à succo diligenter secerni oportet. nam si minimum quid relinquatur, unguentum corrumpet. Alij autem detractis unguibus, rosas tantum oleo macerant in sole, hoc modo: Rosæ quæ selibram pondere æquant, in sextario olei diebus octo madescunt, & usque tertiam perfusionem quadraginta diebus insolantur, & sic oleum reconditur. Alij calamo, aut aspalatho prius olei spissamenta faciunt. Alij coloris causa anchusam admiscunt, & salem, quo minus oleat\*. Vim astringendi & refrigerandi obtinet. fomentis & cataplasmatibus utile. Porum soluit aluum, stomachi ardorem restringit, ulcera caua replet, & mulcet, quæ cacothe uocantur. ulceribus

\* Alij, corruptur.



ceribus in capite manantibus, atque feruidis eruptionibus illinitur. caput dolens eo perfunditur. dentes inter initia doloris collui prodest. ad genarum duritias illitum efficax est. ad lacessita interanea & concitatas uulvas utilissimè subijcitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Paulus Rosaceum sic construit: Rosarum rubearum exungularum per diem unam naturalem exsiccatarum unc. 3. olei omphacini sextarium unum: obstrue diligenter uas ne expiret, expone soli per quadraginta dies: reponque non super pavemento, sed tabula. Alij non soli exponunt, sed in puteo ponunt: alij sodium sub terra quadraginta dies. Arabum modus in butus olei compositione hoc die officinis usitatus mihi melior uidetur. Habet uirtutem frigidam & sipticam, & ideo ad dolores capitis ex fibre seu ex calore solis optimus est.

## Elatinum.

## Cap. XLIII.

**F**RACTA elate tusa & scarifcata, in labellum deiicitur. omphacinum oleum tri duo infunditur, mox per sportulam exprimitur. uerum pares esse debent utriusq; portiones. dein mundo uase ad usus reconditur. Viribus rosaceo pro portione respondet. aluum tamen non mollit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Ελάτη, tencellum palme germen secundum Galenum, iuxta Dioscorid. ipsum fructus tegumentum, πῶδι κέλυμα καὶ ἡ καρπία. Secundum Hirschium, prima palme germinatio. de eo longius & certius in historia palme paulo post.

## Melinum.

## Caput XLIII.



**M**elinum hoc modo temperatur: Olei congius, decem aquæ sextarijs admiscetur. Adijcitur elatæ palmarū fractæ quadrans, & iunci odorati uncia, quæ die uno macerata coquuntur, mox in uas oris patuli oleum excolatur, & indita arundina cea crate, aut uetusta tegere, cotonea mala superponuntur, & uestimentis operata tantisper inhibi resident, dum malorum uires ad se oleum alliciat. Aliqui cotonea, decem dierum spacio operimentis inuoluunt, ut cōtineatur odoris suauitas, nec euanescat. postea bi duo macerata oleo exprimuntur, oleūq; reconditur. Id uim refrigeratoriā & astringentē habet. Contra scabiosa ulcera & quæ serpunt, ac furfures, perniunculosq; effectū prabet. exulceratis uuluis infunditur. citatam urinam sistit infusum. sudores cohibet. contra cantharidas, buprestim, pinorū erucas, bibitur. Laudatur maximè quod cotonea mala olet.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Magnus est hoc in uentris fluxibus. Paulus μέλιτρον uocat, & hunc modum componit: Cydoniorum bene deterforum & cum suis corticibus incisorum accipit unc. tres, olei omphacini sextarium unum, expōnit soli diebus quadraginta.

## Oenanthini compositio. Cap. XLV.



**O**Enanthe è labrusca, optimè olens postquam emarcuit, deiecta in omphacinum oleum mouetur, uoluiturq; & cum bi duo manserit, exprimitur, & reconditur. Astringit, proximum rosaceo effectum præbens: sed aluum non resoluit, aut mollit. Probatissimum est quod odore oenanthen refert.



*Oenanthe vitium sylvestrium germen unà cum floribus Galeno appellatur, ex quo succedentibus diebus uua fit: plura in ipsius Oenanthæ historia & pictura.*

Teleni componendi ratio.

Caput XLVI.



**F**Oenigræci libræ quinq; calami libra una, cypiri libræ duæ, olei libris nouem, septenis diebus macerantur, quotidie termouentur, postea premuntur, & reponuntur. Aliqui pro calamo cardamomum subtitunt, & cypiri loco xylobalfamum macerant. Alij oleo antea his odoribus spissato scenumgræcum macerantes exprimunt. Hoc telinum abscissus emollit, & concoquit. omnibus uuluarum duritijs magnopere conuenit. sceminis difficile parientibus subijcitur, ubi præcretis humoribus loci siccitatem contraxerunt. sedis inflammationes lenit. tenefimo subditum prodest. ulcera capitis manantia furesq; expurgat, ambustis & pernionibus addita cera proficit. uitia cutis in facie emendat. pigmentis ad conciliandum faciei nitorem inferitur. Eligi oportet recens, quod non uehementer scenigræci odorem præ se ferat, & manus abstergat, sapore ex dulci in amarum inclinato: tale enim optimum iudicatur.

EXPLICATIO.

*Hoc unguentum à Silicula, id est, scenugræco nomen habet, in Telo insula etiam Menandri temporibus celeberrimum.*

Sampsuchini compositio.

Caput XLVII.

**S**Erpylli, casia, abrotoni, florum sisymbrii, frondium myrti, sampsuchi singulæ portiones, quadam pro uiribus ipsorum coniectione, unà tunduntur, atque is omphacini olei modus adijcitur, qui madentium uires non euincat. hæc post quadriduum exprimuntur. denuò noua alia, similimensura & æquali tempore macerata premuntur, ita enim ualidius reddi solet. Eligi oportet sampsuchum colore ex atro uiridi, plurimum redolens, mediocriter acre. Vim habet acrem, calfactoriam, extenuantem, aduersus uuluarum præclusiones, conuersionesq; efficax est. menses & secundas & partus extrahit. uuluarum strangulatus recreat. lumborum inguinumq; dolores lenit. sed cum melle uti eo præstat, quandoquidem uehementi astrictione locos indurat. lassitudines illitum discutit. in opisthotonicorum, uulsoforumq; cataplasmata utilissimè additur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

*Maiorana, Amarakus, Sampsychus. Dioscoridi, Theophrasto, Plinio eadem sunt herba: unguentum tamen antarcinum à Sampsuchino cur diuersum sit Dioscoridi, doctè mihi Musa coniectare uideatur, ex plantæ huius appellatione consuetæ utriq; regioni, in qua utrumq; id unguentum fiebat laudatissimum.*

Ocimini compositio.

Cap. XLVIII.

**O**Cimum oleum fit ut cyprinum: Ocimi folia decerpta librarum undecim & bessis pondo, die noctuq; uiginti olei libris macerato, premito, colato, cumq; exhauseris quallum, rursus parem olei modum fundito, & exprimito. Vocatur autem id secundarium, nam tertiæ perfusionis non est capax. Deinde recens ocimum æquali pondere, ut in rosaceo diximus, rursus maceratur, & cum tanto temporis spacio maduerit, exprimitur, & oleum reconditur. quod si in animo fuerit ter aut quater madefacere, semper ocimum recens addes. Potest ex omphacino confici, sed illo modo melius. Idem quod sampsuchinum potest, sed inefficacius.

NOMI



## LIBER PRIMVS.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Ocimum oleum fit ex ocimo aut oximo si manus ab *ὄξω*, quod redolere significat, herba odora, que nunc Basilicon dicitur, Germanice Basilien.

## Abrotonini compositio. Caput XLIX.

**O**lei cyprini odoribus imbuti libris nouem & quincunce, foliorum abrotoni libras octo die noctuq; madefactas, premito, quod si in longum tempus oleum uelis asseruari, eiectionis prioribus folijs, noua appones, & macerata exprimes. Calfacit, ad uuluarum duritias, præclusionesq; efficax est, menstrua & secundas pellit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Abrotoninū oleum corpori infricatum, rigores circuitu remeantes persanat. Abrotoni historiam & picturam quere lib. 3. cap. 25.

## Anethini compositio. Caput L.

**O**lei libris octo & dodrante, florum anethi libras undecim & bessem, maceratas in oleo die una, manibus premito, & recodito: quod si iterum perfundere uelis, recentes anethi flores consimiliter madefacito. Vuluarum duritias emollit, uenarum spiracula laxat, contra horrores febrium circuitu redeuntes auxiliatur, calfacit enim, & lassitudines discutit, prodest articulorum doloribus.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hic Dioscorides pro lib. 8. & unc. 9. olei, ponit florum lib. 11. unc. 8. exponit soli diem unum, deinde exprimit & reponit. Ego tamen non uideo quo pacto olei illa mensura tot florum sit capax. Preferim cum Paulus accipiat comedere siccatæ per unum diem unc. 1. pro Sextario,

## Suisinum. Caput LI.

**S**uisinum, quod alij liliū appellant, sic temperatur: Olei libras nouem cum quincunce, calami libri quinque & quadrās, myrrhæ uncia quinque, permixto odorifero uino decoquantur, & colato oleo, cardamomi tusi & celesti aqua madefacti libras tres & semis macerantur, premunturq; tres libras cum semisse spissati olei assumuntur, mille lilia decerptis folijs, in latum, non tamen profundum, labellum demittuntur: iniectionem olei, manibus melle perunctis agitur: die noctuq; coquiescunt, & in pyxidem matutinis exprimuntur, quod defluet oleum, protinus ab aqua, quæ simul expressa fuerat, colo incerni oportet, non enim, ut rosaceum, moram tolerat, nam concalfactum feruet & computrescit: quare sæpius decapulandum, uasa melle illinenda, tenuis sal inspargendus, & si qua sordes uasis faucibus hæsit, eximenda. Odoramentis iam expressis ex quafillo in labellum transfusis, rursum olei prius odoribus imbuendi, quod primum pondus æquet, & cardamomi tusi drachmæ decem congiuntur. Hæc manibus scitè pressa, interiecta breui mora exprimuntur: quod profluit, repurgatur: tertio eadem infunduntur, adiecto cardamomo & sale, & manibus melle madefactis. Longè optimum erit quod prius exprimitur, secundum quod sequitur: tertium locum sibi uendicat quod nouissimum prodit, denuò in mille lilia euulsis folijs expressum primo oleum infunditur: tum eadem ratione prosequendum, idemq; faciendum ut prius, addito cardamomo, dein expresso: & quo frequētius recentia lilia maceraueris, eò ualidius unguentū efficiet. Deniq; cū factum abundè uidebitur, singulis compositionibus miscere cōuenit myrrhæ quā optimæ duas & septuaginta drachmas, & croci decem, cardamomi quinque & septuaginta: croci uerò & cinnamomi partes portiones tunduntur, & cribratæ in lutram cum aqua demittuntur, expressumq; primo unguentum infunditur, & paulò post excipiuntur uasculis siccis, myrrha aut gummi antea perfusis, & croco, melle & aqua madefactis. eadem sunt in altera aut tertia expressione: aliqui simplex ex balanino, alioue oleo, & lilijs componunt. Optimum esse constat in Phœnice, mox Aegypto factum. Sed cum pri-



mis laudatur quod lilia redolet. Excalfacit, emollit, uulua præclusiones, & collēctiones aperit, utilissimum ad muliebria mala, ulcera in capite manātia, feruidas eruptiones, uaros, furfuresq; emendat, uibices cicatricesq; celerrimē ad colorem reducit, ita ut saepe fallant in summa extenuat, potum bilem per aluum extrahit, urinam ciet, sed stōmachō alienum est, & nauseam parit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Susinum quod σόσινον & λεπίνον Græci uocant, diuersum ab eo est quod lilinum officinae nominant, quum præter lilia & oleum multa alia eius compositionem constituent. Σόσινον σωδέσινον hoc est compositum, sic conficit Paulus: Olei sex. 3. Calami aromatici lib. quinq; myrrhæ unc. 1. Cardamomi lib. 3. σωδένον lilij exungulorum & diem unum expansorum, lib. 10. Cinamomi unc. 3. croci semina. Primo infunde in uino myrrham & calamum per dies quinq; mouendo ter in die: post coque cum oleo donec uinum ferē consumptum sit. Secundo cardamomum aqua infunditur, & ter in die mouetur, & similiter coquitur per horam unā cum oleo. Postea auferentes cardamomū, oleo puro imponis tertiam partem liliorū, & post tres dies, priore ablata, addatur alia tertia liliorū pars, & interim post tres dies hac amota, additur ultima tertia pars cū croco resoluta, & post tres dies oleo puro addimus cinamomū contusum, et reponitur. Idem Paulus in cōpositione simplicis Susini accipit unc. 2. foliorum, & sextariū olei, ut in Rhodino, & exacte obturat ut non respiret, perq; tres dies exponit soli: abieclis dehinc folijs alias unc. duas apponit, & iterum exponit soli per alias tres dies.

## Narcissinum.

## Caput LII.

**N**arcissini olei spissamenta ita fiunt: Sex libræ asphalathi cum sextante tunduntur, olei eloti libræ septuaginta cum uncijs quinq; assumuntur. Asphalathus aquæ inadafactus in tertia olei parte coquitur: quo exempto, calamus quinquæ libris & bese adijcitur, cum myrrhæ gleba contunditur, cribrataq; ac uino ueteri odorato immista decoquitur, simulac autem cumijs efferbuerit, eximitur, refrigeratum oleum excolatur, cuius portio in labellum mittitur, flores narcissi quamplurimi conijciuntur, qui bi diu spaciō, ut in susino dictum est, permoti exprimuntur. Oleū subinde decapulandum, siquidē celerrimē putredinem sentit. Valet hoc ad emolliēdas uulua duritias, præclusionesq; sed capitis dolores facit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Plinius lib. 21. cap. 5. & 19. item Dioscorides lib. 4. cap. 142. narcissi duo genera faciunt, licet & Theophrasto & Apuleio non nisi unum genus constituatur: nisi ex floribus diuersitate duplex eius genus facere uoluerint. Est autē planta narcissus, cōgener aut saltem similis lilio. quare quidā ipsum nō minus quam lilium lilion uocant, ut tradit Dioscorides lib. 4. cap. 142. ubi de narcisso plura.

## Crocinum.

## Caput LIII.

**C**um crocinum componere uoles, prius olei, ut in susino diximus, spissamenta facies, eisdem ponderibus & mēsuris, cuius olei libras treis & semissem, croci unciam unam assumes, identidem quotidie moueto, & sexta die quā hoc assiduū peregeris, oleum à croco colis incernito: eidem croco parem olei modum adijcito, moue triduo\*, dein contusæ myrrhæ atq; cribratæ drachmas quadraginta permisceto, & in pilo agitatum recōdito. Aliqui oleo aromatibus ad cyprinum imbuta in crocini compositione utuntur. Optimum est quod abundē crocum spirat, in medendi usu expetitur. Proximum quod myrrhā refert. Calfacit, somnum allicit: quare persæpe phrenitici subuenit, perfusum, aut naribus admotum, aut illitum, pus mouet, ulcera purgat, contra uulua duritias atq; præclusiones, & ulcera quæ cacoethe uocantur, prodest, cum croco, cera, medulla, duplicato olei pondere: concoquit enim, emollit, humectat, & permulcet, ad oculorum glauitates ex aqua illinitur. Huic autem proportionē respondent būtyrinum, onychinum & styracinum, quæ etsi nominibus distant, uiribus & cōpositione cognata sunt.

\* Alij, dieb.  
tredecim cōtinuis.

Nō.



## EXPLICATIO.

Crocini oleum hodie neglectum quamuis ab authore Luminis inter uulgata & commoda olea recensetur. diuersum tamen ab hoc, quia alia arte utitur quam hic.

Ex unguento crocino fit crocomagma, expressis aromatibus & in massam coactis, quare uiribus inter se non multum distant.

## Cyprini spissamentum. Caput LIII.

**O**lei omphacini eloti pars una, aquæ cœlestis tantundem cum semisse, cuius una parte oleum diluitur, altera adijciendis odoramentis admiscetur: dein assumptis aspalathi libris quinq; & semisse, calami libris sex & semisse, myrrhæ libra una, cardamomi libris tribus & dodrâte, olei libris nouem, & uncis quinq;. Asphalatus tufus & aqua affusus decoquitur in oleo, donec conferuescat. myrrhæ autem uino uetere odorifero subacta, contususq; simul calamus, digeruntur in offulas, quæ exempto asphalatho immittuntur, & ubi efferbuerint, sublato ahenò, oleû percolatur. Cardamomû tufum reliqua aqua aspersum infunditur, spatula agitatur, nulla, dum refrixerit, interpellatione. Post hæc colato oleo, in uigintiocto libras olei, floris ligustri, quod cyprum uocant, sex & quadraginta libræ cum besse instillantur, quæ sufficienter madefactæ per sportulam exprimuntur, quod si copiosius desideretur, idem recentium florum pòdus iniectum simili modo prematur. & iterum aut tertio, si quis uelit, madefacere poterit, & ita reddetur efficacius. Eligi oportet bonum, quod cum odoris suauitate nares feriat. Aliqui cinnamomum addunt. Calfacit, emollit, ora uenarum adaperit, uulua neruorûq; uitis conuenit: pleuriticis, fractisq; per se uel cerato immistum. malagmatis imponi solet, quæ opisthotonicis, angina laborantibus, inflammationiq; inguinum opitulantur. item in a copâ adijcitur.

## EXPLICATIO.

Cyprinum oleum Arabes oleum de Alcanna uocant, quod enim Græcis Cyprus, Arabibus Alcanna est, ut Manardo placet, hodie non conficitur. Posidonius alio modo parabat, ut tradit Paulus Aegineta.

## Irii spissamentum. Caput LV.

**S**pathæ quamminutissimè contusæ sex libras cum besse, in tribus & septuaginta libris & quincunce olei, aëreo uase, additis decem aquæ heminis incoquito, quoad odorem acceperit. postea in capulam melle oblitam colato, ex eo aromati bus imbuto oleo, irinum primo temperatur, iride ex oleo inspissato macerata, ut scripsimus. Sed alia est componendi ratio: In olei septuaginta libris & quincunce, xylobalsami, ut dictum est, contusi, libras quinq; & sextantem excoquito. postea detracto xylobalsamò nouem libras & dextantem adijcito, & myrrhæ glebam uetere uino adorato perfusam, & in olei ita odoribus imbuti quatuordecim libris, totidem tufæ iridis, binis diebus ac noctibus madefacito, strenuè & uehemèter adstringito. quod si uis ualidius fieri, par pòdus iterum ac tertio similiter maceratum exprimito. Longè optimum est quod solam irin olet, quale est in Perga Pamphiliæ, & Elide Achaia natum. Vim habet calfactoriam atq; emollientem, crustas adimit, sordida ulcera & putrida purgat. confert fœminis uulue caufarijs, item inflammationibus eiusdem atq; præclusionibus. partus eijcit, hamorrhoidas recludit, contra auriû sonitus ex aceto, ruta & amaris nucibus, prodest, diuturnis destillationibus, naribus illitum, & contra graueolentia earum ulcerum, quas ozænas uocant, auxiliatur, aluum purgat cyathus epotus. facit ad ilei cruciatus. urinam mouet. difficileis uomitiones adiuuat, perunctis eo digitis & immissis, uel ijs quæ ad uomitum ciendum induntur. angina etiam illinitur, aut ex aqua mulsa gargarizatur. item contra arteriæ scabritiam datur ijs, qui cicutam, coriandrum, aut uenena fungorum hauserunt.

EX.



Alio modo nunc parant officina: esset nunc magnarum uirium si bene pararetur, ut Dioscorides tradit.

## Gleucinum.

## Caput LVI.

**G**leucinum absolutè constat omphacino oleo, iunco odorato, calamo, celti ca nardo, spatho, aspalato, fertula campana, costo, & musto, circumdatis interim uina ceis uasi, quod aromata, uinum & oleum conceperat. Tricenis diebus, bis in die mouetur, postea expressum oleum reconditur. Calfacit, emollit, remittit, horrorib. & neruorum uuluaq; uitij auxiliatur, omni acopo iuuantius, quippe quod emolliat.

## EXPLICATIO.

Γλεῦκινον Latinis sonat musteum, hodie exoletum, eius constructionem monstrat Galenus lib. 7. comp. medic. γλ' γέν. Calfacit & quouis acopo ad emolliendum utilius. Galenus proprium Gleucinum, quo usus est, habuit, cuius descriptionem uide loco iam citato.

## Amaracinum.

## Caput LVII.

**A**maracinum longè optimum in Cyzico fieri solet ex omphacino & balani no, spissamentis ex ylobalsamo, iunco odorato, & calamo factis, cōditisq; amara ci, costi, amomi, nardi, casia, carpobalsami & myrrhæ odoribus. Aliqui, quod preciosius fiat, cinnamomum addunt. Mel autem & uinum assumuntur, hoc in uasorum illitionem, illud ad cogendas tusorum aromatum offas. Amaracinū calfacit, soporem mouet, uenarum spiracula aperit, emollit, feruorem excitat, urinam cit, putrilaginibus ac fistulis perquam utile: nec non humentibus hernijs, postquam medica manus operam suam impenderit: crustas, & tetra ulcera, quæ theriomata uocant, rumpit: difficili urinæ, illita sede, & eius inflammationibus auxiliatur: hæmorrhoidas illitu soluit, uulua subditi mensruos cursus euocat, duntitias, ac uulua tumores discutit, uulneratis neruis, musculis confert, laneo cunctunculo modicè madefactum & impositum.

## EXPLICATIO.

Ex hoc loco quidam probare uolūt amaracū & Sumpsychem diuersas esse herbas quandoquidem de Sampsuchino & Amaracino unguento scorsum scribit Diosc. sed falluntur, Dioscorides enim, distincta fecit capita, quod non sit eadem compositio, sed diuersa.

## Megalinum.

## Caput LVIII.

**F**actitabatur olim Megalinum, sed nunc compositio exoleuit & prorsus oblitterata est: cuius ad historiæ complementum meminisse non fuit alienum. Mistura cum amaracino eadem erat, sed refina exuperabat, hac tantum ratione differens. Quare leuiter emollit. Refina unguentis, neq; tutelæ neq; uoluptatis gratia adiicitur, sed coloris crassamentiq; causa. Ea tantisper coquitur, dum desinat olei: cuius coquendæ ratio declarabitur, dum de refina disseremus.

## EXPLICATIO.

Megalinum oleum etiam Dioscoridis tempore exoleuerat, ut ipse inquit, ante sua tempora aliqui amarati simū. Galenus scribit Mendesiū quoq; Megalinū appellari, ut plura in explicatione Mendesi.

## Hedychroum.

## Caput LIX.

**Q**uod hedychroon uocant, in Co fieri solet, eisdem præditum uiribus & misturis, quibus amaracinum, sed suauius spirat.

## EXPLICATIO.

Hedichroi descriptionem quam Dioscorides hic reliquit, inquitens eandem eius uim ac præparatio nē esse, quæ amaracini est unguenti. Galenus habet tū lib. 1. de Anidosis ex Andromachi uersibus, tum ad Pisonem ex Magni traditione. Habet autem & cā Aëtius. 13. cap. 89. & Paulus 7. cap. 11. uariano

uibus



tibus tamen paululum inter se descriptionibus. Apparet itaq; hediachroi usum nō solum in Theriaca quondam fuisse, sed etiam unguem loco usurpatum esse, & ozanis odoris gratia illitum à Galeno, Sicut etiam pulmonis per odorem resiccandi gratia, cuiusdam se idem exhibuisse refert locorum affectiorum. 4. sine. Qua gratia etiam medicamentis ad sumum comparatis inditum fuit.

## Metopium.

## Caput LX.

**F**It in Aegypto unguentum, quod metopion patrio nomine appellatur, propter galbani missionem: nam lignum in quo galbanum enascitur, metopion uocant: constat amaris nucibus, omphacino oleo, cardamomo, odorato iunco, calamo, melle, uino, myrrha, balsami femine, galbano & resina: probat pingue, graui odore, quod magis cardamomum & myrrham, quàm galbanum respiciat: Calfacit uehementer, & adurit, atq; extrahit, ora uenarum aperit, ulcera purgat, extrahitq; ad præcisos nervos, & musculos, ad hernias humore contractas, cum erodentibus medicamentis efficax est, ceratis & malagmaris inseritur: horribus, conuulsisq; præsertim quibus ceruix in scapulas deiecta, & retrorsum contracta est, utile habetur. sudores ciet, uulnæ spiracula recludit, & eiusdem duritias laxat, in summa, moliendi naturam habet.

## EXPLICATIO.

Metopium ex Galbano unguentum, ut Dioscorides ipse testatur, sic dictum ab ligno ex quo defudat. de lacryma metopij uide plura lib. 3. cap. 79.

## Mendesium.

## Caput LXI.

**M**endesium constat balanino oleo, myrrha, casia & resina. Aliqui tamē post singulorum pondera, cinnamomi exiguum addunt, nullo compedio, nam quæ simul ex cocta non fuere, uim nullam exhibent. Similem metopio uim obtinet, sed inferiorem multo.

## EXPLICATIO.

Mendesium unguentum quo modo fieret docet hic Dioscorides & Paulus lib. 7. cap. 18. meminit eius etiam Plinius. Mendesium dictum est, quod in præfectura Mendesium in Aegypto inuentum esset, & laudatissimum fieret, atq; hoc est quod Paulus lib. 7. cap. 18. ait: ἀλφύρα ὅσα τοῦ αὐγυῖος ἐν γαίᾳ δὲ ἐνθα καὶ ὁ μύδος καὶ τῶν περὶ τῶν. Id est, dictum est Mendesium, propterea quod in Aegypto inuentum sit ubi etiam Mendes nutritur. Quamquam ego pro τῶν περὶ τῶν legendum putem οὐκ ἐστὶν, id est, collitur. Est autem Mendes hircus, itemq; Pan deus, Aegyptia uoce ac lingua uocatus, quem hirci effigie Mendesium uenerabantur, ut etiam ipsi inde appellationem inuenerint, uelut apparet. Hypocrates porro rouinum Mēdeum sepe probat, quod non à Mēdesijs in Aegypto, sed Thraciæ urbe Mendæ appellata nomen inuenit. At uero Galenus lib. 2. cap. 2. de comp. pharm. part. Mendesium etiam Megaleum uocari dicit, utroq; cognomine à Megalo accepto, qui scilicet Mendesium patria fuerit. Sed & Aegyptiū idē à tota regione appellatum est. Dioscorides Megaleum suo tempore defecisse suprā dixit & aliud à Mendesium fecit.

## Staete.

## Caput LXII.

**S**Taete uocatur pinguitudo recentis myrrhæ, cum exigua aqua tusa, & origano expressa. Ea per quàm odorata, ac preciosa est: atq; unguentum per se facit, quod staete nominatur. Maximè probatur quæ nullam olei missionem admittit, cuius minima portio compos est uirium plurimarum. Vim calfactoriam myrrhæ & calidis unguentis respondentem habet.

## EXPLICATIO.

Officina styracem liquidam uocant. Huius sex styrax rubra dicitur Arabum familia.

## Cinnamominum.

## Caput LXIII.

**C**innamominum confit è balanino oleo, & xylobalsami, calami, iunci odorati spissamentis, atq; cinnamomi, & seminis balsamini suauitate conditur, qua



quadruplaq; myrrha ad cinnamomum portione: mel ad cogenda omnia adhi-  
tur. Laudatur non acre, molli odore, planè myrrham redolens, crassum, odora-  
tum, gustu perquam amaro. Id non à resina, sed myrrha, crassitudinem obtinuit.  
resina enim neq; amaritudinem præbet, neq; ullam odoris gratiã adijcit: uim ha-  
bet admodum acrem, amaram, & calfacientem. Itaq; ora uenarum aperit, calfa-  
cit, discutit, diffundit, humores & spiritus attrahit, caput aggrauat, contra uul-  
uæ uicia cum duplo oleo, cera, & medulla efficax est: ita enim ferè multum a crimo-  
niã exolefcit, & quãdam emolliendi uis, contrahitur, alioqui adurit, & præ omni-  
bus crassis unguentis indurat, facit mirum in modum ad fistulas & ulcera, quæ pu-  
tredinis uitium senserunt: item ad hernias humidiores, carbūculos, febrium hor-  
rores, tremores, gangrænãq; cum cardamomo: aduersus serpentium morsus illi-  
nitur, scorpionum & phalangiorum ictibus cum tritis grossis imponitur.

*Cinamomi unguenti Dioscorides hic sanè eleganti præparationem ostēdit: quam tamen facere non possumus, quum uero cinamomo careamus. Sed si etiam cum uulgari paretur, erit satis utile.*

## Nardinum.

## Caput

## LXIII.

**R**atio nardini faciendi uariat. Nam aut malabathrino folio, aut sine eo fit: plerunq; autem balanino oleo, aut omphacino, iuncus odoratus spissamen-  
ti gratia adijcitur: sicuti propter odoris suauitatem, costus, amomum, nardum,  
myrrha, balsamum. Laudatur tenue, non acre, nardi aridæ aut amomi odorē re-  
ferens. Vis ei extenuans, acris: expurgat, excalfacit, absterget humores, rarefacit.  
Hoc liquidum est, nec habet strigmenti crassitudinem, nisi resinam recipiat. Fit  
etiam simplex ex omphacino oleo, iunco, calamo, costo & nardo.

## EXPLICATIO.

Foliatum unguentum ex malabathri folio, quod ipsum etiam peculiariter folium appellatur, com-  
positum fuisse atq; appellatum satis cōstat ex Dioscoride, qui diuersa capita facit, quanquã Plinius lib.  
13. cap. Nardinum & foliatum appellet. Cuius rei causa ex hoc loco Dioscoridis elici potest, ex eo sci-  
licet quod nardinum unguentum tum cum folio tum citra folium malabathri apparari scribit, & mox  
capite sequenti de malabathrino unguento prodit eadem esse eius spissamenta quæ nardini, nisi quod  
plus myrrhæ in ipsum additur. Porro spicatum, à spica nardi quoq; nominatum, ex eaq; compositum  
fuisse nemo dubitat. Fuerant itaq; diuersa unguenta, Nardinum ex optima nardo, spicatum ex nardi  
spica, & foliatum ex Malabathro, quorum ingenia precia Romæ tempore Galeni fuerunt, sicut etiam  
apud Plinium uidere est indicatum. Ceterum Galenus unguentum nardinum lib. 1. cap. 2. de comp. ph.  
part. 1. ter simpliciter nardum uocat, atq; id etiam genere foeminino. habet enim, *μῆλα νάρδου τῆς ἀ-  
γίας*, id est, cum optimo nardo, & mox *τῆς δὲ νάρδος μῆλα* & *μῆλα νάρδου*, id est, liquefacto cum nardino. &  
rursus, *νὰ νάρδου μῆλα* & *μῆλα νάρδου*, id est, cum myrrho aut nardino uti: quæ modum  
loquendi etiã hic Dioscorides usurpauit de nardino unguento, ita loquēs: *ἀλόμας δὲ αὐτῆς λεπτὴ  
τῆς δὲ μῆλα*, & cæt. Et mox *ὑγρὰ δὲ ἐστὶ νὰ δὲ γλοιώδης*, id est, liquidum est, & non strigmento-  
sum. Nam de ipso nardo hoc intelligi non potest, & Tibullus poeta,

*Iamdudum Syrio madefactus tempora nardo,*

*Hoc est nardino unguento. & Horat.*

*Nardo uina merebere. Nardi paruus onyx elucet cadum.*

## Malabathrinum.

## Caput

## LXV.

**M**alabathrinum spissamenta nardini habet: insuper myrrhæ plusculum ad-  
ditur, qua de causa calfacit, crocino, aut amaricino uiribus respondens.

*Malabathrinum siue foliatum dictum à Malabathro. uel potius nardus piscifera illa, cuius Euangelis-  
te meminerunt, si Barbaro credimus, hodie peregrinum & exoletum.*

## Iasminum.

## Caput

## LXVI.

*Hoc caput  
non putatur  
esse Dioscor.*

**A**pud Persas fit, quod Iasminū cognominatur, ex albis floribus uiolæ: quo-  
rum sextans, in Italicum sextarium sesamini olei demittitur, uiolis, ut in  
lilino diximus, uicissim permutatis, Apud Persas inter epulandum usurpatur  
odoris



odoris causa. Nam toti corpori conuenit, præsertim cum in balneas descensum est. Sed his opitulatur corporibus, quæ calfactionem, laxationemq; desiderant, grauius enim spirat, quàm ut libenter à plerisq; recipiatur.

## EXPLICATIO.

Iasminum, iasme, uel iosma, frutex topiarius in Gallia hortis colitur. Græcum nomen subolet, licet ueterib. ignotū fuisse uideatur, ut Ambrosio Musæ placet quia Serapion in cap. de Zambac, siue Sambac, siue Iasmin, authores Græcos non citat, quod argumenti genus tamē ualidū non est, quū quandoq; ille idem author de aliquo simplici medicamento commemorat, de quo antiquiores quidam Græci mentionē habuerunt, tamen eos ut illius rei ignaros præterit: quandoq; uerò illos citat, cum tamen nulla sit in eorum, quæ apud uos sunt, cōmentarijs, memoria. cuius igitur æstimandum est Iasminū uiolam Dioscoridi innotuisse, cum hic Iesminum siue Iasminum unguentum describat, ab ea uiola sic cognominatum, quemadmodum etiam Hermolaus annotauit: tamen si nonnullas esse sciam antiquorum compositiones, quæ ab aliquo simplici medicamento cognominari uidentur, in quas tamē nullum huiusmodi immutatur. de hac re plura in sequentibus.

## Myrrha.

## Caput LXVII.



**M**Yrrha lachryma est arboris, quæ in Arabia gignitur, Aegyptiæ spinæ non dissimilis, è cuius uulnere defluit lachryma in subiectas tegetes: alia circum caudicem concreuit. Dicitur ex his aliqua pediasimos, præpinguis, quæ expressa, stacte emittitur: alia gabi rea, pinguis, lato & pingui solo nascentis, ea copiosam sudat stactem. Omnium prima est quæ trogloditica appellatur, accepto cognomine ab loco, in quo prouenit, splendens, subuiridis, ac mordens quinetiam legitur tenuis\* quædam, quæ à trogloditica secunda est, bdellij modo mollis, uerum odore grauiuscula, apripis nascentis. Alia caucalis cognominatur, præter modum exoleta, nigra, & retorrída. Omnium deterrima quæ ergasima dicitur, pingui carens, cano situ obducta, acris, ad gummis imaginē uergens, & uiribus eius proxima, improbatur aminea cognomine, ex ijs pastilli fiunt, sed è pinguibus pingues, & odoratis è ficioribus haudquaquā pingues, & inodorati minus odore\* quæ oleum non admittit, cum in pastillos digerebatur. A adulteratur macerato gummi aqua, in qua myrrha maduerit. Eligenda est recens, squalore obfusa, leuis, undique concolor, quæ contracta uenas unguium modo candidas & laues ostendat, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciēs, superuacua & inutilis est ponderosa, coloris piceo. Calfacit, cohibet, soporem gignit, glutinat, siccat, astringit, uulnam emollit, & præclusam aperit, menses & partus celeriter extrahit, cum absinthio, lupinorum cremore, uel succo rutæ admota, tuberculo fabæ deuoratur in uetere tussi, orthopnœa, in laterū pectorisq; dolorib. in alui profluuiio, & dysenteria. horrores discutit, duabus horis ante febrium accessiones, fabæ magnitudine pota cum pipere & aqua, subdita linguæ liquataq; scabritiem arteriæ expollit, obtusam uocem expedit, uentris tineas enecat, contra grauem oris halitum manditur, & aduersus alarum tedia, cum liquido alumine illinitur, gingiuas & dentes stabilit, colluto cum uino & oleo ore, uulnera capitis illitu glutinat, medetur fractis auribus, ac ossibus nudatis, peruncta cum cochleæ carnis. item purulentis auribus inflammatisq; cum meconio, castorio, & glaucio: ad uaros aurem cum casia & melle illinitur, impetigines ex aceto purgat, defluentes capillos cum ladano & uino myrteo illita, firmat, diuturnas destillationes lenit, illitis pinna naribus, oculorum ulcera compler, albugines tollit, caliginem discutit, scabritiem lauigat, fit è myrrha, perinde atq; thure, fuligo, & ut postea ostēdemus, ad eadem conueniens Bœotica myrrha, dissecta radix est arboris cuiusdam in Bœotia nascentis. Melior est quæ myrrham odore repræsentat: uis ei calfactoria inest, emollit, discutitq; suffimentis commodissime inseritur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *σμύγνα, μύρρα*. Latine Myrrha appellatur.  
 Officinis nomen retinet. Germani Myrrhen. Galli Myrrhe uocant.



- Lib. 5. simp.** Myrrha est arboris Arabice lachryma, calida sicca ordine secundo, tenuis essentie, multa amaritudine, terget potenter, tamen sine exasperatione, imò lenit: digerit non ignauiter, sed citra rofionem.
- Lib. 1. 6. cō.** siccatur ualde, tamen sine astrictione: coquit modicè etiam prauos humores, & præter naturam habentes: ph. part. & qua ratione stomachicis in id malum compositis miscetur, sed pauca, & cuius qualitas medicamento se absurditas odoriferis superetur, tamen ea tutius auferri potest. Myrrha rubra Acluario,  $\sigma\mu\upsilon\rho\upsilon\alpha\ \alpha\lambda\delta\iota\upsilon\eta$ , Myrrha uerax eidem. Eligenda recens, squalore & situ obducta, leuis, tota cōcolor, & quæ constricta candidas unguum modo uenas, & leues ostendat, glebis minutis, amara, acris, odorata,
- Lib. 9. cōp.** ut Dioscoridi placet. Quapropter colice Paccij Antiochi pauca myrrha miscetur, quæ odorem tantummodo præstet. improbatur  $\alpha\mu\upsilon\upsilon\alpha$  nomine Dioscoridi: Galeno autem eligitur Troglotyris, quæ & Minea dicitur à regione ubi præstantissima gigni affirmant. Egregiatissimi sit odoris, et nullo uicia
- Lib. 6. cōp.** ta liquore (ubi Minea, uelut bis lib. 9. comp. ph. part. legitur,  $\mu\upsilon\upsilon\alpha$ , uidetur eadem quæ Dioscoridi ph. part. & Aminea improbatur) adulteratur enim gummi macerato aqua, in qua myrrha maduerit, ut Dioscorides tradit. Vera enim est rara inuentu, præcipue sincera: nam optimam myrrha opocalpason inuenitur ab optimam myrrha diuersum, ut in Galbano sagapenū, in castia cinamomum, & horum aliquid medium, quæ à se inuicem discernere is solus potest, qui sæpe ea obseruat, adeo ut ex una sæpe solanota internoscat. Nam Sagapenum ex Galbano odoris hircini speciem retinet: non habet autem propria tcm odoris cuiusdam, ut propriè dictum Sagapenū. Tamen in hoc Sagapeno & congeneri Galbano parua est differentia ad medicamenti compositionem. Ambo enim cōueniunt, qui aduersantur uirulentis & deleterijs: sed Galbanum minus Sagapeno. At opocalpason lethale est intra corpus sumptum: ob id sua etate multos periisse scribit Galenus usu myrrhæ, quæ opocalpason habebat, à nonnullis de industria mistam myrrhæ, ut eam redderent laudatissimam. Nam sic mista, collirijsq; indita, pus citra rofionem discutit, ac interdum suffusionem incipientem substantia tenuem, siue ceratum, siue emplastrū, siue aliud medicamentum myrrham opocalpaso mistam recipiens oculo iniicitur. Myrrha igitur officinarum omnino adulterata parum tutus est usus in sumendis.
- Haftenus Galenus lib. 1. Amid,**

## Styrax.

## Caput LXVIII.

**S**tyrax lachryma est arboris malo cotoneæ similis. Præfertur sordescens, flavus, resinosus, albicantibus grumis, quamplurimum in sua odoris gratia permanens: qui dum mollitur, melleum liquorē reddit, qualis è Catabalis, Pissidia, & Cilicia deuehitur. Deterior niger, furfurosus, friabilis, canoq; situ obductus. Cæterum lachryma inuenitur gummi similitudine, perlucida, & myrrhæ emula, uerum per pauca manat. Adulteratur ligni scobe, quam uermiculi erodentes excusserunt, melle, & iridis sedimento, & quibusdam alijs. Alij ceram aut adipem odoribus imbutum, flagrantissimis foliis cum styraçe subigunt, & per laxa cribri foramina in frigida aqua uermiculos exprimunt, uenundantq;. Styraçe hūc, quoniam in uermiculorum speciem contrahatur, scoleciten cognomināt, quem tanquam syncerum imperiti approbant, non animaduertentes ad præcipuam odoris fragrantiam: siquidem acer admodum est, qui adulterationis uitio caret. Styraçe calfacit, emollit, & concoquit, medetur tussi, destillationibus, raucedini, grauedini, & interceptæ uoci, uuluz præclusæ duritiæ laboranti conuenit, citra menses potu appositūq;, aluum leuiter mollit, si exiguum cum resina terebinthina catapotij modo deuoretur, miscetur utiliter discutientibus malagmatis, acopisq;. adoletur autem & igni torretur, ut fiat ex eo, uelut ex thure, fuligo, ad eadem conueniens ad quæthuris fuligo, ex eo etiam in Syria styraçinū oleum contponitur, quod calfacit uehementer, & emollit, uerum caput dolore afficit adgruatq;, & soporem adfert.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè  $\Sigma\tau\upsilon\rho\alpha\varsigma$ .

Latini Græcum nomen retinere.

Officina perperam uocant storacem calamitam.

**Lib. 8. simp.**

Styrax lachryma est arboris Syriacæ, calfacit, mollit, coquit, tusses, catharros, coryzam, brachomenses autem mouet sumptos & admotus. Styracis drach. unam misceat Andromachus arteriace 13. lib. 7. comp. pharm. part.

**Lib. 1. Ant.**

Adulteratur multis modis Dioscoridi: sed ab eo præscriptis notis dolus deprehenditur.

**Styrax cala**

Styrax injiciendus theriacæ, qui ex Pamphilia in arundinibus affertur, hic autem paucissimus est, mites. Et tanto discrimine à copioso hac Styrace variat, quantum salernum nimum ab eo, quod in tabernis

mendatur



uenditur. Tamen illius penuria. huius accipe quod calidissimum & odore & gustu ualidissimum est. Lib. 5. simp.

Styrax, ut crocus, myrrha, quantitate sunt deleteria: nam largius pota quædam dementant, quædam cap. id. mentem auferunt, sed mensura apta alijs mista iuuant.

ΣΤΥΡΑΞ ὡς ἀνίορ, id est, Hispanum cognominatur. Aëuario in Trochisco Neapolitæ.

## Bdellium.

## Caput LXIX.

**B**dellium, alij bolchon appellant, alij madelcon, lachryma est saracenica\* arboris. Probatum gustu amarum, translucidum, taurini glutinis in morem, in tus pingue, liquescens facile, ligni ac fordis expers, suffitu odoratum, ungui simi-  
le. Est etiamnum bdellij genus iordidum, nigrum, uberioribus glebulis in offas  
conuolutum, aspalathi odore, ex India aduectum. defertur etiam à Petra oppi-  
do siccum, resinosum, liuescens, sed facultate secundum. Adulteratur gummi: sed  
ita uitiatum non perinde gustui amaritudinem representat, nec usque adeo suffi-  
tionibus odoratum, calfacit & emollit duritias, & turgentia guttura, humidascq;  
hernias discutit, cum ieiuna salua dilutū, uulua spiracula laxat appositū & suffi-  
tu. & partus humiditatesq; omnes extrahit, calculos potu cōminuit, urinam mo-  
uet, tussientibus, à serpente percussis, utilissimè datur, ualet ad rupta, uulsa, laterū  
dolores, & discursantes spiritus, malagmatis inferitur, quæ cōtra duritias & ner-  
uorum nodos profunt, contusum resoluitur affuso uino aut aqua calida.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci Βδ'έλλιον. Latini bdellum arborem & ipsius lachrymam uocant Græca appellatione, quo nomine & Germanis & Gallis cognita lachryma.

Bdellium lachryma est arboris Sarracenicæ, calfacit, mollit et coquit, discutit mediocriter. Scythi-  
cum est acrius, resinosius ad emolliendum efficacius. Arabicū autem è petra delatum resinosum, liuescens,  
dilucidius, magis siccans quàm emolliens, nisi recens et humidum sit, et quod tundendo facit mollescat,  
id enim idem pollet quod Scythicum. Tertium Indicum addit Dioscor. sordidum, nigrum, grandiori-  
bus glebis in offas conuolutum. Optimum uerò est, ligno, cortice, sordibus carens, ut taurinum gluten  
translucens, ob id bdellium clarum dicitur lib. 8. comp. pharm. part. quo libro Damocrates, in quarto  
malagmate Bdellium onycha appellat optimum bdellium, & quod incensum ac suffitum onychis Indicis  
eōchilij teste odorem refrat. tale hic Dioscorides optimum esse dicit: Nimirum ut ipse inquit, ἐν δὲ τῷ  
ἐν τῷ θυμιάσει τοῖς ὀνυχί. hoc est, odoratū in suffitu similitudine onychis. Atq; sic sanè lib. 2. de an-  
tidotis in Charmidis antidoto, ex eodem Damocrate, à Galeno citatur, hoc uidelicet uersu, Βδ'έλλιον  
ὄνυχον & τὸ θυμιάσει ὡς θυμιάσει, id est, Onychasq; bdellij cape drachmā lucidi. Et paulo post  
lib. 10. de comp. pharm. part. cap. 2. in Fabulla malagmate; Βδ'έλλιον ὄνυχον & λίτρον. B. habemur, hoc  
est bdellij onychis lib. 2. ut onychis uox quasi appositio sit, declarans optimi bdellij speciem. Poscit ta-  
men fortassis æquè rectè Damocratis uersus sic legi: Βδ'έλλιον ὄνυχας τὸς ἴσος θυμιάσει, id est,  
Onychasq; bdellij pares alumi. Sed in Græco exemplari ita expressum habetur: Βδ'έλλιον ὄνυχας τὸς  
ἴσος ἵσος θυμιάσει. ut genus tantum uocis ὄνυχον sit mutatum, τὰς ἵσος enim, ὄνυχας dictum est,  
quali ἡ ὄνυχας æquè ut ὄνυχας dicatur, quod tamen uelut ad Βδ'έλλιον foemininum genus relatum, acci-  
piendum uidetur. Verum utro horum posteriorum modorum legas, ambiguitas & suspicio oboritur,  
ἐννυχας uocem non ad hanc quam ex Dioscoride ostendi, odoris similitudinem referendam esse, sed ad  
similitudinem ὄνυχας unguis, ut uidelicet unguis bdellij indicari accipiamus, atq; sic sanè Marcellus  
Dioscorid. locum hunc interpretatus est, nempe τοῖς ὀνυχί, humano ungui colore simile uertendo,  
fortassis ex Plinio inductus qui lib. 12. cap. 9. Baetiano inquit, nidor siccus, multiq; candidi unguis,  
quasi ex Græco reddidisset, τὸ δὲ βακτηριανὸν λεῖος ἔχει καὶ πολλοὶ λευκοὶ ὄνυχας, quod ta-  
men minime credo aliquem Græcum scriptorem sic prodidisse. In hodierno certè pharmacopolorum  
bdellio nulla similitudo ad unguem cōspicitur, ad onychem uerò aromaticam Indici conchilij testam,  
bdellium accensum odoris similitudinem habere libentius crediderim, & eius rei periculum etiam face-  
re possumus, si onychem aromaticum habemus. Nam quæ Blattæ Bytantia uulgo appellantur, ut in-  
fra audies, dubium apud me est an ueri onyches existant, qui apud Dioscorid. libro sequenti describun-  
tur: sicut possibile est etiam bdellium officinarum non esse sincerum, ut certum ex suffitu utriusq; expe-  
riminum facere non queamus. Sed tamen ego penitus nullam aliam sententiam Dioscoridis uerborum  
esse opinor, quàm eam quam à principio dixi, atq; ita etiam Galeni locos à me citatos accipiendos.



Thus.

Caput LXX.



**T**hus in ea gignitur Arabia, quæ thurifera cognominatur. Primatum tenet in eo genere masculum, stagnias appellatum, suapte natura rotundum. tale autem indiuiduum est, candidum cū frangitur, intus pingue, in suffitu statim ardens. Indicū uero fuluescit, & colore liuet, sed rotundum industria factitant: nam in quadrangulares formas dissectum fictilibus uersant, donec rotunditatem contrahat. uerum huiusmodi thus tempore flauescit, quod aramum aut syagrum appellant. Secundum locum habet Arabicum, & in Smilo nascens, quod aliqui copiscum uocant, minus multò & fuluius. Est & genus aliud, cui ammittæ cognomen est, alioqui candidum: quod dum molliuit, mastiches more digitis cedit. Adulteratur in itinere, pini resina & gummi: quod faciliè deprehendi potest, siquidem suffitum gummi flammam non excutatur, & resina in fumum euanescit, thus uero statim ardet, idem maleficium odor prodit. Ad calfaciendum & astringendum pollet. oculorum caliginem discutit. caua ulcera complet, & ad cicatricem perducit. cruenta uulnera glutinat, infrenatq; cunctas sanguinis eruptiones, etiamsi cerebri membranis effluat. ulcera quæ cacoethæ uocantur, & sedis & reliquarum partium permulcet tritum cum eo & lacte linamentum, formicantes uerrucas inter initia, impetiginēsq; ex aceto & pice illitum, tollit. ambusta igni, pernionesq; cum suillo adipe aut anserino, & ulcera in capite manantia cum nitro, si infricetur, sanat. paronychijs cum melle, auribus fractis cum pice, medetur. ad reliquos aurium dolores cum dulci uino infunditur. inflammata à partu mamma cum cimolia & rosa cœo magna utilitate perungitur. additur ad arteriæ uiscerumq; medicamenta. prodest sanguinis excreationi potum. sed in secunda uale tudine haustum insaniam mouet, & largius cum uino potum interficit. In fictili mundo thus crematur, flagrante glebula succensum à lucerna, donec exuratur. post perfectam uisionem operire oportet usq; dum restinguatur, sic enim in cineres non redigitur. Aliqui ollulam æneo uase cauo circa medium perforato cingunt ad excipiendam fuliginem, ut in eius mentione mox ostendemus. alij crudo fictili luto oblito, & in fornacem indito, cremant. Fictili etiam nouo uiuacibus prunis torretur, dum non amplius bullet, aut pinguedinem uaporemue emittat: faciliè enim comminuitur quod perustum non est.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè λίβανος.

Latine thus arbor lachrymam sibi cognominem fundens. In Officiis Latinam appellationem seruauit.

Germanis Weyrauch.

Gallis Encens &amp; labre dencens, dicitur.

Thus est lachryma Arabice arboris, calidum ordine secundo, sic ut primo, modicè astringit, terget imbecilliter, coquit phlegmonas, acrodyon est & sarcoticum, cicatricem remouet, emplastrum temperaturam iuuat, acerbis mistum uehementiam illorum obtundit, pus mouet, quia calidum emolasticum, nullam eminentem astringendi uim sortitum, præcipuè pinguius & albius. Nam flauius siccat magis.

Primatum tenet in thuris genere masculum, quod λίβανος ἄρρεν Αἰθuario dicitur, suapte natura rotundum, indiuiduum, candidum, cum frangitur intus pingue, in suffitu statim ardens. Dicit autem Dioscorides naturaliter rotundum, quod Galenus lib. 8. cap. 10, comp. pharm. ἄρρεν uocat in quodam Aristarchi medicamento, nam sectum de industria rotundum fit, nimirum cum quadrangulæ figura sectum ac in figulinum coniectum, tandiu obuoluitur, donec rotundum fiat atque hoc ὀψιμορον appellatur, illo deterius, ut contrariæ appellationis. Dicuntur hæc genera etiam θυρίον & ἄλμυρον.

Thuris



## Thuris cortex.

## Caput

## LXXI.

**P**Ræfertur thuris cortex crassus, pinguis, odoratus, recens, lauis, minimè scaber, sine membranis. Adulteratur admiſto pini aut nucis eius cortice. sed horum index ignis est: siquidem reliqui cortices suffiti nequaquam incenduntur, sed sine odore fumum eructant. thuris uerò cortex ardet, & cum odoris fragrantia uaporemeiaculatur. thuris modo uritur, & uis eadem quæ thuri, sed ualidior astrin- gentiorq; Quare potu cruentis ex creationibus, uuluis fluxione laborantibus, in pecto confert. ad cicatrices oculorum, & caua fordesq; efficax est. tostus scabris lippitudinibus auxiliatur.

## EXPLICATIO.

Cortex thuris insigniter astringit, siccatur ordine secundo, crassiorum est partium quam thus, minime habet acrimoniā, ardet igni cum odoris fragrantia.

## Manna thuris.

## Caput LXXII.

**M**anna thuris probatur candore, micarum frequentia, & puritate. Vim habet eandem quam & thus, sed inualidiusculam. Sunt qui cribrata pini resina ac polline, aut cortice thuris contusi adulterant. sed hæc igne deprehenduntur. Neq; enim æquè suffitu aërium uaporem, sed fuliginolam & impuram expuit, & permistum sua uolentia halitus uirus habet.

## EXPLICATIO.

Mannam, seu mannum thuris (ut lib. 9. comp. ph. par. bis leges) propriè uocant micas thuris ex magnis fisticulis concussis elisis, à thure leuigato diuersas. Nam fragmenta quædam exigua corticis thuris ei manna inhereant, à quibus exiguum quiddam astringentis assumptis, qua differt à thure, quippe quo magis astringit, tamen etiam coquit, ut Galenus lib. 1. comp. pharm. part. & lib. 13. Meth. Dioscorides hic mannā albam puram et granulosa probat, ita enim γαρ δὲ οὐδὲν ἀποδέχεται. Verum uim eius remissorem thure facit, cuius contrarium ex Galeno ostendi Gal. lib. 3. cephalicum medicamentum aridam recenset. Sed lectio corrupta est in Græco exemplari, legitur enim λιβαίνοντος μάννης. quæ res fecit ut interpretes uerterit. Componitur ex iride, & aristolochia, & eruo, & thure et manna, id est, cortice thuris: gemino errore, propter unicam syllabicā tantum particulam admissa. pro manna enim thuris primum thus per se uerit, & mox etiam eius mannā adicit, cui cum apponeret, corticem thuris per eam significari, errorem alterum incidit, Mannam corticem thuris interpretando, cum micas aut grana oportuit, aut mannā simpliciter ut Græci, dicere, sed ita interpretatus est ut corticem tanquam à thure diuersum aliquid, in medicamentū addi indicaret, quum intra ipsius thuris micas nihil differre putaret. At uero ipsum thus solum, aut eius adeo mannā in hoc medicamentum corripere de bere ex præcedentibus & sequentibus apparet. Quod autem alterum pro altero interdum usurpet, ex lib. Meth. 5. patet, ubi ait, καὶ μάννην δὲ αὐτὴν λιβαίνοντος ποτὶ ἀβάνου. ἐστὶ δὲ συγχεῖται κώτερον μὲν φάρμακον ἢ μάννην ἢ λιβαίνοντος. ὁ λιβαίνοντος δὲ ἐμπλεσιώτερος ἢ μάννης. Quod uerò ad carnem gignendam illo loco thuris mannā potius quam ipsam thus indicari ex 5. Meth. ad finem hæc uerba indicant. μετὰ δὲ ἐγχεῖν αὐτὴν ἐν φημίοντι μάννης ἀντὶ τοῦ τοῦτο. Sorbonius porro Largus mannā thuris sepe numero pollinem thuris appellat. Paulus uerò lib. 3. cap. 22. de cicatibus & albuginibus oculorum μάννην appellat etiam μαμμήν, atq; ita etiam Aetius uocat serm. 12. cap. 44. in fine.

## Thuris fuligo.

## Caput LXXIII.

**F**uliginem thuris sic facito: Forcipicula, lucernis accensas singulatim thuris glebas, in nouam fictilem ollam concauam imponito, & æreo uase in medio perforato, deterſa diligenter forde, obtegito. alteram admoueto, ex altera eius parte aut utraq; subiectis quaternum digitorum altitudine lapillis, quò facilius perspici queat. si urantur, & qua locus capax fuerit, glebula alias supponito, & antea quam prorsus prior gleba restinguatur, aliam imponito, donec sufficien- tem fuliginem uidearis coëgisſe. Continuo tamen externæ æramēti partes spongia, aqua frigida madefacta, abstergantur: ita enim temperato æris feruore, fuligo omnis inhærebit, quæ alioqui per leuitatē decidua, thuris cineribus admisce-



# DIOSCORIDIS

tur. Derasa itaq; fuligine, cinis cremati thuris seorsum subtrahendus est. idem opus, quoad satisfactum tibi uidebitur, obeundum. Oculorum inflammatione-  
mitigat fluxiones suspendit, ulcera purgat, caua explex, carcinomata fistit. Simi-  
li modo è myrrha, resina, styrace, reliquisq; lachrymis, fuligo excipitur, ad ea-  
dem conueniens.

## EXPLICATIO.

Alium modum querendi thuris fuliginem, uide apud Vitruium de architectura. nescio tamen an a-  
liquis hodie in usu sit. plura in annotationibus nostris in cap. 80. huius libri de fuligine liquida pice.


Picea & Pinus.

Caput

LXXIII.

Nux pini.

Nux pini.



**P**inus & Picea gen-  
ri eidem ascribun-  
tur, sed quendam flagi-  
tant specierum distin-  
ctione. arbores uulgo  
cognita, quarum cortex  
astringit, prodest tritus  
& illitus intertrigini,  
ulceribus summum cor-  
pus occupantibus, am-  
bustisq; cum spuma ar-  
genti & manna. ulcera  
delicatulorum acrimo-  
niam recusantium, cera-  
to myrtino exceptus,  
ad cicatricem perducit.

tritus cum sutorio atramento serpentina cohibet. suffitu partus & secundas eicit.  
potus aluum sistit, urinam mouet. Folia eorum trita & illita inflammationes le-  
niant uulnera ab inflammatione uindicant. trita autem & decocta in aceto, fer-  
nient collutione, dentium dolores mulcent. hepaticis utilia sunt, drachmae pon-  
dere in aqua aut mulsapota. Pineae nucis cortex & folia potu idem praestant. Te-  
da earum particulatim secta si in aceto coquantur, & de cocto deus colluatur, dolo-  
res leuat. ex his etiam fit spata acoporum pessorumq; compositionibus idonea.  
quinetiam earum crematarum fuligo ad librarij atramenti confectionem exci-  
pitur. ea circumlitionibus efficacissime imponitur, quibus palpebras ornant, co-  
loremq; mentiuntur, calliblephara Graeci uocant. arrosis oculorum angulis, cal-  
lois glabrisq; genis, & collachrymationibus opitulatur. Pityides appellantur pi-  
norum piceaq; fructus, qui in conis inueniuntur. Vini astrictoriam habet, & ali-  
quantum excafacientem. tussi & pectoris utriusq; auxiliantur, per se, aut ex melle  
sumpti. Noces pineae cum repurgatae maduntur, aut cum passo aut cucumeris  
semine bibuntur, urinam cient. acrimonias in renibus & uesica heberant. stomachi  
rosiones leniunt. data cum portulacae succo, uirium infirmitatem roborant. cor-  
ruptorum quoq; humorum labem obtundunt. Pineae noces integre receter arbo-  
ribus decerpae in passo franguntur. & decoctae, uetusti tussi ac tabitudini confo-  
runt, si quotidie ex eo liquor eterni cyathi bibantur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Pinus Graece πινυς. Germanice Eyn forchen/ arben/ bünge sticht zweffen/ so man pineen  
Fernen nennet. Gallice ung pin uocatur.  
Piceam Graeci πίστρον. Germani Rott dannen ut quibusdam uidetur, alijs eyn Sicht dannen.  
Galli ung abre du genre du pin appellant.  
Pinus arbor uulgo nota, non nisi à uertice ramosa. folio pectinum modo dissecto promissoq; acma-  
erone aculeato, conis lignosis frequenti nucamento in turbinata effigem copastilibus, in quibus nuclei  
singulis cameratis toris incluse. Officinae piceas, Germani pincen Fernen. Galli corix au pomes de  
pin appellant, sunt magni usus in officinis.


216



LIBER PRIMVS.

Picea uerò larici simillima est, folio breui, sete proximo, crassiore tamen duroq; ut eypressis, immortali uirorē: ad laricis uerò comam colliso, rariore, sicciore, tenuiori q; ac magis argenti: rami statim à radice modici, uelut brachia lateribus inherere, materia abieti proxima, frequēs in Alpibus. Collyris uisitur, fundens resinam thuriusq; eo similem, ut pro eo sepe fallat, & odor adest nō ingratus. Galli du garipot uocāt. Nucces pineis similes sed minores, ut & arbor tota pinu humilior graciliorq;. Pinus et picea, ut scribit Dioseorides, eidē adscribuntur generi: sed quandā flagitant specierū distinditionē: sic autē differt à pinu picea, quod pinguior ac tenuior folio est, quodq; minus alta, minusq; recta, quā pinus adsurgit: praterca & conū minorē ac magis argenti, nucleos quoq; resina per fusos obrinet. Viriq; folium capellamenti modo prætenue, ac breui seta uillosum, crassiore, durāq; seu eypressis. materia candida & abieti similior. Pinus uilis radicibus non repullulat. Picea repullulat, ut in Lesbos uidisse Theophrastum scribit, incenso Pyrrhei montis nemore, quod pinis seatebat.

Lentiscus.



Cap. LXXV.

**L**entiscus nota arbor est, cui uis inest astringendi. semini enim, folio, ramo, cortici, radicibusq; cognatae insunt uires. Liquamentum autem ita fieri solet: Folia, cortex & radix in aqua coquuntur, & ubi abunde cocta refrigerataque sunt, folia abijciuntur. aqua denud coquitur. donec mellis habeat crassitudinem. Lentiscus sua adstringendi dote, ualeat aduersus sanguinis reiectiones, aut ui profluuia, & dysenterias in potu. item contra eruptionem sanguinis è uulua, & eiusdem aut sedis procidentia. In totū acaciae & hypocistidis uicem representat. idem facit succus è tritis folijs. Decoctum fortitaua explet, & fracta ossa ferruminat. uuluarum fluxiones sistit. nomias arceat. urinam pellit. motus dentium collutione stabilizat. Virentes surculi calamulorum uice dentibus repurgandis affricantur. Fit è semine oleū, quod prodest cum quid astringi opus est. Lentiscus resinam gignit, quae lentiscina cognominatur, & ab aliquibus mastiche. Pota utilis est sanguinem reiicientibus, & tussi ueteri. stomacho auxilia tur, sed ructum mouet. additur in den-

nificia & illitiones faciei, ad nitorem cuti conciliandum. palpebras oculis incommodas replicat. manducata halitus oris commendat. gingiuas contrahit. Optima & copiosissima in insula Chio prouenit: Praefertur nitedulae modo resplendescens, & candore Tyrrhenicae cerae similis, adulta, retorrída, friabilis, odorata, stridorem ædens. Viridis autem inferior est. Adulteratur thuris, resinaeque pineae nucis mistura.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Graecè Ξύον. Latine Lentiscus. Officinis incognita. In Germania non prouenit.

Galli Lentiscus, & Restringe Monspefuli uocant.

Arbor est roboris magnitudine, forbi folio, terebinthi odore, acinis syluestris punicea rubentibus ubi maturuerint nigris, tantisper dum coquantur rufis. Fertur & alia iunipero similis.

Lentisci baccas schinides appellant Hippocrates.



Resinam lentiscus ubiq; sudat, mastichem uero dictam in Chio tantum insula fr̃e, Officinali Gr̃eo & Latino nomine cognita, Germanis & Gallis mastix appellata. Parum astringit, siccatur sine morfu, calida & sicca ordine secundo, minimum est acris, tenuium maxime partium, stomachi intesti-  
norum, hepatis imbecillitati & phlegmone prodest: Laudatissima & copiosissima ē Chio insula (unde Galeno Mastiche Chia passim dicitur) affertur.

## Terebinthus.



## Cap. LXXVI.

**T**erebinthus cognita arbor est, cuius folia, & semen, & cortex astringunt, & ad eadē ad quā lentiscus conueniunt, simili parata modo sumptaq;. Fructus eius aptus est, sed stomacho aduersatur. ex calfacit, urinā mouet, uenerem excitat. contra phalangiorum morsus conuenienter in uino bibitur. Resina eius ex Arabia petrāa defertur. Prouenit etiam in Iudaea, Syria, Cypro, Aphrica & Cycladibus insulis. sed praua et candida, perlucida, uireo colore, & in caeruleum uergente, odorata, terebinthum olens. Terebinthina resinas omnes antecedit. proxima lentiscina, & ē pinu, & abiete. has sequitur ē picea & pineis nucibus resina. Natura omnibus calfacere, mollire, discutere, expurgare. tussi ac tibi conueniunt per se, aut in eglemate ex melle. uitia pectoris expurgant. urinam cient. cruda concoquunt. uentre emol-

nunt. palpebras commodissime replicant lepras tollunt. cum arugine ac futorio atramento, nitroq; auribus saniem emanantibus cum melle & oleo. item in pruritu genitalium utiles. malagmatis, ac opisq; admiscuntur. laterum doloribus per se, illitu & appositu auxilio sunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Gr̃ecē Τερβινθος. Latine Terebinthus.

Officina ueram Terebinthinam non habent, nam ea qua hodie passim utuntur, resina est picea ac Teda.

Germanis quoque & Gallis hodie incognita, uulgarem Terpentini & Gloriet, Galli Termentini appellant.

Terebinthus arbor cuius picturam damus, iuxta Monspefulum nascitur, Pudiis appellata.

Terminthos arbor circa idam Macedoniamq; breuis, fructuosa & contorta: in Syria uero magna et copiosa decoraq; materia lenta, nigra, lauri penē folio, olea flore, sed puniceo, baccis primū herbaceis, mox rubris, & tandem maturitate nigrantibus, magnitudine fabae, resinosis, sulphureosis, et ra dice ualida in profundum acta. Fert & folliculos emittentes quaedam animalia ceu culices, lentoremq; resinofum, qui ex cortice erumpit, Pulvis Terquidivn Gr̃ecis dicta, hoc est, Terebinthi resina, cetera rum praestantissima, astringit manifestē, sed minus quā mastiche: emollit autem magis, coquit, digerit. qualitate subamarā, & partium tenuitate terget angustos meatus uasorum, & in eis osculorum obstructions liberat, ob id putredinem prohibet, aut finit: et hepaticis probē miscetur, ē profundō potentius trahit quā ceterae resinae. Hec aluum citra noxam soluit & uiscera omnia, iecur, lienem, reas nes, pulmonem abstergit. Terebinthina Resina omnis ex Chio insula est praestantiss. & odore & gu-  
stus ceteris praecellit. Chia igitur semper atenda, si haberi potest. Huius penuria Libyca, Pontica, & ex alijs regionibus optima est miscenda theriaca & alijs medicamentis: non autem libyca, tanquā omnium praestantissima cum Andromacho. Praestantior est alba, uel caerulea, uel colore uiri perlucida, odorata & Terebinthum plus referens, qualis quae ex insulis Cycladibus affertur: ob id Chiam quoq; Terebinthinam laudat Galenus. Minus laudata Cypria, Syriaca, Iudaica, Arabica, Aphrica, Libyca tamen ut dixi laudat Andromachus. Nunc Cypria Venetijs commendatur. Quae autē pro Terebinthina resina uenditur, aut Laurica est, aut Abietina, ut supra monuimus.

Resinae



## Resinæ alia.

## Caput LXXVII.

Larix.



**L**iquida resina è pinu & picea, à Gallia & Hetruria conuehi solet: atque olim à Colophonie petebatur, hinc Colophonix sibi cognomentum uendicauit. A Gallia quoq; subalpina, quam uernaculo nomine laricem appellant incolæ. Ea in linctu, & per se, magnopere prodest tussi ueteri. Colore inter se distant, siquidem alia candida est, alia oleosa, alia mellei liquoris similitudine, ut larigna. Cupressus etiam liquida fundit resinam, quæ ad eadem potest. Quæ uerò aridarum generi ascribuntur, quædam ex pineis nucibus, alia abiete, alia picea & pinu exierunt. Eligi debet longè omnium odoratissima, translucens, non retorrída, neq; diluta, quandam ceræ faciem præbens, & friabilis. E picea & abiete resinæ cæteras antecedunt: odoratæ enim sunt, atq; thus odore imitantur. Præstantiores à Pityusa insula deferuntur, quæ secundum Hispaniam sita est. Sed quæ e picea, nucibus pineis & cupresso manarunt, nihil ad illas, nec tantis uiribus potiuntur. Veruntamen eorundem gratia quo,

et si & illæ sumi solent. Lentiscina terebinthine respōdet. Vritur resina omnis liquida in uase quadruplæ capacitatis ad humore qui infunditur. itaq; resinæ cōgius, in duobus aquæ pluuiæ coquitur, subiectis leuibus prunis: resina assidue mouetur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis & retorrída reddatur, ac digitis cedat: ceterum ubi refrigit, in fictile non picatum, quod aconitum uocant, id est, non illitum, reconditur. Fiet etiam eximij candoris, si resina omnis eliquata præcoleatur, quò sæculenta sordes excernatur. Vrantur quoq; sine aqua, primum lento igne, & ubi coire cœperunt, maior carbonum strues supponitur, & triduo citra intermissionem discoquantur, usque dum antedictas naturæ suæ notas exuerint. mox ut dictum est, reponuntur. Aridas unius diei spacio decoxisse satis est. Vtæ odoratis malagmatibus, & acopis, & unguentorum colorationibus magnopere utiles sunt. E resina perinde atq; thure fuligo excipitur, ad circumlitiones idonea, quibus palpebras fucant, & colorem mentiuntur. prodest glabris genis, collichrymationibus, erosissq; oculorum angulis. ex ea fit atramentū scriptorium:

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Resinæ inferiores Terebinthina in digerendo & attrahendo sicut pinea, Hartz von forhen, Strobilina, hartz von Stelin baum/ picea, von rot donnè oder fichten. abietina dennhartz. larix von lerch damm. Cyparissina von Cypress baum.

Resinarum mitissimæ sunt Terebinthina / Venedischer terpentin (nostra Laricina & Abietina officinis, sed insipitis partibus præstantior) Larix vnser gemeiner terpentin/ oder hartz vom lerch dammen.

Resine Terebinthine larix propemodum similis, est ob id illius penuria hac utendum, illa autem per omnia est melior quàm Colophonina, & quæ Phrygiæ dicitur.

Resinæ siue larix siue Terebinthina uocata aduersus ulcera maligniora magis ualent.

Κόλαπονικα κλυ τώσλω in emplastro epulotica duæ καρύϊας uocat, paulò post γύρτωλυ appellatur.

Strobilina resinarum longè calidissima, & celerrimè siccans omnium moderatissima est, utraque qualitate Terebinthina.

Pitynon, Phrygia priuatim dictum, genere etiam resina est, multò minus calida, & sicca quàm strobilina



strobilina, media harum calore Abietina, liquida tamen diu durat, ut Colophonia, thus redolens, odore suavi ut abietina mediocri, quæ à nonnullis sola dicitur Colophonia, nascitur admodum medica, ob id est preciosa.

Resinæ siccata pinguis experte sunt: ob id emplastra bene adherere non possunt, ut in scorse & liquida.

Humidissima est Larix altera: est enim Resina Larix dicta duplex, una Terebinthina omnino similis, altera calidior, liquidior, odoratu grauior & ingrator, gustu amarior, acrior, mordacior.

Quare satis est terebinthinum omnibus medicamentis ulcera recte curaturis miscere, in quibus curandis præcipuus est scopus non mordere.

Τερμινθίνη περὺ πυμύδα, retorrída Lib. 8. comp. ph. part.

Arborum partibus præsertim truncis à germinatu incisis & scarificatis resinas elicimus.

### Pix liquida.

### Caput LXXVIII.

**P**ix liquida, quam alij conum uocant, è pinguiissimis pini piceæq; lignis congregatur. Optima est splendens, syn cera, læuis. Contra uenena, phthisin, purulentam excreationem, tussis, suspiria, & pectoris humores qui difficile extussuntur, efficax est, eclegmate cyathi mensura cum melle dato. tonsillarum & uulæ inflammationes, anginæq; utiliter perunguntur. purulentis auribus infunditur cum rosaceo, & illinitur cum trito sale serpentium morsibus. adiecta uerò pari cera scabiosus ungues extricat, impetiginesq; emendat. uulæ duritias ac sedis tubercula disecunt: cum farinaq; hordeacea & pueri impubis urina decocta, strumas rumpit. cohibet ulcera quæ serpunt, cum pineo cortice, aut sulphure, aut furfuribus illita. ceterum cum thuris manna & cerato profundos ulcerum sinus conglutinat. rimis sedis & pedum, magno auxilio illinitur, ulcera replet, & cum melle purgat. quin & cum uua passa & melle carbunculos, & putrida ulcera emarginat, disrumpitq; erodentibus medicamentis, quas septas uocant, probè immiscetur.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Κόνιον GAZA Conum transfert. Marcellus uerò nucē pineā interpretatur, ut accipit Dioscorides, alijq; ueteres græci. Galenus autem Conon arborem appellat, fructificius, hoc est nucem κοκκαλον, & σπόβιον, atq; hoc pasto apud Paulum accipi debet.

Accensis arboribus resinosis, ut pina, picea, larice, terebintho, teda, cedro, ex resinosa substantia igni parum siccata fit pix liquida, cui post supernatat pissanthum tenui consistencia, & facultate est astringente, ob id caniciem sine ulla noxa tardat. Vt pissaleon, id est, pix liquida cum oleo mista.

Germanicè Schiffbech/dörr.

### Picinum oleum.

### Caput LXXIX.

**P**ice fit quod pissaleon appellant, separato liquore aquoso, qui supernatat epici, sicut serum lacti. Nam expansa, quandiu pix coquitur, supra cortinam uellera pura madescunt, a ceptoq; halitu eius exprimuntur in uas. Quas pix liquida, præbet utilitates. alopecias capillo replet cum farina hordeacea illitum: quibus pix medetur. iumentorum ulcera scabiemq; emendat.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Pissaleon, hoc est, oleum picatum, Galenus uocari in Asia dicit oleum cum liquida pice permixtum, quod ipsum neq; hic Dioscorides, neq; Paulus neq; Plinius, ubi de pissaleo agunt, uolunt: sed pissaleon seu oleum picinum uocant id quod in pice liquida serosum superstat, & quod dum pix coquitur, pura supra tensa lana excipitur ex sublato uapore. Verum hoc ipsum Galenus ad superioris differentiationem, non pissaleon uocari dicit, sed pissanthos, hoc est picis florē. & Paulus lib. 3. ca. 74. ὀρροπίσας idem appellat, hoc est picis serum. Scribonius autem largus cap. 40. ait: picis florem, quod pissaleon appellant. Sic etiam Marcellus cap. 9. Galenus cap. 6. libri primi de comp. ph. r. part. extra compositionem, πίσας ὀρρῶς ὀρρόν dixit. Sic etiam Aëtius 6. cap. 69. ὀρρόν inquit, ἀπὸ τοῦ καὶ σαρκὸς τοῦ ἀγρίου λεάνου καὶ πίσας ὀρρῶς μίξας ἐπιχρίει, id est, sulphur, uinum & staphidem silues trem terito, & picis sero permixta illinito.

### Fuligo



## Fuligo liquida picis.

## Caput LXXX.

**F**it hoc modo è liquida pice fuligo: In lucerna noua quæ ellychnium habeat, nonnihil picis incendito, lucernâq; fictili uase in clibani specîe conformato, superius in angustum fornicato, inferius perforato, ut clibani esse solent: operito, & adoleri fuito, consumproq; liquore nouum infundito, quoad sufficientem usui fuliginē collegeris. Vis ei astringens, acrisq; usui est ad pigmēta qbus palpebras liniūt & uenustāt, & ad circūlitiones, item ubi glabris pilos restitui oportet, ad imbecilles lachrymososq; oculos: insuper ad eorundē ulcera nō inutilis est.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè λυγρός. Latine fuligo. Officinæ latinum nomen usurpant. Germanicè Râssa.

Fuligo omnis excicatoria est, ac prout de terrestribus est essentia, habens quisdā etiā ignis q materia cōbustū, reliquias, sed id pusillū est. Porro tota natura terrena est, tenuiū partiū. Sed quæ speciatim in ea differentia sunt, ea pro ista materia eueniunt: ex acriore & calidiore, tali etiā proueniente fuligine, ex dulciore simili quoq; & hinc fuligine proueniente. Primum enim thuris fuligine utuntur in oculi laris medicinis mista, eas uidelicet quæ ad oculos etiamnum phlegmone tentatos accommodantur, atq; etiā cum fluxione uexantur, & ulcera habent: nā illa expurgat, & carne implet. Ad hæc usurpant quoq; eā ad facultates quas uocant ealliblepharas. Præterea Terebinthina myrrhæq; fuligo molestia caret nō aliter quam thuris: sed styacis quodāmodo uolentior est: magis etiam picis liquida, quæ etiā magis cedri. Porro acrioribus utuntur ad uitia superciliorū uocata ptila, & erosos oculorū angulos humidosq; circa phlegmonē. At mollioribus mitioribusq; tum ad hæc, tū ad eā ad quæ competere possunt superius diximus, thuris fuliginem.

## Pix arida.

## Cap: LXXXI.

**L**iquida pix decocta in spissam coit, quā uocāt aliq palimpissam. q̄n genere quqdā uis ci modo lentescit, boscas cognominata. altera sicca est. Probatur pura, pinguis, odorata, subrufa, resinosa. Talis Brutia & Lycia, picis resinæq; simul naturā habētes. Calfactoriā uim habet. dura emollit. pus mouet. tubercula panosq; discutit. ulcera replet. uulnerarijs medicaminib. cōmodè permiscetur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Si pix iterum coctione siccetur, Palimpissa dicitur ueteribus Græcis, sicca adeo, ut puluerizari possit: qualis est græca, etiā Colophonîa, & Hispana, & Gallica dicta πικρα ὀπία lib. 8. comp. par. p. & hic Dioscoridi probatur et Lycia. Est etiā Dioscoridi ex ipsē arboribus resina liquida & sicca. Pix arida Germanicè Gritschisch bedy / Spiegelharz / Geigenharz / gesottē harz / uulgo dicitur.

## Zopissa.

## Caput LXXXII.

**Z**opissam aliqui aiunt derasam nauibus resinam cum cera, quam aliq apochyma appellant. Ea dissipandi naturam habet. quoniam marino sale macerata fit. Alij pineam resinam hoc nomine uocauerunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Zopissa uocatur, ut Dioscorides quoq; testatur, derasa nauibus maritimis pix, efficacior omni pice & resina traditur, ad omnia quibus ille profunt: uidelicet adiecto salis callo. Optima à tyrociniis nauium eraditur cera nauibus, marino sale macerata Additur in malagmata ad discutiedas collectiōes.

## Bitumen.

## Caput LXXXIII.

**B**itumen Iudai cum cæteris anteponitur. Cuius probatio est, ut purpuræ mordospendeat, sitq; ponderosum, ac ualidum odorem uibret. nigrum autem & sordidum, uitiosum est. adulteratur pice. Gignitur in Phœnice, Babylone, Zacyntho, & Sydone. Liquidum inuenitur in Agragantino Sicilia, fontibus innatans, quo utuntur ad lucernatum lumina, olei uice: Hallucinantur qui id Sicili cum oleum nominant: nanque liquidi bituminis genus esse constat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Asphaltos hic aut hæc, lib. 1. antidorum Galeni, id est, bitumen, uerum est nigrū & splendens: cum aquis innatat, molle: cum siccatur est, pice sicca durius efficitur. calciscit, siccatur ordine secundo. Optimum est ex mari mortui, stagno salso in Celosyria.

Vero asphalti, id est, bitumine in officinis caremus. Possumus autem ipsa mumia loco ipsius uti.

Nam in



Nam in Syria pauperes mortui bitumine implentur, uendunturq; postea. Diuites aut Mirra, aloë, croco, balsamo, alijsq; id genus conduntur. Sed cum propter illam hominum partem quæ secum admiscetur, inualidius necessario, ac deterius multo reddatur, longè melius nobis fuerit, eo omisso, aut pice sicca uti, cū eisdem fere polleant facultatibus, aut petroleo, quod ex agro Siculo ad nos importatur, hoc ex inter Bituminis genera hic quoq; connumerat Dioscorides, quam Arabum Mumia, quæ licet ex bitumine, & alijs rebus confecta sit: credendum tamen est uitium potius attraxisse ab humido corporis situ, & putrefactione, et proprias uires, aut omnino, aut multum earum perdidisse, quæ nouas ex eo & ad medicinam præstamiores acquisiuisse, neque ita potentem esse ut antea, in excicando.

## Pissasphaltum.

## Caput LXXXIII.

**N**ascitur in Apolloniatarum agro circa Epidaurum, quæ pissasphaltos appellatur. Ea Ceraunijs montibus deuoluta, impetu fluminis rapitur, æstuq; in littus expuitur, illic coacta in glebas, mistam bitumini picem redolet.

Pissasphaltus est, Mumia Serapionis.

## Naphtha.

## Caput LXXXV.

**N**aphtam uocant Babylonij, bituminis colamen, colore candidum inuenitur etiam nigrum. Vis ei ignium rapax, ita ut ex spacio protinus in eam transiliant. Ad suffusiones oculorum, & abugines utilis. Bitumen omne discutit, glutinat, emollit, ab inflammatione tuetur. uuluarum procidentia, strangulationesq; olfactu, suffitu, impoſitu emendat. comitiales morbos suffitum deprehendit, gagatæ lapidis more. purgationes mulierum cum uino & castorio potum elicit. tussim ueterem, & anhelitum adiuuat. serpentium morſibus, coxendicum laterumq; doloribus auxiliatur. datur celiacis in catapodio deuorandum. cum acetato potum, discutit sanguinem concretum. dysentericis cum ptisana liquatum infunditur. destillationibus suffitione medetur. mitigat dentium dolores oblitum. cæterum pilos in commodos siccum replicat, specillo impoſitum. concalescitum autem & cum farina hordeacea, nitro & cera illitum, podagris, articulorum doloribus, lethargicisq; prodest, Pissasphaltos eadem quæ pix & bitumen, si miscantur, potest.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Plutarchus in gestis Alexandri Magni scribit. Peragrata uicta;q; omni Babylone quæ armis & imperio eius sine labore subito cesserat, nihil e quæ eum regem admiratum fuisse, quàm in Ecbatanis, sic enim regionis eius pars quædam uocatur, ubi scaturit naphtha, sic enim scribit, τὸ τὰ χάσμα τοῦ πυρὸς ἐν τῇ βαβυλωνίῳ ὅσπερ ἐκ πυρὸς οὖν καὶ ἀναφερόμενον ἐν τῷ ῥήματι τοῦ μαθητῆς λέγουσι. διὰ τοῦ πλῆθος οὐ πῶς τὸ χάσμα τὸ ἐστὶν ἀλλὰ μὴ ἀσφάλτω, &c. Quorum sensum si querat aliquis, hic est. In Ecbatanis autem admiratus præcipue est ignis ueluti ex fonte continnuè emergentis hiatum, & Naphtæ ex eo fluxum, qui non procul ab hiatu illo tanta eruiatur copia, ut paludem faciat, cuius adeo ad trahendos ad se ignes tam facilis natura sit, ut ex interuallo &c. De naphtha Strabo libro 15. meminit, cuius uerba adijciam. Liquidum bitumen quod uocant naphthā, admirabilem habet naturam. Nam adiunctam ignem illi corripit, & si corpus eo illitum igni admo-ueris, deflagrat, nec aqua ullo pacto extingui potest, sed magis ardet, nisi ualde multam superinsuderis ceno, & aceto, & alumine, & uisco oppressum extinguitur. Vnde Alexandrum tradunt, experientie gratia, puero cuidam, balneo Naphtam inspersisse, ac lucernam admouisse, ut puer totus deflagrasset, nisi circumstantes multa aqua flammam euicissent.

## Cupressus.

## Caput LXXXVI.

**C**upressus refrigerat, & astringit. Cuius folia ex passlo & exiguo myrrhæ pota, uesicæ rheumatismis, & urinæ difficultati auxiliantur. pilulæ autem ex uino tuse in dysenteria, alui fluxione, tussi, & orthopnœa, aut si reijciatur sanguis, conuenientissimè bibuntur. earū decoctum eosdem præbet effectus. tuse cum fico duritias emolliunt, nariumq; polypo medentur. in aceto coctæ & cum lupinis detritæ scabros ungues eiiciunt. hernias intestinorum prolapsu erumpentes illitu reprimunt. Folia eadem præstant. Pilulæ cum arboris coma suffitæ, culices



*Chamaecyparissus.**Cupressus.*

culices abigere existimantur. folia trita & imposita, uulnera cōglutinant. sanguinem suppressant. capillum ex aceto tingunt. illinuntur per se aut cum polenta ignibus sacris, ulceribus quæ serpunt, carbunculis & oculorum inflammationibus. admota cum cerato stomachum corroborant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *κύπρεσος* &c. Latine *Cupressus*.

Officinis *Pila* siue fructus *cupressi*, nomine *nucis cupressi* tantummodo cognitus. Germanicè *Cypressen nuss*.

Galli *Cyprez* appellant arborem, fructum uerò *noyx de cyprez*.

*Didymus cupressos* duplici nomine uocari solitas memorie prodidit, *charitas*, quod oblectamentum nobis sint, & *cyparissos* à partu *parilium* ramulorum & fructuum, *κῶπὸν κύπευ πᾶσι σὺν*, hoc est, quod ex aquo & ramos & fructum creat.

*Cupressus* proceræ arbor est caudice oblongo ac tereti, folio pini, sed carnosiore, amaro, nec ita pungenti. Fronde indecisa, odore uehementi. Semen conis innascitur prætenue, exile, & quasi laticis fructui proximum. quod pilula sua satiscite labitur. raram materie & macilentæ radice per summa cespitum uagante.

*Cupressi pilula* quæ etiam *Coni* quibusdam dicuntur, unde *Conifera Cyparissi*, Verg. siccant ualenter sine insigni calore aut acrimonia: ob id hæ molles & recentes ulcera magna in duris corporibus glutinant, enterocelas inuunt.

B.



## DIOSCORIDIS

Resina è Cupressum manat, qua cum res sunt uncta, à carice uindicantur.

Est et coacta breuitatis frutex, quem chamæcyparison, quasi pumilam cupressum uocant, hanc familiarem, hunc ab odore formag; foliorum eiusdem nomenclaturæ arboris Cypressen, uulgo nominamus, quod in genere sit pumilionum, et quasi Cupressi uideretur abortus, folio incano et pereant. Sunt qui Chamæpytin, alij uero qui adonium esse putent, quasi abrothoni speciem: tamen si Nasonis flos adonij purpureus est, huic uero aureus. Pollet aduersum omnium serpentium scorpionumque uena, ex uino potum, sed de ea alio loco in sequentibus per amplius.

### Iuniperus.



Sus illini aut bibi prodest. Corticis cinis cum aqua illitus lepras eximit, rameno ea ligni deuorata interficiunt.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Ἀρνέυδος, ἡ Ἀρνέυδ'is. Latine Iuniperus uocatur.

Officinæ Latinam appellationem retinuerunt.

Germanicè Wecholtzer, Krametbeer, id est, turdorum grana uocantur, quod fructibus eius turdi pinguescant.

Galli arborem Geneure, bacca uero grain de geneure appellant.

Iuniperus latine dici uidetur, quod iuniores et nouellos fructus pariat: sola enim ferè arborum seculis suos in biennium prorogat, qui ne maturescunt quidem, nouis superuenientibus.

Iuniperi fructus calidum ordine tertio, siue primo: sed folia calida sicca gradu tertio.



Iuniperi gummi nec Dioscorides nec Galenus memorant, fortè quod ad nihil sit utile, ut Actuarius, Plinius. Subit uero mirari, cur medicis hodie Arabas secutis, Sandaracha uocetur, et suffitibus propè omnibus misceant, fluxiones à capite prohibentibus, cum sit calidum, et plantæ ipsa etiam umbra, non solo uapore sit gravis.

Vernigo dicitur Hermolao, uernix uulgo, quod rore uerno magis concreseat. Scriptoribus in usu est multo et pictoribus.

### Herba Sabina. Cap. LXXXVIII.

Sabina duorum generum est. Vna folijs cupressi similis, spinis horridior, grauiter olens, acris et feruens. arbor est coactæ breuitatis, quæ sese magis in latitudinem fundit. huius folijs nonnulli profuturi utuntur. Altera tamarici folio similis est. Vtriusque folia nomas sistunt, collectiones illitu mitigant, et cum melle nigritas sordesque repurgant. carbunculos cum uino potantur, sanguinem per urinam eliciunt, partus apposita extrahunt, et suffitui idem præstant, unguentis calfacientibus immiscetur, et priuatim gleucino.

NOMI.



LIBER PRIMVS.  
NOMINA. ET EXPLICATIO.

Græcè Βεγδus καὶ Βεγυδγορ.  
Latine Sabina, uel Sauina.  
Officina Latinum nomen seruant. Germanis Seuenbaum / palmbaum / Seuenpalmen.  
Gallis Sauinera & du sauiet, dicitur.  
Passim in hortis nascitur. Tertij est ordinis ex calfacientium & desiccantium, & ex numero co-  
rum quæ uel maxime tenuium sunt partium.

Cedrus.

Cap. LXXXIX.

**C**edrus arbor magna est, ex qua picæ colligunt, quæ cedria uocatur. iuniperi  
modo baccas parit, baccarum magnitudine, rotundas. Cedria optima myrti  
est crassa, perlucida, grauis odoris, quæ dum effunditur, guttatim non dissipata  
coit. Cui ea uis inest ut defuncta corpora conseruet, & uiuentia corrumpat. quæ  
ex causa mortuorum uitam, aliqui appellauere. uestimenta quoque & pelles ex  
imia calfaciendi & siccandi dote, corrumpit. magnâ ad ocularia medicamenta  
usus. quippe illita oculis claritatem affert. albugines cicatricesque detergit. instil-  
lata autem cum aceto, uermes aurium necat. cum hyssopi decocto infusa, soni-  
tus sibilosque sedat. cauis dentium indita eos frangit, & dolores leuat. idem fa-  
cit cum ex aceto colluitur. peruncto ante coitum genitali abortiuum fieri con-  
stat. angina ea perunguntur. tonsillarum inflammationibus auxilio est. lentes  
pediculosque illiti enecat. cerastæ moribus cum sale imposita subuenit. con-  
tra hausta leporis marini uenena, in passo sumpta. auxiliatur. in elephantia, aut  
linctus, aut perunctione proficit. pulmonum ulcera purgat, & si cyathus eius  
sorbeatur, persanat. uermes & tineas subter indita necat. & partus extrahit.  
Fit & oleum, à cedria separatum, dum coquitur, uelleribus supra halitum eius  
expansis, ut in pice, eiusdem ad omnia usus. priuatim uehementer perunctum  
scabiem quadrupedum, canum, bouumque persanat. in hærentes ricinos enecat.  
ulcera quæ ex tonsura acceperunt, ad cicatrices perducit. Cedrides cedri fru-  
ctus uocantur. Calfastoriam uim habent. stomacho aduersantur. auxilio sunt  
tussi, conuulsis, ruptis, stranguriæ. menses ciunt, ex polline piperis poti. contra  
haustum leporem marinum in uino sumuntur. serpentes fugantur, peruncto ex  
adipe ceruino, aut medulla, corpore. in antidota adduntur. Fuliginem, quomo-  
do ex pice, congeri oportet, quæ eandem quam picea fuligo uim præbet.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè κέδρος. Latine Cedrus. Officinis incognita.  
Germanicè ein Zederbaum. omnino peregrina arbor.

Gallis Cedre.

Cedrus præterquam nomine, omnino ferè ignota est, ut pote alibi quam trans maria nasci fitti-  
diens. Optima clasibus, nauigijs, & trirēmibus, neque non domorum tectis: quippe cum ipsi insit  
eternitas.

Plurima in Cylicia, Syriaque proficit: sed laudatissima in Creta, Aphrica, et Syria montibus, quæ in  
bi usque eo crassescit (si Theophrasto credimus) ut quinq; hominum complexu cingi nequeat.  
Dioscorides & Plinius Cedri usum damnant propter ancipitem naturam uiuentia corrumpendi,  
& defuncta conseruandi: cum uitam auferat spirantibus, defunctisque pro uita sit. ob hoc non censent  
interius sumendum. Huius tamen diuersitatis rationem per pulchrè Galenus inniuit: quia tametsi adu-  
rat, ita ut ordine quarto calfacientium censei meruerit, inter omnia tamen erodentia medicamenta,  
quæ Greci & septica & septascognominant, infirmissimum esse constat. proinde uiuentibus admo-  
tum uitæ calore adiuncto, adsumit uires & quasi accenditur, atque ita iugulat: sed defunctis additum,  
putrilaginem extertit, & uitiosos humores depascit, quibus detractis corpora à labe corruptionis  
affert.

Laurus.

Caput XC.

**L**aurus quædam tenui folio constat: altera latiore. Vtraque ex calfastoriam na-  
turam habet, & emollientem. unde decoctum earum in muliebres infessus

E 2



## DIOSCORIDIS

*Laurus.*



additum, uulua & uesticæ uitij conuenit. uirentia folia sensim substringūt. illita quoq; ac trita uesparū apiumq; ictibus opitulatur. eadem cū polenta & pane illita inflammationem omnē mitigant. sed pota stomachum effundunt, & uomitiones mouent. Lauri baccæ magis quàm folia calfaciunt. ergo in eclegmate trita cū melle uel passo prosunt tabi, orthopnææ, & omnibus thoracis rheumatismis. cōtra scorpionum ictus ex uino bibuntur. utiligines emaculant. succus bacarum utilissimè auris dolori & grauitati instillatur, cum uino uetere, & rosaceo. in medicamenta autem adiunguntur quæ neruorum lassitudines reficiunt, acopa uocant: & ad unguenta quæ calfaciunt & discutiunt. Cortex radices calculos rumpit. partus necat. hepaticis prodest, tribus obolis in uino odorato potus.

### NOMI. ET EXPLICAT.

*Laurus arbor*, Græcè Δάφνη, Lauri baccæ Δάφνις.

Latine *Laurus arbor*, et Lauri baccæ.

Officinæ latinum nomen retinuerunt.

Germanicè *Lorbeerbaum* / arbor, baccæ uerò *Lorberen*.

Gallis ung *Laurier* & le fruct d' ung *laurier*, dicitur.

Lauri folia & fructus calfaciunt, & siccant uehementer, sed hæc magis quàm illa: leuiter astrin-  
git hic addit Dioscorides, quam uim & amaritudinem soli radices cortici tribuit Galenus, quæ calculos confringit.

### Platanus.

### Cap. XCI.

**T**Enerrima plani folia in uino decocta, mox illita, oculorū fluxiones sistunt. tumores & inflammationes leuant. Decoctus cortex in aceto, dentes in dolore colluit. uirides pilulæ in uino potæ, serpentium moribus auxiliantur. ex ceptæ autem adipe, igni ambusta sanant, incidens foliorum pilularumq; lanugo, oculos & aures offendit.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Πλάτανος.

Latine *Platanus* à latitudine foliorum dicta.

Germanicè *Ahorn*.

Gallice *Plaine*. dicitur.

Officinæ peregrina & incognita.

*Platanus* cum adoleuit cubitorum est sexdecim, cortice crasso, fronde uiridinea, longo rubroque pediculo, flosculo pallido, pilulis scabris, lanuginosis, minutis.

### Fraxinus.


### Caput XCII.

**F**Raxinus arbor nota est, cuius foliorum succus & ipsa peruncta, aut ex uino pota, uiperarum ictibus auxiliantur. corticis cinis ex aqua illitus lepra s eximit, ligni ramenta scobemq; potu perniciem afferre tradunt.

### NOMI.



Græcè Μελία. Latine fraxinus.  
Officinæ Latium nomen servant.  
Germanicè etn äschbaum.  
Gallicè Fraisine, dicitur.



Actu facillima fraxinus : semen reddit post un-  
demiam et arcturum.

Populus. Caput XCIII.

**P**orus albæ populi cortex uncie unius pondere, ischiadicis ac urine stillicidior prodest. Abortiuum fieri tradunt, si cum mulino rene bibatur. folia quoque cum uino post purgationes pota, idem præstare produntur. repens foliorum succus utiliter aurium dolori infillatur. pilulæ quæ primo foliorum partu exili-

unt, illitæ cum melle, oculorum hebetudini me-  
dentur. Memorizæ prodiderunt corticem albæ  
populi & nigræ particulatim cæsum, & sulcis  
stercoratismandatum, omni tempore anni edu-  
les fungos proferre. Populi nigra folia cum ace-  
to illita magna utilitate podagricis doloribus il-  
linuntur. Refinam populus fundit, quæ in mala-  
gnata additur. Semen potum ex aceto comitali-  
bus utile est. Lachrynam populorum comemo-  
rant quæ in Padam amnem defluat, durari ac coi-  
re in succinum, quod electrum uocant, alij chry-  
sophorum. Id attritu iucundum odorem spirat, &  
aurum colore imitatur. tritum potumq; stomachi  
uentrisq; fluxiones sistit.

NOMINA BT EXPLICATIO.

Græcè ληύκη.

Latinis Populus alba.

Germanis Sarcobachbaum/mitt weyssen bletteren vnden  
Gallis, ung Peuplier.

Populus nigra Græcè Αἰγυρὸς.

Germanicè / Garbachs baum / poplen baum / Albee  
baum.

Gallicè, du tremble & peuplier, dicitur.

Populus, ut Dioscorides tradit, duplex, λευκη, id est, alba,  
 et αἰγυρος Galenus, αἰγυρος Dioscorides, id est, nigra, αγγ. Ὀκλί populi

prius, id est, flores, seu *κατάπρα*, id est, pilule, primo florum partu exiliemia. Officinis oculi po-  
 puli. Germanis *Alber spross* dicuntur, calida primo à temperatis recessu: nam ex *τῆς πρώτης*  
*κατάπρατος*, Paulus & Marcellus in Galeno legunt: licet ex *τῆς τρίτης*, id est, in tertia ha-  
 beat codex Aldinus, & ita legerit in Arabicis, unde uertit uetus interpres: & Oribasius Græcus  
 medicus libro secundo ad Euenaprium, & libro 15, ad Iulianum Cæsarem. Paulo siccora, quam quid  
 humidum & siccum est temperatum: tenuium partium potius quam crassarum. Folia floribus sunt

起 矣



similia, sed imbecilliora: & Resina eius exigua floribus similem habet facultatem, sed calidiorem: semen floribus & resina siccius, non multo calidius, sed partium est tenuium. Folia λεύκας, id est, populi albe media sunt inter folia lauri calidissima, & folia ἀκίvou herba refrigerantis Dioscoridi, sic enim libro secundo comp. ph. legendum censuerim potius quam ἀγρον, qui libro 6. simplic. dictus est calidus ordine tertio, etiā si uetus interpres ex Arabibus eo loco habet agni casti. λεύκας καὶ ἄγρος, id est, populi albe fructus digerentis est facultatis, ibidem paulo ante.

Gustanti Manardo populum nigram & communem, uisa est modicè astringere, postea minimum amara, odore non insuauis, sed languido. Ex eius igitur floribus Myracopi siue unguentū populē refrigerat, cum præter adipem & populi oculos modicè calida, cetera habeat frigida, etiam magna parte ad supremos usque ordines.

Populus alba temperata ex aque tepida substantia, & terrea tenuata terget: eius flores multum acres nobis sunt, ex hisque uulgo fit unguentum populcum: licet acopum δι' ἀγρόν apud Galenum & Paulum galetur, non ἄλ' λεύκας.



Succinum seu succina gutta à succo dicta, Græcis ἡλεκτρον, esse lachryma populi albe, uel etiam nigre quibusdam uidetur, ab eiusdem arboris resina Dioscoridi & Galeno dicta, differens & ἡλεκτρον, id est, paleas trabens, quoque uocatur, quamam ei quoque Galenus tribuit lib. 1. facultat. natura. quid tamen esse censuerit, nondū in eo legi. Plinius uerò li. 37. ca. 9. Succinū scribit à quibusdam pinei generis arboribus, ut gummi à cerasis excidere autum-

no, & largum mitti ex Germania septentrionali, & insulis maris Germanici. quod hodie nobis est compertissimum: ad hæc liquata igni ualentiore, quia à frigido intensiore concreuit. pineam apertè olet, calidum primo gradu, sic cum secundo, stomachū roborat, uomitum, nauſeam arcet, cordis, palpi lationi prodest. prauorum humorum generationem prohibet.

Germani weiss vnd gelbagstein, & breisstein.

Galli ambra uocant: uulgo in corollis precarijs frequens.

#### Macer.

#### Caput XCIII.



**M**acer ex Barbaria aduehitur. cortex flauescens, crassus, gustu perquā astringens, qui contra cruentas excreationes, dysenterias, & alui fluxiones bibitur.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Macer hoc loco Dioscoridi est cortex flauescens, seu cum Plinio, rubens, radice magne, nomine sue arboris nobis incognite, crassus gustu, perquam astringens, ex Barbaria allatus.

Galeno autem est cortex gustu multum acerbo, cum leui quada acrimonia, odorem iucundum redolens, ut pleraque aromata. siccatur ordine tertio, calore & frigore est temperatus. Tamen lib. 6. comp. phar. part. in compositione ἡλεκτρον ad finem scribit, καὶ λευκὸν μὲν καὶ φαιὸν τὸ ἀγρόν, nisi cauſeris aduerbium ἡλεκτρον transponendum, ut solum determinet ἡλεκτρον. Ex Iudæa uerò affertur. Macis autem Arabum, cuius picturam damus, membrana est extima nucem Moschatam propè totam uestiens, tenuis, rufa, aut flaua, interdum nigrescens, aromatica, odore suauis, sapore subacri, & minimū amaro, tenuium partium, calida siccatur tertio gradu, uentriculum roborat, coctionem iuuat. Ex quibus liquet. Macis & Macer res planè diuersas, licet odore, colore quadantenus conueniant: at temperamento tamen differunt, nisi contendas in Dioscoride & Galeni simplicibus mendam esse, quod uix queas demonstrare. Quod si res sunt diuersæ, ut ex Plinio apertè patet Macer hodie est incognitum: tamen pro Nicolai Macis Actua-rius Macer reponit.

#### Vlmus.

#### Caput XCV.

**V**lmi & folia & cortex & rami, uim habet spissandi. Folia trita ex aceto ad lepras efficaciter illinuntur. uulnera glutinant, sed multo magis corticis tilia



Ulmus



tilia, si fasciæ loco intorqueatur: nati  
in lori morē flecti potest. craſſior cor-  
tex in uino aut aqua frigida unciatim  
potus, pituitas trahit. fracta oſſa cele-  
rius ſolidescunt, ſi decocto foliorum  
corticis aut radicis foueantur. humor  
in folliculis enaſcens prima germinis  
eruptione, cuti illitus nitorem indu-  
cit, faciemq; ſplēdidiorē præſtat. qui  
dum ſiccatur, in animalia abit, quæ cu-  
licum formam gerunt. folia cum tene-  
reſcunt cocta olerum more ad obſo-  
nia uſurpantur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Πτελίνα.

Latinis ulmus.

Germanis, Ulmerbaum / Küſtbaum / Ky-  
ſtenbaum / Ulmen / Lindbaſt.

Gallis Orme appellatur.

Proſpera eſt arbor, folio indiuiduo, lente cre-  
mato, ſcabra, oblongiore quàm pyro, ſemen ra-  
cemoſum. in foliis & petiolis gummi producit,  
& quoddam beſtiolarum genus quod carpiſ di-  
cunt, materia ſlaua, robuſta, neruata, deſormi, &  
quæ nihil præter cor habeat, uiridis, caſu ſaci-  
lis, ſicca difficilis, apud aquas facilis incremēti.

Lignorū marcor. Cap. XCVI.

**E**X caudicibus lignisq; ueteribus  
caries congeritur, quæ farinæ mo-

do illita, ulcera purgat, & ad cicatricem perducit. ſerpentia cohibet, ſi cum pari  
anifo & uino ſubacta, linteisq; impoſita, illinatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Lignorum caries præſertim ulmi, tumentia purgat ulcera, & explet, Germanicè Wurm mel / ap-  
pellatur.

Harundo.

Caput XCVII.



modata. alia craſſa, concaua, apud amnes naſcens, quæ à quibuſdam cypria, ab  
alijs donax appellatur. alia phragmites ſeu uallatoria, gracilis, candida, uulgo

E 4



## DIOSCORIDIS

cognita cuius trita radix per se, aut cum bulbis suis illita, spicula a culcosq; corpore extrahit. luxata, lumborumq; dolores cum aceto mulcet. uirentia folia tu-  
sa & imposita ignibus sacris medentur; & ceteris inflammationibus. corticisci-  
nere peruncta cum aceto alopecie sanantur. panicula lanugo si aures intraue-  
rit, exurdat. Eundem effectum implet harundo quæ cypria dicitur.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis *ῥάδαυος*.

Latinis harundo siue arundo appellatur.

Officinæ Latinum nomen seruarunt.

Germani *Ror*.

Galli ungroseau uocant.

Arundo principatum in aquaticis fruticibus tenet: Caule confurgit geniculato, tereti ac fistuloso qui mox senescens fissili inarescit ligno, in leue fastigium cacuminato, circa quod densius excreuit to-  
mentum ad faciendas cauponias culcitras nō inutile: folia ex articulis alterno laterum gradu emergen-  
tia, membranæo calamum uestiunt cortice usq; ad medium internodium: hinc enim à cauo alarum sinu  
resupinantur, procumbente languido promistore coma uel panicula pondusculo. Radix quoq; mul-  
tis geniculatur articulis, secunda stirpe, ut quæ etiam uel adusta uel recisa latius numerosiusq; re-  
uiescat.

### Papyrus.

### Caput XCV.

**P**apyrus qua chartæ fiunt, nullis non cognita, præcipuè in medicina utilita-  
tis, ad laxandas fistulas, madefacta lino inuoluitur, usq; dum inaruerit: con-  
stricta enim atq; immissa in hiatus, humore completur, & in tumescendo fistulas  
aperit. Habet nescio quid alimenti radix: itaq; Aegyptij eam mandunt, succum  
tantum deuorantes, & mansam expuunt. ipsis radicibus pro ligno utuntur. Cre-  
mata papyri cinis depascentia ulcera cum omnium partium, tum oris maxime,  
cohibet, uerum melius id combusta charta præstat.

### EXPLICATIO.

Papyrus nascitur in palustribus Aegypti, aut quiescentibus Nili aquis, ubi euagat stagnum, duo en-  
bita non excedunt gurgitum altitudine, brachiali radicis oblique crassitudine, triangulis lateribus,  
decem non amplius cubitorum longitudine, in gracilitatem fastigiatum thyrsi modo cacumen inclu-  
dens, &c. Plura de papyro uide apud Theophr. lib. 4. cap. 9.

Fiebat apud ueteres è papyro charta, cuius ut in Europa nunc euauit usus, ita nomen remansit. Ete-  
nim quam ex comritis hodie linteolis chartam passim conficiunt, isdem quibus & illa commendata do-  
ribus, quippe tenuitate, candore, laeure, densitate Niloticæ nostra charta non cedit, quam etiam uula-  
pus illius imitatione papyrus uocat.

Non papyro hodie, qui nobis ignotus & peregrinus, sed sponsa utimur ad laxandas quæ præcluse  
sunt fistulas, & intumescendo ad introitum medicamentorum aperiendas.

### Myrica.

### Caput XCIX.

**M**yrica seu tamarix arbor uulgo cognita est, cum apud pigras & stagnantes  
aquas enascatur, fructum quasi florem ferens compage muscosum. Aegy-  
ptus Syriaq; alteram gignunt mitiorem, syluestri cætera similem. fructum parit  
gallæ proximum, inæqualiter astringentem gustu, quo conuenienter utimur uis-  
ce gallæ in medicaminibus oculorum orisq; datur cruentæ excretioni in potu,  
& celiacis, & contra profluuia fœminarum, regium morbum, & phalangiorum  
morsus. illitus tumores inhibet. Cortex in eisdem usus adhibetur. Decoctum fo-  
liorum cum uino potum, lienem absumit. ad dolorem dentium in collutionibus  
salutare. & mulieribus fluxioni uulua opportunitis, in defensionibus. pthiriasilen-  
dibusq; circūfusus prodest. abūdantiā fœminarū sistit impositus arboris cinis.  
potorios calices è caudice lienosis moluntur, quò datus in his potus proficiat.

NO-



LIBER PRIMVS.  
NOMINA ET EXPLICATIO.

57

Myrica.



Græcis Μορίγγ.  
Latinis Myrice & Tamarix.  
Officinis Tamariscus.  
Germanis & Gallis Tamarisc, nonis  
natur.

Tamarix seu Myrica, fructu, radice, folijs, extremis ramulis tergit, incidit sine manifesta siccatione, parū astringit, tenuium partium, lien indurato cū aceto aut uino coctis prodest: fructus et cortex ualentiū astringunt. fructum tamen & succum & non radicem adhibet spleneticis remedijs Gal. lib. 9. com. ph. part. Quinetiam trunco in uascula uel potoria uel escaria cauto, lienem arcano quodam odio suis et hominibus longo usu absumit.

Plinius contra Dioscoridem & Galenum nullum fructum ferre dicit lib. 16. cap. 26. his uerbis. Fructum arborum solæ nullum ferunt, hoc est, ne semen quidem, tamarix scopis tantum nascens, populus, alnus, ulmus, &c. quod itaq; Dioscorides dixit: λεγόμενον αὐτῶν φέρονται ἑσπέρδες λεῖτα τῶν ὀσάριον, idipsum Plin. tū semē, tū fructū esse aut dici posse non putauit. Porro calices fieri, ut suprà quoq; monuimus, ex trunco myricæ arboris solitos, qui spleneticis essent in usu commodi Dioscorides prouidit. Sed ea gratia hodie uina ex tamarisci uirgulis concinnantur in superiori Germania cisthenana, quæ spleneticis utiliter bibuntur, Tamariscina uulgo appellata. quod ut nouitium inueni adscribere uolui, quum facticij huius uini Dioscorides inter tot genera, nō meminerit. & Democritus apud Constantinum Cæsarem libro decimonono capite septi

mo, ad eandem rem uinum prunis Myricæ superfusum, & sic potatum magis probet.

Erica.

Caput C.

**E**rica fruticosa arbor, myricæ similis, lōgè minor, cuius flore apes reprobum mel efficiunt. tam flos quàm coma serpentinum ictibus illitu medetur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis ἔρακη:  
Latinis Erica.  
Officinis inusitata.  
Germanis Heyd/Gallis Brugere: quidam esse putant quam Galli rosmarinum aculeatum, uel potius iomarinum appellant.

Erica



# DIOSCORIDIS

Erica.

Erica digerentis plantæ flore potissimum ac folijs utendum: semen etiam adhibetur apud Galenum lib. 6. comp. pharm. part. Erica dicta sepe lib. 9. comp. pharm. part. in splenicis.



Acacalis.

Caput CI.

**A**cacalis fructus est nascentis in Aegypto fruticis, seminis myricæ quadam tenus similis. cuius aqua in qua maduerit, ad collyria additur, quæ ad excitandam oculorum aciem conueniunt.

EXPLICATIO.

Hodie planè incognita, nomen frutici à nympha datum crediderim Acacali.

Rhamnus.

Caput CII.

**R**hamnus fruticat in sæpibus, ramos ferens rectos, & aculeos in acutæ spinæ modum, folijs paruis, oblongis, suppinguibus, teneris. Alterum ei genus candidius, tertium nigrioribus latoribusq; folijs constat, & quadam tenus rubetibus, cuius rami quinum cubitorum longitudinem implent, spinosiores quidem, sed infirmioribus minusq; rigentibus aculeis. Fructum ædit latum, candidum, tenuem, folliculari specie, uerticillo similem. Omnium folia igni sacro, & serpentibus ulceribus, efficaciter illinuntur. Fama est ramos huius ualuis fenestris ut impositos, ueneficia depellere.

Rhamnus.

Vincrista.



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Rhamnus frutex spinosus apud ueteres tria habet sùstigia. Ego Rhamni unum genus hoc puto quod Galli burgam spinam uel Neprum uocant, fructum myrti, foris nigro, intus uiridi, ob id ad calorem cum cingentibus idoneo, Germani Begunbeer / Wäpberbeer / serbberbeer / serbbeer / appellant. Cortex arbori



## LIBER PRIMVS.

Arbori subnigræ, & nitidæ quasi ceruise, intus uirens, post luteus, lignum extra candidum, interio-  
re medulla rubet: eo ualidos arcus nostri fabricant. Audio etiam adhuc hodie Italissimum ceruinum  
uocari, nam & ab hisdem Dioscoridis spinam ceruinam dicit testatur.

Rhamni fastigijs genus aliud annumerandum in afflata maris nascens, frutice nonnunquam arbore  
scens, per longas ramulis, qui rigidis armantur spinis aculei mucrone se uentibus, folijs tamen æmula  
facie ligustrum exprimentibus, ut pro illis fallant, bæca folliculari specie, uerticillata, primum candida,  
da, post maturitatem rubefacta foris flaccida, intus rimosa, quam pastores pecorū pabulo decutiunt.

Sunt qui primum Rhamni genus arbitrantur hoc, quod officina uiam crispam, Germani Drensel  
beet. Galli uero grosselles uocant. fruticosi namq; generis est, ramuliculis, rectis spinarum mucro-  
ne horridus, flore ex herbido candicante, in frutetis & sepibus nascens: folia tamen non respondent  
que circum æ rotunditatis conspiciuntur, apij modo dissecta, frutice aculeato, acinis candidis, & a  
maturitate dulcibus, granosis, translucidis, ciborum condimentis expeditis.

### Halimus.

### Caput. CIII.

**H**alimus frutex est sepimentis idoneus, similis rhamno, sine spinis, folijs o-  
leæ, sed latioribus, nascitur in sepibus & maritimis. Folia decoquuntur ci-  
borum gratia. radix conuulsa, rupta, torminaq; mitigat, dra chmæ pondere in  
aqua mulsa pota, eadem lactis ubertatem facit.

#### EXPLICATIO.

Halimus in magno nominum ambitu est. Ruellius arbitratur fruticem eum qui in Gallia uitis septi-  
bus frequens blanceputa uulgo appellatur. Halimū esse, gustu subacerbo in balsilagnem tendente, qua-  
re mensis folia cum tenerescunt non essent ingrata, tamen non esse edendo, cum propè nimia habeant  
pur olera.

### Paliurus.

### Caput CIIII.



**P**aliurus frutex cognoscitur aculeatus,  
durus, cuius semen pingue & fuliginos-  
um inuenitur, quod potum tussi opitu-  
latur, uelicæ calculos comminuit. serpen-  
tium ictibus aduersatur. Folia & radix astri-  
ctoriam uim habent. quorum decoctum po-  
tu aluum sistit, urinam trahit. contra uene-  
na & serpentium morsus auxiliatur. Radix  
recetia tubercula, tumoresq; omneis discus-  
sit, trita & imposita.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Παλιούρος. Latine Paliurus. Officiis  
inuitata. Germanicè Weelberin.

Gallice aubepin, appellatur, aut saltem paliuri spe-  
cies est.

Apud nos paucis antea annis frutex inuenitur, qui  
etiam arborescere possit, folio per ambitum laciniatum  
sinuato, rotundo, molli, ramis spini, quem alium cogno-  
minant, modo maculatis, bæcis rotundis, rubris, myr-  
teis, longè maioribus, gustu iucundo, qui & uinum sua  
uitate sua commendat. Condiuntur & grato ori cibo.  
Cæpit mea memoria propagari iasita, quantum reor,  
albo spino. Qui colunt in hortis uelut alienigenam &  
aduenam arborem, Myribalanum appellant. Hanc  
esse putauerim, nullis ferè notis reclamantibus. Paliurum  
Africanam, eam præsertim quæ non siliquetur. Ruellius  
Paliuri genus esse conijcit fruticem aculeosum, uulgo  
Weelberin, Gallis Aubepinum. i. album spinum. Fer-  
tur enim farinæ è fructu olim in fame quæ sita unde Cera-  
micum



manicum nomen habet, quod sanè etiam de Paliuro tradunt ueteres. Item fruticem quendam rursus  
Gallis iuncum marinam uel potius Iomarinum appellant, cui aliquantulum fauere delineatio uidetur,  
an tamen Paliurus sit, non ausim affirmare, quòd ei spina pro folio sit.

## Acuta spina.

## Caput CV.

Ribis.

Acuta spina.



Rubus canis.



**A**cuta spina, quam pyrinam aut pityanthen aliqui  
uocant, arbor est pyraëto similis, spinosa ualde, &  
minor. baccas profert myrti, plenas, rubras, fragiles, &  
intus nucleum: radicem multitudine, altè descendente.  
Huius baccæ potu aut cibo, alui profuiuum, & abundan-  
tiam sceminarum sistunt. radix illita aculeos & spicula  
extrahit. abortum fieri tradunt, si ter radice uenter, aut  
sensim feriat, aut perungatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ῥόζα κανίος, ῥόζα πυρίνη. Latine acuta spina. Offi-  
cinis Berberis & Bugia. Germanice Eibseln / Saurcuch / wein-  
leglin / uocatur. Galli, quòd huius acinis uinum exprimitur, spinuè  
metam appellant, aliqui acrem spinam. Oxiantha uel oxianthi  
racemosa bacculæ, dum maturuerunt rubentes, astringunt: uis eadem so-  
lipsis languidior. E baccis uinum exprimitur eodem fere usu, quo  
uinum ex malo punico. Conduntur etiam uel melle uel saccharo ad re-  
stringendâ sitim, depellendâq; febricitantium maliciam. quorû mo-  
rosus nimis palatum cibum ferre quemcunq; respuit. Elanguescens ap-  
petentia grato huius acore recreatur. Frutex Arabibus Ribes di-  
ctus huic planè congener, racemosus, acidus, acerbus, frigidus siccus se-  
cundo gradu, sitim extinguit, uomitum & fluorem alui biliosum sistit,  
morbillis & uariolis, quas uocant, saluber: frutex à nobis poterii ru-  
brû dicitur. Quid sit, frutex an herba, & quæ, ambigit Serapio in suis  
testimonijs. Succus ex his expressus, cum saccharo cydoniati modo co-  
ctus, est delicatissimus. Ribes Damascenus Muse additur, folijs ro-  
tundis, & magnis iisdem.

## Rubus canis. Caput CVI.

**F**rutex est arboris instar, rubo longè maior. folia  
multò latiora myrto, firmis circa ramos spinis, flo-  
re candido, fructu oblongo, nucleo oliuæ simili, qui per  
maturitatē fuluescit, & flocculos inrus cōtinet. Fructus  
exemptis interioribus floccis ar factus, aluum sistit: fer-  
uefacti enim in uino, mox poti, arteriam infestant.

NO.



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *λευκοκάνθου*. Latine *rubus canis*. Officina cum sylvestri Rosa confundunt.  
 Germanicè / *Sambutten* / *Wickdorn* / *strauch*. Gallicè *ung eglâtier sans odeur*, in differētiam  
 rosa sylvestris, appellatur. Rubi, seu semis, Græcè *βάρβα* genera Theophrasto tria sunt, magnus  
 seu rectus, humilis, & medius, qui suo loco declarabuntur. Batus magnus seu rectus est Dioscoridis &  
 Galeni *λευκοκάνθου*, fructu oblongo per maturitatem rubente, cytino simili, in quo ceulana flocci  
 arteria si deuoremur infestant: huic folijs, fructu, rosa similis est cynosrhoda, Englemier Gallis dicta:  
 & rosa frutex omnis, nisi quod fere gerit folia florum magis multiplicia & maiora, arte ofimor adiutur

Ligustrum.

sed Cynosbatus spinis hamatis horridior, rectior, & altior assurgit, odore  
 caret, quem Cynosrhoda tota habet præstantissimum: rosa uero frutex flore  
 solo est odorata, nunc albo, nunc rubro, nunc amborum medio (incarnia-  
 tum Galli, Germaniq; *Leibsch* uocant) nunc etiam muschhatum.

Ligustrum.

Caput CVII.

**L**igustrum arbor est oliuæ folijs circum ramos, latiori-  
 bus, mollioribus, & uirentioribus: flore candido, mu-  
 scoso, odorato: semine sambuci, nigro. Optimum nascitur  
 in Canope & Ascalone. Folia astrictoria uim habent: qua-  
 re commanducata ulceribus oris medentur. illita feruidis  
 inflammationibus, carbunculisq; profunt. de cocto eorundem  
 igni ambusta fouentur. capillum rufant trita folia, quæ in ra-  
 diculæ succo maduerint flos ex aceto frõti illitus capitis do-  
 lorem sedat. Cyprinum oleum quod ex eo fit odoratum, ex-  
 calfacit, emollit nervos, si quæ feruenti natura prædita sint,  
 assumat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Ligustrum Plinij aliorumq; Latiorum, cuius picturam damus, omnes fe-  
 re hæcenus Dioscoridis Cyprum interpretati sunt, sed  
 illos nuper redarguit doctissimus uir Franciscus Mas-  
 sarijus Venetus. *φίλυρα* quidem tiliam esse demon-  
 strans, ligustrum autem *φίλυρα*, non cyprum, ut  
 sequenti capite fusius.

Philyrea.

Philyrea.

Caput CVIII.

**P**hilyrea arbor est ligustri magnitudi-  
 ne, folijs oleæ, nigrioribus & latiori-  
 bus, fructu lentis, nigro, subdulci, ra-  
 cematis coherentibus, asperis nascitur. Huius  
 folia astringunt. ad eadem utilia ad quæ o-  
 leaster, cum astrictione est opus: maximè ad  
 oris ulcera, commanducata, aut si decocto  
 colluantur. pota urinam ac menses cient.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis *φίλυρα*.

Plinio alijsq; Latinis Ligustrum.

officinis saltem Germanico nomine cognita.

Germanis *Weynholz* / *Widholz* / *Sarttrigel* /*Reyn weiden* / *Berngert*:Gallis *Dutroesne* dicitur.

*φίλυρα* Græcis, Tilia Latinis & officinis. Germa-  
 nis *Linden* appellatur, alia ab hac est arbor quæ hic

F



# DIOSCORIDIS

Philyra.



Dioscoridi *φιλύρα* uocatur, quod non animaduertentes uiri etiam nonnulli doctissimi, utraque arboris magno errore confundunt, quod forma admodum disscrepent, ut è Dioscoride & Theophrasto lib. 3. de plantarum historia cap. 10. inuicem collatis abundè constabit. Differunt itaque inter se Philyra, quæ Tilia est, et Phillyrea, de qua in præsentis capite Dioscorides agit, neque una uoce utraque arbor significatur, sed diuersæ, quemadmodum ostendit nuper doctissimus uir Franciscus Massarius, ut supra meminimus.

## Cistus. Caput CIX.

\* Alij, roboræ.

Cistus, quem aliqui citharon, aut citharon uocant, ramosus frutex est, sed improcerus, foliosus, saxosis locis nascens, folijs rotundis, acerbis, hirsutis, flos masculo ut mali puniceæ, foeminæ albet: Vis astringens, unde flores in uino austero bis in die poti, profunt dysentericis. & nomas per se illiti cohibent. uetustati ulcerum, & igni ambustis cum cerato medentur. Hypocistis, erythron\*, aut cytinus à nonnullis cognominata, iuxta cisti radices nascitur, floris punici similitudine quædam flaua, altera uiuens, tertia candida. Liguatur acaciæ modo. Alij qui tamen exiccant, fractamque macerant, & in coquant, reliquaque ut in Lycio prosequuntur. uires acaciæ habet, uerum aliquanto magis siccatur, & astringit. prodest dysentericis, celiacis, sanguinem excreantibus, foeminarum profluuiis, & pota & indita.

## EXPLICATIO.

Cistus frutex Germanis peregrinus. In quibusdam Gallie montibus, & (ut aiunt) Patuinis hypocistis uidere licet, & fruticem sub qua nascitur, ortu folio flore candido, quasi syluestris rosa, radice lignosa, prædura, è cuius fere medio hypocistis uelut infixæ pullulat, cuius officinis succus est notior, quam ut explicari mereatur.

Hypocistis succus, & Hypocistidis succus passim dicitur in lib. comp. part. pharm. Hypocistidis succo addita γλυνέας, id est, passæ parte, maceratur, gummi, tragacantham, myrrham, thus, lib. 7. comp. pharm. part.

## Caput CX.

### Ladanum.

Est & alterum cisti genus, ledon à nonnullis appellatum, frutex simili modo nascens, longioribus folijs & nigrioribus, quæ uerno tempore quiddam cōtrahunt pingue foliorum uis astringens, atque effectus cisti præbens. Fit ex eo quod ladanum dicitur: Siquidem cum cisti frondes pascuntur capræ, hircique, pinguitudinem conspicuè barba carpunt, & suo lentore uillosis cruribus adhærescentè reperiunt: quam depeccantes incolæ, colantesque, cogunt in ossas, & ita recondunt. Alij uero attractis funiculis, insidentem fruticibus lentorem abstergunt, conglomerantque in ladanum. Maxime probatur odoratum, subuiride, facile mollesces, pingue, quod arenas non collegit nec squalore oblitum est, resinofum, quale in Cypro gignitur. Arabicum uero Libycumque uilius. Natura ei spissandi, calfaciendi, molliendi, ora uenarum patefacit. capillum fluentem continet, addito uino, myrrha, & myrteo oleo. cicatricibus decorem reddit, cum uino illitum, medetur aurium doloribus, cum hydromelite aut rosaceo infusum. suffitu secundas eiecit. pessis immistum, uulua duritiem sanat, in medicamenta quæ dolorem tussimque finiunt, & malagmata utiliter inseritur. aluum sistit cum uino uetere potum. & urina m ciet,

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Cisthos quæ alio nomine Lada & Ledon appellatur, frutex is est unde capræ & hirci folia decerpentes, barbas ac uillos laterum succo eorum imbuunt, unde postea homines depeccant, quod Ladanum uocatur



uocatur, officinis optimè notum. Verum Plinius haud in paruum errorem de lapsus est, qui ob uocum  
cisi & cisthi uicinitatem, cisthum hunc hedera speciem existimauit. At uerò Ladanum non tantum ex  
barbis hircorum depecti, ut ueteres tradiderunt, sed alijs etiam modis inde colligi apertè ostendit Ga-  
lenus lib. 1. cap. 1. de comp. pharm. part. quum dicit non manifestum esse, an hoc solum Ladanum quod  
ex hircorum barbis depectitur, in illud medicamentum quod tradit adhiberi uelit, & possibile esse per  
hanc speciem totum Ladani genus designari: sed tamen nullum certum modum neq; hic, neq; alibi quod  
sciam, eius colligendi prodit. Dioscorides certè hic unum aliquem amplius colligendi Ladani modum  
prescribit, qui funibus per forfices tractis contingit, ut scilicet eo modo glutinata pinguitudo postea  
ex ipsis funibus deradatur: quem modum etiam Plinius lib. 12. cap. 17. tradit. Quin & tertium quen-  
dam modum eius colligendi Plinius lib. 26. cap. 8. habet. per neruos in arcu lanis circumdatos, atq; id sic  
ri in Syria atq; Africa, unde etiam toxicum appellatur. Toxon enim arcum Graecis significat. Rufus  
porrò apud Erembos populos Ladanum illud prouenire dicit. Sunt autem Ercmbi Aethiopia popu-  
li, qui & Troglodytae, utroq; simili nominis etymo appellantur, siquidem ἐρεμβος ἀπὸ τῶν ὀτρύνων  
ἐρεμβόων ἀπὸ τῶν ὀτρύνων. Sicut τρωγλοδυτας ἀπὸ τοῦ τρωγλῆος τρωγλῆος δὲ οὐδὲν. Ad  
hos populos se peruenisse Menelaus apud Homerum. 4. Odys. gloriatur. Αἰθιοπῶν δὲ ἐν οὐλῳ  
σὺν οὐλῳ ἐρεμβόων. Posidonius apud Strabonem lib. 16. ἐρεμβόων & ἀρεμβόων eosdem esse dicit,  
facta leui nonnum commutatione & corruptela. ἐρεμβόων nimirum ἀπὸ τῶν ἀρεμβόων ἀρεμβόων. Gale-  
nus lib. 7. simpl. pharm. Cisthum qui & Ladanum, in calidioribus regionibus nasci dicit, non alterius  
generis ab eo qui in Asia prouenit, sed ob regionis proprietatem, illud discussoriam habere caliditatem.  
& in hoc ab Asiano differre, quod non solum frigiditatem deposuerit, sed caliditatem assumpserit.  
Plinius lib. 12. cap. 17. apud Nabateos Arabas hoc fieri scripsit, atq; mox uerum Ladanum Cypro in  
sule attribuit, quæ sub illius fide relinquo.

## Ebenus.

## Caput CXI.



**E**benus optima habetur Aethiopica &  
nigra, nullos habens uenarum discursus, factitij cornus laeuore. cū frangitur densa  
sa apparet, mordens gustu, atque attringens. sufficit iucundo odore supra carbones sine  
fumi tædio. recens autem ad ignem prolata, ob pinguitudinem accenditur, & trita ad co-  
tè flauescit. Altera est Indica, internatis seg-  
mentis candicantibus, & modicè fuluis, item  
frequentibus maculis. cæterum prior, boni  
rate antecedit. Apud quosdam sesamina, aut  
spinea ligna\* cōsimilia pro ebena ueneunt:  
quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt, &  
in purpureas assulas resolunt, nihil morda-  
citis in gustu, nec redolentia in suffitu præ-  
ferentia. Caliginem oculorum absterget, ad  
ueteres destillationes, pustulasq; mirum in

\*Alij, Syda-  
minina, aut  
spinea Indica.

modum pollet, si quispiam facta ex eo coticula collyrijs utatur, melius proficiet.  
ad oculorum medicamenta efficax est, si scobes ramentaue uino Chio dieno-  
ctuq; macerata, in collyria digerantur. nonnulli prætrita ipsa excolant, reliquaq;  
eundem in modum peragunt. alij pro uino aqua utuntur. Vritur in fictili nouo,  
donec in carbones redigatur. lauatur plumbi usti modo, & ita siccis scabrisq; lip-  
pitudinibus conducit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Lignum, quod ea gens Barbara, quæ nobis transmittit, uernacula lingua Guaiacum appellat, ab Hy-  
spanis & Italis Sanctum à Germanis Franzosen Holz, Blatterholz. Gallis Guaiac, dictum, Latinis  
uerò Indicum lignum appellatum. Ego cum aliquot doctis medicis Ebenum esse put o uel omnino alia  
quam eius speciem: uamq; per omnia descriptioni quam de Ebena hic Dioscorides ponit, conuenire



uidetur: præter enim soliditatem & renitentem duritiem, aqua non superfidet: sed innata pluri-  
 materreſtri ſubſtantia fundum petit, quod Ebena tantum præ cæteris arboribus attribuit Ariſto-  
 telis. Triplex eius genus eſſe dicunt, & quod ex Aetiopia uenit, probatiſſimum eſſe & in Pompeij Al-  
 thridatico triumpho, primum Romæ urbi ſpolium gratiſſimum & admirandum fuiſſe narrant. Ra-  
 dicem magiſterra exerta, nigro colore, ſcribit Dioſcorides, nihilominus tamen pleriq; neotericorū,  
 à Theopraſto non diſidentes, apud Indos in altitudinem mediocrem arboreſcere, eorum qui ab India  
 ueniunt, relatu adſignant, craſſitie corporis hominis, folijs plantagnis, ſed minoribus paulò & rigidio-  
 ribus, glandibus ad modum quercuum, & ueluti oliuis, ramorum extremitatibus inhianteibus. Et ex  
 eo optimū cenſetur, quod recens ſatis, neq; admodum uetus & cariolum exiſtit: tale etenim igni ſu-  
 perimpoſitum, ob reſinaceos ſauos, quibus interius nigrum medullarū diſcriminatur, citius acceditur,  
 & flammā agit: quo ſolo ligni bonitatem ab adulterato probare ſolent: laudatur item quod ſubcitr-  
 no & buxæ eſt colore, quale eſt noſtrum, quod paſſim in officiis diuenditur: & poſt detractum corti-  
 cem, colore ad liuidum uergente: item quod in guſtu præter astringentem ſaporem, etiam leniter lin-  
 guam eroſione mordet. Lignū eſt ſatis calidum, morbis omnibus ex humore, præſertim frigido natis,  
 ſalubre: nam acrimonia & amaritudine incidit, tenuat, terget, uacuat. De huius facultate mira do-  
 ctiſſimus Anthonij Galli medici commentarius, his diebus paucis in lucem editus, facit, ne mihi de hoc  
 pluribus ſit agendum: ut interim taceam Huttenum, Matheolum, Maſam, & alios quā plurimos, quā  
 uerbosiſſimè uires eius nobis inculcarunt, potiſſimum in curanda lue Hiſpanica ſiue potius Gallica: ſed  
 tamen etiam morbis alijs, præſertim frigidis, conferre, adeo eſt hodie perſuſum, ut certatim eo etiam  
 magnates uti geſtiant.

Rosa,

Caput CXII.



**R**osa refrigerat & astringit, ſed ſicca multò magis. Succus recentibus folijs  
 exprimitur, deſectis fornice unguibus (ſic appellatur candidæ foliorum par-  
 tes) reliquum in pila premi & teri debet in umbra, donec cogatur, & ita ad oculo-  
 rum circumſcriptiones recondi. Siccantur etiamnum folia roſarum, continuo uerſa  
 ta, ne muceant, neue ſitus in ijs inſi deat. Aridis roſis & in uino decoctis expreſſus  
 liquor, facit ad dolores capitis, aurium, oculorum, gingiuarum, ſedis, recti inte-  
 ſtini, ac uulvæ, pinna illitus aut inſuſus. eadem ſine expreſſione tuſa, præcordio-  
 rum inflammationibus, humidiſtomaſchi uitijs, igni ſacro illini prodeſt. ſiccis  
 ac tritis fœmina\* aſperguntur. miſceri ſolent uulnerarijs antidotis, atq; compoſi-  
 tionibus quas antheras uocant. Folia uruntur in calliblephara. Flos qui in me-  
 dijs roſis inuenitur, ſiccatus, gingiuarum fluxionibus efficaciter inſpergitur. Ca-  
 pita pota citam aluum, & cruentas reiectiones ſiſtunt.

\* Aliàs, ſemo-  
 rum intertri-  
 gines.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ρόζον. Latine &amp; officiis Roſa. Germanis Roſen.

Gallicè une Roſe, appellatur.

Rhodon autem Græcis, Plutarcho teſte, nominatur, quod largum odoris effluuium emittat.

Roſa



Rosa omnis amara est atq; astringens, precipue rubra, à qua substantia refrigerat, siccat: flos autem eius astringit magis, proinde etiam siccat ualentiùs. Rosarum flores potius quam rosas, quia imbecillam astrictiorem habent, in Diabesa ponit Heras lib. 6. comp. pharm. part. Gal. & Andromachus in stomachicis, lib. eodem. Flos autem est pars interior, in qua semen est & capillus. Id semen uulgus Anthera uocat, cum Anthera compositio sit Græcis rosas siccas & alia recipiens: quoniam & sine rosarum flore Anthera medicamentum est. lib. 6. comp. pharm. part. Rosæ præstantissimæ sunt, quæ longè omnium sunt suauissimæ, & alijs rubicundiores. Siccandæ uerò sunt loco sublimi meridiano, quo solis radij penetrent, rosas tamen non tangerent. Rosarum succus essentia est tenuissimæ, nam celeriter acefcit, & lentore caret, & unguentorum omnino odores exoluit & obscurat. Ex Rosis calidissimæ uidetur Moschata: post has rosæ colore insignes, incarnatæ nobis dictæ, Germanicè Leibfarb rosarum, quæ & cerebrum ualenter ferium, paulò minus albæ.

## Rosei pastilli.

## Caput CXIII.

**P**astilli quos rhodides uocant, hac ratione conficiuntur: Rosarum uiridium, quæ nullo antea humore madefactæ extabuerint, drachmæ quadraginta, Indicæ nardi drachmæ decem, myrrhæ drachmæ sex, tritæ digeruntur in pastillos, qui trium obolorum pondus æquent, siccati in umbra, in fictili non picato, atq; obturato reconduntur. Alij adijciunt costi drachmas duas, iridis Illyricæ totidem, & uinum Chium cum melle miscent. Mulieribus monilium uice collo circumdato usui sunt, ad retundendum graue sudoris uirus. tritis etiam utuntur ad illitiones & diapsasmata, quæ fiunt ad sudores coercendos, ita ut à balneis inarescant corpora, dein frigida aqua abluantur.

## EXPLICATIO.

Officina sub nomine trochiscorum diarhodu alio modo parant, ab hoc nō multum diuerso. ualidiores autem sunt omnibus his trochiscis qui à rosis nomen acceperunt, qui à Mesue traduntur sub nomine trochiscorum de Rosis & Eupatorio.

## Lycium.

## Caput CXIII.

**L**ycium, quod aliqui pyxanthan uocant, arbor est spinosa, ramis trium cubitorum, aut longioribus, folijs buxi, densis, fructu piperis, nigro, læui, amaro, densiq; cortice pallido. non dissimili ly cio madefacto, radicibus multis, obliquis\*, lignosis. Nascitur plurimum in Cappadocia, Lycia, & plerisq; alijs locis. \* Alij, lat. aspera loca amat. Succus extrahendi ratio hæc est: Rami cum radiculis rursi & ante permultos dies macerati coquuntur, tum abiectis lignis itidē liquor, donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur id lycium, adiecta decoctioni amurcæ, aut absinthij succo, aut felle bubulo. Innatans spuma inter coquendum exempta, oculorū medicamentis additur, reliquo ad alia utitur. Simili modo fit lycium, semine expresso & insolato. Optimum quod uri potest, restinctumq; rubentem spumam ostendit. glebis extrinsecus nigris, intus cum fregeris rufis, odore minimè uiroso, cum amaritudine astringens, crocino colore, cuiusmodi Indicum est, cæteris præstantius. Lycium astringit, caliginem oculorum discutit, genarū scabiem, pruritus, ueteresq; fluxiones sanat, facit ad prurulentas aureis, exulceratas gingiuas, tonsillas, labiorum fissuras, sedis rimas, attritusq; illitum. celiacis, dysentericis, potum inditumq; conuenit, datur sanguinem excreantibus & rufis, ex aqua contra rabiosi canis morsus in catapotio deuoratur, aut in aqua bibitur. flauos facit pilos, reduiis, ulceribus quæ serpunt aut putrent, medetur. sceminarum profluuiā appositum sistit, rabiosorum ictibus ex melle\* potum, aut uice catapotij deuoratum, auxiliatur. Tradunt Indicum fieri lycium, ex frutice lonchitide appellato, ea spinarum generi ascribitur, ramos rectos habes, ternum cubitorum longitudine, maioresue, rubo crassiores, à radice numerosos. fractus cortex rubescit, folia oleæ similia. Herba in aceto decocta proditur lienis inflammationibus & re gio morbo mederi: & sceminarum purgationes elicere. asseuerant etiam crudam in potu, eosdem effectus præstare: semen cyatho dimidio potum pituitam expurgare: uenenis quoq; auxilio esse. \* Alij, lat. as.



*Lycium à Lycia regione dictum, et delatū, hic succus est Pyxiacanthæ Dioscoridi & Galeno liquidus, quo utebantur ad sugillata, Phlegmonas oris & sedis, herpes, putredines, ulcera consumacta, aures purulentas siccant, & digerit ordine secundo, astringit, terget. Calore symmetris est proximum. Copiosum etiam est in Cappadocia: Indicum autem ad omnia est ualentius. Hamorrhagiam à naribus Lycium sistit, linamenco impositum. Gal. lib. 2. comp. phar. part. Lycium coquit, digerit, ut castorium. Indicum autem dico, non quod apud nostros gentes nascitur lib. 4. comp. pharm. part. Lycium etiam Afrum dicitur lib. 3. comp. pharm. part. Spumam lycij appellat ex Solone, lib. eodem. Succus ex bacchi Peryclimeni Lyciam mentiuntur. Modus alius est in lib. de dynamibus, qui Galeno ascribitur.*

## Acacia.

## Caput CXV.

**A**Acacia in Aegypto nascitur, spina instar arboris fruticosa, non se in rectum attollens. Florem habet candidum, & semen lupino simile in folliculis: ex quo succus expressus siccat in umbra, niger ex maturo semine, subrufus ex uiridi. Eligatur modicè rufus & odoratus, ut in hac arbore esse potest. Aliqui expriment ex folijs & semine succum. Manat & gumi ex ea spina, uis ei ad spissandum, refrigerandumque efficax. Succus oculorum medicamentis utilis. ualet ad ignem sacrum, ulcera quæ serpunt, perniones, pterygia, & oris ulcera. proci dentes oculos reprimat mensuram abundantiam sistit, proci duam uulnam cohibet, citam aluum supprimit, aut potus aut subter inditus, capillos denigrat, lauatur oculorum medicamentis, trito in aqua, mox effuso quod concreuerat, donec pura extet aqua, & ita cogitur in pastillos. uritur etiam in cruda fidelia, donec fictile fornacibus percoquatur: torreturque in carbonum halitu perflata. Spina decoctum solutos artus fortis committit. Præfertur eius spingummi, quod in uermiculorum speciem contrahatur, & uirum modo perluceat, ligni expers. proximum est candidum, sordidum uerò ac resinofum inutile. Cutis meatus obstruit, & medicamentorum quibus admiscetur acrimoniam hebetat. ambustis ex oculo illitum, pustulas non patitur erumpere. Alterum acaciae genus in Cappadocia Pōtoque prouenit, Aegyptiæ spinæ similitudine, longè minus, tenerius, humile, a culeorum uallo munitur, folia habens rutæ. semen lentacula minus fert autumnis, in loculis connexis, ternum quaternumue capacibus. Succus eius astringit uiribus inferior, & ocularibus medicamentis inutilis.

*Prima syluestris.*



## EXPLICATIO.

*Acacia ueterum succus ex fructu seu semine, interdum & folijs spinæ Aegyptiæ expressus*



expressus, in umbra siccatus, siccatur ordine tertio, refrigeratur primo: secundo autē, si lotionē leuē suam acrimoniam deposuerit. Acacia  $\chi\epsilon\gamma\alpha$ , lib. 7. comp. phar. part. indyaco dio Hera. Hæc tamen huiusmodi usurpari potest, ut in theriace leges apud Galenum.

Eligenda modicè rufa & odorata, quatenus illi datum est. Eius loco ex bacculis prunorum agræstium coctis succum expressum tessellatim confectū insolatūq; usurpamus minimo errore, quia refrigeratur, siccatur, astringit ut ueterum acatia.

Ex hac Acatia Aegypti spina, ex cuius semine aut fructu succū exprimi antè diximus, manat gummi in uermiculorum speciem contractum, utriusque modo per lucidum, purum, refrigeratur, densatur.

Huius non meminit Galenus in Acacia lib. 6. simpl. ut nec Acatie nomen facit paulo post in Acanthia Aegyptia seu Arabica (quo nomine solo Dioscoridi uocatur) unde colligas licet Accaciam & Acanthiam Aegyptiam seu Arabiam diuersasse in Aegypto spinas arbores. Tamen in libro comp. phar. frequenter legitur  $\chi\alpha\upsilon\mu\iota$  absolute tragachamæ coniunctum pro gummi Arabico, quod  $\chi\alpha\upsilon\mu\iota$   $\delta\iota$   $\beta\alpha\lambda\alpha\nu\upsilon$  uocat lib. 7. comp. ph. pa. à Thebis opinor Aegypti centisforibus, ut etiam Babylonicum quibusdam dicitur, à Babylone Aegypti Arabiam attingentis,  $\chi\alpha\upsilon\mu\iota$   $\delta\iota$   $\beta\alpha\lambda\alpha\nu\upsilon$  per sepe Actuarii uocat.

## Vitex.

## Caput XCVI.



**V**itex siue lygos, frutex est in arborem assurgens. nascitur in fluminum ripis, asperisque locis, ac torrentium alueis. ramos gerit prælongos, fractu peruioces. folia ovata, sed molliora. Duo genera eius. una harum album florem mittit cum purpureo: altera tantum purpureum, & semen, ut piper. Excalfactorias uires habet, & adstrictorias. semen eius potum uenenatis ictibus, aquæ quæ cutem subijit, lienosisq; auxiliatur. lac euocat. menses ciet, drachmæ pondere in uino potum. genituram exoluit. caput tentat, & soporem affert. decoctum herbarum & seminis in defensione, mulieribus uuluarum malo opportunis opitulatur. item in inflammationibus. purgationes mouet semen cum pulegio potum, etiam suffitu uel appositu. capitis dolorem dissoluit illitum. instillatur cum aceto & oleo capiti in lethargo & phrenitide. folia suffitu aut substratu fugant uenenata. illita quoque serpentium moribus auxiliantur. testium duritias cum butyro & folijs uitium emolliunt. rimas sedis semen cum aqua illitum mitigat: & cum folijs medetur luxatis, uulneribusq; uirgam qui manu teneat dum iter facit, negatur intertriginem sentire. Agnum, quasi dic-

cas castum, uocant Græci, quoniam matronæ in thesmophorijs Atheniensium castitatem custodientes, folijs huius cubitus sibi sternunt. & lygon quasi uimen, propter inuictam ferè ramorum flexitatem.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè  $\alpha\gamma\upsilon\varsigma$ . Latine Vitex. Officinis agnus castus.

Germanicè / Abrahamsbaum / Feuschbaum / schaffs mülle.


$\alpha\gamma\upsilon\varsigma$ , id est, castus, quod ad castitatem conseruat, folijs & floribus sumptis & substratis, & semine friso, uel non friso: id enim sumptum, ut semen rutæ, nocturnas ueneris imaginationes cohibet. Gal. lib. 6. simp. & lib. 6. sanitatis tuendæ. Calfacit, siccatur ordine tertio, acris est ac astringens, & substantiæ multum tenuis, status omnium maxime discutit. Ob id lege libro primo alimentorum, calfacit, non cū Græcis exepularibus et ueteri interprete, refrigeratur, quod effecta illic adscripta indicat.



## DIOSCORIDIS

Item lib. 2. comp. ph. part. de cephalalgia ab estu, ubi Agnū inter refrigerantia cōmemorat: et par-  
tē post ubi Archigenis dicta distinguit, folia lauri calidissima: Agni uerō mediocriter refrigerant.  
Legerem non ἄγρου sed ἀγρὸν, quae planta Dioscoridi refrigerat, & astringit, etiam si Galenus for-  
te alibi nusquam ea herba sit usus. Neq; enim placet elusio, quod per accidens refrigerat: id enim e-  
tiam fōijs Lauri & calidis omnibus commune est.

### Salix.



**Caput CXVII.**  
**S**alix uulgo nota est. Cuius semen, folia, cortex et  
succus spissandi uim habent. trita folia cum exi-  
guo pipere & uino pota, ileosis subueniunt. sumpta  
per se & cum aqua praestant mulieribus ne concipiāt.  
salignum semen in potu sanguinem expuentibus pro-  
dest. cortex eosdem praebet effectus. corticis cinis ad  
misto a ceto maceratus, illitu clauos & callos tollit. ex  
folijs & cortice succus cum rosaceo in calyce punici  
calfactus, aurium doloribus auxiliatur. decoctio eo-  
rum podagras foueri utilissimum. furfures purgat in  
corpore. Excipitur succus qui manat ex ea, cum flo-  
ret, exciso cortice. in plaga enim concretus humor in-  
uenitur, qui ad purganda, quae obstant oculis, suam  
uim praebet.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Graecis ἰτιά. Latinis Salix.  
Officina latinum nomen seruarunt. Germanis Weiden.  
Gallis saulge, appellatur.  
Salix uerō ἁ saliendo dicta est, quod ea celeritate crescat, ut  
quasi salire uideatur. Sic etiam iteam quasi sali-  
cem uocauerunt Graeci. Plura uide apud Theo-  
phrastum per nos in alium atq; commodiorem  
ordinem redactum.



### Syluestris olea. Cap. CXVIII.

**S**yluestris olea, quam aliqui olea-  
strum appellant, alij Aethiopicam  
oliam. folia astringunt. trita autem  
& imposita ignem sacrum, ulcera que  
erumpunt, epinyctidas, carbunculos,  
reduuias, nomasque cohihent, cru-  
stas emarginant cum melle illita.  
quinetiam sordida repurgant. in-  
flammationes panosque, cum mel-  
le imposita discutunt. cutem à capi-  
te uulsam cōglutināt. oris ulceribus  
& priuatim infantium, commanduca-  
ta medentur. Succus & decoctum eos-  
dem habent effectus. sanguinis erup-  
tiones, ac muliebri profluuium, admo-  
tus succus inhibet. uux oculorum, pu-  
stulisq; prodest. ulcera & ueteres de-  
fluxiones sistit: quapropter in colly-  
ria additur, ad genarū erosiones per-  
quam utilis. Exprimitur succus tufis  
folijs, affuso uino aut aqua, siccatusq;  
sole in pastillos digeritur. sed longe  
validior ad recondendum succus ha-  
betur, qui



betur qui cum uino, quàm cum aqua expressus est. auribus subuenit, siue ulcerentur, siue pus effluat. Folia conuenienter cœliacis cum farina hordeacea illinuntur. uruntur cum floribus folia, ut spodiũ uicem cinis præstet. in cruda olla, oblito ore luto, usq; dum figlinum percoquatur. restinctaq; uino & rursus subacta, eodem modo uruntur. postremo cerusæ modo elota coguntur in pastillos. Huiusmodi cinerem in medicamentis oculorum constat spodio non cedere, sed eisdem uiribus præditum esse putandum est. Foliorum satiuæ olea eadem uis intelligitur, sed aliquanto inferior: unde ocularibus medicamentis ob suam mitiorem uim conuenientior est. Sudor ligno uirenti accenso manans, illitu sanat lichenas, furfures & scabiem. Oleaginum semen illitum medetur furfuribus, & ulceribus quæ depascunt uorantq; quod autem intra nucleum est, ex adipe & farina scabrosos ungues excutit. Colymbades trita & ambustis illita pustulas gigni prohibent. sordida ulcera purgant. muria succus collutas gingiuas contrahit, & motus dentium firmat. Oliua staua & recens stomacho utilior est, uentri difficilis. nigra autem & matura corruptioni opportuna est, stomacho aduersatur. oculis non conuenit. capitis dolorem mouet. arefacta illitu depascentia ulcera sistit, & carbunculos emarginat. Oleum syluestris oliuæ gingiuas putri uligine laborantibus colluitur. dentium mobilitates stabilis. calfacti foras, gingiuas fluxione laborantibus utilis est. lanam enim specillulo circumligatam oleo madefacere oportet, & gingiuas admouere, donec alba spectentur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Κότινος, ἢ ἀγρίλακος. Latine oleaster & syluestris olea.

Officinis latinum nomen retinet.

Germanicè Wylderölbaum.

Gallicè Oliuier sauvage, dicitur.

Syluestris olea secundior satiuæ, quod ferè syluestres habent, cœu cura fertilitatem minuente. Oleastro uita longior quàm oleæ, sed olympiæ longissima. Syluestris olea ex satiuæ nucleo nascitur. Mansuete hanc densis curatulis, aut omnino translatione mitè fieri, uix potest adduci Theophrastus ut credat.

## Lachryma æthiopica olea.

## Cap. CXIX.

**L**achryma quam æthiopica olea stillat, scammonia similis quadantenus est. fulua, stillis exilibus constans, mordax. quæ autem ammoniaci, aut gummi similitudinem refert, colore uigricans, nec gustu mordens, superuacua est. Nostrates olea, oleastrique, similem lachrymam sudant, quæ commodè ad oculorum hebetudines illinitur. ci catrices albuginesq; illitu emendat. urinam & menset ciet. cauis dentium impressa, ad dolores efficax est. inter uenena scribitur. parius pellit. lepras & impetiges sanat. Appellatur aut æthiopica & agrestis olea.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Gummi Elemi ab elea uel corruptè & enhemum.

Ex elea, id est, olea Aethiopica & nostrate inquit Dioscorides, & Italica Plinius. & oleastro lachryma funditur scammonio similis, fulua, stillis exilibus constans, mordax. Similis autem ammoniaci, uel gummi, colore nigricans, morsus expers, inutilis. Explora an uerum sit officinis.

## Amurca.

## Caput CXX.

**A**murca expressæ oliuæ recrementum est. decocta in cupreo uase ad crassitudinem mellis astringit, cæteros præbens lychni effectus. insuper dentium dolori & uulneribus, cum aceto, uino aut mulso commodè illinitur. additur in medicamenta ocularia, & meatus inductu suo obstruentia. uetustate meliorem fieri constat. utiliter infunditur sedis, genitalium, ac uulua exulcerationi. si uerò cum omphacino recoquatur ad mellis crassitudinem, cariosos dentes extrahit. iumentorum scabiem cum decocto lupini & chamæleonte illitu sanat. cruda & recentis amurca podagras articularesq; dolores foueri utilissimum. peruncta in uillosa pelle, & hydropicis imposita, tumoris molem reprimat.

## NOMINA



Amurcam greci ἀμύργην appellant: nos amurcam aut sedimentum olei. Germanicè Mheffen-  
niböl.

Quercus, Glans, Fagus, Ilex. Caput CXXI.

Viscum quercinum.



Fagus.



Ilex.



**Q**uercus omnis ad-  
strictoriam vim ha-  
bet, præsertim liber  
qui cortici & lig-  
no intercedit. quin  
etiam tunica puta-  
mini glandis subie-  
cta. decoctum ex  
ijs datur dysenteri-  
cis, cæliacis, san-  
guinem excreanti-  
bus. tritain pessa,  
fœminis fluxione  
uulvæ laborantibus  
subijcitur. Glan-  
des eosdem effectus  
exhibent. urinam  
ciunt. capitis dolo-  
rem & flatum in ci-

bum sumptu pariunt. resistunt escitæ uenenatorum ictibus. decoctum earum &  
corticis cum lacte uaccino potum prodest contra toxica. intritæ crudæ, inflam-  
mationes illitu leniunt. ad duritias quas cacothe uocant, & malefica ulcera  
cum salsa exungia conueniunt. Iligneæ glandes uiribus quernas antecellunt.  
Fagus & ilex quercus generi assignantur, & consimile munus obeunt. Iliginæ  
radicis cortex cum aqua coctus dum mollitus intabescat, & tota nocte illitus,  
denigrat capillos, prius cimolia terra purgatos. Folia omnium tusa & trita tu-  
moribus prosunt. & imbecillas membrorum partes corroborant.

NOMI



## NOMINA ET EXPLICATIO.

**Quercus** Græcis ὄρος. Officinis Latinum nomen seruauit. Germanis Eychbaum.  
**Gallis** uue cheſne. appellatur. Exiſtimatur dicta ueteribus etiam Hemeris, id eſt, placida. No-  
 viſſima arbor eſt, procera, craſſiori & aſperiori caudice, ramoſa, folijs profunde laciniatis. Glandes <sup>hæbent</sup>  
 producit optimas, & maximas. gallas item & uiſcum.

Græcis ἰſος. Latinis & Officinis uiſcum. Germanis Myſtel / & Myſſolter.

**Gallis du guy** appellant. Caſſia cum acrimonia: plurima enim ærea & aquæ, pauciſſima terre  
 na conſtat. Igitur acrimonia in eo amaritudinem excellit.

**Fagus** Latinis. Græcis φάγος. Germanis Bächbaum.

**Gallis Faus** uocatur, expuncta litera g.

**Fagus** glandiferis arboribus annuneratur: tametſi fructu nihil glandi ſimilimum habeat. aſſur-  
 get caudice craſſo, & in orbem comoſo, neq; ita procero: folio tenui & leuiſſimo, populo ſimili, celer-  
 rimè ſtueſcente: & media plurimum parte ſupra hoc paruula gignitur bacca uiridis, ſiſtigio aculea-  
 ta. Glanſcius dulciſſima, nucleis haud abſimilis, triangula cute includitur, & parte poſtrema  
 utrinq; lapideſcit in duritiā, ſi uirilis ſexus fuerit.

**Ilex** glandiſtra Græcia ὀξὺς & dicta, apud nos peregrina arbor eſt. Ilex uerò quæ aquifolia co-  
 gnominatur duplex exiſtimatur, altera coccum tinctorum ferens officinis notiſſimo, paruo frutice:  
 altera magna, fructu inutili, Germanis Stechend palmen: Gallis houi & houſſon appellata, cuius pi-  
 ſturam damus &c.

## Caſtaneæ. Cap. CXXII.

**S**ardianæ glandes, quas aliqui caſtaneas, aut lo-  
 ſpina, aut glandes lous appellant, adſtringunt,  
 ſimilesq; effectus præbent, præſertim tunica quæ car-  
 nem & corticem media intercuſat, caro his qui eph-  
 merum biberunt conueniens eſt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis Καστανά, ἢ Λιός Βάλας & ἢ Λόπιμος.

Latinis Caſtaneæ, glans Sardiana, lous glans, appellatur.

Officine nactem Caſtaneam. Germani Keſten / Baſtanti.

Galli Chaſſaignes & marrons, uocant.

Caſtaneæ autem à Caſtana Magnæſiæ oppido, unde primum ado-  
 uctæ ſunt, nominatas eſſe conſtat. Sardianæ uerò glandes, quoni-  
 am in Sardinia optime naſcantur.

Adſtringit & exiccat Caſtaneæ haud ſecus quàm aliæ glandes.  
 Calida uerò & ſicca eſt primo ordine.

Caſtaneas inter cæteras appellationes Sardianas glandes &  
 Λόπιμα Græcis dici, hoc capite oſtendit Dioſcorides.  
 & Galenus libro 2. de alimenis τὰ καſτανά ἐνιὸς ἡγὰρ  
 Λόπιμος ὀνομάζου σιν, inquit. Earum itaq; hiſpidum  
 corticem in uſum aſſumit Galenus lib. 1. ca. de comp. ph.  
 part. uocatq; πώγιθα Λόπιμα, id eſt, barbam caſta-  
 neæ, id quod Plinius echinatum calicem dixit. Neq; aliud  
 quàm caſtaneæ cortex eſt, quem Aëtius Βαλάνου κα-  
 στανὸς φλοιὸν appellat, ſermone. 3. cap. 73.

## Galla. Cap. CXXIII.

**G**alla fructus eſt quercus. Aliqua om-  
 phacitis appellatur, parua quidem ſed  
 tuberoſa, ſolida, nullo foramine peruia. alte-  
 ra plana, leuis, perforata. Eligi debet ompha-  
 citis, quæ efficacior eſt. Vtriuſque uis uehe-  
 menter aſtringere, trita excreſcentias in car-  
 ne, fluxiones gingiuarum & uux, atq; oris  
 ulcerationem cohibent. nucleus dentium ca-  
 uernis inditus dolorem ſedat, crematæ car-  
 bonibus





honibus donec igne flagrent, & uino aut aceto aut acida muria extinctæ, sangui-  
nem supprimunt. decoctum quibus insidere expedit, efficax est, & contra uul-  
uas procidentes, fluxionesq; capillos denigrant, aceto aut aqua maceratæ. dy-  
sentericis eccliacisq; cum uino aut aqua trita conuenienter illinuntur, aut bi-  
buntur obsonijs addi debent, aut integræ in aqua præcoqui, in qua nonnihil ex-  
coquendum est, quod his affectibus conferat, in summa, his utendum ad astrin-  
gendâ, aut siccandâ quæ opus sunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *Κυλίσ*. Latine *Galla*. Germanicè *Gallôpfel*.  
Gallus noix de galle, appellatur. Gallitria galle genera ostend. in, primum periate galle, alterâ  
galle de romane, tertium galle legiere appellant.

Gallarum gener. hoc cap. Dioscorid. duo facit his uerbis. *κυλίσ καὶ πῶς ὁ δὲ δρῦος ἢ μὲν τις οὐ  
φανέρως καὶ εἰς τὰ μὲν καὶ καὶ κοῦδ' ὡς δὲ, ἢ βαρὺ, ἀπὸ πηχτος, ἢ δὲ τις λεῖα καὶ κοῦφη καὶ  
τετραγυλὴ, hoc est, Gallâ fructus est quercus, & altera ex his omphacitis appellatur, parua, nodo-  
sa, solida, non perforata. Altera uerò glabra, leuis & perforata. Galenus autem lib. 7. simpl. phar-  
ma. alteram simpliciter omphacitim appellari ait, alteram uerò flauam, & laxam ac magnam de-  
scribit, & siccare quidem ut priorem tradit, sed tamò minus, quàm ò acerba qualitatibus minus quàm  
prior complectitur. Ex quibus sanè uerbis pleriq; omnes qui omphacitim Gallam apud Græcos Me-  
dicos, Galenum, Dioscoridem, Paulum, ac alios legunt, nobis immaturam uertunt, tanquam sanè ea ip-  
sa, uoce *ὀμπακίτις* significetur, quum aliàs *ὀμπαξ* uua itemq; oliua immatura, & *ὀμπακίτις*  
ex oliuis immaturis oleum appelletur.*

Verum nos non temere ita uertimus, sed semper omphacitim diximus, ut qui non per hanc uocem  
immaturam Dioscoridi & Galeno ac Paulo dictum putamus, sed certum quoddam genus, quod Diosco-  
rides ac Galenus alterum ex eis faciunt, quum immaturæ appellatio de utroq; genere intelligi possit,  
quod non ad iustam maturitatem peruenit, atque ita accipio à Plinio dictum lib. 24. cap. 8. immatu-  
ræ ex his ex aceto potæ lienem consumunt. Eadem crematæ & aceto falso extinctæ menses sistunt,  
uuluasq; procidentes siccant. Neque enim aliud est quod Dioscorides & Galenus de utroq; genere dixe-  
runt, quod uidelicet *ἰσχυρὰ* sunt, si ignitis prunis urantur, & aceto aut uino, aut oxalimæ extin-  
guantur. Quando igitur utraque Galla suo tempore immatura est, & dicitur, minime hæc certa  
alterius generis differentia putanda est, minimeq; pro omphacitide primo gallarum genere, immatura  
accipienda. Inquirendum utaque est quod genus gallarum sit omphacitis appellatum, alterum enim ge-  
nus nemini non est notum, atque id conabimur ex descriptione quam Dioscorides habet cruce, singu-  
lis eius uerbis æstimatis. *ὀμπακίτις*, inquit, καὶ λεῖα καὶ μὲν καὶ καὶ κοῦδ' ὡς δὲ, ἢ βαρὺ, ἀπὸ πη-  
χτος. Paruam itaque primum dicit, mox nodosam, Solidam deinde, & non perforatam tradit, ut pla-  
nè hæ differentia sint, quas Plinius dixit. Nimirum alteram solidam, alteram perforatam, illam mi-  
norem, hanc maiorem. Nam albæ & nigre differentiam Dioscorides non habet, & Galenus alterum  
genus, magnum scilicet, fuluum esse dicit, quod sortasse primum candidius iuxta Plinium fuit. Sicut  
contrâ appellationis Omphacitidis differentiam Plinius nunquam habet. Habemus itaque non Gallâ  
omphacitim esse paruam, nodosam, solidam, non perforatam. quæ certe immatura dici Latinis non  
potest, sicut neque etiam est, sed in suo genere perfecta. Quæ igitur talis est? Ego sanè omphacitim  
gallam esse & appellari à Galeno, ac describi à Dioscoride puto, id quod cauum primum ex quercu  
enascitur, ex quo postea ipsa glans prodit, eique innascitur, quanquam id non perpetuo contingat, ut  
ex eo glans proveniat, atque in hanc opinionem induxit me Paulus, qui libro 3. cap. de dysent. aper-  
tis uerbis docet, *ὀμπακίτις*, id esse quod dixi *ὀμπακίτις*, inquit, legitur tamen in uulgo exem-  
plari *ὀμπακίτις*, καὶ τανύς. δὲ ἡ κοῦδ' ὡς δὲ καὶ πηχτος, ἢ τῆς, δρῦος βάλανος ἀπὸ  
βυρῶος χροῦται, hoc est: omphacitidis costæ, est autem cauum illud ex quo glans quercina enasci-  
tur, quo coriarij utuntur. Euidens est descriptio rei quam uelit, & quum hoc amplius addat, eo co-  
rarij uti, planè hoc indicat quod hodie etiam usu uenire uidemus, quanquam utraque galla à tincto-  
ribus expetatur.

Utraq; Galla refrigerat ordine secundo, siccatur tertio, crassæ est essentia, astringit.

## Caput CXXIII.

## Rhus.

Rhus quæ obsonijs aspergitur, ab aliquibus erythros appellata, semen est  
coriarij fructicis, sic uocati, quoniam coriorum infectores eo utantur ad  
inspissandas pelles, arbuscula in petris nascens, binum cubitorum altitudine, fo-  
lijs ob-



Rhus. Sumach.



lijs oblongis, subrubentibus, in ambitu serratis, acino uuarum gracilium denso, magnitudine terebinthi, quadam tenui lato. Cuius corticosa tunica perquam utilis est. folia uim habent astringendi, & acaciae effectus praebent. decoctum capillos denigrat. dysentericis infunditur, & in potus eorum infususq; adijcitur. instillatur auribus purulentis. gangraenas & pterygia cohibet. folia ex aceto aut melle illita. Liquamentum fit ex aridis folijs, ad crassitudinem mellis in aqua decoctis, ad eadem, ut lycium, conueniens. Semen eosdem effectus exhibet. celi acorum, dysentericorumq; obsonijs inspergitur. fracta, desquamata, liuida q; illitum ex aqua, ab inflammatione uindicat. linguae asperitates cum melle abstergit. candida facieminarum profluua sistit. haemorrhoidas sanat, cum querno carbone intrito admotum. aqua in qua semen maduit decocta, cogitur coitq; efficacior ipso semine. Gummi defert, quod dentium cauis imprimitur, ad dolores finiendos.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis ῥόδον καὶ ῥόδον καὶ ῥόδον καὶ ῥόδον. Latine Rhus erythros & Mugiricus, quod obsonijs aspergetur. Officina nomen à barbaris mendicatum Sumach usurpant.

Rhus hic aut hæc, est fructus racemosus, cortice acido, astringente, repellente, nunc medicamentarius tantum, olim etiam culinaris, pro sale obsonijs aspergebatur, stomacho ualde idoneus: alter uero & corarius densandis pellibus applicabatur. Ille etiam Syriacus & ruber, lib. 3. & libro 6. comp. phar. part. uterq; tamen musto austero incoctus stomachicum est medicamentum optimum, lib. 6. comp. phar. part. Eius succus omphacij uice est in Gallia Narbonensi, in hortis Gulielmi Pelliserij, Episcopi Montispeffulani longè omnium doctissimu & optimi.

Rhus erythros differt à byrjodepsico, quandoquidem utrumq; in patillum pantolimon dictum Medici diuersis ponderibus contra dysentericos & cruenta reijciunt requirunt.

## Palma.

## Caput CXXV.



Palma in Aegypto gignitur. Ea medio maturitatis uigore, autumnno decerpi solet, Arabici myrobalani similis, pomatis cognomine, colore uiridi, & odore mali cotonei, quod si ad maturitatem peruenire sinatur, phenicobalanus fiet. Palma acerba est & astringens. contra alui sceminarumq; profluua, in uino austero bibitur. haemorrhoidas sistit. uulnera glutinat illitu. Phenicobalani recentes plus siccis astringunt, capitis dolorem afferunt. copiosiores in cibo inebriant. sicciores sanguinem excreantibus, stomachicis & dysentericis utiles in cibo. illinuntur cum cotoneo & cerato œnanthiuo uesicæ uitij. Cariotæ, praesertim esu, faucium asperitati medentur. Thebaicarum decoctum potu æstuationem sedat. uires recreat cum hydromelite ueteri sumptu. cibo idem faciunt. Fit ex eis uinum ad eadem conueniens. Decoctum per se potu et gargarizatione magnopere astringit, et cohibet. Nuclei palmarum, cæterorum more, cremati in crudo fide li, & uino restincti, cinere loto, spodij uicem efficiunt, miscenturq; in calliblephara. quod si non iustam uestionem acceperint, denuò cremandi vim astringendi habent, & spiracula cutis obductu suo claudunt. contra oculum



lorum uuam & pustulas, palpebrarum defluuia, cū nardo effectum præbent, cor poris excrescentias cum uino reprimunt, ulcera ad cicatricem perducunt. Sed in ter primas utiles ex palmis humilibus Aegyptiæ.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè φοῖνιξ. Latine Palma arbor.

Germanicè Dattelbaum. Gallicè arbre de dattes, appellatur.

Fructus palmæ, Græcis δάκτυλος. Latine palmula.

Officinis dactyli. Germanis Dattlen.

Gallis dattes & figue royale, dicuntur.

Ex palmulis caryotides celebrantur cibus, harum generat tria sunt, Nicolai, sorores Græcis adel phides, Patri, sunt & Eunuchi Aristoteli genus Palmulæ, quod alij enorchos uocant, quasi testicula res ac spadonias. Sunt & Magarides authore Plinio, palmæ breues, candidæ, rotundæ, acinis quàm balanis similiores: quare à margaritis nomen accepere.

φοῖνιξ, ut hoc loco Dioscorides tradit, in Aegypto nascitur, uiridi colore, odore mali cotonei, meo dio maturitatis uigore per autumnum decerpi solet. Arabici Myrobalani similia, sine osse, quam My robalanum quoque uocari Hermolaus affirmat. τῶμαα autem & ἄδωλ-ος etiam Dioscoridi uoca tur, quod ex hoc fructu palmæ Aegyptiæ humidior, acerbior, astringentior, expresso, potius sit sitim se dan Solino authore, qualis nobis ex pomis, pyris, sorbis. Hic autem fructus si usq; ad maturitatem in arbore sinatur, solibus nigricat, & φοῖνικο βάλανος uocatur. φοῖνικες ἢ φοῖνικο βάλανοι, uel quomodo aliter uocare, & moderatè stringunt, acerbior sapore, φοῖνικα βάλανα Pl. Cædus, & in colice Scribonij ibidem. Caro φοῖνικος σπιγδακόν in arteriæ Andromachi 12. caro φοῖνικο βά λανων 15. φοῖνικων βάλανοι proprietatem quandam habent capitis dolorem excitandi: easdem dat ibidem in cephalagia: sed addit, si sint consuetæ & accipienti iucundæ. Adhæc bilem pellunt de orsum, ut absinthium, & refrigerant. φοῖνικες δὲ βαῖνοι à Thebis Aegypti opinor, & paulò post, φοῖνικες πάντες celebrantur, φοῖνικες πάντες μέγιστοι bis lib. 9. comp. phar. part. & paulò ante φοῖνικων κερύον, πάντες autem uocatur, quod id genus tertium palmularum caria tarū præhumidum in parente rumpat se præ humore, calcato simile redditum. φοῖνιξ uero pal me ipsius fructus, præsertim dulcis, non paucam obtinet caliditatem: tamen desiccatur, roboratur, cons trahit, stipat, densatur, sumptus & admotus.

Hic autem fructus à palmæ Aegyptiæ fructu ex osse differt: nam hic os habet magnum & longum & durissimum, in quo semen, uel ustum & tritum ualenter digerit, lib. 6. comp. phar. part. Dacti lus à digitorum forma dicitur. ὅξυφοῖνιξ uero dictus Actuarius & alijs quibusdam Græcis recentio ribus ab acido sapore, palmæ syluestris fructus, Tamar Indus, id est, Dactylus Indus Barbaris. Ger manis uero Tamarindè & saur dattel uocatus: quamuis cholagogus sit comprimendo, ut palmæ Aegyptiæ fructus Phœnicobalanus, tamen os habet quod satum arborem nobis produxit, alijs multis conueniunt & differunt, ut mox audies: sed Oxyphanix ueteribus indidus, cum phœnicobalanus in his frequens sit. Oxyphœnix subniger, lucidus, tener, uillis tanquàm radicibus mistus, recens, pin guis, acido sapore. Quibus notis apparet, quantum conueniat cum Phœnicobalano, & quantum di screpet: ad hæc osse ut diximus, & usu hic recentiorum tantum: ille etiā ueterum. Si frigidus est ue teratus, oxyphœnici debet misceri mastiche uel macis uel spica nardi. Rarò per se datur, picrocholis saluberrimum ad uncias quatuor dari potest: annis 10. seruatur.

## Palma elate.

## Cap. CXXVI.

**P**ALMA, quam aliqui elaten aut satham appellant, fructus palmarum adhuc florentium, inuolutus est calyxq; quo in spissamenta unguentarij utuntur. Optima habetur odorata, astringens, ponderosa, præclusa, intus pinguis, uis ei adstrictoria, sistit ulcera quæ depascunt, laxatos artus committit, trita miscetur ca taplasmatibus & malagmatis, prodest præcordijs, imbecilli stomacho, & iecinori affecto, mista conferentibus cataplasmatibus. Eius decoctum subinde detersum, ca pillos denigrat, datur bibendū cōgruè, renū, uesciæ, & uiscerū uitijis, uulū ac uē tris fluxiōes sistit, scabiē cū refina et cera sanat, si uiginti diebus recēs apponatur. Inuolutusq; in ea elate fructus, quē suo amplexu fouet, elate etiā uocari solet, & ab aliquibus borassus. Adstringit, & satham effectus præstat, non sic unguentis expetitus. Alba medulla caudicis recens in cibo, aut decocta, eadem facit quæ borassus.

## NOMI



NOMINA ET EXPLICATIO.

Malum punicum.

**M**alum punicum omne boni succi est, stoma-  
cho utile, perexiguum sufficiens ali-  
mentum. Dulcia stomacho utiliora habentur,  
sed aliquantulum in eo calorem gignunt, infla-  
tiones pariunt, unde in febris abdicantur. Acida  
adstringunt, æstuanti stomacho auxiliaiunt. &  
multo magis contrahunt. acurimam eiecit. ora  
mediam sortiuntur naturam. Nuclei acinorum  
sonis insparfi, concoctiue, fluentem alium sto-  
machi madefcunt, bibunturq; commodè sanguinem  
interiorum, seminariarumq; fluxione uulx labora-  
ntium, reducias, & ea quæ in corpore extuberant, aurium  
in acidiorum. Huius flores cytini uocantur, qd ad  
oleum glutinât. quas punicis, præstât utilitates, hu-  
mide repellunt, memoria tradunt, qui tres quam-  
nullam eo anno lippitudinem passurum. eliquarum  
porum, asperum est mali punci putamen, quod ali-  
andi uim habet, & quos cytini, præbet usus. deco-  
s tineas pellit, & eandem euocat Balaustum sylue  
nilis. cuius complura genera reperiuntur, candi-  
succus ex eo exprimitur, hypocistidis modo, cui ad-  
dens quæ hypocistis & cytinus.

Græcè γοιὰς ἡ, apud nonnullos σίολη.  
Balanstia.

Latine Malapunica. Officinis granata.

Germanicè Granattbaum / arbor. Granattöpfel / fructus.

Gallis arbor ung pomcir de granade fructus pomiet  
de granade & Mygrenes appellatur.

*Malum granatum seu puniceum triplex, dulce, aci-  
dum, & acidodulce, scilicet succo, saporis naturam ui-  
bus refert: omnium tamen flos, cortex, nucleus asiringa  
sed acidi & acerbi magis, dulcis multo minus: mediū hōrū  
mediocriter. malicorium, id ē, cortex nondum adule-  
rum sed perfectum propinquorum est melior ad asiring-  
gendum in ore affectus ex fluxione nascentes.*

Balaustium floridum punice flos cymini sativae &  
domestice Dioscoridis & Galeni.  $\alpha\delta\epsilon\ \delta\omicron\nu\omicron\mu\alpha\epsilon\ \phi\omicron\rho\tau\alpha\epsilon\ \chi\upsilon\varsigma$   
 $\tau\iota\omega\iota\ \alpha\iota\tau\iota\ \phi\omega\tau\ \delta\gamma\omicron\gamma\omega\iota\ \phi\omicron\iota\alpha\iota$ , id est, primogenita punice.  
Nam quando arbor florescere desinit, fructus ipsius appa-  
ret in mali Punici speciem figuratus. Hi in fine utriusque





gignuntur, & meliores sunt ex granatis acidis & acerbis, quia magis astringunt, ibidem. Ambo tamen insigniter astringunt, refrigerant, sicant, crassa sunt substantia: ambo etiam hodie à medicis Plinio Balauſtia, Germanis granat plâst, Gallis fleur de pome granade uocatur.

## Myrtus.

## Caput CXXVIII.



lignem emendat. purulentis auribus infunditur, & capillos denigrat. Succus eadem efficit. Trita folia & ex aqua illita humidis ulceribus & partibus omnibus fluxione laborantibus, coeliacisq; profunt. & admisto omphacino oleo, aut exiguo rosaceo cum uino, ad ulcera serpentia, ignem sacrum, testium inflammationes, epinyctidas, & condylomata. arentium foliorum farina utiliter inspargitur paronychijs, pterygijs, & contra alarum sceminumq; perfusiones. cardiacorum sudores cohibet. folia cruda seu cremata cum cerato, ambustis, paronychijs, pterygijsq; medentur. Exprimitur folijs succus adfuso uetere uino aut aqua coelesti, cuius recentis usus est, nam exiccatuſ planè cariem sentit, & uires amittit. Myrtidanum dicitur, adnatum inæquabile, uerrucosum intumescensq; & concolor, quod perinde quasi manus myrti caudicem amplectitur. magis quàm myrtus astringit. tusum addito austero uino reponitur, coactiq; in pastillos siccatuſ in umbra multo efficacius & folio & semine, cerato, pessis, in sessionibus, cataplasmatibus admistum, ubi astringendum aliquid est.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis Μυρτίνα, uel μυρτίνα. Latinis Myrtus.

Officinis grana Myrti, Myrtilli.

Germanis Welsch oder frembd heydelber.

Gallis grain de Meurte appellatur.

Myrtus ita etiam nota arbor, Dux potissimum eius species, nigra & alba: nigra folia habet quæ ad nigritudinem quandam intensam, & ferè subobscuram tendunt, quæ nigredinem quandam præ se ferro



**Myrtus. Officinarum.**

ferre videntur: alba uerò uiriditatem habent magis, a per tam, quæ respectu intensæ uiriditatis albedo dici potest. In genere autem omnia ex myrto, quæ in usum medicorum ueniunt, feliciora & efficaciora in nigra sunt, quàm in alba.

Myrti utriusq; germina, folia, bacca, succus constant substantia calida, tenui, & contraria illi frigida terrea, astringente magis sylvestris quàm sativa. Bacca Catoni Myrtia, Murtâ Varroni. Myrtilli. Officinis, uulgo Welschheydelber.

Myrtus alba & nigra passim dicitur Galeno in comp. pharm. part.

**Cerasia.****Caput CXXIX.**

tum calulosus auxilio est.

**NOMINA ET EXPLICATIO.**

Grecis Κερασια, κεράσιον.

Latinis Cerasus & Cerasum fructus.

Germanis Kirschbaum. Kirschen.

Gallis Cerisier: fructus, une cerise.



Cerasia dicta sunt à ciuitate Ponti Cerasunte, unde primum ea attulit L. Lucullus, ut auctor est libro 15. Plinius, qui ait: Cerasi ante uictoriam Mithridaticam. L. Luculli non fuisse in Italia. At urbis anno sexcentesimo octogesimo is primum uexit à Ponto. Plura eorum genera inter quæ Aproniana maxime rubent. Nigerrima sunt Aëti. Cecilianæ uerò & rotunda. Iulianis gratus sapor, sed pene tantum sub arbore sua, adeo teneres, ut gestati non tolerant. Principatus Duracinis, quæ Campania Plinius appellat. Sunt & alia quæ tamen omnia alij sapore discernentes in tria genera contrahunt & discriminant, dulcia, austera, & acida: quorum dulcia uentrem molliunt & citissime dilabuntur, maxime recentia, quæ quia lubricos ac putridos gignunt humores, stomacho minus utilia sunt. Austera stomacho utiliora, adstringentia. Acida pituitosos & uiscidos stomachi humores incidunt, & ipsum confirmant, sitim sedant, & appetentiam excitant. In uniuersum ut & hoc loco Dioscorides testatur, bonam faciunt aluum recentia, siccata sistunt. Et Plinius libro 23. idem tradens ait: Cerasa aluum molliunt, stomacho inutilia. Eadem siccata, aluum sistunt: Vrinam ciunt. Inuenio apud authores si quis matutino roscida deuoret cum suis nasaleis, in tantum lenari aluum, ut pedes morbo



# DIOSCORIDIS

liberentur. Siccantur sole aut furnis, saccharo ac melle condiantur, ut quotannis apud nos fieri solet: quare uiderit Palladius quid dicat, cum in Octobri mense ait: Cerasa non aliter quam in sole usque ad rugas siccata seruantur. sed forte hic seruandi modus tantum suo eno in usu conuersus fuit:

## Siliquæ.



## Caput CXXX.

Siliquæ recentes stomacho aduersantur. aluum soluunt. eadem siccatae fiunt, stomachoq; utiliores fiunt. urinam ciunt: sed præcipuè, quæ uinaceis condiantur.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè κεράτια, κεράτνια, ξυλοκεράτια. ράτια.

Latinis arbor, siliqua, fructus xylocerata.

Officinis fructus corrupto uocabulo xylocaragsta. Germanis S. Johans brott.

Gallis carouge appellatur.

Quod ad medicinâ pertinet ferè nullo in usu sunt. Siliquæ, soluunt tamen uirides, utpote humectiores aluum, quam resiccate sistunt, & tum quoque stomacho utiliores esse ait & urinam ciunt Dioscorides, maximè eas quæ reiectis acinis siue internis grauis ipsarum edantur, ita enim existimo legendum, tametsi cura exemplaris uetustioris fidem id non assecutur antius astruam, nempe pro eo quod habetur in uulgatis exemplaribus omnibus, τα ἐκ τῆς σιμφύλου σαρτιδεμένα quæ uerba nullam certam sententiam exhibent. τα ἐκτος τῆς σιμφύλου ἐδοιόμην, ut sit id quod Plinius lib. 15 cap. 28. dixit. Quum in pluribus semina placeant, in siliqua damnantur. σιμφύλα porro grana eius sicut uinaceas dici opinor, quantum etiam solida retrimenta uine in torculari expressa, Galenus 2. de alimentis σιμφύλα uocet, & alios radices uuarum ex sarmentis enascentes ita appellare tradat. sed σιμφύλα pro oliuarum nucleis siue osiculis accipiuntur Constantino Cesare de

agricultu. libro sexto caput. 11. teste qui sic ait: ἰστέναί τε καὶ ὅτι σιμφύλα οὐχ ὡς τινὲς νομίζουσι τὰν ἐλαίων, μόνον ἐστὶ πύρην, ἀλλὰ καὶ τὰ τῶν σιμφύλων γίγναται. Galenus item loco iam citato, σιμφύλα quidem oliuarum etiam dici sâtetur osicula, sed oleo iam expresso reliqua.

Porro quum in solidis illis uine retrimentis σιμφύλους appellatis, tum ipse uine ollares disternantur, uelut alio loco declarauimus, tum etiam oliuæ ipsæ componantur, ita ut antequam exprimentur uicissim in uase cum oliui reponantur, uelut idem Const. Cesar libro nono de agricultu. cap. 31.

Videtur mihi omnino fieri posse ut eodem planè modo uelut oliuæ, etiam ipsæ siliquæ componantur ac adseruentur, easque ipsæ τα ἐκ τῶν σιμφύλων σαρτιδεμένα Dioscorides appellauit, hoc est, Siliquas in retrimentis uinarum compositas & adseruat, atque hæc sententia mihi præ superiore probatur.

## Mala.

## Cap. CXXXI.

Folia, flores & germina cum omnis mali, tum maximè cotoneæ, adstringat. Pomis acerbis adstringendi uis inest, maturis uerò longè secus. Ex his uerna bilem



Mala Cydonia



Mala.



Malimela.



Epirotica.



bilem gignunt. nervos omnes lædunt. inflationes pariunt. Coronea stomacho utilia. urinam cient. verum tosta mitiora habentur. profunt celiacis; dysentericis. purulenta extussientibus, cholericis, præsertim cruda. maceratorum liquor. commodè in stomachi aut utris fluxionibus potui datur. Succus crudorum asumptus orthopnoicis salutaris est. decocto fouentur uulue & sedes si procidant. Coronea quæ melle condiuntur urinam mouent. mel autem sibi constringentem illorum uim & inspissantem asciscit. quæ cum melle coquantur, stomacho atque ori gratiora sunt, sed minus inspissant. cruda cataplasmatibus adcohibendam aluum, aut si stomachus æstuet, aut in uomitiones effundatur, ad mammarum inflammationes, præduros lienes, & condylomata. Fit uinum ex ipsis tuis expressisq; sed quò perduret, quindecim sextarijs succi unus mellis adiungitur, alioquin in acorem degenerat. Prodest ad omnia quæ dicta sunt. Fit & oleum ex his quod melinum uocauimus, quo utimur quoties astringenti oleo est opus. Eligioportet uera, quæ sanè sunt rotunda, & parua & odorata; quæ uerò struthia di-



tuntur, magna quidē sunt, sed minus utilia. Flos & uiridis & ficcus cataplasmatīs imponitur, ijs conueniens quæ astrictionem desiderant, inflammationibus oculorum, reiectionibus sanguinis. contra citam aluum, & mensium impetus, in uino bibitur. Melimela uentrem molliunt, & ab eo animalia expellunt. Stomacho negotiā exhibent, æstuosa. Ea multis dulcia mala uocantur. Epirotica mala, quæ Latine orbiculata dicuntur, stomacho utilia. sistunt aluum, urinas euocant. malis tamen cotoneis inualidiora. Syluestria mala similia sunt uernis. & adstringūt. sanē in hūc usum immatura omnia opus sunt. Persica poma matura tam stomacho quā uentri utilia sunt. acerba aluum cohibent, sed sicca uehementius decoctum ē ficcis alui stomachiq; fluxiones sistit. Armenia ca, quæ à Latinis præcocia dicuntur, minora sunt supradictis, & stomacho utiliora. Medica mala aut cedromela, quæ Latini citria uocāt. nemini non cognita. Arbor ipsa omnibus anni temporibus pomifera, alijs deciduis, alijs subnascētibz. malum oblongū est, rugosum, colore aurum imitans, cum grauitate odoratum. semen habet pyri. Id in uino potum uenenis resistit. aluum mouet. oris suauitatem commendat, decocto eius colluto, aut succo. estur in malacia mulieribus. uestiarijs impositum ab erosionis uitio uestes uindicare existimatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis μυλέα arbor, fructus μῆλον. Latinis Malus. Malum.

Germanis ein apfelbaum/ ein apfel. Gallis une pome & ung pomier dicitur.

Malorum sicut & pyrorum infinita sunt genera, quorum copiose meminit Plinius lib. 15.

Mala cydonia quæ & cotonea dicuntur, sicut sunt ex creta insula aduecta, à cuius ciuitate Cydonē dicta sunt Cydonia Q. Serenus: Aut quæ poma Cydon Creteis mittit ab oris. Horum plura sunt genera. Nam sunt Chrysomela, quæ aurea mala interpretatur, à colore aureo, quem referunt. Sunt demum de minor et odoratis fragrantia, quæ Struthæa uocantur. sunt item quæ à mellico sapore Melimela, & eadem à nascendi maturescendiq; celeritate uocantur mustica, uulgo uero ab arborum paruitate quid pomilæ sunt in quibus nascuntur, Nana appellantur &c. quæ genera lib. 15. à Plinio describuntur. Fit & uinum, mel & oleum ē cydoniis, & condimentum Cotoneatum uulgo, Quitten Latweg. Gallis uero contingnat appellatum. Ceterum cotonea cocta suauiora in cibo, Cruda & matura prosum sanæ guinæ excrementibus ac dysentericis, cholericis, coeliacis, ut Dioscorides testatur.

Persica.



Persica nota sunt poma, uulgo pferfich, Gallis de pesches dicta, ē Persia ad nos translata, unde nomen habent. Nec unum eorum genus est, ē quibus tamen ante alia in precio sunt à duricie & soliditate dicta duracina, quibus corpus ligno adheret auelliq; nequit, in reliquis facillē separatur. Plinius lib. 15. cap. 12. Persicorum palma duracinis. Nationum habent cognomen Gallica & Asiatica. Post autumnum maturescunt, Aestate præcocia Germanis S. Johans pferfich/ Gallis abricot dicta, intra xxx. annos reperta tempore Plinii, & primo denarijs singula uenundata. Supernatiæ Sabinis ueniunt, popularia undiq; Pomum innocuum, expetitur ægris, nec aliud fugacius: longissimū enim decerpto bidui mora est cogiq; senenundari. Paulus Aegmetæ lib. 1. Persica, inquit, malis succi sunt, acefcunt & facillē corrumpuntur, ideoq; in prima mensa sumenda, quo deiciantur protinus, neque propter moram in uentriculo corrumpantur. Præcocia uero & rhodacina et Armenia, persicis meliora sunt, neq; enim acefcunt, neq; similiter corrumpuntur, ac sunt etiam delectabiliora. Ex quibus illud etiā intelligi potest, quod Celsus lib. 2. tradit. Non quicquid boni succi est protinus stomacho conuenire: neq; quicquid stomacho conuenit, protinus boni succi esse. Nec illud omittere uidelicet. Armenia ca non inter Persica à Palladio & alijs, sed pruna numerari à Plinio & Columella.

Citria mala, quæ Dioscorides capite præfenti Persica quoq; & Medica et Citromala, Plinius Assyria appellari dicit. Quorum uaria sunt genera, magnitudine potius quā genere differentia, & iisdem quasi uiribus dotata, odoratissima & uenenis aduersantia, præcipue quod priuatim & peculiariter Latine Citrū, Germanice Juden apfel/ Citrimat. Gallicè ung Citron uocatur, de quo & Virgilius



Citrum.



gilius intellexit, cum ait:  
Folice mali quonon prestantius ullum,  
Pocula si quando seue inficere nouerit  
Miserumq; herbis & non innoxia uerba.

Estq; hoc pomum grande & ut hic Dioscorides illud describit, oblongum, rugosum, colore ad aurum inclinato, cum grauitate odoratum. Habentq; arborem toto anno fecundam & superfluentem, ut à Palladio etiam in Marcio mēse traditur ubi ait: Quod ego in Sardinia, & in territorio Neapolitano in fundis meis comperi (quibus) solum & cœlum tepidum est, & humor exundās) per gradus quosdā sibi semper poma succedere cum maturis se acerba substituant, acerbos

Pomeranzen.



Limonen.



Pum uero etatem florentia consequantur, orbem quandam continuæ fecunditatis sibi ministrante natura. Quæ omnia ferè etiam à Plinio traduntur lib. 12. cap. 3. Verum diuersis citri partibus, diuersæ insunt uires. Cortices enim calidi sunt: qui intus est succus semiacidus: semen item calidum, auctore Aucenna. sed Paulus Aegineta lib. 7. dicit esse frigidum, & carnem eius crassam generare humorem et peccatam ad augere, atq; refrigerare, & lib. 1. ait: Citrei mali extrema pars acris est, quæ uerò ucluti carnis speciem præ se fert, licet esui sit idonea, uix tamen concoquitur. Id uerò quod intus continetur, si uel acidum siue aqueum fuerit, uehementer infigdat. Sunt præterea in citriorum & Medicorum censu minora quæ Aurātia ab aureo colore, Germanis Pomeranzen, Gallis aurenges uocantur, duplici sapore prædita, dulci & acri. Sunt & citrigenum generis quos Limones dicunt, Germani Limonen, Galli Limons, de quibus omnibus eadem ferè dici possunt, & de quorum utilitate eleganter et copiose satis scribit poeta percelebris Iouianus Pontanus lib. 2. de hortiis Hesperidum.

## Pyra.

## Caput CXXXII.



Pyrorū multa genera, quæ tamen omnia astringunt: proinde adduntur conuenienter in repellentia cataplasmata, decoctum è siccis & cruda ipsa aluum sistunt. ieiunos esurientes lædunt. Achras pyrastris genus est, quod tardissime maturescit. Vim pyro astringentiolem habet, & ad eadem conuenit. stringunt etiam eius folia. Ligni pyrorum cinis efficaciter his auxiliatur, quos fungi strangulant. Aiunt fungos, si syluestria pyra cum eis coquantur, innoxios fieri.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis pyrus arbor ὄχυν, ἄνω & fructus ἀπιορ, ὄχυν, uel ὄγγυν: Et si hæc duo posterius a desyl-  
hæstri potius dici uelim ἀπὸ τοῦ ὄγγυν.

Latina



Latinis *Pyrus arbor*. *Pyrus fructus*.

Germanis *Birbaum* / *Bir*.

Gallis ung *poirier* & *une poire*, dicitur.

*Pyrorum* innumera sunt genera, quæ copiosius à Plinio tractantur lib. 15. Ceterum *pyrorum* cunctum cibis etiam ualentibus onerosus, ægris quoque uini modo negatur, ut lib. 23. scribit Plinius: Decocta eadem mire salubria & grata, quæ cumque uerò cum melle decocta stomachum adiuvant, ipsa aduersantur boletis atque fungis, pelluntque pondere & pugnante sacco.

*Pyrum sylvestre* tardissime maturefcit. Comeditur, suspensumque siccat ad sistendam aluum, quod & decoctum eius potum præstat. Decoquuntur & folia cum pomo ad eodẽ usum. *Pyrorum* ligni cinis contra fungos etiam nunc efficacius proficit.

### Mespilus.

### Caput CXXXIII.



**M**espilus, quæ à nonnullis aronia uocatur, spinosa arbor est, folio acutæ spinæ. fert pomum iuaue, exiguum, tribus intus ossiculis, quæ ex causa id nonnulli tricoccon appellauere. tardè maturefcit, esu astringit, stomacho gratum est, aluumque supprimit. Alterum *mespili* genus in Italia nascitur, quod aliqui *setanium*, alij *epimelida* uocant. arbor folijs mali, sed minoribus. pomum fert rotundum, esui aptum, umbilico latiore: quod astringit, seroquẽ maturefcit.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis *μίσπιλος*, ἢ *μεσπίλος*.

Latinis *Mespilus*. Legitur & *Mespila* sœm. gen.

Germanis *Mespelbaum* / *Mespel*.

Gallis ung *mesplier*, *meslier*, appellatur.

Theophrastus idcirco secutus obseruationem tria *Mespili* tradidit fastigia, Dioscorides duplici genere contentus est, ita ut alia quidam ueteres confuderint, quando quidem altissimis connumerant, quod certè sorbo quam *mespilo* nunc uocant, magis conuenit, nisi quis nostratẽ *Mespilum* *chamæmespilum* appellandam fortasse censeat. *Epimelis* frequentissima est hodie ad syluam Hirciniam, fructus eius unedo, uulgo *eyber* appellatur. Hippocrates autem *γυμνακίαν*, α. αμακίαν uocat, uelut Galenus in glossis eiusdẽ testatur.

### Lotus arbor.

### Caput CXXXIII.

**L**otus arbor est uastæ magnitudinis, ferens baccam pipere maiorem, dulcem, cibis gratam, stomacho facilem. Aluum sistit, baccis, ramentorum ligni decoctum siue potu, siue infusione, dysentericis ac fœminis fluxione uulug laborantibus auxilio est, rufat capillos, citam aluum cohibet.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci *Λωτός* *Λεωτόσος*. Aphri celtim. Latini *fabam* Græcam appellanet Italia hodie tum *Amarenum*, tum *pongericum*, tum *uiscium*, quidam *acrisolium*, alij *ciceragnem*. Veteres *fabam* Syriacam unde forsàn Padi accolæ *baccam* Syriacam adhuc uocant, Romæ *pultem* Syriacam, Cænoniani hodie *Calamum*. Germanis hoc tempore incognita arbor.

*Λωτός* *πίναξ*, id est, scobis *Loti*, ad sanguinis sputum usurpatur. Actuário in *ἡλ. ἀλεξ. πορ.*: *Galenus* leno autem ad muliebrem profluuium, dysenteriam, coeliacos affectus. Huius fructus etiam ualent astringit.

In Gallia partibus uulgo *Alifa* dicitur & arbor ipsa *Alifer*.

Cornus



## Cornus.

## Caput CXXXV.



Cornus sylvestris.



**C**ornus dura arbor est, baccas ferens oliuæ modo oblongas, quæ primùm uirent, dein per maturitatem rubescunt, aut ceræ colorem representant in cibo astringunt. profluuij alui atq; dysenteriae salutare, siue in edulio, siue in detruto exhibeantur. Muria ut oliuæ, condiuntur. Sanies quam uirentia folia torrendo refudarunt, impetigini cōuenienter illinitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè λεγανία.

Latine Cornus.

Germanicè Welsch Eirschen / Cornelbaum / Rurberbaum / Thierlinbaum.

Gallicè Cornier, ou curmier, arbor: fructus, corne ou corme.

Cornus arbor nota est Germanis. Nam & apud Heluetios & Alsatias nascitur, et alijs etiam ad Herciniam syluam locis, & fructus eius ab illis instar oliuæ muria conditur, quod etiam Dioscorides fieri hoc loco tradidit & Columella. Cornus scemina quam etiam syluestrem cornum appellant Græcis ὄλυνξανεία. Germanis Spindelholz & Saulbeer dicitur, corearijs expetitus frutex. Theophrasto, caudice fungoso & inutili assurgit, ob id Germanicam appellationem Saulholz, sortita est, uirgulis instar amerinæ fruticat, autumnalibus baccis perquam acerbus, & cunctis amnantibus gustu intactis.

## Sorba. Caput CVXXVI.

**S**orba colorē luteum referētia prius quam maturefcat, dissecta & sole siccata manduntur, ut aluum sistant. eadem est functio molitorum farinæ, si polentæ loco sumatur. quod & decoctum eorum in potu præstat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ὄρα, uel ὄνα arbor, fructus ὄνον.

Latine sorbus arbor, sorbum fructus.

Germanis Äscherslin / Speierling / Spößbren / Alesber.

Gallis corma uel sorba, cormes, sed arbor cormier.

Sorba sunt fructus, malorum pyrorumq; generi iure antiquo

numeranda, quibus quadruplex differentia, ut lib. 15. cap. 21. tradit Plinius. Alijs enim eorum rotunditas mali, alijs turbinatio pyri: alijs ouata species, ceu malorum aliquibus. Hæc obnoxia acris odore & suauitate iucunda. Cateris uini sapor. Generosissima quibus circa pediculos folia. Quartum genus Torminale appellant, remedio tantum probabile, assiduum prouentu, minimumq; pomo, arbore dissimili, folijs penè platani. Non ferunt ante trimatum ex ullo genere. Cato & sorba sepe condi iubet. Seruantur etiam du hoc genere. ut in Ianuario tradit Palladius, lecta duriora, ac posita, ubi mutescere cœperint, fistilibus usq; ad plenum cōduntur urceolis, gypso desuper tectis & bipedanea scrobe loco suo sub sole merguntur ore peruerso, et desuper spissius terra calcatur. Item secta per partes siccantur in sole ut



## DIOSCORIDIS

Sorba.



Prunus.



sole ut hoc loco Dioscorides tradit, & seruantur in usculis in hybernium. Cum voluerimus uti, aqua feruenti macerata reuiscunt sapore iucundo. Aliqui cum pediculis suis uiridia lecta suspendunt locis opacis & siccis. Celsus sorba stomacho aptissima tradit, & aluum astringere, magisq; ea quæ toruentalia vocantur. Martialis uero sorborum uim astringentem & naturam exprimit hoc disticho:

Sorba sumus molles durantia uentres,

Aptum hæc puero quam tibi poma damus.

Et Q. Serenus uentris solutioni mederi docens ait:

Proderit & pueris quos demis origo fatigat,

Castaneas coxisse nuces, & sorba uetusta.

## Prunus. Caput CXXXVII.

Prunus arbor est nota, cuius pomum estur, sed stomachum malè habet, aluum mollit. Syriaca pruna & præcipuè quæ Damasci gignuntur, exiccata stomacho utilia sunt, aluum astringunt. Folia pruni in uino decocta collutiõe & gargarizatu uiam, gingiuas, & tonsillas fluxione laborantibus reprimunt. præstant idem syluestrium prunorum baccæ, post maturitatem exiccatae, cum sapa uero decoctæ, stomacho utiliores redduntur, aluumq; magis astringunt. Gummi prunorum agglutinat, porum in uino calculos comminuit, ex aceto quoq; illitum, lichenas infantium sanat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè λεωνκυσία arbor: λεωνκυσία fructus.

Latine prunus arbor: fructus prunum.

Officinae Latinum nomen seruant.

Germanicè pflaumen / Briedchen.

Gallicè prunier arbor, fructus une prune dicitur.

Ingens est, inquit lib. 15. Plinius, turba prunorum, uersicolor, nigra, candidans, Hordaceæ appellata à comitatu frugis eius. Asinina cognominata à uilitate. Nec non ab externa gente Armeniaca, quæ sola & odore commendantur. Damascena à Syria Damasco cognominata. In uniuersum Pruna aluum molliunt. Stomacho utilissima, sed breui momento, ut ait Plinius. Dioscorides hic uerò stomacho nocere dicit, et Damascena siccata stomacho accommodata esse, sed aluum cohibere, cum mansisset hæc soluam, licet minus quàm alia, ut Paulus Aegina lib. 7. tradit. Martialis: Pruna peregrinae carie rugosa senectæ Sume, solent duri soluere uentris onus. Et Serenus: Sæpe cibis specie, uitio uel corporis ipso, Potibus aut duris restricta morabitur aluus. Vincitur talis mora gramine Mercuriali: Prunaq; conueniunt quæ mittit clara Damascus. Sum autè talia ceteris præstantiora & salubriora. Seruantur etiam pruna sole uel furnis siccata & aliter. Palladius in Nouembri mense, Pruna, inquit, siccamur in sole per crates loco sicciorè disposita. Hæc sunt quæ Damascena dicuntur. Alij in aqua marina uel in muria feruente recentè lecta pruna demergunt. & inde sublata, aut in furno tepido faciunt, aut in sole siccati.

## Arbutus.

## Caput CXXXVIII.

Arbutus siue unedo, arbor est coronæ malo non dissimilis, tenui folio, cuius fructus pruni magnitudinè implet, nullo intus nucleo. huic memæcilo cognomen



Arbutus.



cognomen est. maturus aut flauet, aut rube-  
scit. in esu acerosus. stomacho aduersatur,  
capitisq; dolorem mouet.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis ἄρβυκος. Latinis arbutus.

Germanis incognita. Gallis arbouces. dicitur.

Arbutus ἄρβυκος Græcis est. quæ arbor una cum  
fructu suo, Memecylo Græcis appellato, acerbæ quali-  
tatis est, et stomacho incommodat, ac capitis dolorem in-  
ducit, ut Galenus 7. simpl. phar. de ea prodiit. & Diosc.  
cap. præsent, quod ipsum etiam de comp phar. part.  
de ipso fructu Galenus perhibet, eaq; propter in capitis  
dolore fibriliuit andum censet. Verum Plinius lib. 15.  
cap. 24. ait: Vnedo pomum in honorum, ut cui nomen  
ex argumento sit unum tantum edendi, duobus tamen hoc  
nominibus appellam Græci, Comarum & Memecylon,  
ex quo apparet totidem esse genera & apud nos, alio  
nomine arbutus uocatur. Quibus uerbis Plinius quatuor

oces Vnedonem, Comarum, Memecylon, & arbutum, uni arbori ac fructui tradit, cuius tamen duo  
genera esse putat, atq; ita etiam lib. 23. cap. 8. sentit. Arbutus, inquit, siue unedo fructum fert difficilem  
concoctioni & stomacho inutilem. At uerò ἄρβυκος & arbutum eandem arborem esse, eiusq; fru-  
ctum Memecylon uocari, ex suprâ citatis Galeni ac Dioscoridis præsent, capite clarum est. Vnedo  
nem autem alium esse fructum, & non Comari siue arbuti, sed arboris Epimelidis appellatæ superius  
cap. 133. ex eodem Galeno ostendimus, Sexto namq; simplici phar. de Epimelide, ἐπιμελίδας inquit,  
acerba planta est, & ut dicere possis syluestris malus, appellatur autē à ruralibus in Italia οὐνεδόν,  
hoc est unedo, ac plurimum in Calabrianâ scitur. fructus eius acerbus. stomacho incommodus, & capi-  
tis dolorem inducens, nam peregrina qualitas quædam ei est ammixta. Quæ uerba ex Galeno etiâ Pau-  
lus transcripsit, ut dubitari non debeat quin alia arbor sit ἐπιμελίδας, quæ unâ cum fructu suo in Italia  
unedo appellatur, & alia arbutus, cuius fructus Memecylon Græcis dicitur. atq; hoc propterea quòd  
diuersis locis eorundem mentio fiat, & hoc ab his authoribus qui æquè ut Plinius in Italia uixerunt,  
quanquâ Plinius innuat potius quàm exprimat duo unedonis genera esse, ut uidelicet alteru de Memecylo,  
alterum de unedone accipi possit, Sed tamen mox leuiter satis dictum confundit, cum ait: alio no-  
mine arbutus uocatur. Quare certum est ipsum existimasse arbutum & unedonem Latinis esse, quod  
comarum & Memecylon Græcis, atq; id ut opinor ob similem uim, quæ de Memecylo & unedone pro-  
ditur. Verum ex Galeni uerbis ostenditur unedonem epimelidis fructum esse, Memecylon autem arbuti.  
Neq; refert fructuum & arborum appellationes singulatim inter se in suo genere confundi. Quin &  
lib. 2. de alimentis idem Galenus manifestè inter comarum arborem, cuius fructus Memecylon appella-  
tur. & inter arbutum aut sentem potius, quæ Epimelidas fert, & in Italia unedo appellatur, dis-  
tinguit, ut certum sit duo diuersa genera unedonem & Memecylon esse, quorū αὐτὸ ὄνομα Galenū sus-  
se credo, Plinium uerò ut non adeò circa has res curiosum, ex Græcis tantum transcripsisse, & in his  
uelut multis alijs eos non assequutum esse. Porro Dioscorides supra cap. 133. alterum genus Μεσπύλιον  
Italia nasci prodiit, sed ab aliquibus ἐπιμελίδας uocetur, ut ex eius uerbis Epimelis & unedo ex Me-  
spilorum genere sint. Arbutus uerò & Comarus ac Memecylon sui generis, & ab eis diuersi existunt  
ut suprâ ostendimus cap. iam citatò.

## Amygdalæ.

## Caput CXXXIX.

**A**Mygdalæ amaræ radicum tritarum decoctum uitia cutis in facie corrigi-  
t. illitæ nuces idem munus præstant. menses admotæ ciunt, capitis dolori au-  
xiliantur, illitu fronti aut temporibus cum aceto uel rosaceo. epinyctidas sanât,  
ex uino item putrescentia ulcera, & quæ serpunt. & morsus canum cum melle ea-  
rum autem esu dolores finiuntur. aluum emolliunt. somnum faciunt urinam ciunt.  
contra sanguinis reiectiones cum amylo assumuntur. renum uitij & pulmonum  
in inflammationibus ex aqua in potu aut eclegmate cū resina terebinthina dantur.

H



## DIOSCORIDIS

## Amygdala.



calculosis difficiliq; urinæ in passo auxiliantur, & illinctu cum melle & lacte, hepaticis, tussi, & inflationibus coli, nucis auellanae magnitudine. quinis septenisue præsumptis ebrietas non sentiunt potores. uulpes si cum quadam esca eas uorauerint, emoriuntur. Gummi eius calfacit & astringit. reijcientibus sanguinem, potum auxilio est. impetigines quæ summum corpus occuparunt, illitum cum aceto tollit. tussi uetustæ cum diluto uino potum medetur. calculosis cum passo bibere prodest. E nucibus Græcis, dulces cibo idoneæ: sed multo minus ualent in remedij quam amaræ: attamen extenuant, urinam ciunt. recentium esu cum suo putamine, stomachi uitia emendantur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἀμύγδαλον. Latine amygdala.

Officine Latinum nomen seruauerunt.

Germani Mandelbaum / Mandel Kern.

Galli des amandes appellant.

Amygdala amara incidunt, tenuant, terunt, digerunt sine morfu: ob id ex pulmone exsecrationem crassorum et lentorum promouent, obstructum hepatis, lienem, renem, colicam a crassis & lentis humoribus expediunt. Amygdala dulcia sunt moderatè calida, leuiculam tamen amaritudinem habent, sed à dulcedine occulta tam, quæ tamen temporis spacio fit manifesta.



Pistacia.

## Pistacia.

## Caput CXL.

Pistacia, quæ constat in Syria gigni, pineis nucibus similia sunt, & stomacho amica. trita cum uino contra serpentium ictus prosunt, siue edantur, siue bibantur.

Pistacea Germanica.



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè πιστία.

Latine



Latine pistacea vel pistacia. Nicander Pistacia. Posidonius listacia uocauit.  
Officina fistici.


Germani Welsch Bimpermusslin.

Pistacia in Syria prouenit ut Galenus quoque scribit à pineis nucib. non absimilia stomacho accommodata. Galenus exiguum præstare alimentum pistacia tradit, confirmando dilatandoque iccori haud inutilia: infraactos enim humores excernunt: at stomacho ne proffit Galenus incertum reliquit: Serapion Dioscoridis monitu tantum recenset stomacho conuenire, atque auellana magis excolescere: quare et amygdalis calorificis amplius: Auicenna uero phisticos hæc eadem nominas duobus integris numeris calere testatur, calidiores amygdala ac ipsa nucis: uerum putauerim ego nucem auellanam Auicennam concepissee, etenim iuglandem tertio ordine calorificam scripsit, quod erroneum cum sit, deprauium de iuglande scribentem Auicennam uerisimile est: addidit ille perexiguam nutrire pistacia, iccori peramica, stomachum non parum iuuare, quem nauseantem confirmant et muniant.

Eam arborem quam nupine pistaciorum Germanicorum adproximus omnino eam esse existimo que Plinio Staphylo dendros dicitur, arbor, ut ipse tradit, trans alpes, simillima aceri, alba in materia, siliqua ferens, et in ijs nucleos sapore nucis auellane. Germanis Bimpermusslin dicti. et figura et sapore parum à pistacijs differens. de his plura in herbario nostro Germanico.

Nux iuglans.

Caput CXLI.



**N**uci iuglandes, quas nonnulli Perficas uocant, sunt difficiles concoctu, stomacho inutiles, biliosæ, capitis dolorem inferentes, tussientibus inimicæ, & uomituris ieiunis in cibo aptæ, cum ruta uero & ficis præsumptæ, & à summo cibo, uenenis resistunt nec minus si à ueneni haustu comedantur, largius esitata tinea latas pellunt. illinuntur mammarum inflammationi, abscessibus, luxatissq; cum mellis exiguo & ruta. cum cepa autem, sale & melle, canis hominisq; morsui proficiunt, tormina, cum calyce suo perustæ, & umbilico admotæ, sedant. Putamen combustum tritumq; in oleo & uino, infantium capite peruncto, nutrit capillum. alopecias replet. Siftunt menses nucleiusti, si triti ex uino admo-ueantur. idem è ueteribus, illiti carbunculis, gangranis, & ægilopijs medentur. alopecijs commanducati & impositi presenti sunt remedio. Nucibus tuis oleum exprimitur. Recentes stomacho innocentiores sunt, utpote suauiores. itaq; alio


H 2



# DIOSCORIDIS

Nux Indica.

mista eximunt acrimo-  
niam. liuores in corpo-  
re illitu tollunt.



NOMINA EX  
explicatio.

Græcè *καρύδν βασιλι-  
κόν, ή εν βοίον λεγούσα, ή γα τή εν  
σινί.*

Latine *nux Basilica, iuglās,  
Persica.*

Germanicè *Baum nuss/  
Welsch nuss.*

Gallicè *Vne noix.*

*Nux iuglans seu regia, nu-*

*cleo est tenuium partium ubi inaruit, siccante etiam sine morfu, ex quo inueterato oleum ualenter  
digerit.*

*Nux Indica Actuaria in diasatyrio & diaromato. Veteres huius non meminerunt.*

Nuces auellanae:

Caput CXLII.



**N**Vces auellanae, quas & leptocarya uo-  
cant, stomacho infestæ sunt. ipsæ tamen  
trita, & in aqua mulsa potæ, tussi ueteri me-  
dentur. tosta & cum exiguo piperis potæ de-  
stillationem concoquunt. crematarum cinis  
cum axungia aut adipe ursi perunctus alopecu-  
ri capillum reddit. Aiunt nonnulli usta earum  
putamina, & in cineris speciem redacta,  
cum oleo, cæsiorem oculorum pupillas infan-  
tibus denigrare, peruso sincipite.

NOMINA ET EXPLICATIO.

*Αελλόνα, id est, nux tenuis, Pontica, Prænestina.  
Auellana, à locis ubi luxuriat Ponto, Præneste, Auellis, di-  
citur, Germanicè Baselnuss, Gallicè Noisettes, ou mellio-  
ne. Plus habet terreæ & frigide substantiæ, ob id auste-  
rior iuglande. Noces tenere, rancide, usta, cinere dige-  
runt & astringunt. Gal. lib. 6. part.*

Morus.

Caput CXLIII.

**M**orus arbor nota est, cuius fructus aluum soluit. stomacho inutilis est, & fa-  
cilè corruptionem sentit. Hoc idem præstat mori succus: decoctus autem  
æreo uase atque insolatus, adstringentior redditur. facit ad fluxiones, nomas, &  
tonillarum inflammationes, addito mellis exiguo. Sed in sole scit uis eius, adiecto  
scissili alumine, galla, croco, & myrrha: item myrica semine, iri, & thure. Imma-  
tura mori poma siccantur, tusaq; acinorum rhois uice obsonijs miscentur, ut cæ-  
liacos iuuent. Radicis cortex decoctus in aqua & potus aluum resoluit. latas uen-  
ruristineas excutit. his quoque auxiliatur qui aconitum hauserunt. Folia trita ex  
aceto illita, ambustis igni medentur, tinguntq; capillum, uitiis & fici nigrae fron-  
dibus simul coctis in aqua cœlesti. Succus foliorum cyathi mensura potus con-  
tra phalangiorum morfus auxilio est. Feruefacti corticis & foliorum iure den-  
tes aptissi



MORUS.



res aptissime in dolore colluuntur. Radix cit-  
citer messem incisa, facto in ambitu scrobes  
succum emittit, qui postridie concretus inue-  
niri solet. Is in dolore dentium efficax est. tu-  
bercula discutit, & aluum purgat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *ἡμετέρα, ἢ συκάμυρ* & arbor, fructus uero  
*συκάμυρος*.

Latine Morus arbor; Morum fructus

Officina Latinum nomen seruauerunt.

Germanis Maulber & Manberbaum.

Gallis ung merrier & une meure dicitur.

Morum ab antiquis Græcis ueteribus inditum uidetur &  
Latinis, præter quam Ouidio, forte quia per insitionem  
in populo alba gignitur: nigri catarisimum, & arbor,  
cuius folijs bombyces pasti sericum uent pulchrius &  
splendidius, Mori tamē alba foliū ad hos alendos est mol-  
lius, eoq; hodie tota Italia utitur.

Mori fructus ab eo quod in stomachica pharmaca co-  
modus est, apud nostratos uonā inuenit. Maulber, ap-  
pellatus.

## Sycomorus. Caput CXLIII.

**S**ycorum aliqui etiam sycaminum, id  
est, morum, uocant, cuius fructus sycomo-  
rum etiam propter inefficacem gustum appellatur arbor est magna, fico similis,  
frondosa, multo lacte abundans, folijs mori, pomum ter aut quater anno fert, non  
ramis, ut ficus, sed caudice ipso, capri fico nō dissimile, dulcius grossis, sine granis  
interioribus, quod non maturefcit, nisi ungue aut ferro scalpatur. Nascitur plu-  
rimum in Caria, Rhodo, locisq; non multi tritici fera cibus, ubi prouētū fce cun-  
do restibiliq; iuuamentum adfert, cum annonæ caritas premit. Pomum aluo uti-  
le est, sed perquam exilem præbet alimoniam. Stomacho aduersatur. Succus pri-  
mo uere tenera arbore, antequam fructum ferat, eximitur, lapidis ictu summo  
cortice desquamato. si enim altiore plaga uioletur cortex, nihil effluet. Spongia  
aut uellere la chryma excipitur, quæ siccata & in pastillos coacta fictili uase re-  
ponitur. Vis succi emollit, uulnera conglutinat. discutit collectiones coctioni res-  
pugnantes. bibitur etiam aut illinitur contra serpentium morsus, duratos lie-  
nes, stomachi dolores, & perfrictiones. celerrimè teredinem sentit. Gignitur &  
in Cypro arbor genere distans, quæ cum sit ulmus, prædita tamen est folijs sycō-  
mori, fructu pruni magnitudine, multo dulciore, supradictis cætera similis.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sycomora eadem non sunt cum sycaminis siue moris appellatis, quanquam Dioscorides hoc loco  
quosdam etiam ipsam sycamorum sycaminum appellare prodat: Sycomorum enim Galenus, plantam  
unā cum fructu se in Alexandria uidisse dicit, fructum quidem consimilem ficui parue albe, cumq; in  
medio mororum & ficuum locari posse ait, unde etiam nomen sit adeptus, à similitudine uidelicet  
quam ad utrumque fructum habet. Amplius autem ridiculos esse ait eos qui sycomora dicta putent,  
quod faciis ficibus, hoc est, τοῖς μωποῖς δις ὁμοίως similes existant, per quæ uerba palā est ab eo Dio-  
scoride notari qui præfenti capite ait: λαλεῖται δὲ καὶ ὁ αὐτὸς κατὰ τὸς συκάμυρος, ὅτι  
καὶ αὐτοὺς τὸν γενομένον. Videtur enim sentire Dioscorides ob debilem saporem sycomorum quasi  
facium ficum esse dictum. Sed & aliud mirum de hoc arbore eodem loco Galenus prodit. Nempe



uerationem eius diuersam esse à reliquis arborum fructibus. Neque ex uirgultis ac germinibus, sed ex ipsis ramis magnis ac stipite siue trunco enascitur. Sed in Græco exemplari corrupte legitur ἀ-  
 κρεμύονος pro πρέμνονος. Meminit huius arboris itemq; fructus eius, etiam Plinius, sed non sycomo-  
 rum appellat, uerum ficum Aegyptiam libro decimotercio, capite septimo: Arbor inquit, moro similis  
 folio, magnitudine, aspectu. Pomum fert nō ramis, sed caudice ipso. idq; ipsum est ficus prædulcis, &c.  
 & paulo post. Huic similis quadamtenus quæ uocatur Cypria ficus in Creta. Nam & illam caudice  
 fert pomum & ramis, quum in crassitudinem adoleuerit.

Fici.

Caput CXLV.

**F**ici maturæ recentes stomachum lædunt. aluum soluunt. sed faciliè contracta  
 ab eis fluxio sistitur. sudorem euocant papulasq; sitim sedant, calorem restin-  
 guunt. siccis natura ex calfaciendi. uires alunt, sed sitim magis stimulant. aluo uti-

Ficus.



Ally, Cro-  
 co,

les, rheumatismis uentris &  
 stomachi contraria. gutturi  
 autem, arteriæ, renibus, ue-  
 sicæ, & ijs quos longa uale-  
 tudo decolorauit, anhelato-  
 ribus, hydropicis, comiti-  
 alibus aptissima. feruefa-  
 ctæ cum hyssopo & potæ,  
 thoracem purgant. tussi ue-  
 teri, diuturnisq; pulmonum  
 uitij conueniunt. aluū mol-  
 liunt tuso cum nitro & cui-  
 co\*, dein manducata. deco-  
 ctum arteriæ & tonsillarum  
 inflammationibus gargari-  
 zatu prodest. cum hordea-  
 cea farina cataplasmati mi-  
 scentur. & in muliebres fo-  
 tus cum scœnugræco & pri-  
 sana. cæterum cum ruta co-  
 ctæ torminibus infundun-  
 tur. coctæ illitæq; duritias  
 discutunt. parotidas & fu-  
 runculos emolliunt. panos  
 ad maturationem perdu-  
 cunt, maximè nitro, iri aut  
 calce addita. crudæ si cum  
 antedictis tundantur, ead-  
 em efficiunt. cum malico-  
 rio, pterygia purgant. cum  
 atramento sutorio, deplo-  
 ratis uerè tibiæ fluxio-  
 nibus, & cocoëticis ulceri-  
 bus medentur. quin & cum  
 uino decoctæ addito absin-  
 thio & hordeacea farina,  
 utilissimè hydropicis illi-  
 nuntur. crematæ cum cera  
 to sanant perniones, pruri-  
 gines, sonitusq; si crudæ re-  
 rantur, & sinapi liquoreq;  
 aliquo



aliquo exceptæ auribus instillantur. Tam sylvestris quàm satiuæ fici lacteus succus coaguli modo lac contrahit, concretumquæ dissoluit, ut acetum. exulcerat corpora, meatus aperit. soluit aluum. uulnam recludit cum detrita nuce græca potus. menstrua ciet cum luteo oui appositus, aut Tyrrhenica cera podagrico rum cataplasmatibus cum farina fœnigræci & aceto utilis. lepras, lichenas, utiligines, uicia cutis in facie, pforas, ulcera in capite manantia, cum polenta expurgat. instillatus plagæ, percussis à scorpione, uenenatorum ictibus & rabiosi canis morsibus auxiliatur. prodest dentium dolori lana exceptus, & cauis eorum additus, uerrucarum in formationes tollit cum adipe, circumlita in ambitu carne. Hoc idem præstat succus è teneris ramis sylvestris fici, qui lacte prægnantes, silente adhuc oculo. tusi exprimuntur, & siccatus in umbra reponitur. Et lac & succus imponuntur exulceratoris medicamentis. Decocti cum bubulis carnibus ramuli ficulni, facilem afferunt decoctionem. lac efficiunt quod magis soluat, si inter coquendum ficulneo furculo spathæ loco moueatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Ζυκν.

Latine & Officinis ficus.

Germanis Feigenbaum

Gallis ung figuier.

Ficuū plura traduntur genera, de quibus Plinius partim libro decimo tertio, partim 15. agit. Inter quæ sunt mariscæ uocatae, grandiores & insipidiore, de quibus Martialis extat distichon hoc,

Infanti melimela dato, satuasq; mariscas,

Nam mihi quæ nouit pingere, Chia sapit.

De qua chia eiusdem etiam est alterum, distichon hoc,

Chia seni similis Bacho, quam Setia misit,

Ipsa merum senum portat & ipsa salum.

Sunt deinde à locis etiam dictæ Costana, de quibus etiam apud Martialem est distichon tale.

Hec quæ torta tibi uenerum condita mentha,

Si maiora forent Costana, ficus erat.

Item Caricæ, quæ descendenti nauum aduersus Parthos omen fecere M. Crasso uenales prædicantis uoce Caucæ. Quæ omnia in Albenferus è Syria intulit L. Vitellius, qui postea censor fuit, cum legatus esset in ea prouincia nouissimis Tiberij Caesaris temporibus. Inter quas iam nominatas Caricæ optimè siccantur: Vnde quidam siccæ ficus Caricæ nominant. Sicut item Aphricanæ à prouincia dictæ, quæ Romanis delendæ Carthagini occasionem dederunt libro 15. tradente Plinio. Catonæque perniciosæ, odio Carthaginis flagrans, nepotum securitatibus, cum clamaret in omni Senatu Carthaginem delendam, attulit quodam die in curia præcoccem ex ea prouincia ficum, ostendensq; patribus: Interrogo uos, inquit, quando hoc pomum demptum putatis ex arbore? Cum inter omnem recessu esse constaret. Atqui tertium, inquit, ante diem scitote decerptum Carthagine, tam prope à muris habemus hostem. Statimq; sumptum est Punicum tertium bellum, quo Carthago deleta est: Et inius pomi argumento euerfa. Sunt præterea à prouentu eadem serotine & præcones, bifere, albæ ac nigra cum messe uindemiæq; maturescentes. Serotine sunt, & à corio appellatæ duro, duricoriet. Grossi demum dicuntur fici antequam maturescant. Sed de generalibus earum ad præsens factis. Fici molles omnibus tactus. Maturis frumenta intus. Succus maturefcentibus lactis, percoctis mellis. Senescunt in arbore, anusq; distillant gummi modo lachrymam, siccanturq; Panis simul & obsoniui cæcæ implent. Cæterum quantum ad naturam earum attinet, Ficus multi alimentum sunt Sed alienæ stomacho, inflant & aluum mouent, auctore Celso, Maturæ recentesq; stomacho, testame Dioscoride, noxiæ sunt. Sanguinem malum generant, unde si multum commendantur, pedunculos præcreant, auctore Paulo Aeginetha & Oribasio.

## Grossi.

## Cap. CXLVI.

Grossi, quæ erinei nonnullis uocantur, coctæ, illitæ, strumas nodosq; omnes emolliunt. crudæ formicas, uerrucas & thymos, nitro farinaq; additis, tollunt. Folia eadem possunt. illita cum sale & aceto ulcera in capite manantia, epinyctidas & furfures sanant. ijs ficosæ extuberationes, & genarum scabritiæ perfriantur.





Nigræ ficus folijs cauliculisq; candidæ uitilignes perunguntur. faciunt ad canum morsus, & ulcera quæ ceria, id est, fauos, uocant. Grossi cum syluestris papaueris folijs ossa extrahunt. furunculos cū cera discutunt. cōtra muris aranei morsus, & scolopendræ uenena, cum eruo & uino illitæ, auxiliantur. Fit ex cinere ficus tam syluestris quàm satiuæ lixiuium, crematis ramorum cauliculis, quod sub indemacerari opus est & inueterascere: siquidem inter caustica intelligitur. Gangrenis prodest: namq; expurgat & cōsumit quæ ex crescunt. eoq; sic utendum est: Spongia assiduè hoc lixiuium imbuta superponitur. Interdū dysentericis, & in fluxiones uetustas, & sinus cuniculatim exedentes, magnosq; instillari conueniet. Etenim purgat, conglutinat, carne replet, & oras committit, non secus atq; emplastra quæ cruentis uulneribus iniiciuntur: enama uocant. bibitur ad discutendum sanguinem concretum, & contra præcipitationes, rupta, conuulsa, cum cyatho aquæ recenter colatum, addito olei exiguo. cœliacis, dysentericis per se cyathus datus prodest: neruorū uitijis, cōuulsionibus commodè illinitur ex oleo, ut pote quod sudores moueat. aduersus gypsi potum & phalangiorum morsus bibitur. Hæc eadem præstant reliqua lixiuia, præsertim quernum: omnia tamen adstringunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Grossi dicuntur fici qui non maturuerunt. Germanicè Onzeitrig feigen.

Persea.

Caput CXXVII.

**P**ersea arbor est in Aegypto, fructum ferens cibo idoneū, stomacho utilem, in quo phalangia cranocolapta nomine inueniuntur, præsertim in Thebais de Arida folia in farinam redacta, illitu sanguinis eruptiones sistunt. Arborem hanc prodiderunt aliqui in Perside exitiosam esse, translatamq; in Aegyptum, mutata natura in cibos receptam.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sunt qui ex Nicandri interprete uulgaris pomi persici arborem eandem esse uelint, quæ tum persica tum persea dicitur, & pomum ipsum uenenatum cum cruciati gigni in Persia, in Aegyptū deinde translatum factum fuisse nutius & esui aptum. Quod & Columella in e carmine innuit his uersiculis.

Stipantur calathi pomis quæ barbara Persis

Miserat (ut fama est) patrijs armata uenenis,

At nunc expositi paruo discrimine lati

Ambrosios præbent succos, oblita nocendi.

Verū hoc falsum esse, & non de Persici, cuius mentionem suprā fecimus, sed Persee arboris fructu, intelligi debere ostendit Plinius lib. 15. cap. 13. Vbi sic scribit: in totum quidem Persica peregrina etiam Asia Græciæq; esse ex nomine ipso apparet, atque ex Perside aduecta. Nam Persica arbor sero & cum difficultate transire, ut quæ in Rhodoni nihil ferat, quod primum ab Aegypto carum fuerat hospitium. Falsum est uenenata cum cruciati in Perse gigni, & poenarum causa a regibus translata in Aegyptum & terra mitigata. Id enim de persea diligentiores tradunt in, quæ totū alia est: mixis rubeiscentibus similis, nec extra orientem nasci uoluit. Eam quoque eruditiores negauerunt ex Perside propter supplicia translata, sed à Perseo Memphisatam, Idem de persee & non per



non persici fructu testatur etiam hoc loco Dioscorides, & Galenus lib. simp. ph. &c.

Iberis.

Cap. CXLVII.



**I**beris siue cardamantica, folia habet nasturtij, uere uidentiora: caulem cubitalem, aut minorem. in incultis nascitur. estate lacteum florem promit, quo tempore efficacior est. Radices duas nasturtio similes habet, calfacientes & adurentes. ipse enim ischiadicis cum salsa axungia emplatri modo utiles, quaternis horis alligæ, ut dea in in balneas descendatur, & postea oleo cum lana locus perungatur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Iβῆρις, ἢ καρδὰ ἀμάντικα, ἢ ἀγριοκαρδάμωψ Græcis. Galeno & Paulo Lepidium minus.

Latinis Iberis. Nasturtium agreste. Germanis Gauch blüm, wilde Kressen/Steinkressen &c.

Iberis herba, a regione Iberia nomen inuenit, & uelut Galenus testatur, eadem est quæ Lepidion Græcis appellatur. Quò magis mirum est Dioscoridē hoc loco seorsim de Iberide tradere etim. 2. lib. seorsim de Lepidio, ut herba in ciborum usum ueniente: quam sive de Lepidij folijs testetur, cori esse uim acrē & exulceratoriā, ut ea gratia ischiadicis cōmodū cataplasma exhibeatur. De Iberidis aut radicibus prodit planē auxiliū Galen. li. 10. de cōp. ph. part. a Democrate prescriptū, quod uidelicet cū adipe suillo tuse, ischiadicis impostæ conducant. Paulus tamen Aegineta lib. 2. cap. 77. Iberidem & Lepidium, & agriocardamon, pro eadem herba agnoscens, item foliorum usum ischiadicis prescribit, & si eo tempore quo usus eius expetitur, folia non sint, eum de muncortice radicis, cum axungia ad emplatri formam tusum, imponendum ischiadicis dicit. Damocrates autem foliorū Iberidis in hūc usum nō meminit, sicut neq; Aëtius duodecimo, cap. 2. qui uersus Damocratis, sed tamen lege carminis soluta prodit, & Iberidem etiam Cardamum appellari dicit, propterea quòd odorē, & saporē, & figurā cardami, hoc est nasturtij habeat. Id quod etiam Galenus libro 7. simp. ph. de Lepidio testatur. Quare eadem est herba, Lepidion, Iberis, Cardamina & agriocardamon, siue nasturtium syluestre appellata.

In Dioscoride tamen hoc loco ἰβηρίς ἢ τοὶ καρδὰ ἀμάντικα pro καρδάμυν, falsò legitur. Sicut de scriptio quoque corrupta est, μὴκ & ὅσον πυχιάζον ἢ ἐλαττόν. Deest enim καυλὸν κωκ, & πλεον: ut sic legatur, μὴκ & δὲ καλὸν ὅσον πυχιάζον πλεον ἢ ἐλαττόν, & sic sententia uersuum Damocratis, qui sic habent καυλὸς δὲ αὐτῆς ὄντ, μήκος πύχες & μικρὰ τέλαττα καὶ τὸ ἐλπι μὲν πρὸς πλεον. Id est, Caulem cubitalis longitudinis gerit. Paulo maiorem aut rursus ampliorem &c.

Nam & Aëtius sic describit. Sed & quod ad finem huius capitis habetur, καὶ ἐλαττον μετ' ἁπλῶν τοῖς τὸ πῶς ἐπιχρίδω, corruptè legitur, pro καὶ ἐλαττον μετ' ὀνοματῶν τοῖς τὸ πῶς ἐπιχρίδω, hoc est, oleum cum uino locus illinatur. Sic enim faciendum aperte docet Damocrates loco superius citato, & Aëtius quoque.

Sed & Plinius libro 25. cap. 8. Postea oleo & uino corpus perungatur dixit.

Finis Libri Primi.



94  
**PEDANII DIOSCORI-**  
**DIS ANAZARBEI DE MEDICINALI MA**

teria Liber Secundus. Ioanne Ruellio Sueffionensi interprete, cum figura  
 rum debita appositione, & annotationibus in singula capita. Per  
 Gualtherum. H. Ryff. Argentinum. Medicum, ex doctis.  
 uirorum lucubrationibus adiectis.

**P R A E F A T I O.**



N primo, charissime Aree, libro, quem de medicinali ma-  
 teria condidimus, de aromatibus, oleis, unguentis, arbori-  
 bus, & nascentibus ex eis succis, lachrymis, seminibusque  
 disseruimus. In hoc aut secundo de animantibus, melle, la-  
 cte, adipe, frugibus, atque oleribus explicabimus, subnexis  
 herbaceis quæ acri prædita sunt facultate, utpote quæ cum  
 ipsis cognatione iuncta sint: qualia allium, cepa, sinapi, in-  
 telliguntur. Idque ideo, ne cognatorum uires disiunxisse  
 uideamur.

**Echinus siue erinaceus.**

*Erinaceus Marinus.*

**Cap. I.**

*Histrix.*



*Erinaceus terrestris*



**M**arinus echinus stomacho uentriq; utilis est. urinam cit. huius testa cruda  
 inassata, commodè medicamentis admiscetur, quæ pforas abstergunt. cre-  
 matæ uerò cinis sordida ulcera expurgat. luxuriantem carnem reprimat. Terre-  
 stris erinacei corium combustum alopecij cum pice liquida aptissimè illinitur.  
 assiccatum corpus, & aceto mulso potum, renum uitij auxilio est. item aquæ cus-  
 tem subijt. conuulsionibus, elephantia & malè habitis, quos cachectos uocant.  
 uiscerum fluxiones exiccat. eiusdem iecur fictili solibus excocto arefactum, ad  
 eosdem usus utilissimè reconditur.

**NOMINA ET EXPLICATIO.**

Echinus inter uarias significationes suas significat etiam animal marinum & piscem è testaceo-  
 rum genere, erinaceus uulgo dictus: forma orbicularis, spinis circumuallatus, quibus pro pedibus ut-  
 tur in orbem sese uoluendo, nec aliter ingreditur. Caro illi intus nulla, idq; illi peculiare, sed nigra  
 quædam in omnibus uice carnis spectantur. Meminit echini huius Martialis hoc disticho.

Iste licet digitos testudine pungat acuta,

Cortice deposita mollis echinis erit.

Verum de Echinis, quorum etiam non unum genus est, authore lib. 4. de hist. ani. Aristotele: Plu-  
 nius lib. 9. ubi de sanguine carentibus agit piscibus, ait: Ex eodem genere sunt Echini quibus spina  
 pro pedibus. Ingreditur his in orbem uoluitaq; detritis sepe aculeis inueniuntur. Ex his echino-  
 metra appellantur, quorum spina longissima, calices minimi. Nec omnibus idem uitreus color. Circa  
 toronem



toronem candidaſcantur, ſpina parua. Oua omnium amara, quia numero. Ora in medio corpo-  
re in terram uerſa. Tradunt ſeuitiam maris præſagire eos, correptiſq; operiri lapillis, mobilitatēq;  
pondere ſtabilientes, nolunt uolutatione ſpinas atterere. Quod ubi uidere nautici, ſtatim pluribus an-  
choris nauiga inſrenant. Echinus marinus ſtomacho accommodatus eſt, authore Dioſcoride. Celfus  
quoq; aluum mouere teſtatur. Et Plinius lib. 32. ait, Echini ad calculos in cibis proſunt. Eſt & Echi-  
nus terreſtre animal, cuniculi magnitudine, ſed ſpecie porcina, aculeis uallatus quemadmodum hiſtrix  
eſt: ubi uerò ſenſit uenientem, contracto ore pedibusq; ac parte omni inferiore, quæ raram & inno-  
cuam habet lanuginem, conuoluit in formam pile, ne quid comprehendere poſſit præter aculeos: in  
deſperatione uerò urinam ex ſe reddit tabicam, tergo ſuo ſpinisq; noxiā, propter hoc ſe capi gna-  
rus. cute cuius expoliuntur lina, & uulgo ericium, Germanicè Lin hechel appellant. Echinus Germa-  
nicè Lin ygel iam aquatilis quàm terreſtris Græca uox eſt, à Latinis erinaceus appellatus: quanquā  
Theodorus echinum marinum ubiq; in Ariſtotele non aliter quàm echinum interpretatus eſt, Pla-  
nium fortè imitatus: attamen qui terreſtris, Erinaceum conuertit. Hiſtrix Erinaceo ſimilis eſt.

## Hippocampus.

## Cap. II.

**H**ippocampus marinum animal eſt exiguum. cuius cremati cinis exceptus,  
cum liquida pice aut axungia ſeu amaracino unguento illitus, alopecias  
replet.

## NOMINA ET EXPLICATIO.


Breuem paruumq; hunc piſcem Dioſcorides ait eſſe, & nihilominus magnitudinis notam illi con-  
iunctam. Quod enim Græci Hippo, multis in natura adiungunt, grande ſignificat. ſed id ſic intelligen-  
dum eſt, ut comparatum id animal olerum, aut arborū crucis, grande ſit: marinis uerò beluis & piſci-  
bus, breue & paruum.

Purpura, buccina, corumq; uolutæ.

## Cap. III.

Buccina.

Purpura.



Voluta.



**P**urpura uſta exiccat, dentes abſtergit, excreſcentias in carne cohibet, ulce-  
ra purgat, & ad cicatricem perducit. Eadem præſtant concremata buccina,  
ſed uehementius urunt. ſi quis ſalis plena, fiſtili crudo adurat, dentiſtricio  
conueniunt, ambuſtis utiliter illinuntur, quibus ſolui medicamentum non opor-  
tet. nam poſteaquā uulnus cicatricem duxerit, ipſum in teſtæ modum indura-  
tum, ſponte ſua decidet. Fit etiam calx è buccinis, ut in eius mentione demonſtra-  
bimus. Cionia uocantur purpurarum buccinorumq; mediæ partes, circa quas  
teſtæ uolumen clauiculatim intorquetur cremata ſimili modo, maiorem purpu-  
ris buccinisq; facultatem urendi conſequuntur, quoniam apprimendi naturam  
obtinent. Buccinorum carnes ori gratæ ſunt, & ſtomacho utiles. ſed aluum non  
mollunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Purpura Græcis porphyra uocata, Concha eſt æturbinatorū genere, aculeis clauata, lingua digi-  
tali, ſerina, toroſa et ualida, duritia tanta ut cōchas poſſit perforare, flore purpureo, qui nigrantis ro-  
ſe ſplendore ſublucet, colorum omnium gratiſſimo, tingedis ueſtibis maxime expetito. Purpuram diu  
multumq; conſideraui, cum aliam concham tandiu mordicus premeret, quoad ſuffocata hiſceret. Con-  
ficiendi purpurei coloris rationem noſtri homines ignorare putantur. Olim purpurarum teſtas con-  
ſringeant, & carnes ad tincturam condiebant, & aqua dilutas, & ſordibus expurgatas, ſuccenſis liis.  
ignibus



ignibus in lebetē coquebant, harum sanguis ab igne incallescens, sivebat, & efflorescebat, partimq; flavescebat; partim Cyaneo colore fiebat, partim in alium colorem conuertebatur, ac nuncurum quid imponeretur, cōmutabatur in illius colorem. Massilienses hanc, & Murices, & Buccinos uocant Bios.

Ceryx à Plinio Latine Marex, & Buccinum appellatur: Concha est cl. uiculatim intorta, & turbinata, scabra, sine aculeis, magnitudine purpuris inferior, Buccino turbinato, quo sonus editur, similis, excepto ore rotundo in margine inciso. Ergo eadem erit Buccini descriptio: nam est è genere turbinatorum Concha, sine aculeis, Buccino Concharum generi quo sonus editur similis, nisi rotundo ore differret, in margine inciso: Buccinum enim quo sonus editur, non est incisum. Ligures Buccinos nunc uulgo Cornetos nominant. Massilienses Bios Cornetos: Græci quidem hac ætate Strophilidas. Speusippus dicit similes esse κρηναί, καὶ τροφύρας καὶ σφαβύλιδες, siue ἄσφοβύλιδες: Dercitius dicit commodos esse ad reddendum sonum. Officinæ hæc Concharum genera corrupto nomine Entale & dentale appellant.

## Mituli.

## Cap. III.

Mituli laudatissimi in Ponto. Cremati eundem buccinis effectum præbent. priuatim plumbi more eloti, oculorum medicamentis cum melle utiles habentur. genarum crassitudines absumunt. albugines purgant, & cætera quæ oculis caliginem offundunt. carnes eorum ad canis morsus utilissimè imponuntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Myes à Theodoro uertuntur Mytuli, sed quàm rectè, indicare nondum audeo. Plautus tamen Myes in Rudens musculos uidetur appellare: & Cornelius Celsus inter ea quæ aluum mouent, salsamenta ponit Ostrea, Pelorides, Echinos, Musculos, & omnes ferè Conchulas. Equidem cum Græcis hominibus eos quos uulgo Veneti uocant Musculos, & Cuniculos offenderem, dixerunt esse Mydia, hoc est, Musculos. Athenæus tradidit sua ætate Tellinas à Romanis Mytulos nominatos fuisse.

## Tellinæ.

## Caput V.

Recentes tellinæ aluo utiles, sed maxime ius earum. salitæ uruntur, tritaq; in cinerem & cum cedria instillatæ, auulsos pilos renasci non patiuntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Athenæus dicit Romanos sua ætate Tellinam nominasse Mytulum. Marcellus, Dioscoridis interpres, Tellinas opinatur conchulas esse, quas memoria nostra Tellinas Romanæ uocant. Sed Aristophanes grammaticus Tellinas patellas dicit similes esse, eisdemq; pueros pro cornibus uti solitos fuisse: à quibus longè diuersæ sole clarius uidentur ea, quæ uulgo Tellinæ uocantur.

## Chamæ.

## Caput VI.

Chamarum conchularumque in exigua aqua decoctarum ius, aluum ciet. id cum uino assumitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Chamæ marina & uaria & multiplices sunt, nam aliæ asperæ, aliæ leues: & hæc quidem digitorum compressu confringuntur, illæ uerò uel ægerrimo saxo conteruntur. Quædam ipsarum nigerriimæ sunt, nonnulli argentei coloris, ac quemadmodum est earum uarium & multiplex genus, sic multas & diuersas sedes habent. Quædam enim in litoribus dispersæ, iacent in arena, nonnullæ sub algam subiiciuntur, aliæ in humo commorantur, aliæ in saxis & stabulantur, & presulciuntur &c.

## Vnguis odoratus.

## Caput VII.

## Vnguis odoratus.

Vnguis siue onyx conchyliæ tegumentum est, ei simile quo purpura integitur, quod in Indiæ nardiferis lacubus inuenitur: suauem ideo spirans odorem, quod conchyliæ inibi nardi pabulo uescantur. Colligitur postea quam stagnantes aquæ æstiuis squaloribus inaruerunt. Laudatissimus qui à rubro mari defertur. candicans, pinguis. Babylonius nigrescit, atque minor conspicitur. Ambo odoris gratia suffiuntur. sed aliqua





aliqua tenus castoreum olent, ijdem suffitu excitant foeminas uulue strangulatu  
oppressas, comitialesq; poti uentrem molliunt. Crematum conchylum eadem  
efficit quæ purpura & buccinum.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Galenus unguem odoratum qui hoc loco Dioscoridi ὄνυξ quoque dicitur, officinis uerò Arabica  
aut certe barbara uoce, blattæ Bysaniæ, inter ostraca ac testes purpurarum ac muricarū generatim  
comprehendit, eorundem enim uim habet, & præterea suffitu ab utro strangulatae foeminae, & co  
mitiali apprehensos morbo excitat, quod tamen etiam de purpurarum testis Galenus in simp. ph. tra  
dit. Meminit eius onychis Plinius quoq; 22. cap. 2. quum ait: Inuenio apud quosdam ostracium, quod  
aliqui onychem uocant, hoc suffitum uulue poenis mirè resistere.

Βλάηος & Βλάηιος Βύζαντος appellatur Actuatio in aurea Alexandrina, diamargarito calia  
do, Vnguis odoratus uel aromaticus, lib. 1. comp. ph. part.


## Cochleæ.

## Cap. VIII.

## Cochleæ Terrestres.



## Cochleæ marine.




**T**errestres cochleæ stomacho utiles sunt, & non facile corrumpuntur. Opti  
mæ Sardonicæ, Aphricanæ, Astypaleicæ, & quæ in Sicilia ac Chio gignun  
tur, & quæ in Liguria alpibus, pomatiæ, id est, operculares, cognominatæ. Ma  
rina stomacho idonea, & facile aluo excernitur. Fluuiatilis uirus olet, quæ uerò



# DIOSCORIDIS

Concha margaritifera.



uepribus frutetisq; glutinata cohareret, quam uocant nonnulli sefilon, uentrem & stomachum turbat, uomitiones excitat. Cremata omnium testę excalfaciendi & urendi naturam fortiuntur. purgant lepras, uertiligines, dentesq; emendat oculo rum cicatrices, & uitia cutis in facie, albugines, ac uisus hebetudines si cum carne sua ustrę tritaq; ex melle illinantur. crudę cum tegumentis impositę, aquę inter cutem tumores exugunt. sed non antę soluantur, quā omnis hauriatur humor. podagricas inflammationes leniunt. impactos corpori aculeos illitę euocant. menses tritę & admorę ciunt. Carnes earum cum thure & myrrha illitę, cum uulnera alię, tum maximę quę nerui acceperunt, conglutinant. trita in acetio, sanguinem naribus erumpentem infrenant. uiuę corpus, & presertim Aphricanę, cum aceto deuoratum, stomachi dolores mitigat. trita cum testā, uino & myrrha, si exiguum inde bibatur, coli uesicęq; cruciatus sanat. Terrestris pilos incommodos replicat, si quis abrafo aculeo lentore eius, pilum attingat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Duo cochlearum genera sunt. Alię namque Aquatiles quas Gręci serombcos, Latini turbines com muni alio nomine uocant, quod ex amplo in tenue deficiant in uertiginem tori. Alię sunt terrestres quę per hyemem terra delitescunt, uere prodeuntes, Gręcę cochleę & cochlia appellantur, testā clauiculatim intorta: quaut domicilio utuntur, quo se exerentes, quoniam oculis carent, bina cornicula prętentandi iter causa protendunt, & si quid obstaculi sentiunt, resiliunt. Plinius libro nono ubi de crustatorum sanguine carentium genere agit: In eodem genere inquit, sum cochleę, aquatiles, terrestresq; exerentes se domicilio: binaq; ceu cornua protendentes contrahentesq; oculis carent, ideoq; corniculis prętentant iter. Ait uerō, ceu cornua, quoniam hæc non proprię cornua, sed similitudinarię tantum dicuntur. Nam, ut idem lib. 11. dicit, Cornua multis quidem & aquatiliū & marinorū et serpentū uarijs data sum modis: sed quę iure cornua intelligatur quadrupeditanti generi.

Cochleę Germanis Schnecken. Gallis escargots appellantur.

Limaces marinas uulgo aquatiles cochleas Masilienses nuncupant, itemq; Cochlon Aristoteles animal testaceum aliud alimace tradit, quod Theodorus Umbilicum conuerit. fortę hoc quod Officina ostendunt nomine umbilici marini cuius pictura hæc est.

Umbilici marini.



At uerō durę carnis & costu difficilis sunt, quę licet nutriat, mali tamen succi est, quapropter nonnulli ius cum garo & oleo condunt, atq; sic uentrem subducunt. Item ethiops profunt: pectori & pulmōni ac iecori auxiliares,

NOMI



## Cancrī.

## Cap. IX.




**C**ancrorum fluuiatilium exustorum cinis qui duo cochlearia expleat, adiecto dimidio radicis gentianæ modo, triduo potus cum uino, magno opere prodest canis rabiosi moribus. rimas pedum, sedisq; perniunculos, & carcinomata, cum decocto melle lenit. triti crudi, potique ex asinino lacte, auxiliantur contra serpentium phalangiorumque morsus, atque scorpionum ictus. decocti autem & cum iure esitati, ijs profunt qui tabe conficiuntur, aut leporem marinum hauserunt. ne cant scorpiones triti, & cum ocimo admoti. Possunt eadem marini, uerum inefficacius omnia præstant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Cancrī ueris principio senectutē anguium modo exuunt, renouatione tergorum. His uita longa, pedes octoni omnibus in obliquū flexi. Fæminæ primus pes duplex, mari simplex. Præterea bina brachia.

Locusta marina.

Cancer marinus.



denticulatis forcipibus, superior pars in primorib; his motu uetur, inferiore immobili. Dextrū brachiū omnibus maius. In pauore retrorsum pari uelocitate redunt. Autumno & Vere pinguescunt, & plenilunio magis Aristot. lib. 4. de histo. ani. caneros uidetur appellare eos tantū quibus corpus rotundum est, cum locustis, squillisq; longum sit.

Ceterū cæcri difficilis cōcoctionis sunt, cocti uerò asib; maticis et phthisicis profunt: præstatq; ad isicia fouēda materia, euacuata testa, ipsorū carne ex cauda & chelis trusa: & per se quoq; mensis cōueniunt cocti ex uino & pipere. seu ex aqua, aceto et sale, aut ablata testa in oleo butyri.



## DIOSCORIDIS

ne fricti in sartagine, & præsertim parui aut teneri qui senectutem iam primum exuerunt. Germes  
 Mæsser dicti.

## Terrestris scorpio.

## Cap. X.



Terrestris scorpio tritus & impositus, suæ plagæ remedium  
 est. quin estur assatus, ad eadem.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Aelianus, libro uariæ hystorie, plura Scorpionum genera esse scriptum reliquit,  
 albū, fuluū, nigrū, sumi colore, uiride, flammeū, quod omnium pessimū, uentrosū,  
 caninicide, uolatile. In India enim uolatiles Megasthenes esse prodit, in uniuersum non coitu, sed hu-  
 more ac calore concipiunt, singulis cauda sese complectentibus, nec oua, sed animal pariunt.  
 Oleū ex Scorpionibus paratū mirandū uiriū est. cōtra uenena omnia et pestilentia: de hoc oleo scri-  
 bit Manardus se scire hominē hoc solo munitū, quantū uis suam pestilentia nūbili facere. sed eū et ser-  
 uos suos unā secū uisentes pestilentia affectos, incolumes seruari: & sola unctione quosdā à sauis-  
 uenenis potius liberatos. Duplici modo in officinis ex doctrina Mesue fieri solet. Prius ob scorpiones  
 frigidū est: posterius ob aromata calidū & efficacius, nō ob horū calorem et essentia tenuitatem (quibus  
 aperit, incidit, tenuat, terget, perrumpit) sed etiam totius substantiæ scorpionum proprietate, et ut lo-  
 quuntur forma specificā, qua utrunq; calculus renū & uesicæ frangit, illitum tamen lumbis, si in re-  
 rubus est: si uerō in uesicā, pubi, perineo, & inieciā etiam tum pauca in meatum urinarium. Modum  
 parandi docet Mesue & Nicolaus.

De Scorpione plura in sequentibus.

## Marinus scorpio.

## Cap. XI.

Marini scorpionis fel conuenit ad suffusiones oculorum, albugines & he-  
 berudines.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Cū Scorpio & Scorpina eiusdem generis sine, multum tamen & colore & bonitate differunt.  
 Nam scorpio rufus & pelagius est, Scorpina nigra & littoralis, & cibi suauitate longē Scorpione  
 inferior: quod ipsum non modo ex antiquorum conscriptione accepi, sed certē palati sapientia ex-  
 pertus sum. Iam porrō nonnullæ regiones Italiæ utriusque Scorpionem appellant: & Græci à uero  
 nomine aberrarunt, nam utrunque Scorpionem appellant: Massilienses ut nondum cessant rectē Scorpe-  
 nam appellare, ita parum Massiliē Scorpionem Rascassam nominant. Secundum Pastinacā & Dra-  
 conem nihil in mari uenenatius: etenim in dorso & brachijs bene acutos robustos habet aculeos, quos  
 si Syontinus uidisset, non à similitudine terrestrium nomen duxisset scripsisset, sed ex eo potius, quod  
 quemadmodum terrenorum aculei, sic horum permiciosi sint, nuncupatos esse.

## Draco marinus.

## Cap. XII.



Draco marinus dissectus & apertus impositusq; ictus spinæ suæ qua ferit  
 medela est.

NOMI

Silvius

Petrus Gil.  
 lum.



Plinius lib. 32. Draconē à Dracunculo distinguit, huncq; dicit similē Graculo esse, atque in branchijs ad caudam spectantes aculeos habere, eiusque idem uenenatum esse. Hunc Dracunculū Aristoteles & Oppianus uocant draconem, & similiter Plinius ipse, cum inquit libro 32. Draco marinus ad spine sue, qua ferit uenenum, impositus prodest, quod idem hoc loco testatur Dioscorides.

Ab Ephippo uocatur Dracenis: ipsum arbitror esse quam Ligures, & Masilienses, & Plinius ipse alio loco Araneum uocat. Hac etate Græci Draconem, Sicuti & Neapolitani, Traginam appellant, corrupte, quasi Dracnam. Secundū Pastinacā nihil in mari uenenatius: acutissimos in dorso habet aculeos, quos piscatores ab hoc capto statim abscindunt. Aculeos quoque in branchijs habet ad caudam spectantes. Iam porro cum qui ab Aristotele Araneus uocatur, multi Græci authores uenenatum esse tradunt: hunc uero omnes scriptores, atque etatis nostræ piscatores cum à Pastinaca discesserunt, omnium marinorum uenenatissimum esse assueuerunt &c. plura apud Petrum Gyllium.

Scolopendra.

Cap. XIII.

Scolopendra in oleo decocta si illinatur, auellit capillos. sed contactu pruritus facit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Scolopendra marina, terrestri perquam similis est, quam primum ut homo contigerit statim pruritum morietur, & simili atq; is qui ab urtica terrestri pungitur, doloris sensu afficitur. Scolopendra marina tacto piscatoribus quoq; infestissima est: postea enim quam hamum hac contigerit, nullus piscis ad hamatam escam accedit, quod huius tetri odore procul pellatur.

Torpedo piscis.

Cap. XIII.

Marina torpedo diuturnis capitis doloribus admota, cruciatus uoluntati mulcet. eadem apposita euersam fedem prociduamq; coercet.

EXPLICATIO.

Torpedinis piscis plani et cartilaginei torporem manus sue tactione se periclitatur esse scribit Petrus Gyllius mihi fide dignis. nec tantopere sibi manum obtorpuisse quam scriptores decantant Torporemq; non modo letalem non esse, sed non ita multo post euanescere. Venetijs, Iunæ, Masiliæ, ac ubiq; putat gentium comedi. Masilienses Turpilliam corrupte uocant: Ligures, Tremorizam.

Viperæ.

Cap. XV.



Viperinæ carnes si coctæ edantur, claritatem oculis afferunt, neruorum uitij auxiliantur, incrementes strumas reprimunt. detracta autem cute, caput caudaq; quoniā carne uacant, amputari debent: quippe commentitium est quod precipitur, certam utrinq; mensuram præcidi oportere. reliquum uero corpus exemptis interaneis elotū dissectumq; discoquitur cum oleo, uino, salis exiguo. & anetho. Aiunt ijs qui uiperas escent, pediculos procreari, quod planè à ueritate abhorret. adijciunt aliqui longam senectutem agere, qui eo cibo uescuntur. Sal ex eis ad eadem conficitur, sed inefficacior est. uiua autem uipera in fictile nouum demittitur, adijciuntur salis caricumq; tritarum, singulatim quinq; sextarii, mellis cyathi sex: mox fictilis operculum luto oblinitur, & fornacibus infasatur, donec sal in carbones redigatur, qui postea tritus in pulueris faciem, resconditur. Plerumq; ut ori gratio fiat, immiscetur nardi spica, aut folium, aut malabathri momentum.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci Viperæ. Latini uiperas. Itali Marasas. Germani Braitshlangen, & vincten appellant. caro earum siccat, ualenter digerit, mediocriter calfacit. Vis eius ad cutem properat, & ad eam expellit corporis excrementa, à quibus in multum eacochymis ingens numerus pediculorum prouenit, ut Galenus testatur contra mentem Dioscoridis lib. 11. simpli. De his plura apud Iacobum Sylium hac tempestate medicum præclarissimum, in præparatione Theriaces.

Senecta anguium.

Caput XVI.



Senectus anguium in uino decocta dolori aurium, infusu, & sidentium collutione, auxilio est. addunt eam in medicamentum oculorum, sed præcipue uiperinam.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Serpentis pellem Græci uocant γέρας ὄφις, id est, senecta anguis. Plinius aut uernationē appellat quod ætate ueris senectutē depellat, ac nouam induat pellem. Germanis ein Schlangen balck.



Lepus.



Cuniculus.



Lepus.

## Caput XVII.

**L**epus marinus loligini parue similis est, qui per sese tritus, aut cum urtica marina illitus, capillos euellit. Terrestris leporis infatum cerebrum manditur, iuuandis tremoribus qui ualitudine contracti sunt, affricu aut cibo facilem infantibus dentitionem prestat. exustum caput & cum adipe ursino aut aceto illitum, alopeciarum inanitatibus medetur. Leporinum coagulum post triduum a cubitu potum, conceptum adimere, partusque spem intercipere proditur. uulnus & alui fluorem sistit. comitiales iuuat. contra uenena ex aceto bibitur, praefertim aduersus coeretum lac, & uiperarum morsus. Sanguis eius si calidus illinatur uitia cutis in facie, uiriliginem, lentiginemque sanat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Lepus marinus in caeno gignitur, et sepe una cum Apicis capitur specie cochlea tegmine caudata cernitur. Magni maris lepus (nam qui in alio mari nascitur ante dixi) ex omni parte ad terreni similitudinem accedit, praeter pilos: nam terrestres pili et molles sunt, et ad tactum haud quaquersistemes. Contra illius spinosi et erecti: hunc qui contigerit, laeditur. sed de marino Lepore plura in sequentibus. Terrestris leporis caro in cibis non parue laudis est etiam apud ueteres habita, ut Martialis distichon testatur.

Inter aues turdus, si quis me iudice certet, Inter quadrupedes gloria prima Lepus. Leporum tria genera ferre sunt, ut tradit Varro li. de Re rust. 3. Vnum pedibus primis humilibus, posterioribus altis superiore parte pulca, uentre albo, auribus longis. Qui latinis lepus, Germanis *Rein* in hase Gallis unglicure dicitur. Alterius generis sunt, qui hoc ferre mutant, quod toti ceciderunt. Tertij generis est, quod in Hispania nascitur, simile lepori ex quadam parte, sed humile, quod Latini Cuniculum, Germani *Rein* Finglin. Galli ungliconin appellant. Lucius Belius putabat ab eo dictum leporum a celeritudine, quod leuipes esset. Ego arbitror a Graeco uocabulo antiquo, quod cum Aeoles Boeotij leporum appellant. Cuniculi dicti ab eo, quod sub terra cuniculos ipsi facere soleant, ubi lateant in agris. Martialis.


Gaudet in effosis habitare cuniculus antris.

Monstrauit tacitas hostibus ille uias.

De leporibus plura Plin. li. 8. Leporum caro crassi succi est, sed in hoc a bobus et ouibus uincitur, authore Paulo Aeg. Verum quae cuniculorum est, melius et facilius alit. Hippocrates ait: Caro leporina siccat, sistitque, sed lotum mouet. Celsus leporum in media materia numerari debere dicit, et boni succi esse, aluum adstringere, et urinam mouere. Coagulum quod Germani *lyp* et *Efs* *lyp* uocant, uiscerum pars est, quae ad densandum lac utimur, substantia et mucilago quaedam superflua lacti coagulato quodammodo similis in uentribus, et certis animalium uiscis genita et appesa. habet autem ungula omnia ruminantia, et interdenta utrinque, lepus. Quo uetustius coagulum est, eo praestantius. Tale profluuium alui mederi precipue potest, etc. Plin. uero li. 11. c. 41. Dasipodis coagulo hoc tantum asserit, ingens, Coagulum inutile leporis, boadi laudatum, precipue tamen dasipodis, quod et profluuium alij medetur, unius utrinque dentatorum.

## Pastinaca Marina.

## Caput XVIII.



**M**arinæ pastinacæ radius, qui eius cauda enatus aduersis squammis reflectitur, dentium dolorem mitigat: nam eos frangit & euocat.


NOM I-



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Pastinaca piscis planus cartilagineus, radium digiti, interdum semipedis longitudine, ad similitudinem ferræ dentatum, dentibus reflexis, in cauda habet: quo nihil usquam pestilentius mare generat. Ligures uocant Ferrasam: Massilienses Glorum: Siculi Bastonacā corruptè quasi Pastinacam, de radio radio in littore Ligustico ac Gallico comeditur.

## Sepia



## Caput XIX.

**S**epiæ coctæ dum estur atramentum ægrè concoquitur: aluum mollit. collyrijs è testa factis conuenienter genarum scabritiæ perfricantur. ustum in sua testa donec id quod crustosum est abscedat, postea tritum expurgat uiliginēs, furfures, dentes. & uitia cutis in facie. elotum in medicamenta oculorum addi solet. contra albugines, oculis iumentorum efficitur inspiratur. pterygia oculorum absumit, cū sale tritum & injectū.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sepia è piscium sanguine carentium & mollium genere est, eiusdem similitudinis cū loligine, octonis pedibus, solidum inus quoddam infernum continens, quod Sepium uocant. Sepiarum generis mares ut Plinius scribit, uarij & nigriores, constantiaq; maioris: percussæ tridente fœminæ auxiliantur, At fœmina isto mare fugit. Ambo autem ubi sentire se apprehendi, effuso atramento, quod pro sanguine his est, infuscata aqua absconduntur, quod & Oppianus testatur Halienticon lib. 3. cum ait:

Quin & natina fœcunda est sepiæ fraude.  
Est liquor in tumida concretus turbidus aluo,  
Qui si piscis piceam superat caligine massam:  
Conditus hic humor nutritur corpore, præsens  
Auxilium miseræ, subita formidine captæ  
Atras emittit guttas, & polluit æquor,  
Obscuratq; uias ponti tenebrosa cruore  
Permixto sanies piscaneis lumina turbans,  
Avertit usum & prospectum surripit omne.  
Hæc facili cursu pertinet æquoris undas,  
Effugit horrendos pisces, hominemq; sagacem.  
Loligo atq; alij qui findunt æra pisces  
Tales inueniunt artes: non est liquor ater:  
Illis purpureos potius de corpore fundunt  
Humores: sed fraude pares astuq; putantur.

Ceterum Sepiæ atramentum, auctore Celso, uentrem mouet. Ipsa elixa sepiæ mollis est & suavis & facile concoquitur, & bonam aluum facit. Sucus uerò ipsius sanguinem extenuat & mouet per hæc morrhoidas, ut auctor est Diphilus, referente Massario. Paulus tamen Aegineta difficilis coctionis esse tradit inquiring: Molles pisces, ut polypi, sepiæ, lolignes duri sunt coctioni: renituntur, præsertim polypi. atq; salsum quodammodo habent humorem. Si uerò coctione uincantur, haud parum alimenti corpori præbent.

## Mullus piscis.

## Caput XX.



**M**ullorum assiduo cibo aciem oculorum hebetari constat. Is marini draconis, aranei, ac scorpionis moribus medetur, si crudus atq; dissectus admoueat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Mullus piscis est magnitudine modica, gemina barba inferiore labro insignitus, à qua uulgo barbonem, & M. Varro Rei Rusticæ lib. ultimo ad finem, barbatus mullum, & Græci gneatida, quod uerò ter pa-



riat in anno Triglen uocant. Olim etiam in precio habitus. De quo plura apud Plinium in lib. 9. & 31. cap. 8. Is etsi piscis est haudquaquam in uulgo ignotus, tamen in sermone Latino ignotius esset nubil, nisi Ausonius suo carmine, quod Mosellam inscripsit, illustrasset.

Tuq; per obliqui fauces uexate Sarau,  
Qua bis terna fremunt scopulosis ostia pilis,  
Cum defluxisti fama maioris in annem  
Liberior, laxos exerceas Barbe natatus.  
Tu melior peiore auro tibi contigit omni  
Spirantum ex numero non illaudata senectus.

## Hippopotamus.

## Caput XXI.

**H**ippopotami testes exiccati ac triti contra serpentium morsus bibuntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hippopotami qui et Hippocampi quibusdam dicuntur. Capite & collo equino, & rostro oblongo sunt, ab eorumq; fronte tanquam equorum coma propendet, & eo loco quo e qui iubam habent, pilis diffiunt, horum cauda draconis speciem similitudinemq; gerit.

Ligures & Massilienses uocant Caballos marinos.

## Fiber.

## Caput XXII.

**F**iber ancipitis uitae animal, plerumq; cum piscibus & cancriis ex aqua uictum capeffit. Huius testes serpentium uenenis aduersantur, sternutamenta mouent, & in uniuersum uarios obtinent usus. siquidem menses ac partus ciunt, duobus drachmis cum pulegio poti.

Fiber.

Lutra.



partus secundasq; eijciunt. contra inflationes, tormina, singultus, uenena, ixiāq; ex aceto bibuntur. lethargicos, & utcumq; ueterno obdor miscentes excitant infusi. cum aceto autem & rosaceo, olfactu & odoris suffiit, idem faciunt. poti & illiti profunt tremulis, cōuulsionibus, & omnibus neruorum uitijis. in summa, calfas & gloriam uim habent. Eligi debent testes qui ex uno ortu connexi sunt (feri enim non potest, ut gemini folliculi in una membrana coniuncti reperiuntur) liquore intus ueluti ceroso, odore graui, & uirus redo lente, gustu acri, mordente, ac friabili, naturalibus tunicis circumdato. Quē fraud aliqui corrumpunt, coniicientes in follem gummi, aut ammoniacum cum sanguine & castorio subactum, & ita exiccantes. Vanum est quod traditur, testes ab ipsis euelli, & à sese abiici, cum uenatu urgentur: siquidem tangi nequeunt, ita, ut in sue, substricti. Operae autem precium est, diuisa pelle inellum liquorem cum euestiente tunica assumere, & siccatum potui dare.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Testes Castoris seu castorium, calfacit, siccāt, est tenuium ualde partium, eoquit dispositiones contumaces & scirrosas. Eligendi qui ex uno principio committuntur, & quibus est intus liquor cerosus, friabilis, odore graui & uirus olente, gustu acri & mordaci. Ex quibus duobus suspicari possis, substantia nobis esse aduersissimos, nulli autem uel admotum uel sumptum est perniciosum castoreum. Pontici Castores sunt praestantissimi, quod & Virgilius neminit lib. 7. Georg.

Nec inepti qui ad Matronam, uulgo la Merne, Galliae flumini crebro capiuntur, mirabili spectaculo animalia, cauda pisciosa, soleaemula, pilo superne canino, alibi lutrae, pedibus anterioribus anseris, sed ungatibus, simiae posterioribus, auribus minimis, rotundis, dente ualidissimo, adunco, praelongo, setae oris cornea, architetura in fossa sua mirabili.

Castoreum nigrum fecit dum, rancidum, die uno necare affirmat Auicenna. Castoreum ē Perside ferre ad nos deferitur: syncerum enim tanta uis odoris est praeditum, ut olfacienti iusficam castoris, sanguinem e naribus eliciat. Seruatur annis decem.

Germanis



Germanis ein Syber. Gallis Biure. Fiber methathesi dictus.  
Lutra animalis fibro similis testes idem pollere addit Hermol.

Mustela:

Caput XXIII.

Wifel.

Mlis.

Warder.



**M**ustela quæ in domibus nostris oberrat, ambusta exenteratur, & inueterata sale, in umbra siccat. Ea binis drachmis cum uino pota aduersus omnia serpentium uenena præsentaneo est remedio. toxico, simili sumpta modo, reficit. eius uenterculus coriandro factus inueteratusq; percussis à serpente, & comitialibus potu auxiliatur. cremata in fictili podagricis confert, cinere ex aceto illito, sanguine perunctæ strumæ iuuantur. comitialibus etiam prodest.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Mustela nomen πολύσμορον est, quæ πολυσμία magni nominis uiros decepit. Plinius appellat. Carolus Plinione Mustela, & Galen. istida complectitur. Nam quod Aristoteles scribit, ἡ γὰρ ὄρεα ὄφι μὲν γὰρ ὄρεα, hoc Plinius penè ad uerbum translulit, cum ait: Mustella cum serpentibus dimicatura, rutam ore gerit. & lib. 29 cap. 4. quas Aristoteles istidas uocauit, has ipse quoque Mustellas uocat. Ita enim scribit, Mustellarum duo genera, alterum syluestre, distant magnitudine. Greci uocant istidas. Ex his locis iam citatis, satis liquet Mustellam esse Plinio generale nomen, & Latinis Mustellam dici animal quod Grecis γᾶλην & ἰκτίς dicitur. Mustellas uero illas quas Greci Galas uocant, opinor à uulgo appellari Vuisellas, Herminas, seu Hermellas. Galli penè eodem nomine dicunt Herminas, Vuisellas autem suinos appellant seu Marturellos, à quibus etiam Fretæ intra Galas ponuntur. Nam Fretæ sunt opinor illa animalia, quæ Galli Furones uocant, & Latini uiuerras. Pueri uis uerri utuntur ad extrahendâ de parietum nidis auiculas. Immittuntur & in caua arborum, & inde auiculas unguibus referunt. Præterea in uenatiõe cuniculorum utuntur Viuerri, ut Plinius refert quæ ita scribit: Magna propter uenatum corû Viuerri gratia est, immittunt eas in specus, qui sunt multi formes in terra. Vnde & nomē animalis, scilicet cuniculo. Gale igitur genus esse constat. Vuisella, Hermella & uiuerria Galorum species, sed Vuiselle sunt domesticæ Gale, Hermella uero & uiuerria syluestres. Caterum istidum duo genera sunt, alterum Galli pariter Germanis uocant Mar dram, alterum genus Germani Mlis dicunt, uoce nā fallor à Græconomine derivata, Mlis, conuerso c. in l. sit Mlis, & Galli hoc genus uulgarilingua uocant ung putois, quod uidelicet hoc animal puteat, quod uero Mustelle nomen tā latè pateat ex etimologia uocabuli accidisse puto. Nam apparet Mustellā esse nomen compositum ex nomine Mūs, id est, mus, & σῆλας, id est ὀπίσσω, id est surripio, ut dicatur mustella, quasi murium fur, seu raptor. Germanicè ein Weus dieb. Mustella quoq; uocatur auis quæ mures uenatur, & mustella piscis est, quem Græcè γᾶλεος, uulgo Lampetram & Lampredam corrupe uocant, quia perinde, atq; gale serpentes prosequitur, ita & galeus piscis uenenatum piscem Passinacam dictum persequitur. Et quidam recentiores uiri citra controuersiam doctissimi, mustellam praefile usurparunt, inter quos est Marcellus Virgilius Dioscoridis interpres & commentator, is enim scribens in caput præfens, satis indicat se per Mustellam domesticam intelligere feles seu catos, cum totum hoc caput non περὶ τῆς ἀλώου, ἀλλὰ περὶ τῆς γᾶλης intelligi debeat. Quod autem Virgilius Marcellus Mustellam & selem promiscuè usurpauit indicio esse poterunt ipsius annotationes in caput de lychnide. Nam inibi multa narrat de felibus, & postea addit se de felibus copiosius scripsisse in hoc secundo uolumine, præfenti capite, ubi de Mustellis agitur. Idem in capite de Ruta uertit, ut debuit, ἀλώου, feles. At Aristoteles ait Acluros & galas esse diuersi generis animantia. hic uero tamædus error ex eo manauit quod pleriq; arbitrati fuerint γᾶλεος esse feles seu catos, & cum legebant præfens caput in Dioscoride de domestica Mustella imaginabantur esse selem siue cattum. Et Erasmius multis in locis γᾶλην uertit selem, utpote in prouerbio γᾶλην ταρτηροσίαν, id est, feles Tartesia, & in prouerbio: γᾶλην ἀροκωτόν. Feli crocoton. Ipse tamen ingenue fatetur se dubitare an rectè uerterit.

Verba



Verba Erasmi sunt hæc in proverbio supra citato. Porro uox hæc, γαλῆ, falem ne significet an Mustellam, an quem uulgo catum appellant, quoniam inter eruditos controuersum est; relinquo alijs iudicandum. Hic Erasmus uidetur innuere aliud esse falem, aliud esse Mustellam, & aliud esse catum, & sequitur fortasse hæc in re Columellam, cui felis est bellua illa quam supra diximus Fovinu appellari, mustellam autem forsitan caput pro istide. Nec dubium est, quia felis sit animal quod Græci αἰλουργος, & quod uulgo ab aslu, catum nominant &c. Sit igitur catum post hæc, Galem & istida esse mustellam, & elurum esse falem seu catum uulgo eim. Wensser/oder Ras.

## Rana.

## Caput XXIII.

**C**ontra omnium serpentium uenena pro antidoto sunt ranæ, si ex sale & oleo decoctæ edantur, iusq; earum itidem sorbeat. contra inueteratos tendinum rigores pollent. illitus earum cinis, profluentis sanguinis impetus sistit. expendis alopexiarum inanitatibus ex liquida pice illinitur. uiridium ranarum cruor auullos genis pilos reuasci prohibet; in uestigia euulorum instillatus. decoctæ in aceto & aqua, dentium dolores collutione leniunt.



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Ranarum plura genera, alia est rana quæ dicitur phrynos, hoc est rubeta; perniciofa item chersidros, cunctarum grandissima. Buffo quibusdã dicta Germanis eim Brött & Pogg. Apocynon quoq; dicunt, quod canum impetus cohibeat: aliud genus dictum calamites. Est & palustris rana, dicta elobatrachon Græcis, Germanis eim Scosch, Gallis une raine, & une grenouille, Aristoteles, ranas omnes telmaticos dicit, aut lymneos.

Hodie passim ex ranis palustribus oleum parant officina. Podagra calenti admouerunt quidam, sed nullo fructu. Neq; enim frigidas in eo magna esse potest à ranarum capitibus, coquendo coctione tam longa, & ea in oleo sesamino, alteratis. Rectius meo iudicio ranæ uirides in syluis crebra, uirgibus reptantes in altissimas quasq; arbores & sub noctem brexantes (uox enim earum unica est, brex) oleo uiolato, uel omphacino, ad hos usus incoquerentur. Quas manibus uiuas hodie ex mere tenent ad refrigerium febre acuta aliqua ardentis, croiser Gallis, Germanis Laub si dsch dictas, quarum meminit uidetur Galenus lib. 10. simp.

## Silurus.

## Caput XXV.



**S**ilurus recens in cibo nutrit & facilem præbet aluum. sale uero conditus, minimum suppeditat alimentum. arteriam expurgat, & uocem expedit. illita saliti caro, aculeos & infixæ corpori spicula extrahit. muria eius incipientibus dysenterijs prodest, si in defidentium fatus adijciatur: fluxiones siquidem ad summa cutis elicit. ischiadicis infusa medetur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Silurus piscis in fluminibus priuatimq; in Nylo thymos in mari præcipua magnitudine æquans. Hunc quidam Sturionem. Germanis eim Stsz/ dictum esse putarunt, sed falso. Silurus enim maleficus & dentatus est, cum sturio neq; dentatus neq; maleficus sit. Plinius lib. 9. ait: Silurus grassatur ubicunq; est omne animal appetens, equos innatantes sæpe demergens, præcipue in Mæno Germaniæ amne prope Lisboum. in cibo aluum mollit silurus è iure eodem Plinio auctore lib. 32. Item cum ceteri omnes mores suis fœminis sine præstantiores. Silurus fœmina præstat suo mari.

## Smarides.

## Caput XXVI.

**S**maridis piscis caput exustum, excrecentes ulcerum oras puluillosq; reprimat. Snomas cohibet. thymos clauosq; absumit. caro non secus atq; fassamentum prodest à scorpione percussis, aut à cane demorsis.



## EXPLICATIO.

Vide annotationes nostras ex Petro Gyllio in cap. 27. proximè sequens.

Menæ.

Caput XXVII.

**M**Acenarum ex capitibus cinis si illinatur, callosas sedis rimas aboler. eius etiam garum oris putrilagines collutione sedat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

*Mena* pisciculus, hyberno tempore candidus, æstiuo cerulea uarietate pictus. *Ligures* *Manulum*, *Masilienſes* *Medolam* uocant, neq; modò speciei uerum etiam generis nomen esse ex eo conijcio, quòd uarium & multiplex est earũ genus, aliæ in utroq; latere nigrâ maculâ orbiculatâ habent, quas ij qui *Adriaticum* sinum accollunt uulgo *Menas* *Selanas* appellant: aliæ *Leucomandes*, hoc est albæ *Menæ*, à *Græcis* *Smaridas* uocant: *Masilienſes*, *Gerres*: *Neopolitani* *Cerres*, per c. quos *Theodorus* secutus *Smarides* *cerros* uidetur conuertisse, non *Gerres*, de quibus *Marcialis*, ueluti uilibus p. cibis, ita ait:

*Alec.*



Fuisse *Gerres*, aut inutiles *Menas*. *Theodorus* *Menidas*, in *Aristotele* *Menas* & *Aleces*, & *Menidia*, id est, *Menas* paruulas *Aleculas* appellat, ut *Alecula* nomen generis sit, hoc idem Latine significans quòd *Græci*, ut *Hermolaus* putat, *Anthracides*, hoc est, pisces qui succensis carbonibus commode coqui possint, cuiusmodi sunt *Smarides* & *Menæ*: Equidem ipse generatim pisciculos ignobiles significari ex, *Columella* arbitror, qui *Aleculas* riuales pisciculos, ignobiles uocauit atq; alios pisces sale exesos, *Arencos* nuncupatos, *Thrysis* similes: itemq;

sunt *Menæ* *Boopes* appellatæ, quas *Græci* adhuc rectè *Boopas* uocat. *Ligures* & *Masilienſes* *Bogas* corruptè nominant.

Gobius.

Caput XXVIII.

**G**obius recens in suillum uentrem coniectus, si confuta rima in duodecim aquæ sextarijs, donec duo super sint, decoquatur, ex colatus & sub diuo refrigeratus, porui detur, alius sine molestia deijcitur. illitus contra serpentium canumq; morsus auxilio est.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

*Gobiorum* multiplex est genus, alij palustres, alij saxatiles, uulgo *Goaca* uocati, quos *Cothonas* *sic* aut *Nicander* inquit, *Sticuli* appellant: quosdam alios *Gobioni* saxatili propemodum similes, *Aristoteles* *Cortos* nominat, quos adhuc nonnulli *Coranos* nuncupant.

Thunnus.

Caput XXIX.

**C**onditanei thunni caro, quam omotarichon uocant, sumpta ijs auxiliatur, quos uipera nomine preiter, momorderit. sed oportet uinum quamplurimum subinde cogantur haurire, ita ut uomitione reddatur. contra acrimonias effratorum maxime ualet. canum moribus utilissimè illinatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

*Thynni* *pelamudum* generis esse uidentur, nam ut *Aristoteles* lib. 6. de *Historia animalium* ait, *Limaribus* *Thynni* prouectiore ætate, anno esse putatur uno. Et *Plinius* lib. 9. *Pelamides*, inquit, cum annum excessere tempus, *Thynni* uocantur. quod falsum esse, nec ex *Pelamidibus* unquâ fieri *Thinnos*, sibi piscatores *Ligures* & *Masilienſes* aperit ostendisse scribit *Petrus Gyllius* harum rerum peritissimus, quæ rationes in aliud tẽpus rejcit, lib. de *Galicis* nominib. pisciũ. Est itẽ *thynnorum* generis qui uocatur *pompylus*, hunc *Masilienſes* piscatores haud ignorantes corruptè *Pampalum* uocant.

Garum

Caput XXX.

**G**arum omne, quod ex piscibus carnibusq; sale maceratis liquamen est, si ex eo forus fiat, depascentia ulcera sistit. morsis à cane medetur. dysentericis atq; ischiadicis infunditur: nonnullis, ut exulcerata adurat: alijs autem, ad lacessenda quæ ulcera non senserunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Quid sit garus sine garum docet nos *Plinius Naturalis historie* lib. 9. cap. 7. ubi inquit: Aliud est *garum*.



tiamnū liquoris exquisiti genus est quod garon uocauere, quæ intestinis pisciū ceterisq; abijcenda esse sent, sale maceratis, ut sit illa putrescentium sanies. Hoc olim conficiebatur ex pisce quam Græci garon uocabant, Nunc è scombro pisce laudatissimum in finibus Carthagini, Spartariæ & Cetarijs, sociorū appellatur. Nec liquor ullus penè præter unguenta maiore in precio esse cepit, nobilitatis etiam gentibus, fiebat etiam ex alijs piscibus, ut plura apud Plinium loco id citato. Sume item qui coctiorū piscium ius garum uocant, & ita, ut in uetusto quodam manuscripto codice, sed incerto auctore, reperi, confici præcipitur. Confectio gari. Sume pisces minores salsos, aut si salsi non fuerint, saluntur pauco sale, & mitte ex illis sextarium unū, & de bono uino sextarios tres, et coque in æreo uase usq; dum duæ paries consumantur, & tertia remaneat, tum cola per saccum usq; ad claritatem, & refrigeratum mitte in uitream ampullam, & utere. Ceterum ex syluro pisce aliquando etiam fieri solitum, testatur reliquit Cælius Aurelianus medicus Chronicorū, siue tardarum passionum lib. 2. cap. 1. de paralyti, cum ait: Garum quod appellamus liquamen ex pisce syluro confectum. Demum quamuis liquaminis uocabulo garum intelligit Apicius, Latino tamen nomine aliquando caruisse testis est Ausonius in epistola ad Paulinum, his uerbis: Scis autem me ad nomen murie, quod in usu uulgus est, nec solere, nec posse dicere, cum scientissimū ueterum, & Græca uocabula fastidientes, Latinum in gari appellatione non habeant, sed quocunq; nomine loquar, liquor iste sociorum appellatur. Quod reliquum est non modo ex piscibus & eorum extis, sed ex animalibus salis fiebat garum, liquor scilicet ex salsura eorum exsudatus fluens & aquæ modo supernatās, ut hoc loco Dioscorides tradit. Differt autem ab Alece garum, quod alex imperfecta nec colata fixa est Horatius: Quo fece primus & alex.

Differt item ab Halme, id est, muria: quod garum sanies intestinorum piscium est: halme uero muries & salsugo piscium in æteratorum, hoc est ius salsum in quo seruamur, Germanus Lac dictum, Minuit utruq; Martialis, murie quidem hoc disticho:

Antipolitani fateor, sum filia Thygni,  
Essem si Scombri, non tibi missa forem.

Garum uero sociorum hoc altero:

Expirantis adhuc Scombri de sanguine primo  
Accipe serosum munera chara garum.

### Ius piscium.

### Caput XXXI.

Recentium piscium ius, modo per se, modo ex uino potum, aluum subducit priuatim ad hunc usum conficitur è phycidibus & scorpionibus, & iulide, è percis, & recentibus alijs saxatilibus, nec uirus resipientibus, simpliciter cum aqua, oleo & anetho.

### EXPLICATIO.

Zomos, id est, piscium ius conficitur apud Paulum lib. 7. ex his qui testacea cute integuntur, tellinis, hiatulis, et conchulis, ius quoq; ueteris galli (apud eundem) cum sale diutissime excocti, uentrè subducit. è contrario gallina ius comprimit.

### Cimices lectularij.

### Caput XXXII.

Cimices qui in cubilibus enascuntur, cauis fabarum inclusi, si ante febrium significationes septeni deuorentur, quartanis auxilio sunt. & citra fabas sumpti, percussis ab aspide profunt. uuluarum exanimationes olfactu reuocant. poti cum uino aut aceto, adhaerentes sanguisugas abigunt, triti & urinariæ fistulæ impositi, urinæ angustias leuant.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Cimices Germanis Wanzen/Gallis à tetra odore, punaises dicuntur. foedissimum animal, hostis nocturnus, nam in lectis quietem dormituris, adimit & putridum odorem ingenerat tægentibus eum. Elsi tamen foedissimum animal sit, non tamen ui medica caret, ut apud Plin. lib. 29. cap. 4. traditur.

### Millepeda.

### Caput XXXIII.

Millepedæ, quæ sub aquario uase stabulantur, animalia sunt multis pedibus nitentia, quæ contacta manu contrahuntur in orbem. hæc ex uino potæ diffusi cili



Millepeda. ciliurina, & regio morbo auxiliatur. millepedas illini anginis cum melle utilissimum. trita, & in cortice mali punici calfacta, doloribus aurium, addito rosaceo, conuenienter instillantur.



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Animalia que Græci οἰστὴρ, & οἰστροί, & πολὺποδὴς, hoc est, aselli, & Latine millepeda & multipeda. Germanis Hehl appellantur, satis nota sunt, ut que non solum sub hydris & aquariis uasis, uelut hic ait, nascuntur, sed ubiq; in locis tunc etiam, uelut cellariorum parietibus & fenestris pluuia aut tempestate madefactis proueniunt, itemq; in sterquilinis generantur, & ad contrahendum mares in globum contrahunt, coloris alii fusci, & ad gryscum declinantes, Dioscorides etiam hoc loco λευκοπόδας appellat, Galenus λευκός, id est, fabas à similitudine Asianos uocare dicit, Marcellus uero Cutiones, ob cutis ut uidetur, duritiā & soliditatem, cap. 8 & 9 nominat. Verum significantissime ea Galenus lib. 3. comp. pharm. part. describit, his uerbis: ὁ οἰστὴρ πολὺποδὴς ὅτι τῶν ὀστέων οὐκ ἔχει, ὡς οἱ ἄλλοι ζῷοι, ἀλλ' ὅτι τῶν ὀστέων ἐκείνων ἐκείνην τὴν σκληρότητα ἔχει, ὡς οἱ ἄλλοι ζῷοι. Et Plinius 29. cap. ult. Millepeda ob alios centipeda aut multipeda dicta, animal est de uermibus terræ, pilosum, multis pedibus armatum, repens, tactuq; contrahens se, oniscum Græci uocant, alij ilon. Quare manifestarium incurrit errorem qui οἰστρούς uermes terreos esse credunt quod hi in Italia Niculii, quasi corrupta ex Græca uoce, uulgo appellantur, quum uermes terrei longe alia animala sint, &c. de his plura infra cap. LIX.

## Blatta pistrinaria.

## Caput XXXIII.




Blatta eius quæ in pistrinis inuenitur, interanea trita aut cum oleo decocta, aurium dolores instillati mitigant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Plinius libro XXIX. capite ult. Blattarum tria genera facit his uerbis: Hoc quoque animal inter pudenda est, inquit, sed propter admirationem naturæ, piscorūq; curæ, totum in hoc loco explicandum. Plura earum genera serui. Molles quas in oleo decoctas uerrucis efficaciter illini experti sum. Alterum genus Mylocion appellat uere, circa molas ferè nascens. Hoc capite detractio attrita, lepræ sanasse, Musa & Pictor in exemplis reliquerunt. Tertium genus & odoris tædio inuisum, ex acuta elyme, cum piscalco sanare uleera alius insanabilia &c. Germani Gyllen & Symichan appellant.

## Pulmones.

## Caput XXXV.



Podagras pernionesq; emendat pulmo marinus recens tritus & illitus. Suillus & agnus urinusq; pulmo impositus, attritus à calceamentis contractos, ab inflammatione tuetur. Vulpinus uero si arefactus bibatur, suspiriosos adiuuat, adeps quoq; liquefactus, infususq; auris dolorem finit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Pulmones marini sua sponte nascuntur, cum nascunt, Cirræ ex imo, more polypi, emittunt: quod autem speciem quandam mulieris uulue representant, tota à circo Italia eos turpibus nominibus appellat, ut nulla ratione scriptis honestè mandari queant. Ligures nominant, Capellos marinos: Masile naves, Carneos pileos: cum iacent omaso similes sunt: cum eriguntur, pulmones uidentur: Ad id omnino lucidi & uirci sunt, ut sine sectione interiora omnia uidere possis: ac quamuis fluctibus in litus ex pulsi, nullo negotio capiuntur: tamen cum non sine esculemi, à prætereuntibus præclare contemnuntur. Pulmonem uulpis siccum potumq; asthmaticis Galenus, phthysicis uero ob eandem totius substantiæ familiaritatem saluberrimum, omnes prope prædici inculcant.

## Genitale cerui.

## Caput XXXVI.

Genitale cerui tritum & in uino potum, à uipera demorsis auxiliatur.



# DIOSCORIDIS

## NOMINA ET EXPLICATIO.



Cervi genitale, Asinum iecur, ungula asini, lichenes equorum (Germanice der Kamp) ungula caprarum, iecur caprinum, apri, canis rabiosi, ueteres fo-  
le ueteramentariorum, nota omnia nulla explicatiōe opus habent.

### Ungula asini. Caput XXXVII.



VNgularum asini cinis per dies multos bi-  
nis cochlearibus potus proditur comitia-  
les adiuuare. eadem oleo subacta strumas di-  
scutiunt, & illita perionibus medentur. Ca-  
prinarum cinere peruncta ex aceto alopecie  
sanantur.



### Lichenes equorum. Caput XXXVIII.

Lichenes sunt in equorum genibus, & super ungulas in fle-  
xu harum partium indurati calli. qui triti & in aceto poti-  
comitialibus mederi traduntur.

### Iecinora.

### Caput XXXIX.



Asini iecur inassatum esu comitialibus prodest. uerunta-  
men ieiunis edendum præcipitur. Capræ uerò inassati  
decidua sanie, inungi lusciosos prodest, & dum coquitur, aper-  
tos oculos halitu eius uaporari. prodest in cibo tostum ad ea-  
dem. Tradunt hircini iecinoris cibo comitiales deprehendi.  
Aprinum recens si arefactum teratur, ex uino potum contra serpentium uolu-  
crumq; morsus auxilio est. Iecur canis qui rabie exagitur, tostum & in cibo  
ab emorsis sumptum, ne tententur metu aquæ tueri creditur. Utuntur autem ad  
arcendos aquæ pauores dente eo, qui caninus dicitur. hunc à cane qui momor-  
dit exemptum, & folliculo inditum, pro amuleto brachio adnectunt. Inue-  
teratum autem sale mergi iecur, ex hydromelite binis ligulis potum secundas  
pellit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Caput extorum iecur est, dextra in parte situm. Aegre concoquitur, crassos generat humores, appe-  
tentiam tollit, lactentium tamen iocinera minus insalubria putantur, & adhuc minus gallinacea &  
Paul, lib. 1. anserina, anatumq; & porcina. Paulus Aegineta: Cor & iecur crassi succi sunt, coctu difficilia, & tar-  
de transmittuntur. Sed suillum iecur bonitate ceteris præstat. Celsus tamen libro secundo, omne iecur  
boni succi esse dicit.

Iecur lupi in medicamentum ex eupatorio hepaticum saepe indidi, nec multo efficacius ob id com-  
peri. Hepaticos tamen ipsum tota substantia iuuare sufficientem se habere experientiam scribit li-  
bro octauo compo. pharmac. part. Gale. Puluerem quoque ex eo in hydropse cum uino albo in dies ali-  
quot mane potum, inter secreta quædam remedia reponunt nonnulli. Hepar tamen uulpis aridum  
ex oxymelite potum, splenicis imponit Archigenes apud Galenum lib. 9. composit. pharmacor. part.  
Hepati calido sicco salubre existimo hepar raie, cithari, id est, rouffete, & hepati, id est, aquile ma-  
ris, & si qua sunt alia in piscibus similia.

### Coria ueteramentaria.

### Caput XL.

Veteris corii cremati illitus cinis ambusta igni, inter trigines, nec non calcea-  
mentorū attritus sanat,

Gallina



## Gallinæ.

## Caput XLI.

Gallus.

Gallina.

Capus.



**D**iffecta gallinæ & adhuc calentes appositæ, serpentium moribus auxiliatur. sed identidem alias sufficere oportet. Earum cerebellum in uino bibendum datur contra serpentium morsus. sanguinem à cerebri membrana profluentem sistit. Quæ interiore uentriculi galli linu residet membrana, secti in laminas cornus specie similis (ea uerò inter coquendum abijci solet) siccat, tria; in uino conuenientissime stomachicis datur in potu. Ius è uetere gallinaceo aluum deijcit. abiectis itaq; interaneis salem coniici oportet, & consuto uentre de coqui inuiginti sextarijs aque, donec ad tres heminas redigantur. totum id refrigeratum sub diuo, datur. Aliqui incoquant olus marinum, mercurialem, cum; aut filiculam. Crudos humores crassosq; atram bilem, & strigmenta elicit. prodest longis febribus, suspirijs, articularijs morbis, & inflationibus stomachi.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Varro Rei rustice libro 3. cap. 9. ait, è gallinarum generibus proprio nomine uocantur feminae, quæ sunt uillatice, gallinæ Germanicè Hennē. Gallicè gelme. mares Galli. Germa. uerò ein Hæn / Galli ce ung eoq; capi semimares, qd sunt castrati, German. ein Capaum / Gallicè ung chapou. Et Columella libro octauo capite secundo ait: Cohortales feminae proprie appellantur gallinæ: mares autem gal li: semimares capi, qui hoc nomine uocantur, cum sint castrati, libidinis abolendæ causa, nec tamen id patiuntur amissis genitalibus, sed ferro cadente calcavibus iniustis, quæ cum ignea ui consumpta sunt, facta ulcera dum conulescant, figulina creta aliniuntur. Capi caro laudabilis est, temperata, boni alimentum, & sanguinis generatiua. Horum testiculi nunquam improbatur, cum aliorum animalium sine indigestibiles & cacochymi, digesti autem benè nutrientes. Gallorum autem optimi præsertim saginatum, qui & suauis sunt, & primum alimentum corpori præbent, authore Paulo Aegineta.

## Quorum natura.

## Caput XLII.



**O**uum molliculum plus alit sorbili, & durum plus molli. Luteum oui, contra oculorum dolores utile est. inflatum sedis inflammationibus prodest, cum croco & rosaceo & condylomatis, cum meliloto. cum uita autem fruticis eius, quem rhoa dicunt, aut galla, in patinis frigitur, ut cibo aluos sistat, per se etiam offerri solet. Candidum oui crudum refrigerat. spiramenta cutis ocludit. inflammationes oculorum infusum lenit. ambusta, si statim eo perungatur, pustulas non sentiunt. faciem à solis adustione tuetur. fronti impositum cum thure fluxiones arceat, auertitq; inflammationes oculorum lana exceptum, addito rosaceo, melle & uino, mitigat. utiliter cōtra hæmorrhoidis serpentis morsus crudum sorbetur. summè tepidum prodest uescicæ rosionibus, renum exulcerationibus, gutturis scabritiq; reiectionibus sanguinis, destillationibus, & thoracis rheumatismis.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Dum de ouis loquimur, gallinarum oua potissimum intelligimus, quæ gratioris saporis incommuni ciborum usu sunt, & de quorum ad ganeam delectu sic præcipit Horatius:

Longa quibus facies ouis erit, illa memento,



Ut succi melioris, & ut magis alba rotundis  
Ponere: namq; marem cohibent callosa uitellum.

Cibos quot modis inuicent, notum est. Nullus alius cibus, ait Plinius, qui in aegritudine plus alat, neq; oneret: simulq; uini usum & cibi habeat. Ouum durum, inquit Celsus, ualentissima materie est: molle uero uel sorbile, imbecillissima.

Et Dioscorides quoq; hoc loco molle magis nutrire quam sorbile testatur, & molli rursum quod durum est. Sed de ouis quid sentiat Paulus, uide lib. 1. Seruari ouis in tomento, aut hyeme in paleis, & state in furfuribus utilissimum tradit Plinius. Sale exinaniri creduntur. Et inter alios custodiendi modos dicit Columella nonnullos solida, multos etiam fresa faba coaggerare. Germani ouum eim ex Galli uog ouf appellant.

Cicadae.

Caput XLIII.

**C**icadae quae inassatae manduntur, uesicae doloribus profunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Cicadae nostrae Germaniae peregrina ac incognita animalia, haec uero omnino in animalium genere ore carent. prolixum quiddam compactum, indiuisumq; gerunt, simile ei quod linguae speciem refert, in ijs quibus aculeus in ore, eoq; ipso rorem hauriunt, alimentum unum & peculiare. Excrementum cicadis nullum in alio reperitur. Plura earum sunt genera, quae magnitudinis modo differunt, ut Aristoteles lib. de historia animalium copiosius tradit.

Locustae.

Caput XLIII.



**L**ocustae odoris suffitu urinae difficultates adiuuant. praefertim quae feminas male habet. earum carnes nullo sunt in usu. Est & quoddam genus locustae, quae asiracis aut onos dicitur, sine pennis, praelongis cruribus. exiccata autem si ex uino bibatur, contra scorpionis morsus magnopere proderit, hac abunde uescuntur Aphri, qui Leptin incolunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Locustae Germanis *Schweydecken*. Gallis *fauterelles* dicuntur.

Locusta est insecti generis, uolucris animal. Italis uulgo *Caballeta* dicta, quae pedes ultimos habet longissimos, & cetera.



Osifragus.

Caput XLV.

**V**enter eius auis quam Latini osifragum appellant, particulatim potus, calculos cum lotio pellere proditur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Osifraga auis ex genere aquilarum, Germaniae peregrina est, hanc quoq; uim quam illi Dioscorides attribuit, nostri medici motacilla ascribunt.

Galerita.

Caput XLVI.



**G**alerita auicula est parua, apicem in uertice, pauonis modo, gestans. quae assa & in cibo sumpta, coeliacos adiuuat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Galeritam alij alaudam, Germani uero eim *Waldt lerdh* uocant, haec auis Romanae legioni nomen dedit: nam apud Romanos alauda dicta est. Galli galeam siue galeritam, alaudam uocant, quare milites galeati à Romanis dicti alaudae. Itaque cum Caesar ex Gallis conscriberet legionem, alaudam appellauit. Omnia uero quae hoc capite Dioscorides de alauda scribit, illud falso attribuit Serapion *A-rabs upupe*.

Hirundines.



## Hirundines;

## Caput XLVII.

**D**issectis crescente luna pullis hirundinis, qui primo partu exclusi sunt, in uentre eorum lapillos offendes: è quibus duos, unum colore uarium, alterum purum eximes. h. priusquã terram attigerint, in iuuenca corio, aut ceruina pelle brachio aut collo adalligati, comitalib. proderunt, & sæpe prorsus eos recreabunt. Hirundines, uti ficedulæ, in cibo, aciei uisus medicamentum præbent. tam pullorum quàm matrum in fictili olla crematarum cinis cum melle oblitus, oculis claritatem adfert. angine eo commodè perunguntur. uua & tonsillarum inflammationibus hoc cinere succurritur. & ipsæ & pulli exiccati, si drachmæ pondere ex aqua bibantur, hos iuuant qui angina morbo conficiantur.



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Cinis recens hirundinum in diabesa recipitur. Pulli hirundinum cum primis in fictili super prius nasisti, diachelidonium stomachicè ad Anginæ Andromacho faciunt apud Galenum. Hirundinum ster-  
cus acre & digerens, ut aliorum animalium magis, minus.

Aristoteles in Samo ait albam nasci Hirundinem, cuius oculos si quis pupugerit, statim quidem exacatur, post uero uisum recipit, & sicut ille dicit, sic acutè quemadmodum à principio uidet.

Cinis pullorum hirundinum medetur angina, ut hoc loco Dioscorides testatur, & Celsus libro quarto scriptum reliquit. Hirundinis cerebrum ex melle illitum ad suffusiones facit. Hirundo Germanis ein Schwalb dicitur.

## Ebur.

## Caput XLVIII.



**E**Boris scobe illito paronychia sanantur. Vim adstringendi ebur obtinet.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Ebur tota substantia cor roborare, & conceptum iuuare, prædicis scribitur, frigidum siccam primo gradu. Germanis Holfantbeyn.

## Suillus talus.

## Caput XLIX.



**S**vis talus comburitur, dum è nigro albo. Scat. qui tritus & potus inflationibus coli, longisq; torminibus medetur.

## Ceruinum cornu? Caput L.



**C**eruini cornus cinis clotus, binis ligulis epotus prodest dysentericis, excreantibus sanguinem, celiacis, regio morbo, & uescicæ doloribus cum tragacantha, sceminis fluxione uulua laborantibus, cum liquore huius rei accommodato. Cerui cornu conrusum, crudo fictili luto circumlito, & in furnum indito: uritur donec albescat. id eadem modo elorum, ulceribus oculorum & defluxionibus salutare est. infriatum dentes expurgat. crudi cornus suffiti ni-



dore serpentes fugantur. feruifacitum in aceto, si eo gingivæ colluantur, maxillarum à dentitione dolorem adimit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Cornibus cervi & capræ uſtis, & (ſi opus eſt) lotis utimur ad dentium candorem, gingivas molliſie fluidas, dyſenteriam, fluxiones in oculos, oculorum ulcera, quia tergent ſine roſione: tamen nec dolorem leniunt, nec coquunt, quia frigida ſicca.

Ceruinum cornu, Germanis Stetz horn, Gallis corne de cerf.

## Eruca.

## Caput LI.

**E**RUCIS quæ in oleribus gignuntur, cum oleo peruncti, à uenenatis beſtijs feririnegantur.

## EXPLICATIO.

Eruca uermes ſunt frondes arborum erodentes, quare ab erodendo erucas dictas uolunt, aliqui *Græcorum erucam* Chryſelidem uocant. Germani ein Raup, & Holzwurm.

## Cantharides.

## Caput LII.



**E**Frumentis congeſte cantharides ad recôdendum idoneæ ſunt. quæ ſictili uafe non picato conduntur, & raro linteo obligato ore, & deorſum conuerſo ſuſpêduntur ſuper aceti feruentis quàm acerrimi halitum, donec æſtu exanimentur, poſtea lino tranſfixæ reponuntur. Potentiſſimæ omnes uariæ, luteis lineis, quas in pennis tranſuerſas habent, promiſſoq; corpore craſſæ, ac blattarum modo perpingues. ſed inertes ac imbecillæ, quæ unius ſunt coloris.

## EXPLICATIO.

Totius utitur Galenus ad pſoras, lepras. Hippocrates caput & pedes auferit, lib. de ſceminarum morbis. Hæ ueficam ulcerant ſolæ, ureticis autem ſalubriter miſcentur.

## Bupreſtes, &amp; pinorum erucæ.

## Caput LIII.



**S**imili modo reconduntur bupreſtes, genera quædam cantharidum, & pinorum erucæ, quæ ſupra cribrum ſuſpenſum feruenti cinere paulisper introſtæ, reponuntur. uis omnium communis erodere, ulcerare, calorem elicere. quæ de cauſa admiſcentur medicamentis quæ lepras, ſerasq; lichenas & carcinomata ſanant. menſes ciunt peſſis emollientibus additæ. Aliqui cantharidas antidotis impoſitas, aquæ ſubter cutem auxiliari prodiderunt: arguimento, quòd urinam moueant. Alij pennas pedesq; contra potarum ueneficia remedio eſſe tradiderunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Bupreſtes uulgo ein Knôſter quòd boues rumpantur hoc animante, ſic dictæ. Pini erucæ die wûrm von ſichren appellatæ, non ut cætera, pini frondes, ſed ipſum lignum ſub cortice erodunt: Luce ſcimijs grauiſſimus cibus.

## Salamandra.

## Caput LIII.

**S**alamandra lacertæ genus eſt, iners, uarium, quod fruſtra creditum eſt ignibus non uri. Vim habet erodentem, calfactoriâ, exulcerantem, additur, ut cantharis, in



## Salamandra.



ris, in medicamenta quorū uis est exesse, & lepras abolere. similiq; modo reconditur. liquefacta \* in oleo pilos euellit. exenterata, detractis pedibus & capite in melle seruatur ad eundem usum.

\* Alij cremas  
te cinis.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Salamandra non continuo, nec semper in igne uiuit, ut hoc loco

Dioscorides quoque testatur, sed aliquantulum in eo durare potest, nec est adeo ignotum animal: Imò illud quod Germanicè em Olin/ uel Woll, cuius picturam damus, appellatur. Et falsum est ex eius pilis, quos nullos habet, inextinguibilem telam fieri. Nam huiusmodi materia est uel ex Amianto lapide, uel ex quodam apud Plinium lini genere, si non et id Amianto lapidi idem fuerit.

## Araneus.

## Cap. LV.



Araneus, quem holcum, alij lycon, id est, lupum uocant, subactus cum splenio, & linteo illitus, prolatusq; utrisq; temporibus aut fronti, tertianos circuius persanat. tela eius imposita sanguinem sistit. uulnera quæ summam cutem occuparunt, ab inflammationis inuria uindicat. Est & alterum aranci genus, qui candidam, tenuem, densamq; telam orditur: quem in aluta ligatum, & lacerto appensum, quartanis circuitibus mederi narrant. decoctus ex rosaceo & infusus, aurium doloribus auxiliatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἀράχνη. Latine araneus. Germanicè Spin.

Araneorum plura genera uide apud Hermolaum Barbarum, in Coroll.

## Lacerta.

## Cap. LVI.



Lacerta caput intritum & appositum, aculeos & omnia corpori infixia extrahit. uaros\*, formicantes uerucas & penfiles, quas acrochordonas uocant, tollit. iecur ex esis dentibus coniectum dolores finit, si diuulsa admoveatur, ictis à scorpione leuamentum præstat.


\* Alij clauos.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Lacertum & lacerta, utroque genere dicitur. Luamenta eius lege apud Plinium libro 8 cap. 39. Græcè σαύρα. Germanicè Ein eydechs dicitur. Quinquàm est & genus herbe Saura Plutoni satura, de qua in Nicandro.

## Seps.

## Cap. LVII.



Seps, quam aliqui lacertam chalcidicam uocant, in uino pota morsus suos sanat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Seps ideo etiam Chalcis appellatur, quod à quibusdam lineis, ævis speciem, similitudinemq; gerentibus, eius dorsum distinguatur. Itemq; ad octo palmorum longitudinem accedit, tum in Syria, & Libya, & Cypro nascitur, in saxis domesticam sedem solere habere.

## Scincus.

## Cap. LVIII.

Scincus aut Aegypti, aut Indiæ, aut rubri maris alumnus, quamuis inueniatur in Lydia Mauritanix. Est autem terrestris crocodilus sui generis. Sale inueteratus cum nasturtio, aiunt carnes quæ renes amplectantur id sibi uirum uendicasse, ut si drachmæ pondere bibantur, uenerem accendant. uerum decocto



## DIOSCORIDIS

lentis cum melle aut semine lactucae cum aqua potio, ueneris cupiditates inhibentur. additur in antidota.

Scincus siue Crocodilus terrestris.



Scinci Officinarum.



### NOMINA ET EXPLICATIO.

Recens scincorum, crocodilorum terrestrium; tanquam pudendum ad uenerem intendentes quidam bibunt: alij sumen quoque et caudam assumunt; unde compositio est Aëuario diascincu. Officina corrupte scincum marinum uocant, et aliud genus lacertae ostendunt in paludibus et caeno uiuentis, a uero crocodilo longè diuersum.

### Terreni uermes.

Terreni uermes impositi, preciosos nervos glutinant. tertianas discutunt decocti cum anserino adipe. infusi, affectis auribus medentur. cum oleo autem decocti, si in contrariam aurem instillantur, dentium doloribus praestant auxilium. triti in potu ex passo urinam ciunt.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Υἄς ἔρρεπα, hoc est, intestina terra Graecis. Plinio autem et Latini uermes terreni. Germanis Regen wurm dicitur. similes sunt lumbricis, qui aluo et intestinis innaſcuntur, i λυμβες spony λαε, id est. rotundi Graecis appellati. quare permiserunt sibi etiam uermes terrenos lumbricos appellare, magno errore si quis rei medicae usu, pro uerme terreno lumbricum ex aluo humano adsumat, quum uermes terreni exigendis ex aluo lumbricis, in potu ab Aërio prebeantur.

### Mus araneus.


Mus araneus dissectus & impositus, sui morsus ueneficia luit.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Mus araneus qui Germanice Ein Symsaus dicitur, si in orbitam inciderit, tanquam uinculis capitur, ac moritur: ei qui ab eo fit morsus remedium est, ut Dio, corides tradit, terra ex orbitarum transitu sumpta, eaque simul ut uulnus aspersum sit, statim sanatur.

### Mures.

### Caput LXI.



Mures, qui in domibus oberrant, con-  
cisos scorpionum plagis utilissimè  
imponi, in confesso est. si in aſtatos infantes  
ederint, oris saluam exicari promittunt.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Plura esse murium genera liquet, ut Poncici, alpini, herinacei pungentibus pilis. Omnium autem naturae murium Aristotel. sexto naturae animalium meminit his: Murium mirabilis est praeter cetera animalia, cum numero, tum celeritate. Iam enim foemina praegnan-  
te in uase nulliario aliquando co-  
pata, paulo post reſerato uase, musculi numero uiginti et centum reſerti sunt, hac ille, et multa id  
genus, qui plura uolet locum habet quem adseat.

Murium



Murum capitum caudarumq; cinere ex melle inunctis, claritatem visui restitui dicunt, multoq;  
magis gliris aut muris sylvestris cinere.

Lac.

## Caput LXII.



**L**ac generatim omne boni succi est. corpus alit. aluum emollit. stomachum et intestina inflatio ne uexat. uernum tamen dilutius aestiuo habetur. & e uiridi pabulo aluum magis emollit. Probatum autem candidum, æquali crassitudine, quod ungui in stillatum cogitur. aluum minus tentat caprinum, quoniam pecus hoc adstringentibus pabulis, robore, lentisco, & oleaginis frondibus, & terebintho magna ex parte uestitur, inde stomacho accommo datissimum reddi solet. ouillum autem dulce, cras-

sum, & præpingue, non usque adeo utile stomacho. Bubulum tamen, asininum, & equinum, uentri magis idonea, sed ipsum turbant. Quibus in locis pecora scamoniam, ueratrum, clematidem, aut mercurialem pascuntur, lac omne uentrem *De hoc supra lib. 1. cap. 9.* & stomachum subuertit: quale in Iustinis \* montibus esse, à nobis proditum est. Siquidem capræ quibus candidum ueratrum pabulo fuerit, primo foliorum partu euomunt, & eorum lac haustum nauseam creat, & stomachum in uomitiones effundit. uentrem adstringit lac omne decoctum, præcipueq; candentibus calculis marinis exustum: & in summa, omnibus auxiliatur internis exulcerationibus, præsertim faucium, pulmonis, interaneorum, uesicæ & renum. foris uerò contra pruritus cutis, eruptiones papularum, & uitiatos corporis succos, recens cum melle crudo, addito sale, datur exigua aqua dilatum. minus inflat quodcumque semel seruifacitum. decoctum cum calculis marinis ad dimidias, ulcerosas uentris fluxiones adiuuat. Lac quodcumque serum continet implicatum: quod ubi discessit à lacte, multò potentissimum ad purgationes redditur. datur quibus sine acrimonia uolumus deiectionem moliri, aut melancholicis, comitialibus, lepris, elephantijs, & erumpentibus toto corpore papulis. Ex omni lacte fit, quod schistum, id est, scissile, appellant. Lac autem fictili nouo feruet, ramoque ficulneo recenti mouetur, insparfis, postquam bis aut ter efferbuerit, totidem aceti mulsi cyathis, quot sunt heminae lactis, ita enim ferescens liquidum ab eo diuiditur, quod in caseum concreuit. sed cum feruet, ne superfluum datur, cõueniet spõgia ex frigida cõtinuò fictilis labrũ detergere, sextariumq; argenteum frigida aqua plenum demittere. Bibitur heminis per interualla singulis, usque ad quinās, ita ut intercedentibus spacijs potantes ambulent. Lac autem recens efficax est contra rosiones ustionesq; ab exitiabilibus medicamentis factas, uti à cantharidibus, aut salamandra, bupreste, aut pinorum eruca, hyoscyamo, dorycnio, aconito, aut ephemero. præsertim bubulum ad id eximie confert. gargarizatur autem exulceratis faucibus, tonsillisque. Asininum peculiariter collutos dentes gingiuasque stabilis. fluxiones alui, si ulcera sentiantur, tenesmosque, ouillum, bubulum aut caprinum cum marinis lapillis decoctum, sistit. per se autem & cū hordeaceo, ptisana aut halicaceo cremore infusum magnopere intestinorũ rosiones mitigat. exulceratæ uulue immittitur.

Humanum lac dulcissimum est, & maxime alit. mammis autem exustum, prodest tibi & stomachi rosionibus. contra haustum leporem marinum præsidio est. oculis cruore ex ictu suffusis, cum thuris polline instillatur. podagricis utile est cum meconio & cerato illitum. Lac omne respuendum splenicis, hepaticis, comitialibus, uertiginosis, & neruorum uitio laborantibus, febriculosis, & capite dolentibus: nisi si quis interdum purgationis gratia, ut ostendimus, schistum præbeat. Primiparæ canis lacte perunctos narrant glabrescere. potum contra uenena antidoti uicem obtinet. abortus mortuos expellit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Lac lauat, terget sero, emplasticum est butyro et caseo: ob hæc acres & mordaces fluxiones obstat. recens utendum.

Casei.



## Caseus.

## Cap. LXIII.



**C**aseus recens sine sale sumptus alit. stomacho utilis est, & facile in mēbra delegatur, corpus augeat, aluum modicē emollit. alius tamen alio praestantior, pro natura lactis à quo conficitur. decoctus autem & expressus, deinde in assatus, aluum sistit. illitus, oculorum inflammationibus & sugillatis prodest. Qui uerò recens salitus est, minus alimenti praebet, corpus apte minuit, stomacho aduersatur, negotium uentri interaneisquē exhibet. uetustiore sistitur aluus. Sero quod à caseo manauit, quam optime canes aluntur. Quod hippacen uocant, caseus est equinus. ea uirus redolet, magnopere alit, bubuloq; proportionē respondet. Nec desunt qui hippacem, equinum coagulum appellarint.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Caseus recens refrigerat, repellit, siccatur, uulnera etiam magna glutinat. Ex uetustate uerò acer, cum perne decocto subactus tophos eliquat & aperit.

## Butyrum, &amp; eius fuligo.

## Cap. LXIII.



\* Alias lactis  
sui facultate  
praeditum.

**E**lacte pinguisimo probatum fit butyrum, quale ouillū est. fit & ex caprino, agitato in uasis lacte, donec pingue separetur. Butyrum natura oleosum est & emolliens\*: unde largius epotum, uentrem resoluit. prodest, ubi oleum non adfuerit, contra uenena. cum melle si infri cetur, dentitiones adiuuat. gingiuarū pruritus, & oris ulcera infantibus emendat. illitum foris capaciore alimentorum facit corpora, & ab albidis pustulis per summascatentibus asserit. contra inflammationes & duritias uuluae, quod nec uirus resipit. nec uetustatem sentit, butyrum efficax est. dysentericis, & coli exulcerationibus infunditur. in medicamenta addi solet quae pus mouent, utile praesertim cum nerui, aut cerebri membranae, uesicae ceruix, uulnera acceperint. id autem purgat, replet, carnem creat, ab aspidē percussis utilissimē imponitur. recens obsonijs additum olei uicem pensat. & adipis uicē fungitur in bellarijs. Colligendae ex eo fuliginis ratio haec est: Butyrum in lucernam nouā ingestum accenditur, fistiliquē operculato quod superne in siphunculi speciem desinat, & infima parte cuniculos clibani modo habeat, crematur, & subinde aliud in absumpti locum sufficitur, dum coaceruetur fuliginis modus, quem facere institueris. penna post deraditur ad usus. Eius effectus est in medicamentis oculorum, exiccare & adstringere. fluxiones cohibet, & ulcera celeriter ad cicatricem perducit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Butyrum Germanis Butter, & anken. Gallis buyre. Hispanis manteca dicta, minimum terget, ut decoctum Glycyrrhizae: coquit item & digerit, bubonas, parotides, oris phlegmonas in pueris & mulieribus, ginguas puerorum cum dolore dentientium crebro illitu tenuat, quam uicem mel: idem lacti canino, & leporis cerebello tribuit Archigenes. Expuitionem Butyrum promouet (maximē cum melle aut saccharo) in pleuritide & peripneumonia, quos affectus etiam coquit. In uinguentis potissimum fuliginis usus est. Fumi par est, quae parieti inhaeret: quippe fuliginem summam crassiores condensatum uocamus, Germani Rhs.

## Medicina lanarum.

## Cap. LXV.

**S**ucciduae lanae molles, & collo foeminibusq; laudatissime habentur. Subueniunt inter initia uulneribus, percussis, desquamatis, liuidis, ossibus fractis, aceto, oleo aut uino imbutae. siquidem facile succos cohibent quibus immerguntur. & ob pecudū sordem, sic enim cespiti uocant, emolliunt. capitis, stomachi, aliarumq; partium doloribus, cum aceto & rosaceo efficaciter imponuntur. Crematarum lanarum





lanarū cinis crustas obducit, ex crescentias in carne cohibet, et ulcera ad cicatricem perducit. Mundæ autem & carptæ, in fictili crudo, cæterorum more, uruntur. Nec secus fimbriæ marinæ purpurarum flocculi cremari solent. Aliqui cum fordibus lanas carpunt, & melle irrigant, eodemq; modo urunt. Alij in fictili oris patuli, uerucula inter se distantia cōponunt, & cōcerptas carminatasq; lanas oleo ita suffusas ut ne stillare qdem possint, assulis tedæ subiectis, & eisdem lanisq; permutatim interstratis, leuiter succendunt, & ustas tollūt, quod si è tēda pix, pinguitudo uē ulla profluxit, collecta reconditur. Lauatur ad oculorum medicamenta. cinerem in labellis, aqua addita, manibus confricant, & confidere patiuntur: idq; sæpius, mutantes aquam donec linguam adstringat, nec mordeat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Conferunt humano generi lane, tum ad tuendum corpus à frigore, tum ad sanitatem ualent, potissimum succida: quas ita describit Varro libro rei rusticæ, cap. ultim. Tonsura tempus inter æquinoctium ad ærnum & solstitium, cum sudare inceperint oues à quo sudore recens lana tonsa succida est appellata, Germanicè Schmutzig wollen/robe vngewaschen wollen &c. Lana igitur huius modi plurima præstati remedia ex oleo uinōq; aut aceto, prout quæq; mulceri, moderari opus sit & astringi laxariue.

Lana succida et sordida contusis utilis ob œsypium: lota uerò est uice linamenti capiti: uita autem æris, calida sicca, tenuum partium.

## Oesypum.

## Caput LXVI.

Oesypum uocant Græci, succidarum lanarū pinguitudinem. Cuius parandi ratio hæc est: Succida molles, radícula nō curatæ, calida aqua lauantur, & quibus cunq; fordibus expressis, & in labellum oris ampli coniectis, aqua infunditur, magnoq; impetu ligula, uti respumet, agitur, aut lignea rude ualida oscule conturbatur, quò largius sordida spuma colligi possit, deinde marina respergitur. & confidite pingui quod supernatabat, collectoq; in altero fictili uase, denuò aqua in labellum fusa agitur. spuma iterum mari perfunditur, & demū eximitur. hoc tantisper fieri solet, dum consumpta pinguitudine nihil prorsus spumæ extet, collectum œsypum manibus emollitur, & si qua insedit spurcitia, confestim demitur: exclusaq; sensim omni aqua, recentiq; affusa, manibus miscetur, donec ad motum linguæ œsypum, astringat leuiter, nec mordeat, atque pingue candidumq; spectetur, tum in fictili uase conditur. Verum omnia feruendo sole fiant. Nonnulli excolatum pingue frigida aqua eluunt, & manibus, non secus atque ceratum mulieres, confricant: ita enim candidius redditur. Alij elotiz lanis & fordibus quibus cunq; exemptis, a lento igni in æneo uase ex aqua decoctis, pingue qd supernatat collectum, aqua, ut diximus, lauant: colatumq; in fictilem patellam, quæ calidam aquam contineat, linteo operiunt, atque soli mandant, donec candidum fiat, & satis crassum. Alij bidui spacio aquam effundunt, nouamq; adijciunt. Melius est læue, radícula non curatum, quod succidarum uirus oleat, & si manu in concha fricetur cum aqua frigida, albescat, nihil in se duri aut concreti habens, ueluti quod cerato aut adipe adulteratur. Oesypum ex calfa cit, explet ulcera, & emollit, præsertim sedis ac uulnæ, cum meliloto & butyro, in uellere appositum, menses & partus euocat. ulcera non aurium modò sanat, sed & genitalium cum anserino adipe. contra erosos angulos oculorum, scabiososq; genas quæ occalluerunt, & ciliorum destituta, efficax est. In resta noua torretur, donec redactum in cinerem pinguitudinem amittat. Ex eo etiā fuligo colligitur, uti demonstrauimus, quæ in oculorum medicamenta commodè addi solet.

## EXPLICATIO.

Oesypum est succidarū lanarū pinguitudo, ut Dioscorides præsentī capite docet, ὄσος ὄσος & ὄσος & ὄσος apud Paulum aliquoties legitur, unde opinor prædictis consuetudo appellandi hyssopum humidum.



humidum, pro cœsypum, uolentibus ab hyssopo herba separare: διονυσιος autem Galeno cum Diosco-  
ride semper dicitur.

## Coagulum.

## Cap. LXVII.

**L**eporis coagulum tribus obolis ex uino, uenenatorum morsibus, cœliaci-  
dyssentericis, & fœminis fluxione uulvæ laborantibus, ac reiectionibus à  
pectore, auxiliatur. sanguinem in grumos concretum discutit. post menstruas  
purgationes appositum uulvæ cum butyro, præstat mulieribus ut concipiant.  
potum uero partus enecat, & à puerperio, pariendi spem adimit. Equi coagulū,  
quam hippacen aliqui uocant, priuatim cœliacis dyssentericisq; conuenit. Hæ-  
di, agni, hinnuli, capræ lati cornis, & dorci, apri, cerui, uiruli, bubaliquæ coagula  
similes naturas sortiuntur. contra aconiti potum in uino, & concretum lac in ace-  
to, conuenienter assumuntur. Hinnuli priuatim triduo à purgationibus admo-  
tum, partus spem intercipit. Vituli marini, castorei uires representat. comitiali-  
bus, strangulatis uuluis, potu conferre existimatur. Sed si sit uiruli marini, hoc ex-  
primentum est: aqua inspergitur, quæ paulisper cum alterius animantis, tum præ-  
cipue agni coagulum, maduerit. nam si erit syncerum, statim liquefit in aquam:  
sin minus, confirmile permanet. Excipitur autem cātulis, qui nondum natum  
possunt. in summa, coagulum omne dissipata cogit, & coacta dissoluit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Coagulum omne Germanis *Äymn* / *lypp* & *fäls* *lypp* appellatum, ex lactis in uentriculo primo  
corruptione acre, digerit, siccatur. Lac aut sanguinem in uentriculo coagulatum dissoluit: leporinum  
omnium est præstantissimum. Qui igitur menses immodicos cum *Practicis* & *Medicorū* uulgo queat  
sistere, cum calidum sit uitandum, ubi sanguine fluit, aut fluxurus est.

## Adeps.

## Caput LXVIII.

**A**deps anserinus aut gallicenaceus recens & sine sale conditus, ad uulvæ  
uitia proficit. sale inueteratus, & qui temporis spacio acrimoniam conce-  
pit, uulvæ inimicus est. Recense exemptis membranis in fictilem ollam demissus,  
quæ altero tantopere capacior sit, quantus sit modus adipis quem curare insitue-  
ris, obstructo diligenter uase, flagrantissimo soli exponitur, eliquescentis inde  
humor in fictile alterum ex colatur, donec adeps omnis absumatur, mox loco ue-  
hementer frigido reconditur, & ad usus digeritur. Alij fictile fulciunt super a-  
quam calidam, aut tenuem & elanguidam prunam, quæ solis uicem penitet. Est  
& alia curandi ratio: Exemptis membranis teritur, coniectusq; in ollam eliqua-  
tur, adiecto minuti salis momento; mox lineo colo transfusus reponitur. Vtili-  
ter in medicamenta additur, quæ lassitudines & fatigationes leuant. Suillus a-  
deps & ursinus hoc curantur modo: Recens, præpinguis, renibus potissimum de-  
tractus, in largiore aqua cœlesti & quàm frigidissima, exemptis tunicis, diligen-  
tissimè manibus confricatur; et exprimendo ferme siccatur, subindeq; noua aqua  
abluitur. cæterum fictili capacitatis duplæ inditus, in aquam demergitur, & sub  
ditis leuib; prunis spatha mouetur, eliquatusq; colo transfunditur in aquam:  
ubi uero refrixit, & guttatim aqua omnem excludit, in prælotū fictile demittitur,  
& infusa aqua leniter eliquari debet, & manu deprimi, quò facilius fæculentū ui-  
rus pessum eat: postea in pilam spongia madefactam transfunditur: ubi coire cœ-  
pit, residens in imo sordes eximitur. tertio citra aquam eliquatur, repurgatusq;  
fictili bene operculato, perquam frigidis locis reponitur. Hircinum seuum,  
ouillum, ceruinumq; ita curato: Elotum ex his quodcunque, tunicis, ut in suilli  
mentionem dictum est, exemptis, pilæ emolliendum tradito, ac manibus fricato,  
affusa paulatim aqua, donec ne amplius quidem crauentum uirus ex cernatur, aut  
pingue aliquid innatet, sed nitida spectetur. deinde in ollam fictilem conijcito,  
& adiecta aqua ut superemineat, leui pruna liquefacto, & moueto, atq; in aqua  
colato: cumq; refrixerit, iterum in loto fictili eliquato, & quæ antè diximus faci-  
to. tertio sine aqua liquefactum, in perfusam liquore pilam colato, refrigera-  
tumq; ut in suilli ratione diximus, recondito. Bubulum autem seuum, renibus  
maximè detractum, exemptis membranis, aqua marina ex alto petita eluenda  
est, mox



est, mox in pila tundendum diligenter, affusa maris aqua. cum uerò dissolutum fuerit, in fictilem ollam coniiciendum, & marina aqua, quæ non minus doctante superemineat, proluendum. decoquendum donec omnis aboleatur odor, additis ad singulas seui Atticas minas, quaternis Tyrrhenicæ ceræ drachmis: excolatumq; detractis quæ pessum ierāt sordibus, in nouo fictili reponendum, operitumq; soli interdiu credendum, ut ad candorem reducatur, & odoris uis euanescat. Priuatim taurorū pingue sic curari debet: Renibus euulsum pingue proflute amnis aqua abluito, detractisq; tunicis, fictili nouo postquā exiguum salem insperferis, liquefacto, dein in nitentem aquā excolato, & ubi con crescere cœpit, manibus iterū cōfricando uehemēter lauato, aqua sæpius infusa, refusaq; donec quā optime elotum uideatur. rursus in olla cum pari modo uini odorati decoquito, & cum iterum efferbuerit, dempto ab igni uase, ibidem finito pernoctare. postridie si grauius adhuc oleat, noua olla repetitum, uino odorato perfundatur. eadem quæ prius fiant, dum omne uirus euanescat. Colliquatur & sine sale, præsertim affectionum earum causa, quibus sal aduersari solet, sed ita paratum nō magnopere albescit. Eodem modo pardorū ac leonū\* pingua curari oportet. Taurinum autem et uitulinum pingue, necnon ceruinum, atq; etiam huius animalis medulla, odoramentis imbuuntur hac ratione: Pingue quod odoratum reddi debet, demptis, quo diximus modo, membranis, elotum et uino quāmodoratisissimo, nulla maris aqua diluto, feruefactum, pernoctare finitur: alterū id genus uinum eadem mensura infunditur, colliquatur, & exquisitè colatur, nouemq; eius heminis, iunci Arabici septem drachmæ adijciuntur. Quod si ipsum odoris fragrantior fieri uoles, quadraginta floris eiusdem drachmæ, cū paribus palmæ, calami, & casie modis additur, & xylobalsami, aspalathi singulæ drachmæ, cinnamomi, cardamomi, & nardi, singulæ uncie, omnia exactius tunduntur, et affuso uino odorato, in uase operto, quod supra carbonēs firmiter collocatū sit ter efferuescunt, & semoto ab igni uase inibi pernoctāt. postridie uinū effunditur, aliudq; generis eiusdem adijcitur ter simili modo bene cōferuescat, deinde matutinis exempto adipe uinum effundatur, & abluto uase, si quid imo subsidens hēsit, detergatur. postremo eliquatum pingue & excolatum, ad usus reconditur. Hoc autem modo odoramentis imbuuntur, quod antea curatum est uerū antè dicta prius inspissari solent, quod facilius sibi odoramentorū uires adsciscant. Itaq; assumens quodcumq; horum uoles, cum uino feruefacto, impositis unā myrti ramulis, serpyllo, cype-ro, item aspalatho plenius tuso, aliqui tamen ad hunc usum, uno duntaxat horū contenti sunt. cum aut ter efferbuit, exemptum leniter, & linteo colatum, aromatis, uti expositum est, imbuuntur. Adipibus spissamenta sic fiunt (quemcumq; acciperis, oportet ut recens tundatur) Sincerus & sanguinis expers adeps, reliquas habens notas quas sæpe retulimus, in ollam nouā demittitur, infuso uino albo, uetere, odorato, quod semipedis altitudinem superet. lento igni feruescat, dum uernaculus odor aboleatur. planèq; uinum redoleat. at ubi deposito uase refrixit, duæ adipis minæ in ollam mittuntur, & duo uini eiusdem sextarij. & seminis Loti, eius inquam cuius è ligno ludi cretæ tibi facituntur, tusi minæ quatuor adijciuntur, lento igni subinde miscendo decoquuntur, cumq; odoris uirus euanescit, excolatusq; adeps refrixerit, una contusi aspalathi minæ, cum amara cini floris minis quatuor, & uetere uino subigitur. nocte una hæc odorem rapiunt, comibunt. postridie in fictilem ollam tricongialem ea omnia cum adipe iniecta, additis sextarijs tribus uini unā feruescunt, quousque & uim & odorem spissamentorum adeps ipse contraxerit, qui eliquefcens colatur, & reponitur. Quod si maiorem odoris fragrantiam efflagites, drachmas octo quam pinguiissime myrrhæ uino macerata, quod multos in annos asseruatum est, misceto. Gallina cecus anserinusq; sic odoribus imbui solent: Cuiusuis eorum percurati sextarij duo fictili olla excipiuntur. erysiceptri, xylobalsami, palmæ elatæ, & calami planè cōtusi, singulorū fescuncia admiscetur. uini Lesbij ueteris cyathus unus adijcitur, ea ter efferuescunt prunis, mox uase sublato ab igne, die noctuq; refrigerantur. postridie liquata per linteum crassum, mundum, in uas excolatur. ubi uerò adeps

\* Quidam ad dunt, suis angrestis camelorum, equorū, & similia.



NOMINA ET EXPLICATIO.

Inter taurinum & suillum fuerint vulpinus alopecias fanans, caninus, melinus, felinus, cuniculus, equinus, uaccinus, camelinus, vitulinus.

Reponitur aut incuratus, lotus, siccatus in umbra, uel exemptis pelliculis fusus. Jole uel igni in uase duplici. Adeps cerui nullo medicamentorum molliensium est inferior.

## Medullae



## Medulla.

## Caput LXIX.

**L**audatissima est ceruina, mox uitulina, post hanc taurina, dein caprina, & ouilla. Colliguntur ætatis exitu, cum appetit autumnus: quippe cum alijs anni tēporibus concrementum sanguinis, et ueluti caro friabilis, in ossibus inueniatur. nec facile cognosci potest, nisi quis eā ossibus extrahat et recodat. Omnes medullæ molliunt, calfaciunt, rarefaciunt, ulcera explent. ceruina perunctos uenenata fugiunt. Curantur recentes, ad ipis modo, aquæ resperfu subactæ, selectisq; ossibus tantisper elotæ, & in linteam expressæ, donec aqua syncera emanet: & deterfa sorde pingua, si qua innatet, liquatæ in duplicato uase in pilam exprimuntur, & ubi coiere, omni fece quæ ad ima sidit derasa, fictili nouo reponuntur. quod si libet in curatas reponere, facito omnia quæ de anserum & gallinarum adipe demonstrauimus.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Medulla Germanis *Wax*. Gallis *de la moelle* dicitur, calfacit, rarefacit, emollit scirrhusque uuluis partium, præcipue ceruina, et post hanc uitulina. Taurina, hircina acrior & sicior est. Loco sicco & edito & septentrionem spectanti reponitur, cum folijs lauri siccis, ne putrescant, aut situm ducant: quæ iniuria in locis humidis meridiem spectantibus eis accidit, sunt qui reponant bisariam adipum modo.

## Fel.

## Caput LXX.

**F**el omne curatur hoc modo: Recens præligato ore folliculi lino tandiu demissum in feruentem aquam, dum quis spacium trium stadiorum percurset, mox exemptum siccatum umbroso loco, asperginem non redolente. Sed quod ad oculorum medicamenta adijci solet, ligatum lino in uitreum uas, quod mel habeat, immittitur. circumuoluto ad os uasis lini principio, & aperto uase reconditur: est. n. uis omnium acris et excalfaciens. Intensis tamen & remissis uiribus differunt. si quidem præstantius in effectu esse uidetur fel marini scorpionis, et piscis qui callionymus appellatur, marinæ testudinis, hyænæq; item perdicis, aquilæ, gallinæ cādidæ, & syluestris capræ, quod priuatim prodest contra suffusiones incipientes, et oculorum caligines, argemas, & genarum scabritias. ouillo, suillo, hircino, atq; ursino, taurinum multo efficacius. Felle omni perfacilem, præsertim infantibus, deiectione quis molietur, si intinctum eo tomentum aut simbria fedi subijciat. priuatim taurino angina cum melle punguntur. sedis ulcera fanat, & ad cicatrice usq; perducit. idem auribus fractis & purulentis cum muliebri lacte aut caprino instillatum medetur. & sibilo earundem ex porri succo. admisceri in suauit, uulnerarijs emplastris & circumlinationibus, quæ contra uenenata parantur. phagedænicis ulceribus, colicis & scroti doloribus, ex melle prodest, lepras, furfures cum nitro & terra cimolia quam optime purgat, ouillum & ursinum contra eadem pollent, uerum inefficacius hæc præstant. ursinum eclegmate comitialia adiuuat. fel testudinum anginis, & in ore infantium nomis, prodest. narium inditum comitialia erigit. syluestrium caprarum felle peculiariter peruncti lusciosi sanantur. hircinum idem obit munus. thymia abolet, & luxuriantes elephantiorum extuberationes illitu reprimunt. suillum autem contra aurium ulcera, reliquaq; omnia, magno usu assumitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Felle animalium ob acrimoniam & calorem solo uix utimur, præterquam ad aperiendam hemorroidas, sed collirijs, trochiscis, alijsq; remedijs miscemus.

Fella piscium oculis sunt tutiora, ut eorundem hepata sicco hepatis salubriora.

## Sanguis.

## Caput LXXI.

Lib. Tobia.

**S**anguis anseris, anatis & hædi, utilissime in antidota miscetur. Palumbi autem, turturis & columbæ, necnon perdicis, oculis cruore suffusis, et recentibus eorum uulneribus, lusciosisq; illinuntur. peculiariter columbe sanguis, cruorem membranis cerebri erumpentem inhibet. Hirci, capræ, cerui & lepore sanguis in assatus sartagine, dysenterias & cæliacorum profluvia sistit. in uino potus contra toxica efficax est. Leporinus sanguis ita ut tepet illitus, uicia cutis in





alijs, equorū  
admissario-  
rum.

sunt, in medicamenta additur quę erodunt, septica uocāt. Sanguine chamæleonis genarū palpebras euelli creditum est. Hoc. n. uiridiū ranarū sanguine præstatur. Mēstrua sanguis fœminarū, circūlitu conceptū inhibere existimatur: aut si omni no mulier mēstrua supergrediatur. Leuat podagrę dolores et ignē sacri illius.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sanguis hirci quadrimi, bene habiti, aliquandiu nutriti uino albo, sceniculo, sefeli, lauro, & ceteris calculum frangentibus, Augusto mense iugulati, medius effluens (nam primus tenuior, postremus crassior putatur) uase uitreo receptus, testus linteo raro, sole siccatus, etiam cum myrrha, folijs lauri, & similibus, calculum potenter frangere dicitur Tralliano, Auicenna, & ceteris practico. Huic quandiu ab animali calet coquendi abscessus uim tamū tribuit Galen. lib. 10. simp. qualem caprino, taurino, & ceteris calidis humidis modicē.

Quod si hircinus sanguis adamantem frangit, sed calidus tamū ab animali: sic lapidem calidum tantum epotus refrigerit. Quod & sanguinem vulpinum ex uena secta potum præstare audio. Ne autem coaguletur, Xenocratis exemplo, miscere possis acetum fructu factum, aut coagulum.

Hirci quoque, capri, cerui, leporis, sanguinem sart agne fixū, dysentericorū & celiacorum pro fluxum sistere tantum hoc capite docet Dioscorides, non addit calculum frangere, quæ uis tenuibus conuenit, cum dictorum animalium sanguis substantia crassa & terrea, & cum calore siccatoria, dysenterias sanat.

Sanguis ex secta uena sinistra profluens lieni affecto infricatur Archigeni, lib. 9. com. ph. part. Antidotum de sanguinibus quomodo parari debeat, uide apud Manardum.

## Fimum.

## Caput LXXII.

Armentarie bouis fimum si recens admoveatur, uulnerum in inflammationes mitigat, folijs autem inuoluitur, & calfactum cinere feruenti superponitur. coxendicis cruciatus foru compescit. illitum ex aceto duritias, panos & strumas discutit. priuatim suffitu fimi, quod à masculo boue redditum est, procidentis uulnæ reprimuntur, accensi nidore culices abiguntur. Fimum caprarum, præsertim in montibus degentium, potum in uino, regium morbum emendat. menses cit cum odoramentis haustum. & partus euocat. tritum in farinam, & impositum lanis cum thure, fœminarum profluxu sistit. ceterosque sanguinis impetus ex aceto cohibet. medetur alopecij exustum, & cum aceto aut oxymelite illitum. cum axungia uerò impositum, his qui podagra tentantur, auxilio est. Caprillum in aceto decoctum imponitur serpentium moribus, ulceribus quæ serpunt, igni sacro, & parotidibus. Vtilem ischiadici uestionem hunc in modū accipiūt: In eo interstitio ubi pollex brachiali committitur, caua ueluti la cuna subfodet, in qua lana oleo imbuta substernitur, deinde figillatim feruentes stercoreis caprini pilulæ imponuntur, dum uapor per brachium ad coxam sentiat peruenire. & coxendicis dolorem mitigare. adustio id genus Arabica appellatur. Quillum illitum sanat epinyctidas, clauos, pensiles uerrucas, thymos, & ambusta ex aceto igni, rosaceo cerato exceptum. Fimum suis syuestris aridum, in aqua aut uino potum, reiectiones sanguinis sistit. uetustum lateris dolorem multo. ad rupta & conuulsa ex aceto bibitur. luxatis cum cerato rosaceo medetur. Tam asinorum quàm equorum fimū siue crudum siue crematum, addito aceto, sanguinis eruptiones cohibet. armentarij, qui herba pascitur, sic cum fimum liquatū in uino, mox potum, contra scorpionum ictus magnopere auxiliatur. Columbini uementius & ex calfacit et urit. cū hordeacea farina mixtum strumas ex aceto



ex aceto discutit. carbunculos emarginat, tritum cum melle, lini semine & oleo. ambustis igni medetur. Gallinaceū uerò omnia eadem, sed efficacius prestat. priuatim tamen cōtra uenena fungorum, et coli cruciatus ex aceto aut uino bibitur. Ciconiæ fimum, si ex aqua hauriatur, comitialibus prodesse credunt. Vulturini fimi nidore partus excūti produntur. Murinum detritū cum aceto, et illitum, alio pecijs medetur. cum thure et mulso calculos expellit. subditā infantibus muscerdē, alui deiectionem promouent. Caninum quod flagrantissimo canis sydere fuerit exceptum, cum uino aut aqua potum, sistit aluum. Humanum sterces illitum, uulnera ab inflammatione uindicat, & obiter intumescere nō patitur, sed ea statim glutinat. sicco ex melle anginę perungi commodissime traduntur. Terrestris crocodili fimum, crocodileam uocant, quæ mulieribus colorem nutrit in facie, nitoremq; seruat. Optima est candidissima et friabilis, amyli modo, minimē potius derosa, in humore statim eliquescens, quæ cum teritur, fermenti acorem quadam tenus refert. Adulterant eā sturnorum fimo, quos captos oryza pascunt, ipsumq; non dissimile uendunt. Alij amyllum aut cimoliā miscent, & adscito anchusæ colore per rarum cribrum paulatim exprimunt, ut se contrahat in uermiculorū speciem: qui siccati pro crocodilea ueneunt. Inter omnes conuenire inuenio, humanum sterces caninumq; gutturi impositum, anginis auxiliari.

## EXPLICATIO.

Tria genera fimi Columella secundo libro memoriæ mandauit esse, quod ex auibus, quod ex hominibus, quod ex pecudibus sit, ubi de hac re plura. Item apud Plinium lib. 17. cap. 10.

## Vrina.

## Cap. LXXIII.



Humanam urinam suam cuiq; bibere, contra uiperæ morsus, ac uenena, incipientemq; aquā inter cutem proderit. scorpionis, uiperæ marinorum, draconisq; morsus ea conuenientissime fouentur. Canina ad perfundendos canis morsus idonea est. pruritus & lepras nitro addito expurgat. sed uetus, ulcera capitis manātia, furfures, psoras, & feruidas eruptiones, multo magis abstergit. nomas, & præcipuè genitalium, cohibet auribus infusa manans pus supprime decoctaq; in calyce mali punici, earum uermiculos abigit. Pueri impubis resorpta urina, orthopnoicis auxiliatur. decocta in æreo uase cū melle emendat cicatrices, argemā, caliginēsq; ex ea et cupro idoneū auri ferrumen cōficiunt. Quod in urina subdit, illi ignem sacrum mitigat. feruēfactum cum cyprino, inditumq; uulua dolores mulcet. strangulatus leuat. genas deterget. oculorum cicatrices expurgat. Taurina, si cum myrrha instilletur, aurium dolores lenit. Aprina uiribus eisdem prædita est. priuatim cōminuit uescicæ calculos, & potu expellit. Caprina ad aquam quæ cutem subijt, cū nardi spica quotidie binis cyathis cum aqua bibitur. urinamq; per aluum extrahit. aurium doloribus instillata medetur. Asinina traditur renum uitij inderi. Lyncis urinā, quā lyncurium appellant, simulac ex cernitur, glaciari coire eū in calculi duritiā, uulgò creditum est. quare quod de ea proditum est, uanum esse conuincitur. est enim quod a nonnullis uocatur succinum pterygophoron, ideo dictum quod pennas ad se alliciat. Id potum ex aqua, stomacho aluoq; fluxione laboranti conuenit. Asinina urinæ potu renum uicia sanari traduntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Galenus huiusmodi impura medicamenta stercoris & urinae, ut ingenue & honestate mundicie studioso uiro merito abominanda improbat: præsertim circa caput & faciem adhibenda, quo magis indigne ferendus est aliquarum urinarum, uel etiam humanarum potus, ex quo tamen pestilentia grassante in Syr. a; quidam conualuisse uidebantur, Galeno tradente ac asseuerante: item orthopnoicæ gratia, pueri urinam bibere, non est necesse; quum alia sint multa pharma huic malo commoda, & quidam etiam eo potu opem non senserint. Verum tam abominanda medicamenta etiam homines duram apud aniculas quasdam, & uulgus fortè potioribus & purioribus indignum, non modo illi

Hæc clausula abundat.

Cornarius.



peste, & orthopneæ, ac anhelosis, uerum etiã in alijs tum uentris, tum intestinorum morbis, & præsertim in doloribus coli, ut pote quod uomitus irritando, & deiectiones cõcitando, omne uitium ualentius expurgent, uelut etiam Marcellus cap. 27 testatur.

Mel.

Caput LXXIII.



Principem locum obtinet mel, quod Atticæ regionis est, præcipuè ex Hymetto, mox Cycladibus insulis, & à Sicilia, cognomine hybleu. Magis probatur dulcius et acce, odoratius, subflauum, nec humectum, graue, et minime fluxum, quod ob sequacem lentitiã non facile abruptitur, tractumque resilit in digitos. Mel abstergendi uim habet. ora uenarum aperit. humores euocat, qua ratione in sordida ulcera sinusq; cõmodissime infunditur.

decoctum atq; impositum, abscedentem carnem glutinat. medetur impetigini coctum cum liquido alumine, & illitum. item aurium sonitui et dolori, cum fossili\* sale trito, tepidum instillatur. lentes & sceda capitis animalia illitum\* necat. nudam glandem recutitis operit, præsertim quæ circuncisione aperta non est, si melle præputium à balneo triginta diebus emolliatur. oculorũ caliginem discutit. faucibus, tonsillis, anginae collutũ gargarizatũue medetur. urinã ciet. auxiliatur tussi, & à serpente percussis. contra haustum meconium, cum rosaceo calidum assumitur. aduersus uenena fungorum, & rabiosi canis morsus linctum aut potum proficit. crudum tamen aluum inflat. tussim lacessit, & ea de re despumatus usus aptior est. Primatum tenet in mellis genere uernum, deinde æstiuum. hybernũ uerò, utpote quod crassius cõstet, deterrimum reputatur, ceraginis halitum expirat\*: Quod in Sardinia gignitur mel, amarum est, quoniam apes inibi absinthio uescantur: quo uitia cutis in facie et maculae aptissime perunguntur. Heraclia in Ponto quibusdã anni temporibus, propria quorundam florum dote, mel conflat, quod qui edere, mente abalienantur, ac sudore disfluunt. Remedio sunt, esitata ruta, & fassamenta, aut eporum mulsum, resumpta quoties uomitio ne reijciuntur. acce autem est, & olfactu sternuramenta mouet. Quod cum costo illitum, fœminarum cutem emendat, & cum sale sugillationes rapit. Est & aliud concretum mellis genus, quod saccharon nominatur. In India uerò & felici Arabia in arundinibus inuenitur. salis modo coactum est, dentibus, ut sal, fragile, aluo idoneum, & stomacho utile, si aqua dilutum bibatur. uexatae uisceribusq; auxiliatur. illitum ea discutit, quæ tenebras oculorum pupillis offundunt.

\* Quidam, cremato.  
\* Collutum, alij.

\* Alij ceraginis faciunda idoneum.


## NOMINA ET EXPLICATIO.

Mel Germanis Honig. Gallis du Myel dicitur, in succorum censum referri potest: quod autem est calidum, siccum ordine secundo, ut medicamentum: ut alimenum uerò, & dum actu nutrit, calidum humidum libro tertio. temp. terget, alit, coquit, putredini resistit, ut uinum, non cogendo substantiam corporum quibus exhibetur, uti sal, sed siccando, tergendo, ora apriendo, transitus purgando. Vrinam mouet, stomachum subuertit, ob id non miscendum remedijs uomentum: in temperies frigidas humiditas tuò sanat, calidis siccis seu bilosis est aduersissimum, sinuosa ulcera glutinat. Coctum & despumatum minus acce, & tergens redditur, sed magis nutriens. Mel medicamentis miscetur, uel crudum, uel coctum, uel solum despumatum, uel cum his coquendum, aut solum despumandum, aut ut crudum maneat. Cum autem despumandum est, coquitur supra prunas aut flammam lignorum aridorum, & sine fumo.

Mel optimum sit purum adeò, ut totum perluceat, odorum, flauum, acerrimum, dulcissimum, gustaneum, uicidum, consistencia nec crassa, nec liquida: sed tam sibi coherens, ut continuitatem suam quasi linea longissimam non intercisum seruet, si digito attollitur. Idem coquendo paucam spumam remittit, nec thymũ improbe olet. Albũ etiã ex Gallia Narbonensi præstantissimũ affertur, & pallidũ magis est primo apum mellificio. Sachar autem, ut uocant, & ipsum mellis species, ex India, et felici Arabia aduectũ, in calamis, ut (hoc loco Diosc. tradit) cõcresecit, minus dulce q̃ nostras: similititer tamẽ terget, siccet, digerit nec in meũ stomacho est, nec suum affert, ut nostras, quæ res ipsum à melle substantia differe reosedit. Idẽ sal Indus quibusdã dictum uidetur, in solis gutta extra canas extracta et densata. idem



Idem zuchara Arabum re ipsa esse apparet, solo differens compositionis modo per coctionem & expressionem: noto quidem Varroni & Straboni, ignorato autem Dioscoridi, Galeno, Plinio. Nec tibi difficile fuerit rationes eluere eorum, qui Sa-



charum Græcorum à zuchara Arabum diuersum conuolunt. Actuarius sachar ubiq; scribit pro Arabum zuchara, uoce ab his suo more ex Græcis deprauata, aut fortasse contrà, cū res ea fuerit Arabica, Græci ex his nomen mutasti sumi. Sacharum rubrum est ipsa uelut spuma sachari, spurcit: cōctione deponentis, calidius et acrius sacharo, uti spuma mellis, melli. Germani zer fallen Zucker. Galli Cassonade appellant.

## Cera.

## Caput LXXV.



**C**era optima est subfulua, subpinguis, pura, odorata, & halitum quadam tenus melleum referens, natione Pontica, aut Cretica. secundum locum obtinet candicans, & suapte natura pinguis. Candida fit hoc modo: Ex ea radunt album syncerumq; atq; transfundunt in uas, quod satis habeat marinæ ex alto petitiæ, insperfoq; nitri momento decoquunt. cumq; iterum tertioque inferbuit, separatum uas refrigerant, ac ceræ pastillum eximunt, deterfa forde, si qua fortè adhæsit. tum denuò indita noua maris aqua feruet, uti retulimus, & uase dempto ex igne, fundū ollulæ nouæ aqua frigida madefactum, in ceram summam suspensa manu intingunt, quò celerius concreseat, & quamminima portio extrahatur. suscepto primo ceræ orbiculo, iterum uasis imum aqua refrigeratum, tantisper in ceram immitti debet, dum tota excipiat. orbiculi lino confuti, interuacante spacio, suspenduntur, & interdum, continuo sub sole, non etiam sub luna asperguntur, usq; dum perfectè albescant, uerū si eximius ille candor desideretur, eadem factitari, & identidem recoqui operæ precium est. Nec defunt qui pro marina, in muria quàm acerrima semel aut iterum excoquant, dein laguncula tenui, rotunda, ansam habente, extrahunt, postea orbiculos, substrato affatim cespite herbofo, insolant, donec candorem summum contraxerit. Præcipuum hoc obeundum munus uere, cum sol remissa uehementia humorem pariat, ut non facile liqueatur. Cera omnis mollior, calfacit, modicè explet corporea. datur in sorbitione dysentericis. ac milij magnitudine, decem grana ceræ hausta, lac in nutritibus non patiuntur coagulari.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Cera calidi frigidi, humidi siccique quodammodo media, crasse essentia, emplastica, debilitè coquit admota, habet paulum quiddam digerentis calidæq; potentia, quæ melli plurimum inerat. Materia ob id est aliorum medicamentorum & refrigerantium. Ea autem lutca est, aut fusca, aut alba, & hæc aut natura, ut Pontica apertè acris, aut ablutione, ut Tyrrhenica, & nostra acrimonia expers. Ceteri colores sunt ascitij, ut uiridis ab ærugine, ruber ab anchusa uel cinabrio uulgaribus, nigra à fuligine tede, charta usta, aut atramento, à quibus mistis uires mutat, Germani Wachs. Galli de la cire appellant. *Λιγὸς σάκτρος*, id est, cera stacte, & stillaticia, initio lib. 2. comp. pharm. gen. legitur.

## Propolis.

## Caput LXXVI.



**P**ropolis eligi debet flaua, odorata, styracem referens, in uehementi ariditate mollis, & mastiches more ductilis. Magnopere calfacit & euocat. aculeos & omnia infixæ corpori extrahit. in uetere tussi suffita proficit. impetigines admota tollit, ea in alueariorum foribus cerosæ naturæ inuenitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Propolis Germanis Voistoss, uel bett. Est enim quod apes ante alucum



faciunt, unde Varro tertio rei Rusticæ Propolim uocat quod apes faciunt ante foramen introitus porrectum in alueum maxime æstate, fauorum stabilimentum, quo omnes frigoris, aut iniuriæ aditus obstruuntur. magna ad medicamina usus.

## Triticum.

Optima è tritici generibus ad secundæ ualitudinis usus habentur, quæ recentia & iam perfectè adulta, colorem luteum referunt. dein sequuntur trimæstria, quæ nonnullis sitania nominatur. Itaque cruda in cibis teretes tineas gignunt.

Triticum gallicum.

## Caput LXXVII.

Triticum.

Trimæstre.

\* Quidā addunt: Calentesq; lepras illi auferrūt, incipientesq; inflāmatiōes omnes itidē illitile nium, in rursū decocto, etiam.



petigines sanat. Glutinum ex similagine & polline, quo chartæ glutinātur, sanguinem excreantibus prodest, si liquidum ac tepidum cochlearis mensura detur sorbendum.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè τριπλός. Latine triticum. Germanis Weissen. Gallicè Ble. Fourment.

Triticum plures includit differentias, ut robum, silignem, sitantum. Triticum uero dicitur, quod tritum ex spicis sit. ut author est M. Varro.


Triticum quod cibariorum aut panificij gratia agricolæ serunt, huius plura sunt genera, quæ gentes fecerunt, à quibus nomen acceperunt, ut Italicum, Siculum, Aphricum, & alia, sed qui scrupulose obseruant, tria statunt genera, Primum Robus Latine. Græcè ὁ λεῖψος τριπλός, ὁ λεῖψος. Germanicè



manicè derschönste vollenst weyssen / dicunt, quia pondere & nitore præstat. Secundum ge-  
nus Latini trimestre. Græci στράων, ἀρπὲ γελυγὼ, uel τριμῆνον, quod post sationem tertio men-  
se maturescit, & metitur. Dicitur & de hordeo, & de farre. Inueniuntur autem bimestria, sed circa  
Thracium sinum, quæ quadragesimo, quàm satis sunt die metuntur. Eorum autem postremorum agrico-  
lis usus gratissimus est. Nam ubi propter aquas aliânucaussam matura satio est omissa, præsidium ab  
hoc petatur. Hoc tritici genus Germani Zimmel Korn. fortè ab amylo, quod inde fit præstantissimum.  
Galli Martium uocant, quod à Martio in quo satum est, tertio inde mense maturescat. id quod tamen  
in nostro orbe non fit, in quo Martio mense satum, quinto tadem, hoc est, Iulio mense metitur. Tertium  
tritici genus non undiquaq; notū, Germanis Welscher weyssen, & weyssen olb / dicitur, in Alsatia co-  
piose gignitur. Sunt qui hoc frumenti genus Columella & Plinij siliginè esse putat, diuersum tamè à La-  
conica siligine, quæ sine crista est, rectam habens speciem, nunquā maturescēs, iumentorū pabulū &c.

## Hordeum.

## Caput LXXVII.



**H**ordeum optimum est candidum purumq; id minus  
quàm triticum alit. Pifana tamen ob crenorem in de-  
coctione redditum, plus alimenti præbet quàm polenta ex  
hordeo facta. contra acrimonias atque gutturis scabritias,  
exulcerationesq; pollet, quibus etiam triticea pifana præ-  
sidio est, sed plus alit, magisq; urinam mouet. lac ab uide sup-  
deditat, si cū fœniculi semine decocta forbeat. Hordeū  
abstergit, urinam ciet, inflationem parit. stomacho aduer-  
satur, tumores concoquit. Farina hordeacea decoquitur in  
mulsa aqua cum fico, ut inflammationes collectionesq; di-  
scutiat. duritias cum resina & fimo columbarū concoquit.  
cum meliloto autem & papaueris calyce dolores finit, qui  
latus excruciant. aduersus intestinorum inflationes cum li-  
ni semine, scenograeco, & ruta illini iuuat. strumas cum pi-  
ce liquida, cera, oleo, & impubis pueri urina, ad concoctio-  
nem perducit. Et cū myrto aut uino, aut malicorio, aut syl-  
uestribus pyris, aut rubo, alui profluvia sistit. podagricis  
inflammationibus, cum cotoneis aut aceto prodest. deco-  
cta in acri aceto, modo quo hordeaceū cataplasma, & cali-  
dai mposita, lepris medetur. Cremor uerò farinæ ex aqua,  
atq; cum pice & oleo decoctus, puri mouendo est. cū aceto  
subactus itidem & cum pice contra articulorum fluxio-  
nes prodest. Farina ex his aluum cohibet, inflammatio-  
nesq; mitigat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè λεῖδν τριμῆνον.

Latine Hordeum Cereale.

Officinis antiquum nomen retinuit.

Germanicè Gersten.

Gallicè Orge dicitur.

Hordeum in duo genera distinguitur λεῖδν ἑξάσχυος,  
quod & Cantherinum uidetur dictum, quia folliculo castra-  
tum nascitur. Germani grof gerst. Galli mundum uo-  
cant hordeum, non sponte granum gluma concidit. Alterū  
genus hordei λεῖδν ὀλίγος, id est, hordeum distichū &  
Galatinum. Germanis flitex gerst / & Flein gerst. Gallis  
orge, dicitur, ponderis & candoris eximij, adeo, ut triti-  
co mixtum egregia cibaria familie præbeat. Est & hor-  
deum trimestre, λεῖδν τριμῆνον, summer gersten / & seurgeon, ou seurgeon, quasi succursus gen-  
tium, Gallis dicta.

Hordeum quod tundendo deglubitur, ac suo cortice castratur, mundatum hordeum officinae, Ger-  
mani gerolte gersten, uocant, mundituren im, nec hoc molitur.

Zy-





## Zythum.

## Caput LXXIX.



**E**X hordeo potus fit, cui Zytho nomē est: is urinam citius renes & nervos tentat. membranis praesertim cerebrum uestientibus, officit. inflationē parit. vitiosum succū creat. elephantiasin gignit. perfusum Zytho ebur, obsequiosum & operi tractabile redditur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Ex hordeo & hodie passim potio conficitur, in quibus regionibus uini penuria est, quem Dionysium apud Aegyptios primū inuenisse ferūt. Quā de causa apud Poetas Pelusianus potus nuncupatur. Est autem uelut uinum quoddā, sed ficticiū. Suidas zythum uinū rectē hordeaceū nominat, quōd fit ceruisia ex hordeo cocta, uicem uini natiui gerens. Sophocles autem et Aeschilus id genus uini ex hordeo factum nō zython, sed *Bevōp* uocant. Quod rursus Hellanicus ex *oryza* fieri commemorat Hispani Ceriam, Germani *Byet*/Galli *Berium* uocant.

## Curmi.

## Caput LXXX.


**E**st & ex hordeo potus, quem curmi nominant, eoq; saepe potu, pro uino utuntur: uerum dolorem capitis mouet, malum succum gignit, nervis nocet. Consimilia etiam potus genera ex tritico fieri solent, in Iberia quā occidentem spectat, & Britannia.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

## Zea simplex.

Hoc itē fortasse sit hordeacea ceruisia. Posidonius homo Stolicus non curmi sed corma maluit appellare, a curmite tradit. Dioscorides addidit Hispaniam quoq; occidentalem & Britanniam ex tritico similes potus excogitare Germani. *Weysenbier*/dict bier appellatur. Nec alios ex fruge fieri, nisi supradictos inueniet, qui nationes has exacte consulerit.

## Dicocon.



## Zea, seu semen. Caput LXXXI.

**Z**ea duorum generum est. una simplex, altera in geminis putaminibus. grana bina iuncta gerit, ob id dicocon appellatur. plus quā hordcum alit. ori grata. digeritur in panificia, minus quā triticum alens.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *zēa*. Latine *zea*.

Germanis *Tinkel*/quod Græcè *μυρόκοκκος*. quod *λίκοκκος* Græci Germ. *Spelz*. S. *peterstorn*. *Wlifen*/ *Rinforn*. Galli *Espelira*, & de *l'espeautre* appellant. Apud Campanos priuatim semen uocatur, ubi bis anno feritur. Hanc Homerus nō parum illustrat, quando aruum *ζείδωρον* nominat, quod nōnulli quasi uitam donans, latinitate donarunt, sed idem à Plinio non probantur. Ceterum eadem sepe simplex est propter unum granum, sepe *λίκοκκος* propter duo grana, siue geminum granum duobus utriculis coniunctum, ut hoc loco Dioscorides testatur, ex qua olim alica fiebat, sicut post ex hordeo.

## Crassior farina. Caput LXXXII.

**C**rimnon crassior est ex zeatriticoq; farina, ex qua pultem faciunt. Abundē alit. facillē conficitur, aluum uehementius astringit, si *zea*, ex qua fit, prius torreatur.

Alia, ægrē.

NO-



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Crimnon hoc loco Dioscoridi pars est crasulenta farinae, tritici atq; zea. Sunt qui sufficiuntur cri-  
mū farinae cremorem esse, ut succus à cremore differat sola crassitudine. Cornelius Celsus cremorem  
sive pro succo usurpavit. Crimnon bordei genus est Photioni. & cyceonis Homericum liquamētum. Hip-  
pocrates crimnon dicitur pro crasso, & ad similitudinem farinae tritici corpulentis accepit, ut Gao-  
lenus testatur. Germani Crimnum uoce parum mutata Brites siue Græci appellant.


## Siligo.

## LXXXIII.

Eidem generi siligo ascribitur, sed minus aliquanto nu-  
trit. in panes, ut zea, cogitur. Fit quoque è filigine cras-  
sior farina, quam Græci crimnon uocitant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Plinius li. 18. de siligine ait: Silignē dixrim ppriè tritici deliciam, eādor  
est, & sine uirtute, & sine pondere. Et mox post ait: E siligine lautissimus  
panis, pistrinarumq; opera laudatissima. Præcellit in Italia, si Campana pa-  
sis nata misceatur. Ruffior illa: at Pisana candidior, ponderosior uerò Cre-  
tica. Panis siligneus quem siligniten Græci uocant, omni alio magis alit, ut  
author est Paulus Aegineta. E quibus omnibus facile apparet silignem hanc  
à ueteribus celebratam longe aliud esse à frumento quod nostra etate silig-  
nē, Germanicè Roeken, uocamus, ex quo panis cōficitur niger et plebeius.  
Et ab aliquibus Tipha, ab alijs olyra creditur. Cum tamen id genus fumen-  
ti sit, quod secale & sarrago Plinio dicitur lib. 18. cap. 16. Cuius pictu-  
ra hæc est.



Roeken.

## Athera.

## Caput LXXXIII.

Athera ex zea fit tenuissimè mollita. est autem forbi-  
tio, quasi liquida pultricia, infantibus conueniens, &  
cataplasmatis efficax.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Atheram è zea fieri tenuiter emolita hoc loco Dioscorides asserit, et in  
sortitiones decoctum pultriciæ dilutioris modo, infanti-  
bus uile, unde Ger-  
manis Binder bapp dicitur. Actius ex Amylo cōstare pro-  
dit. Iulius Pol-  
lux Atheram uocat pul-  
tem è mile acra farina. Est autem pul-  
s quod Germa-  
nicè etn müssader bappen, appellamus, cuius ex farre in pul-  
ucrem & fari-  
nam redacto factus, de quo Plinius lib. 18. cap. 8.

## Tragos.

## Caput LXXXV.

Tragos quandam halicæ frugis figuram gerit. multò  
minus quàm zea nutrit, quòd multum aceris habeat,  
quare ægrius cōficitur, aluumq; magis emollit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.


Tragus cerealis, ut ab herba distinguatur, frumenti genus, aspectu similitudo  
alica seu chondro: granum eius compluribus glutinis uestiri refert Gale-  
nus, & ob id minus zea nutrire, ægrè in nemriculo conuinci & aluum  
magis emollire.

Græcè τράγος.

Latine Tragus cerealis.

Germanicè Samel Korn.

Gallicè du ble turguet dicitur.



## Aucna.

## Caput LXXXVI.


Avena genicula quædam habet. folio & stipula tri-  
ticum imitatur, & in cacuminibus dependentes  
paruulas ueluti locustas bipedes gerit, in quibus semen  
conti-



# DIOSCORIDIS

*Bromes.*

*Aegilops.*



*Avena.*



continetur, utile ad catarrhū  
plasmata, uti hordeū. pul-  
te huius alius sistitur. pro-  
dest ruffientibus in sorbi-  
tione succus.

## NOMINA ET explicatio.

*Avena*, genus est cuius due refe-  
runtur species, quarum una folio  
& stipulatriticum imitatur, in ca-  
cuminiibus semina habet ampla, al-  
ba et ualde pilosa, ex quibus bina  
crusta nigrates prodeunt: caui-  
detur esse, quam Theophrastus  
αἰνίδα appellauit. Germani  
Weiß haber/ et Niederlendisch  
haber uocant. Altera est que ab  
hoc βῆμα & ab alijs αἰνίδα  
dicta. Germanis schwarz haber  
Flein haber, superiori non dissim-  
lis folio, stipula & semine, quod  
huc minus est neq; ita pilosum &  
ber, apud nos iumentorum pabu-  
lo potius quam hominum cibo na-  
scitur. Cogitur tamen in panes,  
quando extrema urget fames. Vi-  
detur tamen Plinius Germanos nō  
nihil notare barbarici propter  
pulsem, quam nominamus auena-  
ceam, cuius & Dioscorides hoc  
loco meminit, Germani uocāt et  
haber müss/ & haber brei.

## Oriza. Caput LXXXVII.

**O** Riza frugum gene-  
ris est, in palustribus  
riguisq; nascens. Mediocriter alit, sed aluū supprimit

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ὀρυζα. Latine oriza.

Officinis & uulgo risum. Germanicè Reisz.

Gallis Ris appellatur.

Frumenti genus est notum, non pauci usus in cibo. Ex hoc ptissa  
na etiam conficitur. Vnde illud Horatii: Sume hoc ptissanarum ori-  
ze. Plin. li. 18. Italici, inquit, maxime oriza gaudent, ex qua ptis-  
sanam conficiunt, quam reliqui mortales ex hordeo. Oriza egre  
concoquitur, aluū supprimit, & modicas in nutrendo uires habet  
ut hoc loco Dioscorides testatur, & Paulus Aegineta tradit. Celsus inter res boni succi & que crassio-  
rem pituitam faciunt, enumerat, & his que imbecillis materie sunt annumerari posse dicit. Est & al-  
terum genus orize quod oriza minor, Germanicè Rintelbrot/ & Schwaden dicitur.



## Halica.

## Caput LXXXVIII.

**H** alica fit ex zea, quam diococon appellauimus, plus alit quam oryza. al-  
uū magis cohibet, stomacho longè utilior, decocta in aceto illitaq; lepras  
tollit



collit. unguium scabritias extricat. incipientibus ægilopijs medetur. decoctum dysentericis, quos excruciat dolor, infusum, idoneum est.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Alica siue Halica nunc frugis genus est, nunc ex fruge facta farina, et inde pulicula uel sorbitio. Pro Puge accipitur à Plinio, lib. 18. cap. 7. ubi de frumentis per tempora satis agens, inquit: Aliqui uerna, milium, panicum, lentem, cicer, alicam appellant. Et non longè post ait: Tunc ex frumento plures, hordeum maximè nudum et alica. Celsus item lib. 2. cap. 17. Cumq; panificia, inquit, omnia firmissima sint: elota tamen quædam genera frumenti; ut alica, oryza, ptisanæ, uel ex eisdem facta sorbitio, uel pulicula, & aqua quocq; madens panis, imbecillissimis annumerari potest. Item cap. 19. Boni succi sunt triticum, siligo, alica, oryza, amyllum. Et iterum cap. 25. Pulicula uel ex alica, uel ex panico, uel ex milio, itemq; ex ipsa sorbitio. Est autem farri adorei genus, quod Halicastrum etiam, ut putant, uocatur Columella lib. 2. cap. 6. ubi de farri generibus agens, sic scriptum reliquit: Adorei autem plerumq; uidimus in usu genera quatuor. Far, qd' appellatur Clusinum, cædoris nudi. Far, quod uocatur uernunculum, rutilum, atq; alterum candidum, sed utrumq; maioris pōderis quàm clusinum. Semen trimestris, quod dicitur halicastrum, idq; pondere, & bonitate est præcipuum. Et hoc alicam esse uolunt, Græcorum chondro haud ab similem, teste Paulo Aegineta, qui lib. 1. capite de frumentaceis ait: Alica in reliquis quidem chondro haud ab similis est, sed aluum magis suppressit. Denique halica pro pulce etiam accipitur à Plinio & alijs, quæ in sanitatis usu & medicinali locum habuit, sed diuersis locis diuersimode præparata, ceu ex Plinio lib. 18. cap. 11. patet, ubi uaria eius genera & cōficiendi modos ponit, & ex ea quæ semè dicitur, fieri tradit, quæ admodum & hoc loco Dioscor. Fiebat etiā ex hordeo, cuius cōficiendæ ratio docetur ab Apicio, quæ tamen faciliore est, & paratior, quā in lunio mēse docet Palladius, his uerbis: Hordeū seminaturū, cui adhuc superest aliqd de uirgore, per manipulos ligabis, et torreis in furno, ut facile nota possit infringi, & in modio uno salis aliquantū dum molitur, miscere curabis, ac seruas.

Milium.

Caput LXXXIX.



**M**ilium in panes coactum, minus exteris frugibus alit. sistit pulce sua aluum.

M



Vrinā cit. Torretur milium, feruensq; in sacco ponitur, ut torminibus, reliquisq; doloribus, si foueatur, auxilio sit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè λέγχε. Recenioribus Græcis *wisop*. Straboni λέγχε. Hippocrati *πασπάλυ*.  
Latinis Milium, à milliaria summa.

Germanis *Byrsen*.

Gillis du millet appellatur.

Ex milio quoq; panem fieri Columella testatur, qui priusquam refrigescat, sine tedio potest absumi, quo non parum oblectant Campani. Plinius rursus Sarmatarum gentes tradidit maximè pulce mi-  
liacea ali, quæ & Germanis hodie usitatissima est, adeoq; penè in pauperū culina quotidiana, quæ admo-  
dum Rugis, quos sub Pomeranorum uocabulo complectimur (Germanicè die Rugianer) puls aena-

cea, illius autem purgamentum sicut & panici & sesami applauda dicitur non aliter in frumento palea, apud Plinium lib. 18. cap. 10.

Milium Indicum in Italiam Nero-  
nis principatu conuectum, nigrum colo-  
re, amplum grano, arundinum culmo.  
Adolescit ad pedes altitudine septem,  
prægrandibus culmis, lobas nocant, om-  
nium frugum fertilissimum, ex uno gra-  
no termi sextarii gignuntur. Hodie apud  
nos passim in hortis ostentationis gratia  
serunt, grano pisum aquam, atro, sti-  
pula arundinea, quini apud nos: semina-  
tur pedum proceritate, & frumentum  
Sarracenicum, Germanicè *Thürsch*  
Forn, oder *Indisch Forn* appellat. Græ-  
cè uerò λέγχε *indukós*, cuius pictu-  
ra hæc est.

Quatuor huius Milij Indici generâ  
reperiuntur. Quoddam enim grana rus-  
sa, quoddam uero purpurea, aliquod  
subcandida grana profert. Spicarum si-  
ue panicularum etiam in ijs est diuersi-  
tas: etsi enim omnes muticæ sint, tamen  
alia cædidos, alia luteos, alia purpureos,  
prout scilicet grana colorata erunt, flo-  
res obtinet. Alias quod ad formam attie-  
net, in ijs nulla est differentia.

Panicum: Cas-  
put XC.

Panicum frumētaceis semi-  
nibus annumeratur, milio  
simile. eodemq; modo in panes  
subigitur. eisdem habet usus.  
minus tamen & nutrit & strin-  
git.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *ὄλυνος*. Latinè panicum, à paniculis, in quibus semen est.


Germanicè *pfensich* & *fuchschwang*.



callic



Panicum.



Sesamum.



Gallicè paniz, dici-  
tur. Panicum nulli  
similitudine prosilit,  
denis ut plurimum fo-  
lijs luxurijs, culmo pe-  
nè in surculū extenua-  
to, nutantē, rubido pa-  
nicularū fistiglo, præ-  
dēs acervato granis,  
alijs purpureis, alijs  
rufis, alijs nigris, itē  
& candidis.

Sesama. Ca.

XCI.

Sesama stoma-  
cho inutilis ci-  
bus. halitus gra-  
uitatē facit, quo-  
ties inter mādē-  
dū cōmissuris dē-  
tium inhæsit. ner-  
uorum crassitiem  
illitu discutit. me-  
detur auribus fra-  
ctis, ambustis, in-  
flammationibus,  
coli doloribus, &  
cerastē moribus.  
capitis dolores,  
qui estuatione cō-  
citantur, ex rosa-  
ceo lenit. eadem  
efficit herba de-

cocta in uino. præsertim inflammationibus oculorum doloribusq; prodest. ex  
ea fit oleum, quo Aegyptij utuntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Σήσαμ. Latine sesamum.

Officina sesamum uocant. Germani Leindotter.

Gallicè du sesama, de la iugoline.

Sesamum nunc penè intercidit, quod multis in locis ignoratur, quod tamen Columella & Plinius,  
ex medicis Galenus, & ante hunc Dioscorides capite præfati collaudant. Veteribus sanè omnibus, ut  
pleraq; alia notissimum erat, ut ipse Dioscorides, qui in herbarum pictura diligentissimus est, ista ipsa  
γνώμῃ, id est, nota indicat. Ideo talium historiam præter morem plerumq; neglexit, ex qua colligere  
mus, quodnam certum esset seminum genus. Sunt enim pauca seminum cerealium nota, aut sæpe nulla,  
quibus dinosci possint, adeo ut frugem ipsam non certo uocabulo nominare liceat, ex qua panis quoti-  
dianus conficitur, ita uidemus in plerisq; sola nomina nobis restare: ut supra quoq; ostendimus.

Lolium.

Caput XCII.

**L**olium quod inter fegetes nascitur, molitum, illitu nomas, putrescentia ulce-  
ra, gangrænasq; emarginat. sanat cū raphanis, sale & aceto feros lichenas:  
& ex aceto & sulphure uiuo, lepras. strumas quoq; discutit, cum fimo columbi-  
no & lini semine decoctum in uino. rumpit quæ ægrius ad coctinē perduntur.

M 2



Lolium.



decoctum ex aqua multa utilissimè ischiadicis illinitur. si cum polenta, thure, myrrha, aut croco suffiatur, conceptionem adiuvat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis αἴλα.

Latinis lolium.

Germanis Rhi weissen / Aulch.

Gallis luraya. yuroie, teuille, gasse, dicitur.

Lolium fit ex corruptis seminibus tritici & hordei, inebriat & uertigines facit. unde prouerbiū: Lolio uiciat, quod Plinius inter frugum morbos potius quam terræ pestes numerat. à nonnullis xizanon appellatur. Euchsius errore manifeste depingit aliam herbam, quam Germani Raten uocant, pro lolio.

## Amylum. Caput XCIII.

**A**mylum ex eo appellatum est, quod sine mola fiat. Optimū ex trimestri, natione Creticum aut Aegyptium. Ratio faciendi amyli hæc est: Purgatum trimestre tritici madescit quinque die, & si fieri potest, nocte: cum emollitum fuerit, effunditur sensim, sine agitatiōe, aqua, quò minus cremor utilis unā excludatur ubi mollissimum esse uidetur, mutata aqua pedibus calcari oportet: rursus infusa, tertium demum enatantes ibi furfures incerniculo eximendi, reliquumq; quallo sportisq; siccatum tegulis nouis confestim torreatur flagrantissimo in sole. namq; si paulisper uidum maneat, a corem concipit. Contra fluxiones oculorum, pustulas, cauaq; ulcera efficax est sanguinis reiectio: nes potu cohibet. Exasperatas fauces lenit. lacti atq; obsonijs admiscetur. Fit etiam amyllum ex zea, quæ maceratur ac eluitur uno aut altero die, & subactæ farinæ modo manibus subigitur, pressaq; feruentissimo in sole, ut ante retulimus, exiccatur, nullius in medicina usus, ad alia tamen conueniens.

Fœnum græcum.



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Amylum factitium est & frumenti medulla, arte præparata, appellatum ab eo quod sine mola fiat, siq; ex omni tritico & siligne, optimum autem ex trimestri, ut Dioscorides tradit. Inuenio eius Chio insula debetur, ut lib. 18. Plinius tradit, unde & latidatissimum. Post quod maxime laudatur Creticum, mox Aegyptiacum probatur leuitate, leuore, candore. utq; ut recens sit. E siligine quomodo sicret, docet Cato libri sui cap. 87. Conficitur item ex zea, ut hoc loco Dioscorides testatur. Est item frugis generis aliquando significans amyllum, ex quo fit illud factitium. In qua significatiōe Celus accipit lib. 2 ubi id cum alijs quibusdam inter ea quæ boni succi sunt, & stomacho aptissima, connumerat. Germanicè Amidum, amlung, & Brassmell. Gallis quoq; amy dum dicitur.

## Fœnum græcum. Caput XCIII.

**F**œnigræci farina uim habet emolliendi discutiendiq; in aqua multa decocta aduersus tam internas quàm externas inflammationes efficaciter illinitur. lienem cum aceto & nitro trita extenuat. succus decocti eius fumarum



minarum malis subuenit: & siue tumor, siue præclusio sit uulua, fouentur, & insident. Fenigræci in aqua decocti cremor expressus, capillos, furfures, & manantia capitis ulcera purgat, locos dilatat & emollit, si cum anserino adipe pessui- ce subijciatur. uiride cum a ceto utilissimum imbecillibus locis, & ulcera sentien- tibus, decoctum eius prodest aduersus tenefimos foetidamq; dysentericorum pro- luuiem. Oleum quod eo exprimitur & myrto, capillos & genitalium cicatrices abstergit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis τήλιν, λεγάρις, αὐγόμενος, βόκρος.

Fœnumgræcum Latinis & Officinis.


Germanis Fenigrec, & Boeshorn.

Gallis fenigrec, & senegreue, dicitur.

Fœnum Græcum inter fruges est. Plinius & Varro Silicam, & Siliculam dici testantur. Columella siliquam simpliciter uocat. Vis eius siccare, mollire, dissolvere, testant Plinio lib. 24. ad finem. Nec du- bitatur, quin decoctum eius utilissimum sit uuluis, interaneisq; exulceratis: sicuti semen articulis atque præcordijs, sumitur & sorbitio ē farina ad pectus exulceratum, longamq; tussim. Diu decoquitur, do- nec amaritudo desinat: postea mel additur. Siccum primo gradu, calidum secundo, lib. 8. simpl. calidum autem mediocriter, ob id digerere dicitur lib. 1. comp. pharm. part. Nam is gradus est medius inter summum & omnino temperatum, quod nec calidum absolute, nec frigidum iure dixeris, phlegmouas ar- dentes irritat & exacerbat, minus calidas & duras digerendos sanat. Paulus Aegnetæ lib. 1. calfacien- di, uentremq; subducendi uim illi tribuit, si ante alios cibos sumptum fuerit.

## Linum.

## Caput XCV.



Linum uulgo notum est. cuius semen easdem quas fœ- numgræcum uires habet. discutit & emollit omnem intus forisq; inflammationem, cum melle, oleo, exiguaq; a- qua decoctum, aut melle cocto exceptum. uitia cutis in fac- cie uarosq; crudum tollit. illitum cum nitro & ficulneo ci- nere, parotidas duritiasq; discutit. ulcera quæ serpunt, fa- uosq; cum uino decoctum expurgat. ungues scabros exi- mit, cum pari modo nasturtij & mellis. uitia pectoris ex- trahit, si ex melle in eclegmatis uicem substituitur. tussim lenit, uenerem stimulat, si farina piperis & melle exceptum, pro placenta largius adsumatur. Huius decoctum intera- neorum uuluaq; erosionibus immittitur. alui excrementa euocat. ad uulua inflammationes in defensionibus per- quam utile.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Linum λινόν.

Latinis & Officinis linum.

Germanis Lein, & Flachs.

Gallis du lin appellatur.

λινόν τε γάρ, id est, lini semen, Germanicè Leinsamen, humido et sic- ca quodammodo temperatum, calidum autem quodammodo ordine pri- mo: flatuosum est etiam si frigatur, adeo plenum est humiditate recremen- titia. Quia igitur calidum, humidum, flatuosum, semen homini generat. Lini semen torrefactum ter- get, ut præsana & farina fabarum, lib. 7. comp. pharm.

Lini semen tepide calidum, ut chamæmelum. Lini semen in aqua coctum refrigerantem succum gignit. Lino spermon & succus rosarum frigidioris media temperie sunt natura, sed non ita multo, quam potius caloris sunt tepidi. Lini semen refrigerat, siccatur. Lino spermon tanquam frigidissimū ui- tandum asthmaticis censet Galenus, ut meconium. Mandragorā, hyoscyamū, cicutā, psylliū. Lino- spermon urinas exigue mouet: fixum autem ureticum magis sit, & alium magis sistit esu.



## Cicer.

## Caput XCVI.

Album.



Rubrum.



Faba.



Hoc quidā  
satein.

Cicer satium aluo idō-  
neū est. urinā ciet. infla-  
tionē parit. colorem cōmen-  
dat. mēses ac partus expellit.  
iac auget. cū eruo de coctū  
illinitur ad inflammatiōes  
stium, uerrucosas informica-  
tiones, ad scabiem, ulcera ca-  
pitis manātia, impetiginesq;  
contra carcinomata, & ulce-  
ra quæ cacoethe uocantur, cū  
melle & hordeo prodest. Al-  
terum genus arietinum nomi-  
natur. utrunq; citurinas, dato  
cum rore marino, hydropicis  
aut regio morbo laborātib;  
eorum decocto. Lādunt ea ex  
ulceratam uescam & renes. in  
uerrucarum formicantiū pen-  
siliūq; genere, prima luna  
singulis granis singulas tan-  
gunt, eaq; grana linteolo deli-  
gata abijci post se præcipiūt,  
ita decidere eas arbitrantur.  
Syluestre cicer folijs satiuo si-  
mile est. odore acris, sed semine  
discrepat. idem quod satiu-  
um præstat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Cicer legumen est, cuius differētia plures magnitudinis, figura, colore,  
sapore. Est enim arietino capiti simile, unde ita appellatur. Græcis *Leptos*,  
Germanis *Wichern* / *Wicherebs* / *ziser erbs*. Gallis *Ciche*, uel *pois ciet*.  
dictum, album nigrūq; est. Et columbinum, quod alij *Venerum*, *Columella*  
*la Punicum* uocat, candidum, rotundum, leue, arietino minus, quo religio  
peruigilijs adhibet. Est et cicercula Græcis *ἀραβός*, ut Theodorus ē Theo-  
phrastō reddidit. Columella tamen eandem ciceram & cicerculam uocat,  
Gallis *cerre*, uel *pisa cerra*. Quāquā *ἄραβος* sic uocant. Martinus Grego-  
rius interpretatur *lesse*, inæquales angulos habens, ueluti pisū. Dulcissimū  
autem id quod eruo simillimū, firmitusq; quod nigrū & rufum quāquā quod  
album: author lib. 18. Plinius. Paulus Aegineta lib. 1. de his sic tradit: Cice-  
ra instant, abstergunt, genitale semen augent, Venerē simulant, calculum te-  
runt. At fricta flatum quidem emittūt, sed difficulter concoquuntur.

Faba.

## Caput XCVII.

Faba inflationē excitat. agrē concoquitur. tumultuosa  
somnia facit, tussī confert, carnē gignit\*, media calidi  
frigidiq; natura. decocta in posca, & cū suo cortice esitata,  
dysenterias & cœliacorū profluuiā sistit. contra uomitio-  
nes cōuenienter mādatur. inflatio leuior cōtrahitur, si aqua  
prior inter coquendū abijciatur. uiridis plus nego cū stoma-  
cho exhibet, maiorēq; flatū parit. Lomentū eius & per se,  
& cū polenta illitū, inflammationes quas uulnus excitauit, mitigat. cicarices cō-  
colores facit. turgentes grumoso lacte mamas, etiā si inflammatione tentētur, adiu-  
uat. lac resinguit, furūculos, sugillata, parotidasq; cū sœnigra ci farina et melle  
discutit



discutit. cū rosa autē, thure et oui candido, procidentes oculos, tumores, uuasq; re-  
primit subactū uino, suffusiones et ictus oculorum recreat. Manducata sine cor-  
tice faba, ad auertendas fluxiones frōti illinitur. decocta in uino testis collectio-  
nes sanat. quō tardius pubes erumpat, pueris imo uentri illinitur. uutiliginē pur-  
gat. Fabarum cortice illiti capilli q post euulsionem renascuntur, gracilesunt,  
et minus alimenti capeffunt. cum polenta, scisso alumine, et uetere oleo impositi  
cortices, strumas discutunt. decocto earum lanx inficiuntur. Faba dempto corti-  
ce in illas parteis diuisa, in quas suapte natura scinditur, imponi solet sanguinis  
de fluxionibus ab hirudine concitatis: nanque eas suppressit, si semisecta ap-  
primatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *κύνθος*. Latinis *Officinis faba*.

Germanis *Bon*. Gallicè *sebue* dicitur.

Faba nostris nō ita dānatur quemadmodū olim à Pythagora maximè cū fresca fuerit, hoc est, quā  
uola leuiter cōfracta et decorata fuerit. Altera enim solida dicitur, quæ adhuc integra et cū cute  
est. Fabalia uerò sunt cortices et siliquæ, de quibus Columella inquit, se audisse ueteres rusticos malle  
matura fabalia, quā fructu trimefrem, cuius ratio ex Plin. colligitur. Nā siliquæ caulesq; gratissimo  
sunt pabulo pecori. Folliculi uerò eius apud Festum ualuuli dicuntur, sed quod in summo fabæ nigri-  
cat, hilum est.

## Faba Aegyptia.

## Cap. XCVIII.

**A**egyptia faba, quam aliqui Ponticā uocant, in Aegypto plerumq; proue-  
nit. in Asia etiam Ciliciæq; lacubus inuenitur. Folia habet ampla, etiam si  
ad arborum frondes\* cōparentur: caulem cubitalem, digiti crassitudine: florem \*Alij, galit  
roseum, dupla papaueris amplitudine. & ubi flore exuitur, fert folliculos uespa- modo.  
rum fauis similes, in quibus faba supra operculum, bullantis ampullæ modo, pro-  
minet. Ciborion id eo nominant, id est arculam, quoniam seratur ipsa, humenti  
glebæ mandata, & ita in aquā demissa. Radice firmatur harundine crassiore, quæ  
cruda cocta uis estur. ei colocasia nomen est. Faba uirens mandatur, & exiccata ni-  
grescit. uulgarem magnitudine superat. Adstringendi facultatem obtinet, & sto-  
macho utilem. dysentericis, celiacisq; prodest, in sparso, polente uice, lomento.  
datur quoq; in pulste. Cortices in uino mulso decocti, si terni inde cyathi biban-  
tur, magis proficient. Facit ad aurium dōlorem, quod in earum medio uiride spe-  
ctatur, gustu amarum, si tritum & cum rosaceo coctum infillitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Plinius totā plantā Aegyptiæ Fabæ colocasia nomine intelligit: quā li. 21. sic depingit. In Aegypto  
nobilissima est colocasia, quā cyamon uocant aliqui. Hanc à Nilo metunt: caule cū coctus est harenoso  
in mandendo. Thyrsos autem qui inter folia emicat, speculabilis, folijs latissimis, etiā si arborescōparena-  
tur, ad similitudinem eorū quā personatiā in nostris amniū uocamus: adeoq; nihil suis dotibus gau-  
det, ut implexis colocasiae folijs in uariā speciem uasorū potare gratissimū habeant, unde illud Horatii.

Ciboria exple. Et Strabo geographia lib. 17. ait: in Aegypti lacubus ac paludibus biblus nasci-  
tur, & Aegyptia faba, ex qua Ciborium fit ( & paucis interpositis ipsam describentibus uerbis ait, )  
oblectaneum autem mirum in modum scaphis Thalacegis densissima fabeta subeuntes, & eorum folijs  
innumbrati, quæ adeo magna sunt, ut poculorum & catinorum usum præbeant. Habent enim concavi-  
tatem quandam ad id idoneam: unde Alexandrina officina ijs plena sunt, & ut uasis utuntur.

Faba & semen ipsum quod amarum est. uiride egrè concoquitur, exigui nutrimenti est, & inflat.  
sicca uero tamen minorem inflandi uim habet, auctore Theophrasto & Athenæo:

## Lens.

## Cap. XCIX.

**L**ens frequenti cibo aciem oculorū obtundit. egrè concoquitur, stomachum  
malè habet, eūq; & intestina inflat, sed aluum cū cortice cocta sistit\*. Præstat \*Alij emollit:  
in cibo quæ facillimè coquitur, nihil atri in maceratione reddens. uim habet ad-  
stringendi, quæ ex causa aluum cohibet. si detracto antea cortice discoqua-  
tur accuratè, primaque aqua inter coquendum effundatur (quippe primum id  
decoctum uentrem resoluit) somnia tumultuosa excitat. capiti, neruis, ac pulmo-  
ni inutilis. melius suo fungetur munere contra alui fluxiones, addito cum a ceto



## Lens.



intybo, aut portulaca, aut beta nigra, aut bacca myrti, aut putamine punici, aut aridis rosis, aut mespilis, sorbifus, pyris Thebanis, aut malis cotoneis, aut cichorio, aut plantagine, aut gallis integris, quæ post decoctionem abijciuntur, uel uuarum rhois quæ obsonijs insparguntur. uerum acetum cum eo diligenter percoqui debet, aliàs aluum conturbat. Contra subuersionem stomachi, triginta grana lentis deliberata deuorari proderit, decocta cum polenta, & illita, podagras lenit, sinus cum melle glutinat, crustas rumpit, ulcera purgat, decocta in aceto duritias & strumas discutit, cum cotoneo aut meliloto medetur inflammationibus oculorum, sedisq; addito rosaceo: sed in amplo sinu aut inflammationibus sedis, quæ maius remedium exigunt, cum putamine punici, ac ficcis rosis, adiecto melle, decoquitur. nomis quæ in gangranam euaserunt, adiuncta maris aqua, pustulis, & his quæ serpunt, igni sacro, pernionibusq; ut antea dictum est, contra mammas in quibus lac in grumos coit, & præ nimia sui copia profunditur, cocta in aqua maris & illita auxiliatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Lenticula quæ et lens, Germanis Linsen. Gallis Létile. Græcis uerò quia edendo est φακός id est phakos dicitur, leguminis genus est, cuius duo genera in Aegypto dicitur esse lib. 18. cap. 12. Plinius. Alterum rotundius, nigriusq; Alterum sua figura. Vnde uario usu translatus est

in lenticulae nomen. Inuenio apud athores æquanimiorem fieri uescientibus ea. Laudatur maxime quæ apud Pelusium nascitur oppidum. Vnde illud Vergilij: Nec Pelusiaca curam aspernabare lentis. Et Ausonius in monosyllabis ait: Et Pelusiaco de semine planta, teres lens. Martialis item: Accipe Niliacæ Pelusia munera lentæ. Vilior est alica, carior illa faba. Optima ut Plin. lib. 22. ea. ultimo tradit, quæ facillime coquitur, eaq; quæ maxime aqua absorbet. Aciem oculorum et stomachum inflat, sed aluum sistit in cibo, magisq; discocta aqua celesti. Eadē soluit minus percocta. Propter dissolutionem stomachi. 30. grana lentis deuoratur. Celsus ipsam inter ea quæ aluum adstringunt enumerat his uerbis. Lenticula cui uel Beta uel Intubus, uel ambubeia, uel Plātago adiecta est: magisq; etiā si illa ante fricta est.

## Phasioli.

## Cap. C.



Phasioli inflat. spiritus cient. ægre coquitur. uirides cibo aluum emolliunt, ad uomitiones idonei.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Phaselus differt à phaseolo, & phasiolo, ac ochro, quem Gazanum ciceram, nunc eruiam trāstulit, super quo multum hodie inter clarissimos Medicos cōtrouertitur. Annuerantur autem nō tā leguminibus, quā iumentorum pabulo. Ea igitur uisa est mihi ratio, cur uilem Verg. nuncuparit. Editur tamen in quibusdam regionibus in modum phacoptisane, id est, Ereforum cremore, cuius & Plinius meminit.

## Eruum.

## Cap. CI.

Eruum paruus frutex omnibus cognitus, angusto folio, tenuis, semina in ualculis habens, è quibus farina fit, nomine eruina, ad medendi usus cōueniens, eruā capiti onerosum est, aluum esurbar, sanguinem per urinam extrahit, elixo boues saginatur. Parandæ farinæ ratio hæc est: uberiora grana candidaq; deliguntur, permiscen



LIBER SECVNDVS:  
Eruum sativum.



Lupini.



NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis ὄροβος. Latinis & officinis Eruum, ab eruendo dicitur.  
Germanis peregrinum. In Gallia Narbonensi, ers.

Eruum calidum primo ordine, succum secundo, amarum proinde, incidit, terget, obstructions liberat, largo usu sanguinem per urinas euocat, præsertim rufum. Nam Eruum non candidum sed rufum uehementer amarum est, candidum dulcius. l. b. acid.

Sal. li. s. simpl.

Lupini.

Cap. CII.

Satius lupinus notus est. Cuius farina cum melle delinctu, aut potu, uentris animalia expellit. ipsi quoque macerati, & cum sua amaritudine elitati, eadem efficiunt. Decoctum eorum idem munus præstat, cum ruta & pipere potum. quare lienosis prodest. eodem ulcera tetra, quæ theriomata uocant, gangrænas, incipientem scabiem, eruptiones pustularum, ulcera in capite manantia, uirilignes, maculasque fouere utilissimum, menses & partus extrahit, cum myrrha & melle subditum in uellere. Eorum farina cutem liuoresque corrigit. inflammationes cum polenta & aqua mitigat. tubercula, & coxendicum cruciatus ex aceto lenit. strumas in aceto cocta illitaque dissipat. carbunculos rumpit. Decocti cœlesti aqua, donec in cremorem lentescant, faciem abstergunt. medentur pecorum scabiei, cum radice nigri chamaeleontis, ita ut tepente decocto abluantur. Cit urinâ radix cum aqua cocta. Lupini triti, ubi maceratu dulcescere cœperint, cum aceto poti, fastidium detrahunt, & cibi auiditatem faciunt. Gignuntur & syluestres lupini, satius similes, sed omnino minores, qui eadem quæ satui possunt.

NOMI-



Græcis ὀσπύριος.

Latinus Lupini, quod instar lupi terræ sit appetens, id quod et nomenclatura Germanorū alluāte. Officiæ genuinum nomen retinere. Germanis Seigbonen / Wolffschoten / Wict bonen. Gallis Lupini dicuntur.


Lupinus est satius, idemq; uel dulcis, uel amarus: agrestis uerò minor sed amarior, et ad omnia ualentior domestico, terget, tenuat, incidit, digerit, siccatur sine morfu: uiliginēs, psoras, achoras, ulcera cacothe sanat, lumbricos necat sumptus et admotus, iecur et lienem purgat, phymata, cheradas, liuida ex aceto uel posca, uel oxymelice pro ægri natura et affectus uarietate coctus digerit.

### Rapum.

### Cap. CIII.



Rapum sylvestre.



\*Potius, Napum et eius radix cocta.

Decocta rapæ radix alit, inflationem parit, humentem ac fluxā carnē creat, uenerem stimulat. decocto podagra, pernionesq; fouentur: contritoq; rapo atque imposito iuuantur. si excauata radici rosa ceum ceratum adigatur, & feruenti cinere eliquescat, exulceratis pernionibus proficiet. Cymæ eius decoctæ manduntur, & urinam ciunt. semen antidotis & theriacis, præsertim quæ sensum doloris auferunt, anodyna uocant, idoneum est. potum contra uenena salutare est. Venerem concitat rapum. muria conditum; minus alimenti sufficit, sed multo magis appetentiam recreat. Sylvestre rapum in aruis nascitur, fruticosum, in cubiti altitudinem assurgens, ramosum, læue. in cacumine folia fert læuia, digitali latitudine, aut maiora: & fructum in siliquis calyculatis. cumq; eorū inuolucra aperiuntur, alia intus siliqua spectatur, quæ quādam capitis speciem præbet, in aqua semina paruula concipiuntur, foris nigra, intus alba. Additur in medicamenta quibus ad detergendam cutē in facie, totoq; corpore utimur, præsertim quæ ex lupini aut erui, tritici aut lolij farina, fieri solent.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis ῥαπὺν. Latinis et officinis rapum, uel rapa.

Germanis Rüben. Gallis ung nauea.

Rapæ nota sunt et in cottidiano cibi usu. Quondam ut alia salgama etiam condiebantur: quarum condendarum modum unum tradit in Decembri mensē Palladius. Alium etiam modum habes apud Columellam lib. 12. cap. 54. Apud nos nunc integra, resecta herba in fossis subterraneis, substratis nucum aut aliarum arborum folijs, et coopertis adseruantur: aut integra et deterfa, leuiterq; cocta cum alijs oleribus et pomis ac pyris in muria infusa, in uasis seruantur, pondere imposito ut ius superna tet. Interdum etiam leuiter cocta et munitissimè concisa saleq; plurimò aspersa, in doliolis seruantur.

Rapum Sylvestre quod Græcis ῥαπὺν ἀγρία, Germanicè Rapumzlen. Gallis Raponen appellatur. Describitur enim cubitali altitudine consurgere, fruticosum, in cacuminibus læue, folio glabro, longitudine digitali, aut interdum maiore. fructum fert in siliquis calyculatis, dumque seminum inuolucra dehiscunt, alia intus capitulata continetur siliqua, in qua paruula semina concipiuntur, foris nigra, sed quæ fracta candicent.

### Napus.

### Cap. CIIII.

Cocta napi radix\* inflat, modicum alit. semen eius potum uenenorum uires hebetat: antidotis admiscetur. Conditur sale radix.

NOMI-



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis Βαρβάς. Latinis & officinis Napus.

Germanis Stœck rûben/satiuus trûcken stœck rûben/sylvestris nafs stœck rûben.

Callis Rouonnete, naueau, Raue ronde de sauoye, ou de Limosin.

Easdem quas rapa uires obtinent, nam congêneres sunt rapis, à quibus longitudine in primis differunt. Plura eorum genera. Palma Romæ, ut libro. 19. scribit Plinius, Amiternis datur, deinde Nursini, tertia nostratibus. Hinc illud Martialis de nâpis. Hos Amiternus ager foelicibus educat horis, Nursina poteris partius esse pilas. Condiuntur etiam raparum modo, conditurseq; rationem docet Col. libro 12.

Napus bumæ.

Napus bumæ sylvestris.

Raue de sauoye.



Raue de Limosin.



Radix.

Cap. CV.

**R**adix, quæ græcis raphanus dicitur, ex calfacit. flarus gignit. ori suavis est, sed stomacho aduersatur. ructus ciēt. urinam pellit. aluo aptior. summo tamen cibo sumi debet, quò magis eius distributionem adiuuet. cum autem præsumitur, cibum suspendit quare uomituris commodissimè datur ante cibum. seu suum aciem excitat decocta contra ueterem tussim, & pituitæ crassitiem in pectore, efficax est. cortex ex aceto nullo, celerius uomitiones mouet. hydropicis commodissimè illinitur lienosis utilis sugillata cum melle rapit, & nomas amolitur. contra uiperarum ictus auxiliatur. alopecias ad pilum reducit. lentigines cum loliacea farina emendat. his qui fungis strangulantur, tam cibo quàm potu salutaris est. Semen uomitiones facit. urinam mouet, menses ciēt. lienem extenuat. cum aceto illitum gangrænas ualidissimè emarginat, coctum cum aceto nullo, anginis perquam utiliter gargarizatur. contra cerastis morsus, potum ex uino, auxilio est. Sylvestris raphani, quæ Romani amoraciâ uocât, folia sat uo similia, sed magis lampsanâ imitatur. radix gracilis, tenera, subacris. Tâ foliâ quàm radix in olera recipitur. sed hæc ex calfacit, urinam concitat, æstuosa est.

NOMI



DIOSCORIDIS  
NOMINA ET EXPLICATIO.  
*Raphanus.* *Raphanus sylvestris.*



Græci *ῥάβδος*, ἢ. *Lotiris* & officinis *Radix, Raphanus*.

Germanis *Räich*. Gallis *Refert*. quasi *radix fortis* dicitur.

*Raphanus* apud antiquiores Græcos pro *Crambe*, id est, *trastica* accipitur, quod *pestis* ricesue  
drum Græcos cū Latinos *radicem* significat, quæ comeditur, & quam *radicula* uocat Celsus. Cui  
amaritudo est plima, ut inquit lib. 19. Plinius, & uis mira obligandi sp̄ritum, laxandiq; ruclum, ob  
id cibis illiberalis utiq; si proxime olus mandatur. Aegypto mire cel. bratur propter olei fertilitate  
tem. quod de semine eius faciunt. Frigore adeo gaudet, ut in Germania, præcipue in agro Arg. niensis  
infantium puerorū magnitudinem æquet. Utilissimi in cibis hibi: no tempore exsistuntur: iidemq;  
dentibus semper inimici, quoniam atterant. Mirumq; omnibus uicem hanc saporis inesse. Caesar de  
agricultura lib. 12. cap. 22 ex Florentino: Succus ipsorū ex aqua acceptus boletis & uenenis resistit.  
Si uero raphani succo quis manus suas probe illinat ac confricat, intrepide & citra periculum repti  
lit ac serpentes apprehendet. Dulceserunt, quorum semen in uino, aut utiarum passerum succo succa  
rit maceratum.

*Raphanus sylvestris* cuius pictura hæc est Græcis *ῥάβδος*, ἢ *ῥάβδος* *ῥάβδος* Latinis *Amo*  
*recia*. Germanis *Hederich* dicitur. Fuchsius *Raphanum sylvestrem* falso pro *Irione* pingit.

*Sifer.*

Cap. CVI.

*Sifer* uulgo cognitum. Cuius radix decocta origrata est, & stomacho utilis.  
Surinam ciet, & appetentiam inuitat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *Σιζαργ*. Latine *Silaron* & *sifer*. Germanis *Gairlin* & *girgelin*. Gallicè *Cherry*.  
Plinius lib. 19 mox post *pastinacæ* genera sic scribit. *Sifer* & ipsum *Tiberius* princeps nobilita  
uit. Flagitans omnibus annis in Germania, Geloubs appellatur Castellum Rheno impositum, ubi gene  
rofitas,



rostitas præcipua. Ex quo apparet frigidis locis conuenire. Inest longitudine neruus qui in decoctis extrahitur, amaritudinis tamen magna parte relictæ, quæ multo in cibis temperata etiam in gratiam accipitur. Et lib. 20. idem ait, Stomachum excitat, fastidium abstergit sifer.

**Lapathum siue rumex.**

**Caput CVII.**

Lapathum acutum.

Oxalis.



**E**X generibus rumicis, oxylapathum uocant, quod in acutum tendit, prædura habens extrema, non nisi palustribus nascens. alius est fatius, illi dissimilis. tertium genus sylvestre, paruum, plantagini proximum, humile & tenerum, quartum est quod alij oxalida, alij anaxyrida, aut lapathon uocant. folia eius sylvestri ac exiguo rumici similia, caule non magno, semine subacuto, rubente, acri, in caule & agnatis appendicibus emicante. Omnium decocto olere aluus emolitur. crudi illitu melicoides, rosaceo aut croco adiecto, discutiuntur. Sylvestris & oxylapathi, & eius quam oxalida nominant, semen ex aqua aut uino utiliter bibitur contra dysenterias, & cæliacorum affectus, stomachi fastidia, scorpionum ictus, quod si quis in po-

tu præsumat, nihil molesti ex ictu patietur. Radices ex aceto coctæ aut illitæ cruidæ, lepras, impetigines, & scabrosos ungues persanant. sed antea locus aceto & nitro in sole perfricandus est. pruritus corporis decoctum earum sedat, si foueatur, aut in folijs balnearum confricetur. coctæ in uino & instillatæ, aurium dentiumque dolor emulcent. strumis parotidasque discutiunt. lienem cum aceto extenuant aliqui amolendis strumas radicum gestamine utuntur, eas collo appendentes. trita & admota fceminarum profluuija sistunt. cum uino autem pota, re gio morbo medentur. calculos uesicæ comminuunt. menses cient. scorpionum ictibus auxiliantur. Hippolapathon olus est magnum, in paludibus nascens. eadem habet uires quas supradicta rumicis genera.

**NOMINA ET EXPLICATIO.**

Lapathi siue lapatij, utrunque enim dicitur, plura sunt genera: Vnum quod oxylapathon quasi acutum lapathum uocatur. Germanis Lende wurz / mengel oder menbel wurz. Gallis Herba aux: trigneulx. appellata, palustribus locis nascens, folijs duris & in cacumine acutis.

Secundum genus est hortense, Ἀέτω & ὀξύρις ὀξύρις Græcis. Jam lende fraut Germanis. de la lampe apud Allobroges dictum priori omnino dissimile, folia habens lata, similia betæ.

Tertium genus est agreste Græcis Ἀέτω & ὀξύρις ὀξύρις. Germanis Weyer saur ampfer / breue. plantaginis simile, molle & in terra iacens.

N





Quartum postremo est quod quidam ab aciditate saporis oxalida appellant, alij anaxyrida, aut egreste lapathum. Grecis ὀξυρίς. Officinis acetosella. Cretes oxymidam vulgo dicunt. Germani Spiess ampher dicunt, cuius folia tertio generi similia sunt, et eius caulis non adeo grandis est, semen acuminatum, colore rubro, sapore acri, quod in caule et adnatis nascitur.

Est et q. Hypopolathū, id est, grāde lapathū à Grecis uocatū, grande olus in palustrib. nascens. Sunt qui Monachorum Rhabarbarum, sic hodie tanquam peregrina et incognita res, appellas tū, speciē Rumicis siue Lapathi esse contendunt, cuius pictura supra. Plinius hæc genera aliter tradere uidetur lib. 20. cap. 2. Lapathū digerit modicē, oxylapathū, digerit, et repellit, utriusq. semen leuiter astringit, unde dysenterias et diarrheas sanat, præcipuē oxylapathi. Hypopolathū, quod in aquis omnino nascitur, eadē præstat, sed imbecillius: idē uerò ualētius fuerit in hortos hodie trāslatū.

## Lampfana.

## Cap. CVIII.

**L**ampfana sylvestre olus est. plus alit quàm rumex, & stomacho utilius, cuius folia caulesq. coquuntur in cibo.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Grecē λαμψάνη. Latine Lampfana, holus sylvestre. Germanis Wild Föl / wild senff Kraut / weysheyderich. Rura Gallie sanuas albas, quasi sylvestres napos uocant, de sanues blanches.

## Bunium.

## Cap. CIX.

**B**unium caulē emittit quadrangulū, et in eo foliosos ramulos, tenues, prætenuibus foliolis & flosculis scatentes, lōgitudine digitali: folia propter radicē, apio similia, sed multò tenuiora, et quē modo quodā folia tribuli imitētur. flores anethi. semē odoratū, minus hyoscyamo. Exalfacit bunium. urinā ciet. secundas detrahit lieni, renib. et uescicē utile. eo humenti aridoue utuntur, exempto radice & caulibus succo, ex aqua mulsa.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Grecē Βουνίον. Latine Bunium. Germanis s. Barbare Kraut. Gallis herbe au charpétier, dicitur. Vulnere



Vulnerariam herbam esse & temperamentum eius & experientia docet. His uerò potissimum ulceribus medetur quæ impura sunt, & in quibus caro supercrefcens fuerit: nam quia ualenter siccatur, ideo sordese extergere, & carnes minuere potest.

## Blitum.

## Cap. CX.

**B**litum estur oleris modo. aluo utile est. nullius in medicina usus.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis Βλίτον, ἢ Βλίτρον. Latinis Blitum. Officinae cum beta confundunt. Germanis Wäxer. Gallis Porreterouge, Tourgon in Narbonensi agro, du blit, breyon apud Sabaudos.

Blitum imbecilliter refrigerat & humefcit libro 2. comp. ph. par. in secundo recessu à temperatis, lib. 6. simp. iam uulgare est.

## Malua.


## Cap. CXI.

**M**alua fatiua esui longè aptior syluestri. stomacho adueriatur. aluum iuuat: sed multò magis caules. interaneis & uesicæ utilis. crudâ folia cum salis exiguo manducata, ægilopas ex melle sanant.

## Malua satina.

uerum cum cicatrice trahere cœperint, ea demum citra salem utendum est. contra aculeatos apium uesperti quæ ictus, illita effica est. eadem crudâ cum oleo trita peruncti, non feruntur. ulcera manantia in capite, furfuresq; cum urina sanant. sacris ignibus & ambustis decocta folia, tritaq; uti lissimè ex oleo imponuntur. Eius decoctum uulvas in fessione mollit. prodest erosionibus uesicæ, et intestinorū, uulvæ, sedisq; clystere infusum. ius decoctæ cum radice sua, contra omnia uenena auxiliatur, si continuo à bibentibus reuocatur. contra phalangiorum morsus remedio est. lac euocat. semen in uino potum, addito loti

N 2



Malua vulgaris.





malua arborefcens.



Nec his tantum contenta est dotibus, sed dici horas insuper nobis ostendit, ad solem circumagendo folia, uti testatur Theophrastus & Columella. Quam ob causam etiam ab aliquibus helio-  
strophos uocata est, ut refert Apuleius.

## Atriplex.

## Caput CXII.

**A** Triplicem aliqui chyfolachanon uocant, cognitum olus est. Duo eius genera, syluestre & satitium. coctum estur, ut olus aluum mollit, panos dis-  
cutit siue coctum illinatur. semen cum aqua malsa potum, regium morbum  
fanat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis Ἀτρίπλαξ, πικρὰ τὸ ἀποδὲς ἀνεδδαε.

Latinis atriplex, ueteribus Atriplexum.

Germanis Burehart / Barm mulden.

Gallis bonnes dames arroches, bonnes femmes, follete, à gustu insipido.

Syluestris atriplex ἀτρίπλαξ ἀγρία Græcis.

Germanis Schyfs malter / wilden burehart / myst mulden dicitur.

Non

syluestris semine, uesicæ cruciatus lenit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Quæ maiores, aut minores dicantur malua satis, ex  
Plinio lib. 20. cap. 21. colligere licebit, ubi de maluis  
& earum generibus agens sic scribit: In magnis lau-  
dibus malua est utraq; & satia & syluestris. Duo  
genera earum amplitudine folij discernuntur. Maior  
rem Græci Malopen uocant in satia, alteram ab ea  
molliendo uentre dictam putant malachen. E sylue-  
stribus cui grande folium & radices albæ, althea uo-  
catur, ab excellentia effectus à quibusdam aristala-  
thea. Ex quibus Plinij uerbis colligitur maluas bis  
riam inter se diuidi: suntq; prima & præcipua illo-  
rum genera duo. Satia siue hortensis, Græcis Μα-  
λάχην ἡ ἀγρία: Germanis Römisch bappel dicta, et  
syluestris, Μαλάχην ἡ ἄγρια. Germanis Gemein bap-  
pel appellata. Quarum utraq; iterum in alia duo se-  
cernitur. Prior quidem illa in satiam & horten-  
sem, quæ in hortis ad ciborū usum ferebatur, & quæ  
pro olere utebantur: & in eam quæ locis incultis na-  
scitur syluestris, quæ etiam edendo fuit, sed minus  
quàm alia. Posterior autem quæ syluestris est, duobus  
illis undiq; procerior, & altius à terra erigitur,  
& in hortis crassior arborefcit, unde à Galeno anda-  
dendromalacha, quasi arborea seu arborefcens: ma-  
lua Germanis uerò cym rosen & herbst rosen uoca-  
tur. Quartum malua genus quod itidem syluestre est  
Germanicè Rofs bappel dicitur. Galli malua Ma-  
lue appellant. arborefcem uerò rofes doultre mer,  
id est, rosas ultramarinas.

Maluas aluum mollire testatur etiam Martialis  
hoc disticho.

Vtere lactucis, & mollibus utere Maluis:

Nam faciem durum Phœbe cecaniis habes.

Et Paulus Aegineta lib. 1. inter olera esculentano  
cōnumerat & aluum subducere testatur, cum ait:  
Malua refrigerat quidem, sed obscure, magis uerò  
humectat, atque ob uiscositatem aluum ducit.



Atriplex:



Crambe.



Brassica seculis.

Brassica crispa.



Non parum miror Bertrutium Bononiensem ut doctiss. ita etiam accuratissimum in docendo virum in numerum laudatarum herbarum recensuisse Attriplicem, quumadeò parum commodasit stomacho, ut non consentius Galenus hanc herbam cum oleo & garo miscuisse, ob eam causam acetum quoque addat, quo facilius citiusque secedat è stomacho. Eadem ille gratia blitum quoque condit ob humorem aqueum utrique familiarem. Atriplex tamen in maiore neglectu fuit olim, si fides habenda Plinio est, quippe accusatum à Pythagora fuit olim, tanquam faceret hydropicos, morbumque regium, & pallorem: coqui prætereà difficilime, & in hortis nihil nasci iuxta id, nisi languidum, culpauit. Addidere Dionysius & Diocles plurimos ex eo gigni morbos, nec nisi mutata sepius, aqua coquendum stomacho cõtrarium esse, lentigines & papulas gignere &c.

## Brassica. Cap. CXIII.

**B**rassica satiuua aluo est idonea, si modò leuiter feruefacta edatur: nam percocta aluum sistit, sed multò magis bis cocta, aut quæ in lixiuio coquitur, stomachum autem male habet, acrior est æstiuua, in Aegypto propter amaritudinem non estur, excutientibus & tremulis esse prodest, summo cibo sumpta crapulam discutiit, & uini noxam restinguit, melior stomacho cyama: sed acrior, & ad ciendam urinam ualidior, ea cõdita stomacho inimica est, aluum cõturbat. Crudus succus cum nitro et iride uoratus, aluum emoluit, cum uino quoque epotus uiperarum moribus auxiliatur, cum scenigraci farina, podagris et articulorum uitis illinitur, prodest & sordidis ulceribus, & uetustis, illitus, caput purgat na-

ribus infusus, menses extrahit, cum loliacea farina inditus. Folia per sese illita, aut cum polenta trita, cõferunt inflammationibus, tumoribusque, epinyctidas, ignem sacrum, leprasque sanant, carbunculos ex sale rumpunt, fluentes capillos retinent, cocta,

addito melle, aduersus depascentia ulcera, gangranasque ualent, lienosisque acetato cruda profunt, manfa, deuorato succo, retusam uocem instaurant. Decoctum eius potu, aluum & menses ciet. Flos post cõceptionem in pello subditus, partum abortu uiuiat. Semen eius, præsertim quæ in Aegypto nascitur, potum tineas repellit, in anridota theriaca additur, faciei cutem lentiginesque expurgat. Virentes cauliculi cum radice cremati, & adipe porci uetusto excepti, diurnos laterum dolores mitigat,





Brassica, ut Cato dicit, antistat, et ad salutem tempora comesta sese semper cum calore, et rigore arido, simul et humido, et dulci, et amaro, et acri. Quatuor earum genera. Prima est levis, quae nominatur *laiz*. Germanice breiter *Föl*, grandibus et latis folijs, caule magno: ualidam haec habet naturam, et uim magnam: Altera est crispa, quae à similitudine apij, *σέλινου* in Graecis, Germanis *Krauser Föl*, uocatur: haec est et aspectu et natura bona ad curationem, ualidiorque est quam quae supra scripta est. Item est tertia, quae *κράμ.* in uocatur, minutis caulibus, tenuioribus folijs ob id Germanis *kleiner Föl* dicta, acerrima omnium est istarum, tenui succo uehementissima. Est et quartum genus Graece *κράμβη κεραιώτα*. Latinis Brassica lacuturris, uel tertia aut sessilis siue Capitulata Germanis *Cappis Kraut* Gallis *Capini* uel *cabini coles*, nonnullis albi, uocata. reliqua Brassicae genera Galli communi uocabulo *choils*, id est, caules appellant. Caulis enim etsi dicatur in herbis *robur* ipsum siue stirpes, saepius tamen ob sui caulis ac thyrsi magnitudinem pro brassica sumitur.

Est autem Brassicae peculiaris quaedam uis contra uina, ut Dioscorides hoc loco tradit, ebrietatis et crapulae noxas tollit à cibo sumpta, imò et Plinius historia naturalis lib. 20. Graecorum opiniones referens, scribit Brassicam uino aduersari, ut inimicam uitibus: antecedente quidem cibis caueri ebrietatem propter sumpta, crapulam discuti, cuius rei rationem ex Aristotele colligere licet in problematis. Amplius de brassica scribit Plinius lib. 19. cap. 8. et lib. 17. cap. 24.

Brassica esculenta sapore nitroso, parum acri, siccatur, tergit, sumpta et admota, induratas phlegmonas digerit, lepras terget, ulcera etiam maligna glutinat. Cinis ustorum eius caulium siccitate est caustica, cum adipe ueteri mistus ueteratos laterum dolores discutit.

Brassica syluestris.

Ca. CXIII.

**S**yluestris brassica, maritimis praeruptisque locis magna ex parte gignitur: fatiuae similis, sed candidior, hirsutiorque, amara, cuius cyma in lixuria cocta, ori non



non infuauis. Folia illita uulnera conglutinant, & inflammationes tumoresq;  
discutunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hæc uidetur eadem herba esse, de qua supra cap. CVII. egimus. Germanis Weiß heydenich, uel  
et alij uolunt, gürt hey rich.  
Soldanella.

Brassica syluestris semen maximè tenuat, efficaciter  
siccatur, & digerit lib. 4. comp. ph. part.



Beta.

## Brassica. Caput CXV.

Marina brassica à satua prorsus ab-  
horret, quòd folia ferat rotundæ ari-  
stolochia, prælonga, tenuia singula à ramu-  
lis rubentibus exeunt, singulari, ut hedera,  
pediculo, albo succo prædita est, sed pauco,  
salso gustu, & aliquantum amaro, pingui  
concretu. Herba in totum stomacho inimi-  
ca, acris. uehementissimè aluum ciēt, in cibo  
cocta. coquitur propter acrimoniam cum  
pingui carne.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis λεγυβη θαλασσια.

Latinis Brassica marina.

officinis Soldanella.

Germanis Meer kohl.

Gallis Soldana appellatur.

Brassica marina subsalsa, et subamara, uentrē deiecit,  
& cætera præstat, quæ hæc qualitates sequi cōsueuer.

## Caput CXVI.

Beta duorum generum est. è quibus nigra co-  
quitur cum lenticula, ut uentrē sistat, quod ma-  
gis radice eius præstat. candida aluo utilis  
est. utraq; tamen propter nitrosum humorem, quē  
habet in se, noxi succi est. Vnde succus earum cum  
mellenaribus inditus, caput purgat, aurium dolo-  
ribus auxiliatur. Decoctum radice & foliorum,  
furfures lentesq; deterget, perniciōes fori mitigat.  
crudis folijs utiligines, nitro ante perfrictas: alo-  
peciarum inanitates, scalpello prius exasperatas:  
atq; depascētia ulcera, illini prodest. eruptionibus  
papularum, igni sacro, ambustisq; cocta medetur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Beta hortensiorum leuissima. Vnde illud Martialis: ut sapi-  
satue fibrorum prandia Beta, O quam sepe petet uina, piperq;  
cocus. Eius duo genera nigra quæ Græcis, τεύτλον, uel λαγος  
manis Rotter mangolt, in inferiori saxonia Röt rüben, ob ra-  
dicis magnitudinē exuberantē, & altera alba quæ Græcis τεύ-  
τλον, λευκόν, τεύτλον, τεύλος. Germanis Weiß mangolt.  
Gallis Peres, dicitur. & altera præfertur, meliorisq; succi est,  
euthore lib. 8. Theophrasto. Mira differentia si uera est, inquit,  
lib. 19 Plinius, cædidis soluis alnos, mox licet nigris inhiberi. Et et  
brassica corrumpitur in dolo uini sapor, odore betæ, folijs demer-  
sis restitui. Medici innocentiorem quàm olus esse iudicauer.



Beta nigra.

Asparagus  
quid.

Lib 3. sim.  
et li. comp.  
phar. part.



quam ob rem appositus memini degere  
stare etiam religio est, utq; ualida po-  
tius in cibo sine. Semina ijs natura &  
oleris, et capite ipso exilicentis. Nam  
ut Paulus Aegnet a lib. 1. ait. Bliti, La-  
tuce, atriplicis, malinae, et beta pla-  
ta humida, asparagi uero succus est.  
Per asparagum autem intelligit, quod  
primum, et nondum in folia explici-  
tum earum plantarum ex terra pro-  
dit germen etc. Nec sine remedio est  
utraq; Beta uiridis, alba, et nigra, ni-  
trose est facultatis, qua digerit sine co-  
lore manifesto, terget, per nares pur-  
gat, alba ad haec ualencior: nigra sub-  
stringit, praesertim radice: coquendo  
has uires exiit.

Portulaca. Cap.

CXVII.

Portulacae uis astringit. ca-  
pitis doloribus, inflama-  
tionibus oculorum, care-  
terisq; cum polenta imponi-  
tur. ardoribus stomachi, sacro  
igni, uesicae doloribus, auxi-  
lio est. commandu cata, dentium  
stupores sedat. stomachi & in-  
testinorum aestuationem, flux-  
ionesq; mulcet. renes & uesic-  
am adiuuat, etiam si erosionem  
sentiant. ueneris impetus exol-  
uit. succus epotus simili esse-  
tu prodest, in febribus ualens,  
contra teretes uentris tineas,  
cruentam excreationem, dys-  
enteriam, haemorrhoidas, &  
profluuia sanguinis, percocta  
efficax est. item contra sepi-

morsus ocularibus medicamentis utilissimè commiscetur. interaneis fluxione la-  
borantibus, atq; uuluarum erosionibus infunditur. contra dolores, quos aestus exci-  
tauit, caput ex rosaceo & oleo fouetur. eruptiones papularum in capite, cum ui-  
no emendat. uulneribus quae ad syderationem spectant ex polenta illinitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Portulaca Graecis ἀνδράξην. Latinis et officinis portulaca.

Germanis Burchelkraut / Burchelen / Burchelen / gronsel. Gallis pourpier, porcelles.

Portulaca in duas species distribuitur. Vna in hortis emicat cauliculis teretibus, in altum erectis,  
lenè uergentibus in punicum, folijs pinguibus, à tergo candidis, gustu subulso, semine nigro, in herba-  
Gal. 2. eom. ccis calycibus collecto. Alia sponte sua in uitibus nascitur, et ternis quaternisue coliculis in terra se-  
ph. part. et libus serpit, cultaq; latius uagatur, folio carnosio, uerum turbinatiore, cetera priori consimilis.  
lib. 6. sim. et Portulaca frigida ordin tertio, humida secundo, subaustera: fluxiones biliosas, et aestus febriles ma-  
de optima se xime cohibet sumpta, et adnota, Haemodium, id est, denium stuporem non omnem, sed cum solum, quae  
sta. ab acerbis, auferis, acidis est nata, sanat, quia ab his asperè exsiccata lenit, et replet humiditate lenia:  
uel quia



vel quia suo lentore acidulo herens ac subiens, acorem illum sibi affinem sapore ex dente extrahit, ut Aristoteli placet, huius autem effecti omnibus cogniti causam inexplicabilem, et soli Deo notam, scribit Aphrodisius in initio problematum suorum.

*Portulaca sylvestris.*

*Portulaca sativa.*



**Asparagi. Cap. CXVIII.**

**C**orruda siue sylvestris asparagus vulgaris est notitia. Huius cauliculi in cibo cocti uentrem emolliunt. urinam cient Radicis decoctum contra urinæ difficultatem, regium morbum, renum vitia, & coxendicum cruciatus, in potu proficit, cum uino autem, phalangiorum morbis auxiliatur. si decocti succus super denecorineatur, eius dolori medetur. semē potum ad eadem ualet. canes, aut aiunt, si decoctum bibant, emoriuntur. Asparagus etiam nasci prodiderunt, arietis cornibus contusis, atque defossis. quod, quantum equidem sentio, planè à ueritate abhorret. Altilis autē asparagus multis ramis fruticat, folijs sceniculi, longis, numerois: radice rotunda, grandi, spongiā habente. Huius reperi cauliculi triti in uino albo, renum dolores sedant, aslus autem coctus



coctusue, urinæ stillicidium, difficultatemq; ac dysenterias mitigat. Radix cum uino aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. decocta cum ficis aut ciceribus, supra, regium morbum sanat coxendicis cruciatus stranguriamq; leuat. alligata radix, aut haustum eius decoctum, conceptum adimit, & sterilitatem aufert.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Syluius.

Asparagus, uel Atheniësum more per ph. Aspharagus, uel etiam apharesi, Sparagus, generatim quidem est coliculus tenerior herba, fruticis, arboris, ad fructum & semen increfcens. Speciatim uero herba uulgo nota, eaq; duplex, radice utilis & semine ad deterendas renum & hepatis obstructions. Regij, qui in hortis nascitur et Helij, id est, palustris, meminit Galenus lib. 2. alimentorum. & huius etiam initio lib. 1. comp. ph. part. ad icterum. & illius lib. 5. simpl. Petrei autem lib. 6. simpl. qui post inuentos alules asparagos, Corrua proprie dicitur: Polluci autem syluestris asparagus, hic multo est satius efficacior. in asparago mas à femina semine separatur. Asparagus Græcis ἀσπάργος.

Officinis genuinum nomen seruauit. Germanis Spargen. Gallis Esparge dicitur.

Plantago.

Caput CXIX.

Maior.

Minor.



**D**uo plantaginis genera. minor folia habet angustiora, minora, molliora, leuiora, & tenuiora: caule anguloso, in terra sessili: floribus pallidis: semine summis caulibus emicante. altera maior, latior, uirentiorq; latis constans folijs, oleracei generis. cuius caulis cubiti altitudinem petit, angulosus, subruber, à medio ad uerticem tenui semine circumdatus. radicibus nititur teneris, hirsutis, can didis, digitum crassitudine æquantibus. Nascitur in lacunosis, sepibus & locis humidis. multò utilior magna est. Vim habent folia exiccatoriam, constringentē, quare omnibus malignis ulceribus, & fluxioni opportunis atq; elephantiasis for didisq; illita profunt. profluuia sanguinis, ulcera que serpunt, epinyctidas, carbū culos, nomasq; cohibent. uetera ulcera & inæqualia cicatrice obducunt chironia sanant. sinus conglutinant. moribus canis, ambustis igni inflammationibus, panis, parotidibus, strumis, ægilopijs, illita cum sale profunt. Coctum cum aceto & fa



& sale olus, dysentericis, cœliacisq; sumptum subuenit. datur & in locum betę cū lenticula coctum, & ad aquam inter cutem cui leucophlegmatia nomen est. datur & herba decocta post aridas epulas, sic ut media antecedit. comitialibus & suspiriosis data proficit. Foliorum succus, colluta subinde oris ulcera, purgat. cū timolia aut cerufa igni sacro medetur. fistulis infusus prodest. lippitudinibus & aurium doloribus idem succus instillatur. additur quoq; in oculorum collyria. gingiuis cruore suffusus, & sanguinis reiectionibus, potu confert. clystere dysentericis infunditur. contra talem datur in potu. aduersus strangulationes uulua, inuellere subiicitur, etiam si uulua fluxione laboret. Semen ex uino potū alui fluxiones & sanguinis excreationes sistit. Decocta radix & manducatu, & collutio ne, dentium dolores sedat. eadem cum folijs, ulceribus renum & uesicæ in passio datur. Ferunt treis radices cum tribus uini cyathis, & pari aquæ modo, tertianis auxiliari: & quatuor, quartanis. Sunt qui radices gestamine, discutiendis strumis utantur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Duo hoc loco plantaginis genera facit Dioscorides. parua, Græcis ἀγρόγλωσσος μέλαινα.

Latinis plantago minor. Officinis quinqueneruia.

Germanis Spitzwegrich. Gallis Lanceola dista.

Alteram magnam & hac efficaciorē. Græcis ἀγρόγλωσσος.

Latinis & officinis plantago maior, latifolia, septimeruia.

Germanis Breycht wegich. Gallis du plantain appellatur.

Præter hæc est tertium nobis Arnoglossum uel Arnoglossa nomine generis appellatum, folio rotundiore, sessili, hirsuto, in usu medicorum frequentissimum. Plantago refrigerat, siccatur ordine secundo, stringit, repellit, digerit, ob hæc ulcera recentia & uetera etiam rebellia glutinat, hæmorrhagiam sistit, fluxiones & putredines, & ab his dysenterias coercet, hepatis & renū obstructions tollit. Semen & radix eadē præstant, sed siccant magis, refrigerat minus, ad hæc semini adest essentia tenuitas.

Sisymbrium.

Siam.

Lauer seu sium. Ca. CXX.



Sion in aquis inuenitur, frutice pingui, recto, folijs latis, olusatro similibus, sed minoribus, & odoratis. Quæ cruda cocta q; esu calculos rumpunt, atq; excernunt. urinas cient. menses & partus extrahunt. dysentericis in cibo auxiliatur. De sio Crateuas tradit, herbâ esse fruticis specie, pauca folia ferentē, rotunda, maiora quàm mentha, nigra, & ad erucam accedentia.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Σίον.

Latinè sium, lauer, recentioribus Bernula.

Germanis Wassermerck.

Gallis de la berle dicitur.

Fuchsius Sium falsò interpretatur Wasserpungen.

Sisymbrium. Cap. CXXI

Sisymbrium, alij serpyllum syluestre uocant, in solo inculto nascitur, mētha hortensis similitudine, odoratius, latiore folio. Inseritur coronis. calfaciendi uim habet. contra stillicidia urinæ, calculosq; semen ex uino bibitur.

tormi



tormina & singultus sedat. folia in capitis dolore, fronti aut temporibus illinuntur. item contra uesperum apiumq; ictus uomitiones potu cohibet. Alterum sifymbrij genus, quod aliqui cardaminam, alij sion appellant. ea herba riguis gaudet, & eisdem in locis, quibus sion, prouenit. quæ ideo nonnullis cardamina nominatur, quod gustu cardamum, id est, nasturtium, representet: folia primum rotunda prodeunt, adulta erucæ modo finduntur. Id ex calfacit. urinas mouet. crudum estur. purgat lentigines, cutisq; uitia in facie, noctibus impositum, maturinisq; detractum.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sifymbrij hoc loco duo genera facit Dioscorides, unum quod in aridis, & locis incultis nascitur. Græcis σισυμβριον. Officinis Menta rubea, uel aquatica: item Thymbrea: Germanis Belsam Et aut / Rotebachminis.

Alterum quod in aquis nascitur, Græcis σισυμβριον ἑρπεον. & Cardamine à nasturtij sapore. Officina nasturtium aquaticum uocant, & cresionem.

Germani Wasserfressig / Bruntfressig. Galli Du cresson.


Sifymbrium primum ex calfacit, atq; resiceat intertio ordine. Alterum autem quum siccum est, itidem terij ordinis est ex calfacientium, & exiccantium: quum humidum & uiride, secundi.

Sifymbrium, primum tenuium partium est, digerentis, calfacientis, & exiccantis facultatis. Semen quoq; eius tenuium partium est, & calidum. Quocirca ipsum quidam cum uino exhibent singultuentibus, & tormina patientibus.

Sifymbrium quod quidam Cardaminum uocant, quandoquidem Cardamo, id est, nasturtio simile quiddam gustu præfert, eadem ferè potest.

## Crithmum.

## Caput CXXII.



Crithmū, seu potius, ut aliqui, crithamon, fruticosa & undiq; foliosa herbula est, cubiti altitudinem ferè petens. Nascitur in maritimis, & petrosis: folijs pinguibus, numerosis, albicantibus, ueluti portulacæ, latioribus & longioribus, falso gustu. Flores candidi sunt, & semine, ceu roris marini, odoratum, molle, rotundum, quod siccatum rumpitur. habet intus tritici modo nucleum. radices digiti crassitudine, tres aut quatuor, grati odoris & iucundi. Radix, semen & folia in cocta uino, potu urinae difficultati & regio morbo auxiliatur. menses cient. estur crudum coctumue in oleris. seruatur etiam in muria.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè λεγθρον.

Latine Crithmus, seu crithamus.

Officinis creta marina, & bacula, seu bacille.

Germanis Bacillen.

Gallis Bacille, ou fenail marin.

Desertur ad nos Crethmus sale & aceto conditus. Verum de conditura non satis inter Plinium & Columellam conuenit: quandoquidē. Plinius unā cum Dioscoride seruandum in muria olus prodidit: contra, Columella portulacæ, & bati muriam non conuenire contendit.

Neg; pugnare ista mihi uidentur, cum Plinius de crithmo seu bati marina loquatur. una cum Dioscoride, qui statim nullam rationem habuit: Columellæ tantum altis & hortensianæ condituram profecutus est.

Coro-



Coronopus. Caput  
CXXIII.

**C**oronopus oblonga herbula est, per terram repens, fissis folijs. coquitur in oleo. radicem habet tenuem, adstringentē, quæ in cibo coeliacis facit. Prouenit in aggeribus, & locis incultis, & secus uias.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Coronopus, siue, si dicere malis, cornicis pedem. inter aculeatas sponteque nascentes herbas Theophrastus retulit, Incerim tamen medicina ad usum feri Plinius commemorat, qui oblongam esse herbam cum fissuris, cauliculis per terram serpenteibus designauit. Leoniceus, Capriolam uulgo dici censet: nonnunquam et sanguinariam, quod inditamentis sanguinem eliciat.

Græcis Κορωνόπος.

Germanis Braen füss, dicitur.

Galliæ olitores, nunc dentem canis ab acumine folij uocant, quanquam eodem nomine gramen appellant. u. Igari eorum lingua, la dent de chien.

## Sonchus. Cap. CXXIII.

**S**onchi duo genera, siue strior quidam est, & magis spinis horret. alter teneritate Sonchus satiuus.



Sonchus sylvestris.





quandam mollescit, cibus expetitus, angulosa caule, inani, interdum rubente: folijs in ambitu per interualla dissectis. Vtriusq; uis refrigerat, modicè adstringit, unde æstuanti stomacho & inflammationibus illiti profunt. Succus eorū stomachi rosiones sorbitione mitigat, lac elicit, in uellere appositus, sedis ac uulvæ collectionibus opitulatur, tam herba quàm radix illita uibratis à scorpiōe ictibus subuenit. Alter sonchus tenerior, arboris instar, latis constans folijs. caulem in ramos exeuntem folia distinguunt, sed ad eadem pollet.

*Cichorium latifolium sativum.*



Gens dyscel.



#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Hodie tria genera Sonchi nouimus. primi generis Sonchus, qui candidus, tener & esculentus est, Dioscorides Cicerbitam à Romanis dici prodidit, quod nomen adhuc hodie in Hetruria seruatur. Herbarijs nonnullis leporis palatium dicitur. Fortassis eadem Apuleio lactuca leporina fuerit. Veneti lactucinos indigentant. Græcis σόγχη & ἑσώδου. Germanis Hasenköll Gallis lacterones, uel potius lasseron, Dulaceron, Sonchus sylvestris hic & niger, & spinosior est, Græcis σόγχη & τράκυν. Germanis Wilder hasenköll. Gens dyscel/moss. Sonchi genus tertium est tenerum, arborescens, latiore folio, in quo ramosum caulem folia interserant, hic à solo Dioscoride describitur. plura in capite sequenti.

#### Seris siue intybus. Cap. CXXV.

Seris dum generum est, altera sativa, altera sylvestris, quæ picris & cichorion uocatur: latioribus folijs constat, stomacho quàm hortensis utilior. quæ iterū in duas species digeritur: una folio latiore prodit, lactucarum simillima: altera angustiore est folio, & gustu amara, utraq; refrigerat, & astringit. stomacho utilissima. aluum sistit cocta, si cum aceto adsumatur. sylvestres stomacho meliores, quandoquidem æstuantem ipsum & quem imbecillitas uexet, cibo leniunt. cardiacis per se, aut cum polenta, utiliter illi nuntur. podagris & oculorum inflammationibus auxilio sunt. herba cum radice illita, percussis à scorpiōe subuenit. igni sacro cum polenta medetur. succus cum cerusa & aceto, ualet ad illius eorum quare refrigerationem desiderant.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Intybum, uel intybus sativum Græcis λυκόπιον λευκὸν τὸν σῆν

sis



Cichorea glustria.

Cichorea sativa.



is. Officinis cichorea hortensis. Germanis zame Wegweiss. Gallis Cichorea, ou endive: huius graecis & scorioia.

Latibus erraticus. Λιχόριον ἄγριον, ἀγρίος, Graecis. Germanis W. gweiss, W. gwert. Gallis cichorea sauvage, dicitur.

Cichorium, Romana lingua intybum olus dicitur. Gallis lib 2. comp. phar. part. Id uero et reliqua sicciora sunt, foliorum magnitudine, & cultu distincta, facultatibus parum discrepant, nisi quod agrestia satius sunt sicciora & amariora. Omnia enim haec subanara sunt, subfrigida, modice astringentia: & in his multa humiditas miscita siccitatem extinguit. Ob haec hepatis intemperiem caliditatem solam, & cum corruptis humoribus & ichoribus maxime iuuane refrigerando, roborando, sinam eius partem & gibbam obstructione liberando, praesertim si cum uino albo bibatur, & cum melle, sic enim illi humores per urinas pellunt: nec frigidum multum laedunt, ut alia permulta, quae sunt frigida humida sine amaritudine & astringente: sumuntur succo, decocto, puluere. libro octauo composi. pharmaco- rum part.

## Condrilla.

## Caput CXXVI.

Condrilla, quam aliqui cichorion, alij serin appellant, caulem, flores & folia habet cichorio similia. qua ex causa nonnulli syluestris intubi speciem esse pronuntiarunt: uerum tenuior tora est, in cuius ramulis, gummi mastiches si- millimum, tuberculo fabae inueniri solet. quod cum myrrha tritum, & linteo ap- positum, instar oliuae, foeminarum menses trahit. Tusa cum radicibus herba, adico- cto melle, diuiditur in pastillos, qui nitro admisti uirilgines emaculant. Gummi



## DIOSCORIDIS

Condrilla.



inordinatos pilos replicat. quod item tenera radix efficit, si intincta succo acis, pilis admoveatur. contra uiperas in uino pota proficit. Succus decoctus, in uino, aut per sese potus, aluum sistit. Aliud habetur condrillæ genus, folium ferens oblongum, circumrosum, humi sparsum, caule succo madentem laetico: radice tenui, rotunda, leui uegeta, flauescente, succosa. Cuius & caulis & folia concoquendi uim habent. succus incommodos palpebrarum pilos reficit. Nasceitur in lætis & cultis.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Chondrilla omnis, & sonchus, & Hieraceum utriusque serios species etiam Galeno putata, & serios ac cicborij nomine etiam ab alijs dignata (licet Chondrillam non seri iungat, lib. 2. Alimentorū) sui forma & temperatura sunt affines, sic uiribus minimè discrepant. Ob id ea tanquam congeneria iungit, & hoc loco Dioscorides. Prointubo autē uulgus Enduiam re & nomine corrumpit, ut pro seri scariolam, quasi seriolum dicere tentauit.

### Cucurbita. Cap. CXXVII.

Cucurbita esui apta. cruda trita illitu tumores & abscessus mitigat. Ramenta eius infantibus contra capitis ardorem, quam syriam uocant, in fincipite illinuntur. oculorum inflammationes podagrasque refrigerat. Succus ramantis tufis per se, aut cum rosaceo infusus, aurium doloribus auxiliatur adustiones cutis in ardenti febre illitu adiuuat. totius feruefactæ & expressæ succus, cum melle exiguo & nitro potus, aluum leniter resoluit. Vinum in cucurbita recentē excauata infusum, si mistum sub diuo teneatur, potu alui laxigabit.

Rotunda.

Longa.



### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci Colocynthis. Latine Cucurbita. Officinis genuinum nomen seruauit.  
Germanis Kürbis. Gallis Courge dicitur.

Cucurbita



Cucurbitarum duo genera sunt, longæ & rotundæ. Cibus quo longiores tenuioresq; eo gratiores, & ob id salubriores quæ p̄dendo crevere, minimumq; seminis tales habent, duricia eius in cibus gratiâ terminante. Rotundæ uisum præbent. Sed de his plura apud Plin. lib. 19. De utribus eius dicit Paulus Aegnetæ, quod refrigerat, & humectat, atq; aluum mouet, sed paulû alimenti præbet. Chrysippus Medicus, ut lib. 20. refert Plinius, declamabat eo in cibus. Sed omnium consensu stomacho utilissime iudicantur, & interaneorum uesciarum exulcerationibus.

## Cucumer satiuus.

## Caput CXXXVIII.

Citrullus.



Cucumis satiuus.



Cucumis marinus.



Pepo.



Satius cucumis aluo & stomacho perquam utilis habetur. refrigerat, qui corruptionem non sentit. uesciæ prodest. olfactu reuocat, quos animus liquerit. Semē modicē urinam mouet. cum lacte aut passo, uesciæ exulcerationibus subuenit. Illita cum uino folia, morsus canum sanant: & epinyctidas, cum melle. Peponis caro in cibus, urinam cit. inflammationes oculorum illita sedat. Ramenta eius contra adustionem infantium, quam syriafin uocant, fincipiti imponuntur. fronti admota, oculorum fluxiones auertunt. Succus cum



Melo pepo.



semine, adiecta farina, siccatus in sole cogitur in sinigmata, quæ faciem repurgant, & nitorem afferunt. Radix sicca, & ex hydromelite pota drachmæ pondere, uomitionem mouet. Si quisquam moderatè secundum cœnā uomere cupiat, geminis obolis sit contentus, sanat. quoq; illita cum melle ulcera concreta in modum faui, quæ ceria uocant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Cucumeres qui priuatim & conuenienter hoc nomine uocantur. Germanis dicuntur Gorken & gorken Cucumeren.

Græcis σίτρον & πεπο.

Gallis Cucumbre.

Sunt enim & alij in cucumerum censu, suis etiam priuatim designati nominibus, ueluti citrini, et citrulli nunc dicti; item pepones & melones. De quibus omnibus Plinius lib. 19. cap. 5. Quod autem de cucumere, & cucurbita dicit crescere qua cogamur forma, id etiam ab Hippocrate in libro de seminis genitalis natura prius proditum est, ubi ait: Si quis cucumim cucurbitamue iam deflorescentem, matrisq; pediculo adherescentem in paruo uasculo mittat, cauo uasis illius par similisue redditur. Si uero quis eundem in maiore uasculo mittat, quod probè cucumim cucurbitamue capiat (quod tamen maius quam cucumis natura non sit) cucumis par similisq; cauo huius etiam uasis erit. Nam cum crescit cauo illius uasis heret, & innititur. Cunctaq; uascentia semper fermè crescunt, & habent, quemadmodum ea quis cogat &c. Cucumeru generis sunt, ut diximus, tum pepones, tum melones, figura tantum & quantitate differentes. Pepones quidem uocantur, cum magnitudine excessere, aut in longitudinem processerunt. In rotundum uero effigati & mali formam referentes, melopepones ex pepone & malo facto nomine, dicuntur, & hi sunt quos in Martio Mense Melones uocat Palladius, quo nomine etiam nunc in cōmuni usu sunt. &c.

## Lactuca.



cogat &c. Cucumeru generis sunt, ut diximus, tum pepones, tum melones, figura tantum & quantitate differentes. Pepones quidem uocantur, cum magnitudine excessere, aut in longitudinem processerunt. In rotundum uero effigati & mali formam referentes, melopepones ex pepone & malo facto nomine, dicuntur, & hi sunt quos in Martio Mense Melones uocat Palladius, quo nomine etiam nunc in cōmuni usu sunt. &c.

## Lactuca. Caput CXXIX.

Lactuca sesilis, uel excaulis.



**L**actuca satiuæ quibus natura refrigeratrix inest, stomacho gratæ habentur. somnū cōciliant, aluū emolliunt. lacteo cant. uerū decoctæ magis alūt. stomachicis illotas esse prodest. Epotum semen, assiduas libidinum imaginationes in somno compefcit, & ueneri refragatur. p̄c̄uero frequentiores in cibo, claritati oculorum officiant. inflammationibus & ighibus facris opitulantur. muria condiuntur. cum in caulem exierunt, uim quandam nanciscuntur succo lactis subiectis. NO.



*Lactuca latecaulis.*



*Lactuca* Græcis θηϊδαξ, ἢ θηϊδακινῃ, uulgo apud recentiores  
Græcos μαϊούδιον.  
Officinis *lactuca* latino nomine.  
Germanis *Lactich*.

Gallis *Lactue* nuncupatur. nota herba est.

*Lactuca* dicta, ut in Ianuario mense tradit Palladius, quod d abundantia  
lactis exuberet. Huius diuersas ob causas, diuerso etiam tempore ua-  
rius fuit usus. Antiquitus enim quod ebrietati oblucretur, eamque  
prohiberet, in cenæ fine sumebatur: post uero ad conciliandam appe-  
tentiam in cenæ principio sumi coepta est, unde illud Martialis extat.

Claudere quæ cenæ *lactuca* solebat auorum,

Dic mihi cur nostras inchoat illa dapes?

Hæc nunc quoque æstiuo tempore plurimum utimur in acetarijs.

Herba multum salubris, Vnde Columella in carmine.

Iamque salutaripropere*lactuca* sapore,

Tristitia quæ relictet longi fastidia morbi.

Et Paulus Aegineta libro i. ipsam optimi succi sanguinem facere testatur. Plura eius genera à Co-  
lumella & Plinio traduntur: est enim *Lactuca*, cuius diminutiuum *lactucula*, quam Græcis θηϊδακινῃ  
num uocari supra diximus. Germanis Gemeiner *lactich*. Gallis *lactues* appellata est & *Lactuca*  
*latecaulis* apud Theophrastum ἡ πλεονεκαυλος θηϊδακινῃ appellata & tertium genus. *Lactuca*  
sefalis quam eandem sequenti existimo, scilicet *Lactucam* excaulem, Græcis θηϊδαξ ἀκαυλος. Py-  
thagoricis ἐορόλιον, mulieribus ἀσολίς. Germanis *Krauslactich* mit Eßspin / & *Rémischet lat*  
*ich* dicta &c.

Est quidam natura omnibus refrigeratrix, ideo æstate gratæ, à stomacho fastidium auferunt, ci-  
bi appetentiam faciunt. Celsus somno aptam dicit &c.

*Endiua* Officinarum.

*Lactuca syluestris.*

Cap. CXXX.



*Syluestris lactuca* satiuæ similis est, sed longior  
caulis, & candidiora folia, graciliora, & aspe-  
riora. amaro gustu est, & uiribus aliquantum pa-  
uieri similis. unde lacteum eius succum aliqui me-  
conio permiscuerunt. Aquam per aluum elicit, po-  
tus in aceto mulso succus ad duos obolos. argema ca-  
liginemque repurgat. contra adustiones efficaciter il-  
linitur cum lacte mulierum. in summa, somnum al-  
licit. doloris leuamentum præstat. menses trahit. con-  
tra scorpionum & phalangiorum ictus bibitur. Se-  
men, non aliter quam satiuæ, libidinum imaginatio-  
nes in somno amolitur, ac uenerem arcet. Succus ad ea  
dem ualeat, sed uiribus infirmior. Reponitur in fictili  
nouo lac eius, antea, ut in alijs liquaminibus moris est,  
insolatum.

NOMINA ET EX-  
PLICATIO.

*Lactuca syluestris*, nisi sensus me deficiat, est quæ passim ab offi-  
cinis nostris nunc *Endiua* dicitur.

Germanis *Endiuen*.

Gallis uero *Endiue*, cum in aruis nascatur sponte, & uinearum  
limitibus, folio cum adoleuit per oras aculeato, dorso spiculis in-  
horrescente, quasi prona carinæ parte echinata, supina leniore,



nonnunquam cum infenuit laciniis serratis, caulibus bicubitali proceritate consurgentibus, birtis, flore luteo, ucco candido, amaro, acri, ideo linguam & saliquantulum uellicante. huius uti satina semen occulitur lenigine. Decoctum huius saccharo conditum officina, cuius tantus in crebuit usus, ut nulla non fere sintira ualeudine à medicis prebeat, utinam tam salubriter quam in seide.

## Gingidium.

## Cap. CXXXI.



**G**ingidium, aliqui lepidion, in Syria & Cilicia plerumque nascitur. herbula syluestri pastinacæ similis, tenuior, & amarior: radice parua, candicante, subamara. Olus hoc crudum, coctum, conditumue estur magna stomachi utilitate. urinam cit. decoctum ex uino potum uescæ prodest.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis γγγίδιον. Latini & officinis Cerefoliū pro cherephyllon.

Germanis Beibeltraut, Fäffel.

Gallis Cersueil dicitur.

Paulus A. gnetæ gingidion scandie simile fecit, asringente uel & amaritudine non pauca præditum, stomacho non ingratis: quare ieiunia in diu & commode satiat ex aceto, non tamen magnopere nutrit. Galenus, quod nonnihil amaroris & asringentie gustu re præcitet, refrigerante uel mul & calfaciente donatum ceteri, & ab utraque siccandi naturam sortiri.

## Scandix.

## Cap. CXXXII.

**S**candix, syluestre olus est amarum, si bacre. quod crudum coctumue manditur stomacho & uentri uile. decoctum in potu, uescæ, renibus, & iecinori confert.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Σκάνδιξ.

Latine Scandix.

Officina imprudenter inter dauci generare ferunt. Germanis wild mozen dicitur.

Notissima olim omnibus Græcis scandix fuit, quæ toties Athenis in theatrorum & plausum excitauit. Vulgare & sua sponte nascens incultis plerumque locis olus est, plebis eibus in quotidianum pulmentum, folijs gingidij uel anthrisci, sed maioribus & minus odoratis. gustu acris, subamaroque, nec aliter huius facies ab authoribus designatur.

## Caucalis.

## Cap. CXXXIII.



**C**aucalis, quam alij syluestre daucum uocant. cauliculo est dodrantali, aut maiore, subhirsuto: folijs apio similibus, fœniculi modo per extrema multifidis, hispidisque: candida in cacumine umbellæ, suauiter olente. Crudum coctumue olus estur. urinam mouet.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè καυκάλις.

Latine Caucalis.

Officinis pimpinella hirsuta.

Germanis rauherb. benel dicitur.

Huius



Caucalis.

Eruca sativa.

Sylvestris.



Ruiva herba radix foris nigra, intus alba est, cum rumpitur, caeruleum succum resudans. Galenus apud aliquos sylvestre daucum tradit nominatq; non à similitudine, ut aliqui credunt, quasi rudimentum quoddam esset nascentis dauci, sed quod & gustu & uiribus id imitetur. cum, ut inquit, modo eodem exaltat faciat, exiccat & propellat urinam.

Eruca.

Cap. CXXXIII.

**C**Ruda eruca uenere largiore cibo concitat. semen eodem effectu prodest. Curinam cit. concoctioni prodest, aluo perquam commodata. semine ad cōdimenta utuntur. quod, uti in longum tempus asseruetur, adiecto lacte aut aceto, digerunt in pastillos. Gignitur etiamnum sylvestris eruca, maxime in Iberia, quæ occidentem spectat, cuius semine pro sinapi incolæ utuntur. urinā uehementius pellit. multò satiuā acrior.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Eruca Germanis dicitur weisser senff samē. Gallis Roquette. herba est in acetarijs & ciborum usu non infrequens: cui, ut libro 20. testatur Plinius, in condiendis obsonijs tanta est suauitas, ut Greci ἐρωκίον appellauerint. Hæc uenorem impendio excitat, unde Martialis: Et uenere re uocans eruca morantem. Et Columella: Excitet ut Veneri tardos eruca maritos. quod idem Dioscorides hoc loco testatur. Ad hæc Plinius libro 19. ait: Eruca præcipue frigorum contemptrix diuersa est quæ lactuca nature. Cōcitatrix Veneris, iccirco iungitur illi serè in cibis, ut nimio frigori par seruior immixtus temperamentū æquet. Et Marcellus Medicus libro de medicamentis experimen-  
talis cap. 33. inquit. Ad abundantiam seminis præparandam erucam decoctam bibat, quoties quisq;  
inopia







## Barbula hirci.

## Cap. CXXXVII.

**B**arbula hirci, quæ ab alijs comeuocatur, breui est caule: folijs croci: radice longa, dulci, supina\*, magno super caulem calyce, è cuius summo semen nigrum dependet, unde nomen inditum est. herba esui apta est. \* Hæc dictio alijs deest

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Barba hirci, uel barbula hircina, Græcis τριχόρως γὰρ appellatur Germani Hock's bart & Ganchbrott appellant, hac facie representatur à Theophrasto: Radix longa, dulcis, folium croci longius, caule puro, super quem calix latus & barbula, quæ summo uertice incana & proluxa funditur, unde nomen accepit. Nascitur sua sponte in aruis & pratis, & magna ex parte luteo flore nitet.

## Ornithogalum.

## Caput CXXXVIII.

**O**rnithogalum cauliculus est tener, candicans, tenuis, sesquipedalis\*, tribus aut quatuor in cacumine mollibus adnatis: à quibus flores prodeant, foris herbacei, & cum hiantes se pandunt, lactei uisuntur: inter quos dissectum, chryos modo, capitulum emicat. Coquitur cum pane, ut melanthium. radix bulbo, cruda & cocta manditur. \* Semipedalis Plin.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Nunquam ullum offendere potuimus herbarium, qui nobis hanc demonstraret, incognita sere nunc omnibus etiam doctis, cum tamen plerisque tractibus ornithogalo frumentarij agri seateant. A rusticis passim eruitur rotunda radice, bulbaceam speciem præ se ferente, è cuius medio cauliculus exit, tribus aut quatuor adnatis appendicibus in cacumine, folijs in capillamenta quadam extenuatis, floribus exiguus, foris herbaceis, intus lacteo colore candicantibus, qui simul coaceruari uelut panicula quadam compacti callo squanatum coherentes in pilulam extuberant, nucamentum pincæ nucis representantem Suebionensis Gallie ager churlos. Germani uero rustici erdt nuss & Fockel Fern, uocare consueuerunt, pueris non incognitos, qui propter astantes cum aratro terra proscinditur, aut in latiores porcas sulcatur, erutos uomere colligunt, multo castaneis suauiores in cibis, quibus & crudis & incineribus incostis rura uescuntur, odore iucundissimo eos mirum in modum commendante, nam tuberibus similes sere nascuntur. quare tanquam germanitate, uel quadam cognatione iunctos, Dioscorides hoc loco, his copulauit.

## Tubera.

## Caput CXXXIX.

**T**ubera rotundæ radices sunt, sine folijs, flauescentes, uere fodiuntur, cruda & cocta eduntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ὄρυζα. Latine Tubera:

Officinis Cerui boleti.

Germanis Hirtz brunst.

Gallis Truffle appellantur.

Inter ea quæ sine radice proueniunt tubera quoque à Theophrasto numerantur. Credidit antiquitas cognationem illis aliquam cum cælo esse, nec nisi tonante Ioue nasci, ut in satyra Anqas poetamouit dicens: Et faciem optata tonitrua cœnas.


Licet non fieri sed ostendi, & quasi signari tonitru tubera aliqui dicerent, pulsu aëris ex eo, quemadmodum sole etiam fit, dehiscente terra qua parte ea latent, fallique qui aliter credant, non secus quam si opinentur imbrem cochleas facere non illeceas humore ex sepibus & macerijs

producere. Fuerunt tamen qui secretiores nature causas altius repetentes contra ostenderent, dicerentque ingruentibus in terram à superiore cœli parte tonitru, fulgetris, fulminibus, uentis, & imbribus, quæ omnia plerumque simul fiunt, diuersos rerum succos contrarijs temperamenta fieri in his quæ ad generationem mouentur, non secus quam rorem dulciorem pecori facere herbam. Cœlestem autem arcum subiectam omnem sibi terræ materiam diuino halitu implere dicunt &c. Adde duorum genera esse, harenosa, dentibus immita, & altera syncera. Distinguntur & colore rufo, nigro, quæ & intus candido de Tuberibus his sunt Martialis uersiculi hij.

Rumpimus altricem tenero de uertice terram.

Tubera, boletis poma secunda sumus.

Smilax





Smilax horten-  
sensis.Herba  
Medica.

## Smilax hortensis. Cap. CXL.

**H**ortensis smilax, frutex, cuius semen à nonnullis lobia uocatur. folia habet hederæ, molliora tamen: tenues caules, & capreolos uicinis fruticibus circumuolutos, qui tantum adoleſcunt, ut topiarias scenas repræſentare uideantur. ſiliquas ſcenigræci proferunt, longiores & roſiores. in quibus ſemina renuſumilia, ſed inæquali colore recluduntur: quæ quadam ex parte fulueſcunt. Siliqua cocta cum ſemine in oleribus, aſparagi modo, eſtur. urinã ciet, & tumultuoſa ſomnia facit.

NOMINA ET EX-  
PLICATIO.

Græcè Σμίλαξ ἡρτωνία.

Latine Smilax hortensis.

Officinis phæoli.

Germanis Welſch bonen.

Gallis Faſeolës. & ſibes painctes.

Smilacis hortensiane fructum, lobia quæ ſi ſiliquulæ appellantur, & alio nomine dolichon uocant. alius à phælo quem uilem appellat Vergilius: quare errant qui eundem putant, & uiciniſſe annotarunt uiri doctiſſimi, & in medicæ rei erroribus emendandis per celebres. Ioannes Manardus Ferrariensis, et Hieronymus Tragus.

## Medica Cap. CXLI.

**M**edica cum recenter prodijt, folijs & caule trifolio prætenſi ſimilis eſt. procedens uerò folia contrahit, caules ædens trifolij, & ſiliquas corniculorum modo intortas, in quibus ſemen lentis magnitudine dependet. Id ſiccatum, iucundi ſaporis gratia, conditaneo ſali admixcet. uiride, quibus refrigeratione opus eſt, illius ſuffragatur. Herba tota pro gramine utuntur qui pecora alunt.

NOMINA ET EX-  
PLICATIO.

Eximia eſt ad ſaginanda iumenta, ad ſtercorandos agros, herba Medica, quæ cum ſecuritur decennium durat, per annum quater & interdum ſexies dimittitur.

Mirum eſt quanta de hac herba ſcribuntur. attamen in Germania, niſi fallor, paucis cognita, cum tamen aliunde ſemen afferri, & eodem



Et eodem modo, quo apud Gallos, apud Sequanos, & apud alios coli possit.  
Dicitur autem vulgo focum Burgundiese. Germanicè Burgundisch hew & Burgundisch gras, nempe quod à Burgundionibus semen aliò perlatum est, sicut ex Media in Græciam.  
unde Græcis Μαδύνη τὸ αἶμα.

Gallis uerò foin de Bourgoigne, & fenacia dicitur.

## Aphaca.

## Ca. CXLII.



**A**phaca in aruis nascitur, altior lente, tenuibus folijs. siliquas lenticula maiores fert, in quibus terna quaternae semina nigra, lente minora, continentur. quæ adstringendi uim habent. quare torrefacta, stomachi aluique fluxiones sistunt, si fresa lentis more decoquantur.

## NOMINA ET EXPLICATIONIO.

Græcis ἀφάκη.

Latinis Aphace.

Officinis incognitum.

Germanis wilde wicken & fegels wicken.

Gallis de la ueste, uelut alij scribunt, ueste sauage.

Hic notandum non idem esse Theophrasto quod Dioscoridi hoc loco constat aphacen, qui modò leguminum generi, modò inter olea connumerat, in quiens primo ab æquinoctio statim imbris germinare, & aculeis armari, folijs syluestri morio similibus &c. Sed Theophrasto, quod eundem inuenierim, aphaca non siliquatur, cum flos euascat in pappos, in quibus magna ex parte semen occultatur: nec folium eius ad lenticula, sed magis eichorij frondem aspirat. Hieraciarum primum genus à Theophrasto nomen aphaces putatur intelligi.

## Porrum capitatum.

## Ca. CLXIII.




**C**apitatum porrum inflationem facit. noxium succum creat. tumultuosum somnum parit. urinam ciet. aluo accommodatur. extenuat. oculorum aciem hebetat. menses pellit. sed ledit exulceratam uesicam, renesque. cum ptisana uerò coctum, esu pectoris uitia extrahit. coma eius in aqua maris & aceto cocta, in defensionibus, ad præclusiones uulnæ & duritias, utilis habetur. Porrum bis aqua mutata coctum, tum frigida maceratum, dulcescit, & multò minus inflat. semen acrius est, & quandam adstrictoriam uim habet. quare succus cum aceto, addito thure aut manna, sanguinis profluvia sistit, maximè si naribus erumpat. uenerem itimulat. contra omnia thoracis uitia tabemque, pro delictu efficax est. arteriam esu purgat. sed si assidue estur, uisus obscuritatem inducit. stomacho aduersatur. Succus ex melle potus, aut illitus, contra bestiarum morsus auxilio est. ipsum quoque cum aceto aut thuris pelline, lacte aut rosaceo, utiliter aurium doloribus & sonitui instillatur. Varos tollunt folia illita cum uuarhois, qua ad obsonia utuntur. epinyctidi medentur. crustas ex sale illita rumpunt. ueteres sanguinis reiectiones cohibent, si binis



Ampeloprason.

Sectium.



drachmis & æquali baccarum myrti ponderibantur. Ampeloprasum stomacho magis aduersatur, & plus porro exalfacit. urina nam & menses uehementius ciet, id contra serpentium morsus esse conuenit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Porrorum duo genera sunt, unū sectium à secādo dictū, quod frondem illi suprà terrā emittente auferre solent. Cui nuper, ut lib. 19. scribit Plinius, auctoritatem dedit princeps Nero, uocis gratia ex oleo æstiuis mensibus diebus singulis, nihilque aliud, ac ne pare quidem uescendo. Alterum est capitatum uocatum, eo quod in caput crescat. Ambo eiusdem naturæ, nisi quod capitato efficacior uis est. Si quis autem Sotione, ut refert Constantinus, cumurum præsumat ante porros, non olebit.

Porrum capitatum, quod & aricinum, dicitur & porrus Latine.

Græcè πρᾶσον κεφαλωτόν.

Germanice Lauch.

Gallicè uerò ung porreau.

Porru sectium, Tareninum, Germanis schmit lauch dicitur.

Porrum agreste Græci ἀγρὸν πρᾶσον. uulgaria seale porru. Germani Wild lauch. Sundaist knobloch.

Galli porree de chien, uocant.

Ampeloprason caule prostrato bicubitali, folijs porraceis, sed angustioribus, flore candido, radice bulbosa. Prouenit in uinetis, unde à natalibus ampeloprason, quasi uitiginem porrum nominatur. Galenus agreste porrum esse tradit, siccioreque natura donatum, uti syluestria omnia maiore satiuis acrimonio placent.

Cepa.

Cap. CXLIII.


**C**Epa longa acrior est quàm rotunda, item flaua quàm candida, & sicca quàm uiridis, & cruda quàm cocta, aut sale condita. Omnes tamen mordent. flatu gignunt. appetentiam inuitant. sitim mouent, & extenuant. fastidium pariunt, & expurgant. aluo utiles sunt. ex detractis purgamentis in oleum coniectæ, hæmorrhoidas, reliquosque excretionum exitus referant, subdita probalanis. Succus cum melle illitus, oculorum hebetudinibus, argemis, nubeculis, & incipientibus suffusionibus auxiliatur. angina eodem perunguntur. suppressos menses pellit. caput purgat, naribus infusus, canis moribus cum aceto, ruta, & melle illinitur. cum aceto autem perunctas in sole uitilignes sanat. & cum pari spodio, scabras lippitudines sedat. uaros cum sale reoprimat. contra calcæamentorum attritus, cum gallinaceo adipe utilis est. citæ aluo prodest. in auribus sonitum ac grauitatem emendat. ad purulentas aureis, & eliciens



dam carum



## Cepa capitata.



dam earundem aquam, ualet. alopeciae earum succo perfricantur, qui celerius quam alcyonium pilos euocat. largiore cibo cepa capitis dolores ci- et, coctaque uehementius urinam pellit. eos lethar- gicos efficit, qui ualitudinibus aduersis, ea etiam cocta, plus aequo uescantur. elixa, & cum passis ui- uis & fico illita, tubercula concoquit, & celerius me rumpit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Ceparum plura genera. Omnibus odor lachrymosus, unde & lachrymosam uocat in de cultu hortorum Columella.

Apud nos, inquit, libro decimonono Plinius, duo prima genera: Vnum condimentarium, quod illi gelhyon, nostri pallica- nam.

Germani Prysa lauch/Asch lauch.

Galli porreta & ciueta, appellant.

Alterum capitatum. Graecis κρόμμυον, Germanis Zwie- bel/bollen/Syballon. Gallis uero oignon dictum.


Optima autem quae rotundissima. item rufa acrior quam candida: sicca quam uiridis, & cruda, quam cocta: sicca quam condita. Gethium penè sine capite est, ceruicistamum longè, & ideo totum in fronde, saepiusque refecatur ut porrum.

## Allium. Cap. CXLV.

**A**llium quoddam satium atque hortensi- um habetur. quod in Aegypto, singulari, ut porrum, capite constat, dulce, in purpureum uer- gens, paruum. reliqua uerò magna & candida, ex pluribus coagmentatur nucleis, quos aglitas, id est, spicas, Graeci nominant. aliud est syluestre, quod ophioscorodon, id est, anguinum, uocant. Vis alliacris est. excalfacit. mordet. excernit. al- uum turbat. inflationes facit. stomachum exiccat, sitim gignit. flatum permouet. summam corporis cutem exulcerat. aciem oculorum esu hebetat. Eisdem effectus praebet anguinum, quod & cla- \*Forfan a- phoscorodon dicitur. latus uentris tinea in ci- phoscorodō bo sumptum abigit. urinas detrahit. contra uipe- rarum ictus, & priuati haemorrhoi, prodest, ita ut non aliud magis, si cum uino iugiter assumatur. aut tritum in eodem ebibatur. contra rabioforum morsus & illitu & cibo ualet. magnæ & allio uti- litates contra aquarum mutationes. uocem clari- ficat. ueterem tussim crudum coctum uel lenit. po- tum autem cum origani decocto, pediculos & len- des enecat. cremati cinis illitus sugillationibus cum melle, & alopecij cum nardino unguine, me- detur. eruptiones papularum cum oleo et sale sanat. uirilgines, lichenas, lentigines, ulcera capitis ma- nantia, lepras, & furfures, cum melle eximit. cum thure & teda decoctum, dentium dolorem leuat, si in ore contineatur. contra uenenatos muris ara- nei morsus, cum ficulneis frondibus & cumino il-



Allium sylvestre.



Allium ursinum.



linitus. Feruefactæ comæ ius, scēminarum defessionibus additum, menses & secundos partus extrahit. Allium eiusdem gratia suffitur. factū ex eo et nigra oliua intritum, quod myrtoton vocat, esu citurinum. ora uenarum patefacit. hydropicis utile. Scorodoprasum magnitudine porrū æquat, qualitātū porri & allij particeps. unde promiscuas sibi uires ex utroque uendicauit, effectus allij & porri præbens, inefficacius tamen. coctum, porrimodo, dulcescit & in olerum uicem transit.

## NOMINA ET EXPLICATIONIO.

Græcè Ξόποςλον.

Latine & Officinis allium.

Germanis Knoblauch.

Gallis Aulou aulx.

Tria in uniuersum allij genera sunt. Primum hortense & satium: alterū sylvestre, quod Columella, lib. xij. rei rusticæ ulpicum uocat, alij aphroscorodon, id allio satiuo grandius. Theophrastus libro plantarū octauo Cyprium uocat: eius etiam meminit idem Theophrast. lib. 7. Plantarum. Dioscorides, agreste uocat ophioscorodon, quasi anguinum. hodie ursinum cognominant Germanis wilde Knobloch dicitur. Tertium genus idem sylvestre, scorodoprasum appellatur Latinis. Græcis Ξόποςλον περσόν. Officinis allium porrum Germanis aber Knoblauch, quod & gustu & odore porri & allij conditio nes possidet, quasi olitorum diligentia in unum olera duo ueluti monstrum aliquod coauerint. Communes utriusque uires ascribisse sibi tradit Galenus, cui Paulus astipulatur &c.

Sinapi.

Cap. CXLVI.

**S**inapi hortense, aliqui napium uocant. Eligi debet adustum, ualde rufum, non co madeat, caesium colore. siquidem recens id genus, tempestiuum habetur. Ad calfaciendum, extenuandum, extrahendum, efficax est. ad eliciendam capitis pituitam manditur. contra præduros tonsillarum tumores, ac ueterem callosamq; arteriæ scabritiem, succus ex aqua & melle conuenienter gargarizatur. sternutamenta ciet, tritum & naribus admotum. comitialibus quoq; auxiliatur. scēminas uulua strangulatu oppressas excitat. lethargicis, derafo capite, illinitur. cum ficis admistū, donec rubescat locus, & ad coxendiciū cruciatus impositū, ad lienes, & omne genus dolores confert, cum permutandæ ualitudinis causa, ex **alio uitia extrahenda sunt. alopecis illitum medetur. faciem purgat. sugillata** cum melle, adipe aut cerato rapit. feræ impetigines & lepra, eo cum aceto perunguntur. contra febriū cir cuitus aridum bibitur, aut potui, polentæ modo, inspargitur. extrahentibus emplastris, scabiemq; extenuantibus, utiliter admisce ri solet. tritum, grauitati aurium & sonitui, cum fico impositum prodest. Succus ad hec.



ad hebetudines oculorum & genarum scabritias magna utilitate illinitur. ex-  
pressus recenti semine succus, in sole ficcatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci Ζινναρι. Latine Sinapi. Officinis latinū nomen seruauit. Germanis Senff/mostardt.  
Gallis Moustarde, blanche, noire, seneue.

Duo genera sinapi obseruauimus, primum genus rapitiā frondem exprimit, alterum in Eruce so-  
lū laciniatur, caulibus ramosis, sepe bicubitalibus, flore luteo, nonnunquam albic ante, siliquis tereti-  
bus, duro semine uesto pulloq; refertis, acerrimi saporis, igneiq; effectus. Sinapi calfacit, siccatur ordi-  
ne quarto. Sinapi Alexandrinum laudatur lib. 9. comp. ph. part. Quomodo Sinapi ad salgamarū sit  
mul et conuiuiorum usum conficeretur, olim utrumq; docet nos Columella li. 12. per totum caput. 55.  
Est et sua sinapis Confectio Palladio in Iulio mense. Varro rei Rusticæ lib. 1. cap. 59. ait: Seruare et ap-  
pocificam Sinapi putant.

Sinapi.

Sinapi alterum genus.

Nasturtium.



Nasturtium.

## Cap. CXLVII.

**N**asturtium optimum constat esse Babylonicū. Omnium semen est acre, ex-  
calfacit. stomacho aduersatur, aluum turbat. tineas excutit. lienem immi-  
nuit. partus exanimat. menses cit. uenerem stimulat. sinapis & eruce simile intel-  
ligitur. lepras & impetigines absterget. illitum cum melle, lienem extenuat. fas-  
nos expurgat. pulmonum uitia extrahit, sorbitionibus incoctum. serpentium uer-  
menis potum resistit, atq; eas suffitu fugat. capillorū defluuia cohibet. carbuncu-  
los ad suppurationem perducit, & rumpit. coxendicibus cum polenta coimmo-  
dè ex aceto illinitur. tumores collectionesq; discutit. emittit furunculos, illitum  
cum muria. Herbe ad omnia eadem effectus licet minor.



# DIOSCORIDIS

*Thlaspi minus.*

*Nasturtium sylvestre.*

## EXPLICATIO.

Græcè καπολαύου.  
Latine Nasturtium.  
Officinis Latinum nomen retinuit.

Germanis Bressen.  
Gallis Alenois, cresson de iardin.

Nasturtium autem appellatum est. Varrone & Plinio testibus, à naribus torquendis, quod odore & seminis acrimonia sicut nutimenta prouocet.

Nasturtium duarum generum est, unum satiuum, quo nunc communiter aestiuo tempore cum lactuca, oleo, aceto & sale coctum inchoamus.

Alterum est agreste de quo copiosius tractauimus capite ultim. libr. 5.

Nasturtium quinto die nascitur, herbis reliquis succum admittit multa salis frigora contemnit. Quare tam hyeme quam æstate facillime prorumpit.

Quod etsi nobilius quam ut representari deponat, uolimus propter generum



rum differentias eius picturam subiungere quam Dioscorides omisit. Nasturtium coliculis asurgit sesquipedalibus, longe statim ab radice minorum foliorum pediculo, floribus albis, semine per ramos latera copioso, firmo, calyculis orbicularibus contento, acris sapore, pinguis iusculis in coctum magnam acrimoniae partem deponit. Natura ei omnino sinapis crucisq; similis est.

## Thlaspi.

## Cap. CXLXIII.

**T**hlaspi, herbula angustis folijs, digitali longitudine, in terram uersis, suppin guibus, in cacumine diuisis: binum dodrantum cauliculo, tenui, nō sine adnascens ramis: fructu circa ipsum totum, ab extremo in latius se pandente: semine nasturtij in cluso, lenticulæ uasis effigie, nisi quod infringitur, unde nomen accepit. flos albicat. Nascitur in semitis, & sepibus, fossisq; Semen asperi gustus, ex calfaciens. bilem utrinq; extrahit. potum acetabuli mensura prodest ischiadicis infusum. sanguinem potu educit. internas suppurationes rumpit. menses cie. sed partus enecat. alterum thlaspi tradit Crateuas, quod aliqui Persicon sinapi uocant, latis folijs, radicibus magnis, utile ischiadicorum in fusione.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Thlaspi, sicut alijs placet thlaspidū Græcis θλάστι. Officinis incognita. Duorum generum est primum Thlaspi maius folijs latioribus, Germanis baren senff appellatur, alterum Thlaspi minus, folijs angustioribus constat. Germanice besem traut dicitur. Est et tertium genus Thlaspios. Dioscoridi θλάστι τερον. Officinis Raphanus maior. Latine sinapi persicū. Germanice mörrettich. Gallis rassic dictum. huic fuchsius falso attribuit nomen armoracie. Galenus Thlaspios genera ita distinguit lib. 3. simpl. ubi inquit, Thlaspi duplex, Cappadocium, nigrius, non exacte rotundum, sed quadam sui parte uelat



Thlaspi minus.



Sinapi Persicum.



uelut *ἑρδασα* habet, id est, infra alium  
exiguum, unde illi nomen, multo ma-  
ius, & praestantius quam secundum,  
quod etiam in Cappadocia & Creta  
& ubique nascitur *ἑρδασα*, id est,  
ex pallido flauum, rotundum, admo-  
dum exiguum. Creticum tamen ple-  
rig, immiscet theriaca.

## Draba. Cap. CXLIX.

**D**raba herba ad cubiti al-  
titudinem assurgit, te-  
nues spargens ramos, & ex u-  
troque latere folia ceu lepidij,  
sed molliora, & candidiora. in  
ca cumine uero sambuci umbel-  
lam gerit, candidos\* flores ha-  
bentem. Herba hæc cum prisa  
na coquitur, in Cappadocia  
maximè semen aridum pro pi-  
pere obsonijs admiscetur.

NOMINA ET  
explicatio.

Græcè *ἀράβη*, *ἀράβις*.

Drabe, dabra, Arabis. Apud Herba-  
rios quosdam orientale nasturtium, uel  
Babylonicum.

Officinis & Germanis incognita. Gallis *Drava*, *draue*, Cuminum sylvestre.  
Inuenitur in uoualibus, & saepe cultis cubitali proceritate, ramoso surculorum prouentu, folijs leo-  
pidij, incanis sed mollioribus, umbella sambuci, flore candido, semine frere feniculi.

## Irio.

## Caput CL.



**E**rysimum, Latini irionem uocant, iuxta  
urbes, rudera, hortosq; nascitur, folijs  
erucæ sylvestris: cauliculis in lori modum  
lentis & obsequiosis: floribus luteis, siliquis  
in cacumine gracilibus, ut scenograeco,  
corniculatis: semine nasturtij, exiguo, uren-  
tis gustus. Contra thoracis fluxiones effica-  
x est, & si purulenta extussiuntur. regio morbo  
& coxendicibus prodest. contra uenena in  
delinctu cum melle datur. illinitur ex aqua  
aut melle utiliter cæcis, carcinomatis, paroti-  
dibus, duritijs mammarum, & testium inflam-  
mationibus. in totum extenuat, & calfa cit-  
mitius multo ad clysteres fiet, si aqua mada-  
scat atq; torreatur, uel linteo illigatum pinsa  
farina oblitum perassetur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis *ἐρύσιμον* herba.

Latinis Erysimum & Irio.

Officinis & Germanis proprio nomine destituitur.

Gallis *Erucageratina*, *tortela*.

Italis nobilis eruca dicitur.



Puchius falsò, & errore plus quam manifesto, pro uerbena mare Trionem depinxit in suis rhapso-  
dijs de stirpium uiribus, & natura.

Hæc pomeria, aggeres oppidorum, & rudera uirent, gustu mirum in modum erucam imitatur, quo-  
re syluestris eruca, licet perperam, quibusdam est dicta. &c.

## Piper.

## Caput CLI.



**P**iper in India nasci, breui arbore traditur. quæ in-  
ter initia, prælongū fructum, ueluti siliquam pro-  
mit, quod longum piper est, habet intus aliquid  
tenui milio simile, quod tandem in perfectum piper e-  
uadit. id autem suis temporibus dehiscens, pandensq;  
fese, racemos emittit, grana ferētes qualia uidemus. Ea  
acerba candidum piper faciunt, aptum ocularibus re-  
medijs, antidotis & medicaminibus quæ contra uene-  
nata parātur: theriaca uocant. Longum uerò uehemen-  
tius mordet. & quoniā prius quā ematurescat decer-  
ptum est, subamarum relinquitur, antidotis & theria-  
cis medicaminibus expetitur. Nigrum uerò, utpote  
quod tempestiua maturitate collectum sit, odoratum  
esse constat, candido suauius, acrius, & ori gratius, nec  
non ad condimenta utilius. Sed candidum, & adhuc in  
acerbum uergens, antè dictis infirmius est. Eligiopor-

tet grauissimum, plenum, nigrū, sine multis rugis, recens. minimè furfurolum. In-  
ueniuntur etiamnum in genere nigri semina nutrimento defecta, cassa, inania,  
minimiq; ponderis, quod uocant brasina. uis omnium excalfacit. urinā ciet. con-  
coquit. extrahit, discutit, absterget caliginem quæ oculis obuersatur. piper fe-  
moris auxiliatur. partus extrahit. conceptum adimere creditur, statim à con-  
cubitu suppositum. tussi, omnibusq; pectoris uitij, siue eclegmate, siue potu, suc-  
currit. anginae eo & melle conuenienter perunguntur. potum cum recentibus lau-  
ri folijs, tormina discutit. cum uua passa \* manducatum, pituitam à capite elicit.  
intinctus esculentorum additum. strumas cum pice discutit. uutiligines ex nitro  
emaculat. Fictili nouo, ut lenticula, motum torretur. Non est huius arboris radix  
gingiber, ut aliqui existimauere, sicuti paulò pōst ostendemus. Namq; piperis ra-  
dix costo similis est. ora gustantium accendit. saliuam ciet. hæc lienem reprimi-  
tum aceto illita, aut pota, caput etiam purgat, māducata cum semine pedicularis  
herbæ, quam staphidem agriam uocant.

\* Alias, sta-  
phide agria.

φάρμακον, non  
φάρμακον.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Galen. lib. 3. Piperis fructus inter initia ceu siliqua coryli nucamento similis, longum piper est Græcis πείπερος  
simpl. phar. μακρόν. Officinis ut reliqua piperis genera nomen genuinum retinuit. Germanis Langer pfeffer. Gal-  
lib. 2. antid. lis poiure long dicitur: humidius, ob id cito perforatur, ut zingiber, & tardè, sed diu linguam mor-  
det, ut arus. Hæc siliqua postea in grana milij æmula racematim degenerat, quæ aucta & siccata,  
sed adhuc tanquam omphacodea, & immatura, piper album, Græcis ὀπείπερος λευκόν: Germanis  
Weiß pfeffer, Gallis poiure blanc appellatum, fiunt, nigro δριμύτερον, id est, acrius: nam nigrum  
Gal. lib. 2. quod Græcis ὀπείπερος μέλαν, Germanis Schwarz pfeffer. Gallis poiure noir dicitur, iam superassa-  
antid. & li. tum sole, & super siccātū est, tamen utrunq; ualenter calfacit & siccāt, & maximè digerit. Itē quod in  
4. sanitatis agreste, rufum, cœli & soli iniquitate degenerauit. Germanis Leicht pfeffer / Taub pfeffer. Gallis  
tuendæ. poiure legier dictum. Piper longum adulteratum seculo Galeni erat duplex, efferebatur alterum ex  
Li. 1. antid. Alexandria, alterum erat germen herbæ cuiusdam, quale est nobis coryli aut betulæ nucamentum. Pi-  
Lib. 9. com. per longum nec sit pertusum, nec adulteratum: album sit maximum, plenissimum, grauecitidem & ni-  
phar. part. grum, neq; id sit rugosum. Piper nigrum maius est alio pipere, & corticem habet tenuiorem & minus  
rugosum. Piper album stomacho est accommodatius, & acrius nigro. Piper omne coctionē sumptum  
iuvat



inuat, sed album supra duo reliqua genera stomachum roborat, lib. 4. sanat. tuenda. Radicibus piperis maxime proceris etiam nititur Andromachus apud Galenum lib. 7. comp. ph. part. His vires co-  
 sosimiles tribuit lib. 8. simpl. Piper longum & rotundum bis scribitur lib. 10. comp. phar. part. ut id  
 album, & nigrum comprehendat.

Piper longum, id est, commune Astuario in antidoto podagrica,  
 diapnoia, & diatriopipereon, est nigrum: nam longum & album  
 ibidem commemorat.

### Gingiberis. Caput CLII.

**G**ingiberis sui generis planta est, in Troglodytica  
 Arabia magna ex parte nascens. qua uirente, ad  
 multa, perinde atq; nos ruta, utitur, & primis potibus  
 & edulij admiscet. Huius radices, cyperi modo, par-  
 uæ sunt, candicantes, & odorata, atq; piper sapore imi-  
 tantur. Eligi debent quæ teredines non nouerunt. A  
 multis tamen ob id condiuntur, quod celeriter cariem  
 sentiant. Fistilibus in Italiam asportantur. Gingiberis  
 cibo conueniens est, & cum condimento assumitur, ex-  
 calfactoriam uim & excoquentem habet. aluum leni-  
 ter emollit. stomacho utilis est. efficax aduersus ea quæ  
 oculis caliginē offundūt. in antidota addi solet. in lum-  
 ma, piperis uirib. respondet.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Zingiber Galeno & alijs cum indigenis frē dicitur, qñs  
 busdam zinziber, alijs yyy, iBep, Germanis Ingber. Gallis  
 Gignebre, Lusitanis gengibre: radix est herbe granatilis mo-  
 do serpentis, candicans, odorata, piperis sapore, & uiribus,  
 nisi quod tardius calfacit, sed diutius, uti longum piper. ob  
 humiditatem excrementosam: cuius occasione utrunq; teredē  
 nibus facile tentatur. Condiendū recens omnino est, nunq̃ ue-  
 tus, impostorū more. Mittitur ex Arabia & Troglodytica.

### Hydropiper. Cap. CLIII.

**H**Ydropiper apud aquas nascitur, quæ sta-  
 gnant, aut pigro lapsu repunt. caulem edit  
 geniculatum, prædurum, multis alis concavum:  
 folia menthæ, maiora, molliora, candidioraq;  
 gustu piperis, acri, citra tamē ullam odoris gra-  
 tiam: fructum acrem, in furculis paruis, propē  
 folia racematim cohærentem. Folia cum semine  
 illita tumores ueteresq; duritias discutiunt. su-  
 gillata delent. quæ postquā inauerunt, tusa pro-  
 pipere in obsonijs admiscetur. Radix parua,  
 nullius in medicina momenti.

### NOMINA ET EXPLICATIO.


Græcè ὕδρωπεντρον. Latine hydropiper.

Officinis incognitum.

Germanis Wasser pfeffer, Wassertraut.

Hydropiper herba est in aquosis nascent, ramusculis ad  
 folijs Mentha similis, maior tamē, gustu acerrima, ut piper,  
 perexigua semina ut piper, singulis folijs ferens. Calida quia  
 dem est, non tamen accedens piperi, quæ recens illita sugilla-  
 ta, ac durities sanat. Hanc nonnulli condimentis piperis loco  
 addebant apud ueteres.

Psarmica





## Ptarmica.

## Cap. CLIII.

**P**tarmica frutex est, furculos habens paruos, multos & rotundos, abrotano non dissimiles: & circa eos folia oleæ; longa, multa, & in cacumine capitulum, uti anthemidis; paruum, rotundum, quod suo acri odore sternutamentum excitat, unde nomē accepit. Folia cū floribus illita, fugillationes rapiunt, flores sternutamenta efficacissimè mouent. Nascitur in montibus & petrosis.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Ptarmice, Ruellio uidetur ea quam uulgo in Gallia Draconis hortensis, aut ut ipse scribit pyretbri, glaucis appellatio nouit; reclamantibus tamen notis omnibus, ut huius pictura cum ptarmice descriptione collata clare ostendit. Ptarmicen uerò alio nomine quam Germanico haud noui. uocat Witter Frant; quod locosis mulieribus presenti remedio succurrat, in montium summis nascitur, flore aurco chamemali, folijs oleæ quidem non dissimilibus, ut Dioscorides scribit: multo tamen latioribus, ut in letioribus nata ad plantaginem quandoq; accedant. Sternutamenta tum folijs; tum flore uel solo odoratu cētur. radix fibras multas facit, ruffas, sapore xinziberis, muliebribus uitijs aride in poluem trita b. b. uenit. Sum qui à sternutandi numero, apud ueteres diptarmicem uocant.

## Radicula seu lanaria herba.

## Cap. CLV.



**S**truthium herba uulgo nota; qua purgandis lanis utuntur; qui eas eluunt. Huius radix est acris, urinā ciet, prodest tussi, iecinorosis, orthopnœæ ex melle sumpta, cochlearis mensura. aluum soluit. eadem cum panace & capparis radice calculos frangit, & cum urina exturbat. duritiem lienis absomit. menses imposita trahit. partus efficaciter enecat cum polenta autē & aceto illita, lepras tollit, tubercula discutit. cū farina hordeacea, & uino decocta, miscetur & malagmatis, & ocularibus collyrijs, claritatis causa sternutamenta mouet. per os purgat, trita cum melle, & naribus infusa.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci στρουθίου. Latini Struthium, struthios, radientiam, laurium. Officina saponariam, herbam fullonū, Co. dist.

Germani Seyffentrent. Galli l'herbe à fullon uocant.


Hec herba olim notissima fuit, ideo à Dioscoride minime depicta relinquitur: spinosa herba est, caule lanuginoso, folio oleæ, floret aestate, grata aspectu, uerum sine odore: semen ei nullum, radix magniteres, oblonga, quæ conciditur purgandis lanis.

## Cyclaminus.

## Cap. CLVI

**C**yclaminus folia habet hederæ, purpurea, uaria, in quibus suscipitque albicant maculæ: caule nudo, quaternos digitos æquante: floribus in eo purpureis, rosarum effigie: radice nigra, & aliquantum lata, ut rapum uideri possit. Quæ cum hydromelite pota, pituitam aquamq; detrahit. menses potu appositum ciet. Tradunt, si prægnans radicem transgrediatur, abortum fieri. partum appensa accelerat. contra uenena, præsertim leporis marini, ex uino bibitur. illita contra serpentium ictus, remedio est. immista uino inebriat. regium morbum discutit, tribus draclimis pota, cum passo aut diluto mulso. Sed oportet eum qui ebibit, multis uestibus contentum, loco calido, & à perfrictionibus tuto recumbere, quod facilius exudet. eiecti autem sudores felici colore inueniuntur. Succus eius ad purgandum caput, naribus infunditur. ad deiicienda quoq; alui excrementa, in uellere sedi subicitur illito umbilico & imo uentre coxarum tenus, aluum emollit & abortum efficit. suffusionibus, & retusæ oculorum aciei, oblitus cum melle succus prodest. medica





medicamentis abortum inferentibus admi-  
scetur. succus cum aceto illitus, pro ciduam  
sedem restituit. Exprimitur tusa radice suc-  
cus, & ad mellis crassitudinē decoquitur. Ra-  
dix cutem purgat. eruptiones papularū re-  
primit. uulnerib. ex aceto per se aut cū mel-  
le medetur. lienem absumit. uitia cutis in fa-  
cie, & alopecias emendat. eius decocto luxa-  
ta, podagras, & capitis ulcuscula, pernio-  
nesq; foueri congruū est. ipsaq; in oleo uete-  
re feruefacta, illito oleo, ulcera ad cicatricē  
perducit. Cauata radix oleo expletur, & ci-  
nere feruenti imponitur, adiecto interdum  
Tyrrenicæ ceræ momento, ut strigmenti  
crassitudinem unguentū contrahat, cum pri-  
mis utile pernionibus. Radix, scillæ modo,  
concisa reponitur. Narrant ad amatoria as-  
sumi cōtusam, & in pastillos diuisam. Nasci-  
tur in umbrosis, maximē sub arboribus.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè κυκλάμιον. Latine Cyclaminus.

Officinis Cyclamen corrupte, et panis porcinus, uel  
terre panis & Arthanita. Germanis Schweibrott/  
Schweinbrott / Erdapsel. Gallis pain de porceau.

Cyclamini radix tota uehementer medicamento sa,  
magis eiusdem succus: incidit, terget, ora uenarum ape-  
rit, trahit, digerit, illitus abdomini uentrem purgat, per nares trahit, cum melle illitus suffusus iuuat;  
cirrhos mire emendat. menses & sudores mouet, ut Dioscorides fufius tradit.

## Altera Cyclaminus.

## Cap. CLVII.



Est & altera cyclaminus, quam cissanthemon  
aut cissophyllon uocāt: folijs hederæ, sed mi-  
noribus: geniculatis caulibus, crassiq; circa uici-  
nas arbores, capreolorum modo, se uoluentibus;  
flore candido, odorato: acinis hederæ mollibus,  
lenti gustus, aliquantulum acris: radice superua-  
cua. nascitur in asperis. Huius acini, drachmæ u-  
nius pondere poti, cum uini albi cyathis duo-  
bus, quadraginta diebus, lienem per urinam &  
aluum absumunt, ad orthopnœam bibitur. reli-  
quias à partu purgat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè κυκλάμιον ἄλτερον.

Latine Cyclaminus altera.

Officinæ Sigillum Mariæ.

Germanis hyndts krautt / Je lenger je lieber.

Gallis Le seau nostre dame.

Hæc altera cyclaminos à paucis nūc cognoscitur; omnesq;  
medici, eruditorum pace dixerim, hanc ignorāt cyclaminum;

sed superior pictura eam deliniat, quam nunc herbarij, uel officina, Sigillum Mariæ uocant, quando-  
quidem huic nihil refragari, sed omnia consensire declarabimus. Sigillum Mariæ folia fert hederacea,  
minora tantum, caules crassos, uel ut Plinius inquit, superuacaneos, geniculatos, uicinis arboribus ca-  
preolorum ritu se conuoluentes, flores candidos adatosq; corymbis hederæ, sed mollibus, aliquan-  
tulum



tum acribus, gustu lentis & glutinosi, radice nullius usus in medicinis, præ longa tamen & in miram  
molem extuberante, & cetera. Radicem tamen, utpote medicinae superuacua, non explicuit Dio-  
scorides.

## Dracunculus.

## Caput CLVIII.



Dracunculus palustris:



**D**racunculus folio cōstat hederaceo, magno, candidis notis insigni: caule re-  
cto, bicubitali, uersicolore, maculis resperso purpureis, ita ut anguem pla-  
nè referat, baculi crassitudine, fructus summo caule racematim cohæret, colore  
primum herbageo, & cum ematurit, croceo, gustu feruens, mordaxq;. radice ali-  
quantulum rotunda, bulbosa, arò non absimili, tenui obducta cortice. Nasctur  
in sepibus umbrosis. Seminis succus cum oleo instillatus, aurium dolorem miti-  
gat. naribus etiam ex lana impositus, polypum absumit. carcinomata illitu sistit.  
triginta eius grana, si in posca bibantur, abortus inferunt. odorem aiunt postea  
quam flaccidi flores emarcuerunt, conceptus adhuc teneros enecare. Radix ex cal-  
facit. orthopnceis, ruptis, uulsi, tussi, destillationibus auxiliatur. humores pecto-  
ris ex creatu faciles reddit, siue cocta tostaq; cum melle, aut per sese edatur, siue fa-  
rina eius ex melle delingatur, urinam pellit. uenerem excitat, cū uino pota. pha-  
gedænas ulcerum, & quæ ca coëthe uocantur, trita cum melle & bryonia alba, ex-  
purgat, & ad cicatricem perducit. collyria ex ipsa ad fistulas & eijciendos partus  
feri solent. qui radice suas manus perfricauerunt, à uiperis feriri negātur. illita ex  
aceto, uirilignes emaculat. folia recentibus uulneribus, linamentorum uice, con-  
cōuenienter imponūtur decocta in uino pernionibus apposuisse prodest. caseus  
& oculorum caligines cōuenit. Radix cruda coctaue, ad sanorum usus. pro olere  
recipitur



recipitur, in Gymnesijs infulis, quæ Baleares uocantur, coctam radicem cum melle multo, in conuiuijs placentarum loco offerunt. Radix messibus effoditur, locum frustratim conciditur, & lino traiecta siccat in umbra, & ita reconditur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Ἀρκεντρία μεγάλη Latine dracunculus maior.

Officinis, serpentaria maior, & draguntea, corrupte. Germanis, Grofsnater wurz.

Gallis serpentine dicitur.

Iam in hortis studiose colitur Dracunculus, ludentis naturæ miraculum, & Draconis rudimenta in stirpibus facere condiscens. Simplici caule attollitur, binum cubitum alto, leui glabroq; baculi crassitudine, uersicoloribus anguium maculis uariegate, purpureis etiam intercurrentibus lituris, ita ut planè serpentis habitum coloremq; mentiri uideatur. in uertice remoto folia procedunt, sena septenarius, crassiore pediculo digitorum ritu propendens, candicantibus respersa notis, rumicis figura, specie tamen hederasæa longiore. E foliato scapi fastigio uagantur quædam foris herbacea prostrata, cubitalis ferè longitudinis, in mucronem sensim turbinata, uelut erupturi partus inuolucrum, quæ cum dehiscent se pandit, purpureum cornu in acumen fastigiatum demonstrat. Ea seminis incremento distensa disiluit in rimas, & tandem elanguescens flaccescit, subarescensq; perit refracto cornu, cuius imam partem racemosus fructus ambit, acinis prima pubertate uirentibus, & per adolescentiam coccæ rubore rutilantibus, gustu mordaci, odore uiroso, quandiu lanthnum illud exerit cornu: radice bulbo sat tenui libro uestita, nascitur in opacis sepibus.

Plinio Dracunculus triplici effigie demonstratus est, folijs betæ non sine thyrsos, flore purpureo, hic ut inquit, est similis Aro, huius picturam supra dedimus. Alij radice longa ueluti signata articulos atque demonstrare, tribus omnino cauliculis. Tertia demonstratio fuit folio maiore quam cornu, radice arundinacea. totidem affirmat geniculata nodis, quos haberet acinos, totidemq; esse folia.

## Arum.

## Cap. CLIX.



Aron, apud Syros lupha uocatum, folia emittit dracunculi, sed longiora, & paucioribus distincta maculis: eadem superpurpureum, dōdrantalē, pistilli specie. ē quo <sup>\* Alij, nullis:</sup> croceum semen exit. radice dracunculi alba, quæ decocta estur, utpote cum minus acris sit. Folia ad esum condiuntur, & arida per se decocta, manduntur. Radix, semen & folia, dracunculi uires habent, priuatim radix ex fimo bubulo podagris illinitur, & dracunculi more reponitur, in totum, ob mitiorem eius acrimoniam in cibum expetitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO

Grecè Ἀρόν. Latine Arum.

Officinis pes uituli, serpentaria minor, sacerdotis uirile.

Larus: Germanicè Pfaffen pindt.

Gallis Vid de chien.

Ari radix ut dracunculi, ex fimo bubulo podagris illinitur, eiusdem cortex spleneticos iuuat & hydropicos, calida sicca primo ordine: incidit, tenuat, terget medio <sup>Gal. lib. 9. ph. part.</sup> eriter.

## Arisarum.

## Cap. CLX.

Arisarum exigua herbula est, huius radix oleæ magnitudinem implet, lenè gè maioris quàm Aron acrimonie. Vnde illitum nomas sistit, fiunt colyria ex ea, ad fistulas efficacia, illitui radicis genitale animalis cuiuscunque in pernicio magitur.



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Arisaron pusilla est herba, radix ei olea tuberculo, acrior gustu quam Aron. Galenus longe minus aro tradidit, radicem magnitudine oliuam equare, multo maioris acrimoniae. Paulus multo minus esse sentit, sed acrius, radicem oliuam magnitudinem referre. Aris Plinio similis aro nascitur, minor tantum minoribusque folijs. Est etiamnum aris herba Hippocrati, sed qua sit facie non explicat. Herent igitur utriusque consimiles redduntur. Plinius siquidem eisdem omnino notis arum quibus alij arisarum repredem uocabulis in unum coalescentibus, arisaron dici coepit. Cum igitur nec uiribus, nec reliqua facie dissideant, unam et eandem esse fatendum est.

## Hastula regia.

## Cap. CLXI.



**H**astula regia uulgaris notitia est, folijs maioris portis; caule leui, ferente in cacumine florem, quem anthericon appellant, radices subiacent oblongae, rotundae, glandibus similes, gustu acres, quae exalfaciunt. urinas & menses epotae ciunt. lateris doloribus, ruptis, conuulsis & tussibus, drachmae potere potae ex uino, medentur. Ea uero uomitiones adiuuat, ludicri tali magnitudine comanducata. a serpente demorsis datur aptissime, uerum trium drachmarum potere. folijs, floribus & radice ex uino. morsus illinire oportet. item ulcera sordida & decapascencia. mammarum quoque & testium inflammationes, tubercula, furunculorum decoctis in foce uini bulbis. recentibus inflammationibus ex polenta auxiliatur. Radicis succus adiecto uetere uino dulci, myrrha & croco decoquitur, fitque perquam utile oculis medicamentum. ad purueltas aureis per se, cum thure, melle, uino & myrrha tritus, prodest. in contrariam aurem infusus, dentium dolorem mitigat. Cinis e radice illitus, alopecias ad pilum reducit. Oleum in excauatis radicibus igni decoctum illitu exulceratis perionibus & ambustis igni, conducit surditati instillatum in aurem, auxiliatur. Candida utiligenem, linteis antea praefricam in sole, illita radix emendat. Semen floresque in uino poti, scolopendreae & scorpionum uenenis mirum in modum resistunt, aluum purgant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Graece Ασφodelος.

Officinis asfodillus, uel Aphrodili.

Germanis incognita.

Latinis hastula regia, asphodelus, albucom.

Gallis des asphrodiles, phrodilorum.

Asphodelus Latinis hastula regia dictus, a caule insigni ex multis radicibus bulbosis emicante, quibus agnatis abundat, interdum ad 80. Radice utilis est tergentes: eadem uis a magis calfacit, siccatur, tenuatur, digerit. Nunc porcorum cibum est, olim etiam hominum, muribus uenenum. Autumno legitur cum ualet plurimum.

Fuchsius pro asphodelo aliam herbam falso depingit, qua haecenus officinis non sine graui errore usi sunt.

## Bulbus esculentus.

## Cap. CLXII.



**E**sculentus bulbus uulgo cognitus, a nobis effur. Stomacho & aluo utilis, rufus, qui & ex Africa deferitur. amarus uero & scillinus, stomacho aptior est, et decoctionem adiuuat.



aurat. Bulbi omnes acrimoniam habent, exal faciant, uenerem stimulant. lin-  
guam confillasq; exasperant, multum alimenti præbent, carnes creant, infla-  
nem pariunt, luxatis fractis, articulorum doloribus efficaciter illinuntur. Spicula  
extrahunt, gangrænas & podagras ex melle aut per sese, hydropicorum tumo-  
res, & canum morsus cum melle & piperis polline illiti cohibent, sudores compe-  
scunt, stomachi dolores mitigant, furfures & ulcera quæ in capite manant, cum  
costo nitro abstergunt, fugillata uarosque per se aut ex oui luteo, & lentigines  
cum melle uel aceto, emendant, fractis auriculis unguibusq; ex polenta medetur  
isdem calidis cineribus torrefacti, tollunt ficus: item cum cinere e mænarum ca-  
pitibus, impositi, cremati uerò & cum aleyonio multo, uitia cutis in facie, atrasq; ci-  
catrices in sole illiti, emaculant, faciunt adrupta, si cum aceto cocti edantur. Sed  
copiosiore eorum cibo abstinendum, quoniam nervos tentant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Bulbi priuatim uocati cepis similes sunt, & cepe dicuntur album sine tunicis. Sumq; plura eorum  
genera, ut lib. 8. de plantis tradit Theophrastus. Siquidem magnitudine, colore, figura, et sapore dis-  
cunt. Aliubi enim adeo dulces nascuntur, ut per se sine condimento alio eduntur, quales in Taurica  
Chersoneso sunt. Cato megareses tanquam omnium optimos celebrat, uenerem mare simulant, unde et  
salaces à Martiali uocantur in libro Xeniorum ait.

Cum sit anus coniunx, cum sine tibi mortua membra,  
Nihil aliud bulbis quam satir esse potes.

Colanella item de iisdem in hortulo ait.

Quæq; uiros acuiunt, armanq; puellas,  
Iam Megaris ueniane gent alia femina bulbi.

Quibus & M. Varro ad stipulatur, tradens ob id bulbos sponis in legitimis nuptijs olim apponi so-  
litos. Et Paulus Aegnetæ lib. 1. Bulbi inquit, feminis abundantiam faciunt, & uenerem stimulat, frequen-  
tior cibis eorum. Hæc uerò de priuatim dictis bulbis. Nam generaliter bulbi uocantur, quorum radi-  
ces sub terra sic crescunt, ut ad nouam quotannis sobolem decerpi aliqua pars possit ut lilio, croco &  
similibus: item & alie rotundæ, tunicate radices, & esui dantur radices & olera capitata, uti Celsus  
Sisyrinchion. innuit libro 8. Vbi de alimentorum facultatibus agens, dicit: in media ma-  
teria numerari debere ex oleribus ea, quorum radices uel bulbos assumi  
mus. Et mox post. Ex oleribus ualentior rapa, napiq; & omnes bulbi,  
in quibus cepe quoq; & allium numero, quàm pastinacæ, uel quæ specia-  
liter radícula dicitur.

Theoph. lib.  
8. de Plantis.

Aegnetæ li. 1.

Corn. Celsus  
lib. 2.



Bulbus uomitorius. Cap. CLXIII.



herbam alio pro syluestri bulbo depingit, uidelicet Sisyrinchion Theo-  
phrast.

**B**ulbus quem uomito-  
rioriū uocant, folia ha-  
bet lætiora multo & longio-  
ra quàm bulbus esculentus:  
radicem similem, cortice ni-  
gro. Radix mansa, aut de  
coctum eius potum, uesige-  
nalis medetur, uomitiones  
mouet.

## EXPLICATIO.

Bulbus quem uomitorium uo-  
cant ab effectu, multo longior est,  
quàm esculentus. Facilius aliam



## Scilla.

## Cap. CLXIII.



Pancration.



Gal. li. simp.  
Lib. i. antid.  
Plin. cap. 9.  
lib. 20.

**S**cilla uim acrematq; feruentem habet. affatam ad multa uiliorem esse constat. Polline ad crustam subacta, aut luto oblita, in clibanum conijcitur, aut ca bonibus obruitur, donec obducens crusta sufficienter intosta fuerit. quæ exempta, si non emollescat, alio polline simili, aut luto circumlinitur, & eadem quæ prius, fiunt. nam quæ ita non affatur, interaneis maximè noxia est. Torretur item in oïla, indito operculo, quæ in furnum demittatur. Summi etiam solet, quod maximè est medium, direptis uiuotenus tunicis: quod frustatim confectum coquitur, mutata sæpius aqua, donec ipsa nec amaritudinem nec acrimoniam habeat, traiectaq; lino frusta siccantur in umbra, ita ut ne ulla quidem parte se contingant. his scillæ segminibus ad oleum, uinum, aut acetum scillinum utimur. Ad rimas pedum, interna pars crudæ scillæ in oleo seruata, aut cæ resina liquefacta, imponitur, decocta in aceto demorsis & uipera cataplasma est, ad singulas affæ partis adiectis cionis tosti salis, cochlear unum aut alterum damus ieiunis, ad emolliendam aluum, in potu autem & odoratis medicaminibus, & quibus urinam ciere uolumus, hydropicisq; & stomachicis, quibus innatat cibis, regio morbo, torminibus, in tussi uetere, suspiriosis, & ore reijcientibus tres obolos, in delinctu ex melle sumplisse satis est. coquitur cum melle, & estur eorundem gratia, maximè ut coctionem adiuuet. strigmenta per aluum extrahit. cocta & similisumpta modo, eosdem præbet effectus, sed cauenda scillæ usus his qui intestinū sentiunt ulcus, ad pensiles uerrucas et per niones, tosta efficaciter illinitur. Tritū semen, & carica aut melle deuorata, aluum emollit. Scilla tota in limine ianuæ suspensa, malū medicamenti noxam arceat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis Σκίλλα, ἡ.

Latinis & officinis, retinuit nomen priscum.

Germanis Meuszwibel, merzwibel.

Gallis squilla oygnon marin dicitur.

Scilla calida ordine secundo, admodum incidit: affam aut elixam sumi præstat, ut uirium eius uehementia exoluatur. Legenda ex terra quando folia eius & caules omnino aruerunt. Scille alba segmenta seu taleola cultello ligneo se parata, lino traiecta, modicis interuallis ne se contingant, in umbra siccanentur diebus 60 ut ex his fiat acetum scillites. Alba est masculus, cæq; utilior quàm femina nigra.

## De Pancratio.

## Cap. CLXV.

**P**ancratium, quod aliqui scillam appellant, radice est magni bulbi, subrufo colore aut suppurpureo, gustu amaro ac feruente: folijs lilij, sed longioribus. Scillæ uires & præparatio nem habet, eodemque pondere in morbis efficaciter assumitur, cui tamen mitior quàm scillæ facultas inest. Radicis succus cum



cum erui farina digeritur in pastillos, qui hydropicis splenicisq; cum hydromelite commodissime dantur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *πανκράτιον*. Latine *Pancratium*. Officinis *Scylla minor*.

Germanis *Kleine merzwibel*, oder *meuß zwibel*.

Gallis *Seille bastarde*.

Omnes *scylla* representat effectus, sed longe censetur inualidior. Paulus et specie et uiribus comparauit *scylla*.

## Capparis.

## Cap. CLXVI.



**C**APPARIS aculeatus frutex est, qui in terra stratus, magis in orbem euagat. spinas, ut rubus, habet, in hami modum aduncas: folia mali cotoneæ rotunda: fructum oleæ similem, qui cum dehiscens panditur, florem candidum

promittit: quo excusso, non nihil glâdis oblongæ figura inuenitur, quod apertum grana acinis puniceorum similia ostendit, parua, rubicunda, radices lignosas spargit, grandes numerosasq;. Tenui solo, alperisq; locis, in insulis & iuxta rudera nascitur, caulis & fructus, cibi gratia condiuntur, aluum turbat, stomacho aduersatur sitim gignit, cocta tamen stomacho quàm cruda utilior est, fructus drachmis duabus in uino potus, quadraginta diebus, lienem absumit, & urinam cruentamq; excrementum emittit. bibitur utilissimè in coxarum doloribus, & neruorum resolutione, item ruptis et conuulsis, menses ei

et, caput purgat. Dentium dolorem sedat semen ex aceto decoctum, colluto inde ore. Aridus radice cortex ad eadem proficit, ulcera omnia uetera, & sordida, & quo calluerunt, expurgat, lienosis cum farina hordei illinitur, dente demorsa, dolori eius auxilium datur, cum aceto trita, utiligines albas absterget. Radix foliaq; in trita, strumas ac duritias discutunt. Aurium uermiculos infusus succus enecat. Aphrica, & præsertim Marmarica capparitis, uehementer inflat. Apula uonitus facit, & quæ à Libyco, & quæ rubro mari defertur, mirum in modum acris est: si quidem in ore pustulas excitat, gingiuasq; offendet, exest, quare in cibis non ab re damnatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *καππάρις*. Latine *Capparis*. Inturis.

Officinis genuinum nomen seruauit. Germanis *Kappren*. Gallis *Cappres* dicitur.

Capparitis radice cortex amarus, acer, acerbus, terget, purgat, tenuat, incidit, digerit, constringit, lienes in duratos & ischiadas, ob hæc magnificè iuuat, sumptus, uel cum idoneis remedijs admotus.

Eadem radix etiam hepatica est, lib. 8. comp. ph. part. & splenetica, libro 9. eiusdem. Flos eius simp. & lib. 9. comp. ph. part.

Fructus aceto & sale conditus primis mensis ad excitandam appetentiam sumitur, licet stomacho noxius, siticulosus, aluum turbare Dioscoridi dicatur.

Folia capparitis trita cum mero pota splenetica, lib. 9. comp. ph. part. ad mota cum uirium uehementium obtundatibus cheradas sanat.




## Lepidium.

Hybeus.



Lepidium.



## Cap. CLXVII.

**L**epidium aliqui gingi-  
um uocāt, herbula uul-  
go nota, muria cum lacte ser-  
uatur. Vis foliorum acris et  
exulcerans. quapropter in  
schiadice trita, praesentissi-  
mum est auxiliū, si cum he-  
lenij radice, quarta parte ho-  
tae, illinatur. Lienosis simili  
modo prodest. lepras exi-  
mit. Radix appensa collo-  
dore dētium liberare exi-  
stimatur.

## EXPLICATIO.

Vide annotationes in capitulo  
ultimum lib. 1.

## Ranunculum

## Cap. CLXIII.

**C**omplura ranunculi  
genera, uis tamen o-  
mnibus una, acris, & uehe-  
menter exulcerans. Nam  
unum coriandri folijs con-  
stat, latioribus, subalbidis,  
pinguib. flore luteo, inter-  
dum purpureo; caule gracili,  
cubito alto; radice alba,

exigua, amaraq; multis capillamentis, hellebori modo  
fibrata. nascitur in limitibus humidis. Alterum lanugi-  
nosius, longiori caule, pluribus foliorum incisuris, ple-  
runq; in Sardinia proueniens; quam acerrimū, quod

syluestre apium appellant. Tertium minimum, odore graui, flore aureo. Quar-  
tum huic simile, flore lacteo.

Folia, flores & cauliculi recentes, illitu exulcerant, & crustas non sine dolore  
gignunt, quare ungues scabros extricant, scabiem eximunt. Stigmata delent, for-  
micantes uerrucas, & pēfiles, alopeciasq; paulisper illita, tollunt. tepente decoctio  
perniones fouentur. sicca radix, tritaq; sternumenta ciet naribus admota, denti-  
um dolorem appensa leuat, ipsos tamen frangit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Plura ranunculi genera Dioscoridi demonstrantur. Primum genus ranunculi, Graecis Βαργεγύον.  
Officinis pes corui, ulceraria, sclerata.

Germanice Gleißblümen / biennender hanensfuß.

Gallis bacini dicitur. Cuius pictura sequitur. Florem habet luteam, interdum purpuream, qui  
nihil tamen uisus non est.

Hoc genus ranunculi duplex est, unum folijs candidis, alterum nigrioribus, in medio quasi sangui-  
neis guttis, rubeis maculis respersis, utrunq; genus cultis incultis nascitur.

Ranunc.



Secundum genus.

Tertium genus.

Primum genus Ranunculi.



Secundum genus.



Quartum genus.



Quintum genus.



P 4



Ranunculi genus alterum, lanuginosius, pluribus foliorum incisuris, altiore caule, gustus acerrimi, quod priuatim apium rusticum cognominant. Herbarij hodie apium rufus. Historici Sardoem aut Sardoniam herbam uocant, à Sardinia. Strabo ex hac herbatoxici genus Hispanos conficisse uiminita hausta cuius urgence ui maiore citra dolorem ipsi sibi mortem consciscabant. Græci Βατράχιον ἔρπον. Officinis falsò hydropiper, Germanis, Stoschpfeffer, dicitur, quia palustribus locis prouenit cuius pictura supra est.

Ranunculus tertius minimus est, graui odore, flore aureo, plerisque locis conspicitur, Græcis Βατράχιον ἔρπον, χεῖρον ἄνθος. Officinis incognita. Germanis Gelbwaldt henle, dicitur, nascitur enim in syluis.

Ranunculus quartus, superiori similis, flore tantum lacteo, Græcis Βατράχιον τετραγρον. Officinis quoque incognita, Germanis, Weisse waldt henle.

Est & Ranunculi genus quoddam à radice figura uerticillum Apuleium uocauit, ob globosam rotunditatem. Minor alijs est, et radice floris inuerso. Gustus omnium acerrimi. Sunt qui lauream uocat. Græcis Εἰδός Βατράχιον εἰς αὐτὸν ἄχρον σφονδύλιον ὀμώει. Officinis pes columbinus & uesicaria Germanis Geshälter gleipblümle, Alemer Hanen süß, Tauben süß.

Est & alterum ranunculi genus hortense, quod ob pulchritudinem in coronamenta uenit. Effecit enim cultura, ut qui in limitibus simplici foliorum compage flores oriantur, structi quodam densoque foliorum stipatu nunc in hortis colluceant. Germanis Geshälter Hanen süß, Gallis Bacilles doublets appellatum.

Omnes Ranunculi species urendi nascuntur licentiam, pustulasque uelut ignis excitant, non cornu uis ualde acris & uehementer exulcerant, intra corpus sumi non debent.

### Anemone.

### Cap. CLXIX.



**D**VO Anemones genera, unum syluestre, alterum incultis nascens. Cuius multæ species, una phœniceū florem profert, altera candicantem, aut lacteum, aut purpureum: harum folia coriandro similis, tenuioribus, prope terram diuisuris: caules lanuginosi, tenues, in quibus flores ut papaueris, & in medio capitula nigra, aut cœrulea: radix oleæ magnitudine, aut amplius paulò grandescit, fermeque geniculis quibusdam cingitur. Syluestri amplitudo prorsus maior, latiorque folia, & duriora: oblongius caput: flore puniceo, tenuibus & multis radicum capillamentis. Acrior est quæ nigra habet folia. Vis utriusque acris, ea de causa succus haribus infusus, purgat caput, commanducata radix

pruritum trahit, decocta in passo & illita, medetur oculorum inflammationibus. cicatrices eorundem & hebetudines emendat, sordida ulcera abstergit, folia et caules si cum præsana decocti edantur, copiam lactis præbent, menstrua ciunt, uellere apposita. Illita quoque lepras eximunt. Sunt qui errore ducti, argemonem nominari eupatorium putent: quoniam à syluestri Anemone, argemonē, & papauer, quod rhœada appellant, de quo inter papaueris genera referemus, propter colorum cognitionem in floribus, distinguere non possunt, uerum papauer & argemone colore minus saturato spectantur, & utraque tardius floret, quinetiam Argemone croceum succum, gustu admodum acrem, reddit: rhœas uerò candidiorem & acrem. insuper Anemone & rhœadi capitula syluestris papaueris similia insunt, sed in Anemone supernè crassiusculum\*, in rhœade subangustius. Anemones genera nec succum remittunt, nec calyces habent, sed quasi asparagi cacumen, in aruis illa sæpius enascuntur.

\*Latiusculum.

NOMINA



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *Ανεμώνη*. Latine *Anemone*. Officinis herba *Venti*.Germanis *Ruchenschell* / *Sack* et *Frant*.Gallis *Coque lourdes*, uel *corles*. Hortenses uero *passiflores* uocant.

Empirici hanc herbam uulnerariam faciunt. Secantur eius folia non sine acore quodam, ita ut oculos quemadmodum allium, aut cape feriant. illaq; per alembicum ui ignis destillata, aquam uulneribus mundificandis, curandisq; utilissimam præstant, quæ et putridam carnem erodat.

*Argemone*.

Cap. CLXX.

*Proten  
tilla*.*Argemone*.*Anagallis aquatica*.


**A**rgemone in totis syluestri papaueri similis est. folia habet Anemones, diuisa; florē puniceum: caput in cauliculo papaueris rotatis, oblongius, & summis partib. latum: radicē rotundam. succū croci colore acrem dimittit. Argema & nubeculas expurgat: folia illitu inflammationes compescunt.

NOMINA ET EXPLIC.

Nostri herbarij hodie duo genera Argemones, unum papaueri syluestri omnino simile, alterum Germani *Geosvich* uocant, quia asperibus hæc herba uoluptati est. tamen apud me horum certi nihil habetur.

*Anagallis*.

Ca. CLXXI.

*Duo Anagallis*



**D**vo Anagallidis genera, quæ tantum flore distant, nam quæ cœruleo flores, folijs in quadrangulo caule pusillis, subrotundis, ad helixinæ folia accendentibus; semine rotundo. Vtræq; mitigandi uim habet, inflammationem arcer, adactos corpori aculeos extrahit, nomas cohibet, Succus caput gargarizatu purgat, & naribus infusus, dolorem dentium lenit, si in aduersam narcm inficiatur, argemacum melle Attico emendat, retusæ oculorum aciei auxiliatur, contra uiperarum morsus, iecinoris & renum uitia, si ex uino bibatur, prodest. Tradunt eam quæ cœruleum ædit florem, prociduum sedem reprimere: quæ uerò phœniceum, illitu euocare.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Anagallis in duo genera diuiditur, scemina flore ceruleo conspiciuntur, mas puniceo, lacet in terra uterque sexus. Folia in cauliculis quadratis pusilla rotunda in terra iacentibus nascuntur in hortis & aquosis.

Anagallis Fœmina Latinis.

Morsus Gallinæ officinis.

Αναγallis θηλεα Grecis.

Gauchhey mit blaen blümlein Ger.

Morgeline Gallis dicitur.

Anagallis Mas Latinis.

Grecis Αναγallis αρρενη

Germanis Gauchhey mit roten blümlein.

Gallis quoq; Morgelina (flore enim tantum distans) appellatur.

Est & tertium genus Anagallidis palustre, floribus cœruleis, Germanis Wasserpungen & Bachpängen appellatum Euchsio errore manifesto Lauer seu Sion dictum, eius pictura supra est.

Galenus tradit Anagallidem siue quæ florem parit cœruleum, siue quæ phœnicum, quendam attractoriorum calorem possidere, quo spicula uel impactos corpori refigit aculeos. Quæ de causa succus naribus raptus caput purgat, & ut summum dicitur exicatoriam uim citra morsum obtinet, quare uulnera glutinant, idem de utraq; Anagallide sentit Paulus.

Veterinarij uero in hodiernum diem usq; hac herba quam palustrem siue aquaticam Anagallidem appellauimus in tumoribus discutiendis, & scabie equorum sananda utuntur, ut ipse Euchsius testatur, ut hinc manifestum fiat illam esse speciem Anagallidis & non Sium (ut Euchsius falso contendit) exicatoriam enim uim citra morsum obtinet ut Anagallis quare uulnera glutinat præcipue senum corpori, ad recentia quoq; uulnera tanta ei traditur uis, ut saniem ossibus extrahat, quemadmodum id longa & uaria experientia multis constat, quæ uires singulatim à ueteribus Anagallidi utriq; attribuantur.

Hedera.

Cap. CLXXII.

**H**edera differentias multas in specie sortitur, summas autem genere treis. Nam quædam candida est, altera nigra, tertia helix, candida, fructum fert candidum, nigra, nigrum, aut croci æmulum, quam uulgius Dionysiam uocat, helix fructum non gignit sed albas habet uiticulas, & folia parua, angulosa, & concinniora. Hedera omnis acris est, & adstringens, neruos tentat, flos trium digitorum capiti, facit ad dysentericos, in uino

bis die potus, ambustis cum cerato tritus illinitur, recentia folia ex aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, lienes sanant, foliorum & corymborum succus, cum trino unguento, melle aut nitro, naribus infunditur, & contra ueteres capitis dolores, caput eo cum aceto & rosaceo perfundi utile est, purulentis auribus, aut dolentibus, cum oleo medetur, nigra hederæ succus, aut e potu corymbi, corpus infirmant, mentemq; turbant largius sumpti, acini quinque triti, calidiorq; in punctu mali cortice cum rosaceo, si instillantur à contraria aure, dolorem dentium mitigant, denigrant capillum, illiri corymbi, folia in uino decocta, illinuntur omnium

ulcerum

αδουμότερα  
non ἰσχυρά.





ulcerum generi, etiam si cacoëthe sint, vitia cutis in facie & ambita sanant, uti antea diximus decocta. mouent menses triti et subditi corymbi. isdem poti, post purgationes foeminarum, drachma pondere, concipiendi spem adiungunt. pediculus foliorum melle irrigatus, ac uulua inditus, menstrua & partus extrahit, instillatus succus putrida cædia narium, grauiolentiamq; emendat, & sanitati restituit. lachryma hædere psilothrum est, illitu pediculos ehecat, succus radicum in aceto potus, contraphalangia prodest.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hædera plurimas, ut Dioscoridi placet, sigillatim habet differentias, sed summas species omnium generum tres. Candida fructum candidum fert, Græcis Κισός λευκός & λευκόνεργος. Germanis Weisses Ephew. Gallis Lierre blanche.

Nigrum fructum nigra hædera fert, Græcis Κισός μέλας. Germanis Schwarzes Ephew. Gallis Lierre noire, & dyonisia appellatur. Tertia quæ nominatur Helix, nullum parit fructum, tenuibus sarmentis, folijs paruis, angulosis, cœcinnoribusq; hæc Græcis Κισός ἀκαρπία & ἑλὶξ. Latine Sterilis, Helix. Germani Ephew on frucht. & Klein Ephew. uocant.

Hædera satis omnibus inimica, sepulchra ac muros rumpens, serpemium frigori gratissima, quæ et si crescendo arborum magnitudinem æquat, frutices eam tamen sibi uendicant.

Hædera, ut Aegnetæ placet, contrarijs constat potentijs. Stringit enim, & refrigerat, atq; cum quadam armonia calefacit, essentie aquosæ particeps, uiridis, tepida.

## Chelidonium.

## Cap. CLXXIII.



Chelidonium maius, caule est gracili, cubitali auraltiore, adnatis foliosis: folijs ranunculi, multis, mollioribus tamen, & colore cæsijs: flore uiole albæ, secundum singula folia prodeunte. in eo succus croci, mordax, acris, & aliquantulum subamarus, grauius olens, radix supernè singularis, infernè in multa crocea capillamenta fibratus, filiqua, ceu corniculati papaueris, tenuis, in metæ figuram longa: in qua semen papauere maius recluditur. Succus in æreo uase, cum melle prunis decoctus, oculis claritatem adfert. Folijs, caule, radice, succus exprimitur in eunte æstate, & siccatus in umbra digeritur in pastillos. Radix cum aniso & uino albo pota, medetur regio morbo, & ulceribus quæ serpunt. imposita cum uino aut manducata, dentium dolorem sedat. Hoc nomen sibi uidetur uendicasse, quod aduentu hircinæ exoriatur, & discessu emarcescat. Sunt qui narrant, hircinæ matres excecatis pullis: admota herba uisum restituere.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Χελιδόνιον τὸ μέγα.

Latine Chelidonium & Hircinaria.

Officinis corruptè Chelidonia.

Germanis Schellwurz.

Gallis Chelidoine, ou esclere.

Herba nota est. dicitur autem nomen sumpsisse ex hoc quod eo tempore semper florescit quo hircinæ prestosunt, quas Græci Chelidonas uocant: uel ut quidam memorant, quod nidis suis candem hircinæ serant ob acuendos succedendum uisus.

## Chelidonium minus.

## Cap. CLXXIII.

Chelidonium minus, quod triticum syluestre aliqui nuncupant, herbula pediculis ab radice pendens, sine caule: folijs hederæ, multo otundioribus & minoribus, teneris, & suppinguibus: radices habet ex eodem callo complures, puillas, in granorum tritici modum aceruatim congestas, quarum tres aut quatuor in longitudinem exeunt. Iuxta aquas & lacus nascitur. Vis ei acris, & anemones

modis



*Chelidonium minus.*

alignosi tractus scatent. Quam longe disidenti nomine, proprio ignoto, nunc officinae uocant scrophulariam, quod strumosa radix multis granorum frumenti grani uideatur coaluisse, quanquam partem inditam appellationem, quod strumis (quas uocant græca imitatione non latina scrophulas) medetur. Sed ne sine peculiari demonstratione testemur, id euidenter pictura poterit comprobare. Siquidem scrophularia herbula est à pediculis pendens, uida caule, folijs hederæ, rotundioribus multo, minoribusq; teneris & modice pinguibus. Radices ostendit ex eodem callo procedentes, paruas, complures in granorum tritici morem acervatim congestas, quarum tres uel quatuor in longum protenduntur. Humida sequitur & palustria. Flores aduentu hyrundinum, nec longo post tempore marcescens euascescit, sic ut irrigui limites, qui large foliorum florumq; stipatu pubescebant, confestim ijs spoliati glabrescere conspiciantur, qua de causa Chelidonium, id est hyrundinariam dici nulli dubium est. Flos ei Ranunculi, luteo colore nitens.

## Othonna. Cap. CLXVV.

Othonnam aliqui maioris Chelidoniæ succum esse aiunt, quidam glaucij; alij succum floribus corniculati papaueris expressum. alij permistos cœruleæ anagallidis, hyoscyami, & papaueris succos, esse contendunt. alij Trogodyctæ cuiusdam herbæ succum, quæ Othonna uocatur: nasciq; eam in eo Arabiæ tractu qui ad Aegyptum spectat. Othonna folijs erucae, perforatis cribri modo, & ueluti à tineâ derosis, squalore oblitis, paucis; flore croci, latifolio. quare quidam anemones speciem esse putauerunt. extractus succus oculorum medicamentis adijcitur, ubi expurgare est opus, mordet enim & abstergit omnem caliginem quæ oculis offunditur. Tradunt humorem quendam ex herba emanare, qui elotus, semotis calculis, in pastillos ad eadem digeritur. Alii tamen affirmant, lapidem esse Aegyptium, in Thebaidem nascentem, exigua magnitudine, æreo colore, gustu cum feruore quodam & adstrictione mordaci.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Othonna, quid fuerit, etiam Dioscoride teste, ne inter ueteres quidem satis constat.

## Auricula muris. Cap. CLXXVI.

Muris auricula, quam myosotida uocant, herba est caulibus pluribus, ab una radice, aliquatenus ab imo rubentibus, & concavis; folijs angustis, oblongis, dorso acuto, elato, nigricantibus, per interualla assidue geminatis, atq; in mucronem desinentibus, & tenuibus cauliculis ex

*Auricula muris.*



lis ex alarum sinu prodeuntibus; flore, ut anagallidis, cœruleo; radix digitali crassitudine, multis capillamentis fibrata. Radix illita ægilopïa sanat. Sunt qui alsterum, muris auriculam uocitent.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Μυρσώρις, ἢ μύρος ὠτῆς.

Latine Muris auricula.



Germanicè Waldt Mangolt/ mit blaen blumen.

Existimatur ea, quam in Germania uulgo medici betam syluestrem nominant floribus cœruleis, diuersam à pyrola.

Syluestre glastum.

Glastum.

Cap. CLXXVII.



Satiuum Glastum quod infectores lanarum utuntur, folium habet plantagini simile, uerum pinguius nigriusque cuius caulibus duum cubitorum altitudinem excedit. Illi folia tumores omnes discutunt, cruenta uulnera glutinant, sanguinis profluvia sistunt, ignem sacrum, phagedænas, putrescentia ulcera, & quæ serpunt, sanant. Syluestre Glastum satiuo simile est, folia fert maiora, lactucaceis proxima, caules prætenues multifidos, quadam tenus rubentes; in quorum cacumine folliculi multi dependent, quædam linguarum effigiem referentes, in quibus semen, flore tenui, luteo. Eadem quæ & supra dicta præstat, potu & illitu lienosis auxiliatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Ιοκρίς. La. Gadum, Glastum, Isatis. Officinis Indicum à colore. Germanis Weyd Endich. Gallis.

Du guesde, pastel de languedoc, dicitur.

Viridem herbam Trusatilibus molis præmunt, ut herbaceam saniem excludant: dein abacto liquore digerunt in magnos globos, quos tabulatis in cinerem computrescere sinunt, hos coruinis infectoria coquunt officina, & laneos pannos ac uellera demergunt, ut cœruleum ebibant colorem. Cœruleam illam spumam innatantem quam igni conferuescentes eructant cortina, hæc ad pictorum usus siccant. Germani Indich. Galli Inde uocant.

Telephium.

Cap. CLXXVIII.

Telephium herba portulacæ similis & caule & folijs, habens gemina tubercula, \* à singulis radicum geniculis enascentia: à quibus rami seni septeniue fruticant, à radice referti cœruleis folijs, crassis, lentis, carnosis; flore luteo, aut candido. Nasctur in cultis, & maxime inter uites. Tempore uerno folia senis hodie sunt.

R



Telephium.



ris illita albam uiriliginem sanans: sed postea hordeacea farina illini debet. perunctam ex aceto etiam in sole uiriliginem tollunt. sed ubi inaruerunt, abstergantur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci Τηλεφίον:

Latini Telephium.

Officinis illecebra minor. Vermicularis minor.

Germanis Katzen Treublin dicitur.

Hanc Fuchsius perperam tertium genus Sedi facit.

Breuius Dioscoride Plinius descripsit Telephium portulacæ simile, & caule & folijs, ram à radice septeni ostoniue fruticant, folijs crassis carnosiss. Galenus tradit, putrilagiosis ulceribus opitulari. Vnde Telephij nomen ductum puto, quòd ulceribus malis, quibus rex Mysie Telephus consenuit, ab Achille uulneratus, auxiliatur.

Finis Libri Secundi.

# PEDANII DIOSCORIDI ANAZARBEI DE MEDICINALI MATERIA

Liber tertius, Ioanne Ruellio Sueffionensi interprete, cum figurarum debita appositione, & annotationibus in singula capita. Per Gualtherum, H. Ryff, Argentinum, Medicum, ex doctiss. uiuorum lucubrationibus adiectis.



## P R A E F A T I O.

VPERIORIBVS charissime Arce commentarijs, tradidimus de aromatibus, unguentis, oleis, arboribus, earum fructibus & lachrymis: item de animalibus, cerealibus, oleraceis, & herbis acrimonia praeditis. In hoc aut tertio lib. radices, succos, semina, herbas, & quæ uernacula & inter se cognata censentur, quæq; pluribus scatent remedijs, prosequemur.

Agaricum.

\* Agaricū fertur radicilae serpitij simile.



## Cap. I.

\* Agaricum radix fertur laeipitij similis, sed facie summa solutior, & rariore fungosoq; tota contextu. Duo eius genera, foemina, quæ praefertur, rectis intus uenarum discursibus constat. mas rotundus est, & undiq; compactior. Vtriq; gustus in initio dulcis, mox in amaritudinem transit. gignitur in Sarmatiae regione, quæ Agaria dicitur. Sunt qui radicem esse plantæ affirmēt, alij ut fungos nasci in arborum caudicibus, quadam putredine: gignitur in Galatia Asia, & Cilicia, in cedris, sed friabile & infirmum. Adstringendi calfaciendiq; naturam habet. efficax est contra tormina, cruditates, & rupta. prodest itidem contusis, & ab alto deuolutis. datur duobus obolis in uino mulso, febrim non sentientibus: febriculosis uerò, in aqua mulsa. arquatis quoq; suspiriosis, iecinoris renumq; uitio laborantibus, dysentericis. item si urina ægrè red datur, si uuluae strangulatus urgeat, si pallor membra decoloret, drachma una dari solet: si tabes infestat, ex passo: si lien negocium exhibet, ex aceto mulso. si dissolutio



solutio stomachi est, ita ut cibi tenax non sit, manditur, & sine ulla humoris solitione deuoratur. simili modo acida ructantibus propinatur. sanguinis reiectiones sistit, tribus obolis ex aqua sumptum, facit ad coxendicum, & articularum dolores, & comitiales morbos, si cum aceto mulso, pari pondere assumatur. menses ciet. feminis, quas inflatio uulvæ uexat, utiliter æquali modo datur, horrores scilicet datum ante febrium accessiones. aluum purgat drachma una aut altera, si cum aqua mulsa bibatur. uenenorum antidotum est denarij instar, cum diluta potione sumptum. si serpentes ictum uibrarunt, morsumque subfixerunt, tribus obolis ex uino porum, mirè auxiliatur. In summa, internis omnibus uitijs conuenit, pro uiribus & ætate datum, nunc ex aqua, nunc ex uino: ijs ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsa.

## NOMINA ET EXPLIC.

Græcè Ἀγρίχον.

Latine Agaricum.

Officina genuinum nomen retinere.

Germanus Damm Schwan.

Gallis Agaric dicitur.

Gal. li. i. ant.

et 6. simpl.

Sylvius h. r. mentab. m.

Agaricus tanquam fungus est enatus truncis arborum præcipue glandiferarum, ut ilicum: toto contextu est rariore & fungoso, sed facie summa & mucrone est solutio: sede uero & radice semilignosa & semi putri, ob id abijcienda. In eo femina rectis intus uenarum discursibus fracta constat, qui denium murinorum uestigia in casco duro representant. Eadem leuior, rarior, mollior, albior, breuior, friabilior, splendidior, proinde præstantior. Mas uero in fracturis filios neruorum modo, grauis, deius, durus, niger, lignosus, longus, interdum rotundus, sed ubique compatiior: neuter ad alterationem recipit. Viri: sapor est initio dulcis, mox amarus, tadem etiam subacer, & subastringens: unde incidit, tenuat, terget, digerit, obstructa liberat. Vis autem phlegmagoga, hoc est, pituitæ purgatrix, stomacho aduersa: uitijs tamen omnibus internis ab ea natis saluber est in omni ætate, ob quæ medicamentum familie ueteri uis est dictus. Datur drachmæ pondere, seu à scrupulis duobus ad drachmam unam pro ægri natura, ætate, uiribus, consuetudine, & morbi natura & tempore, cum uino, uino diluto, uino mulso, sapa, acetato, aqua, hydromelite, oxymelite. Quinetiam stomacho solutus, ut cibi tenax non sit & acida ructantibus manditur, et sine humore deuoratur Dioscoridi. Nobis omnibus nauseabundus est, fortasse quia de

Gal. li. 6. sim.

Rha Germanicum.

terior nunc ex Alpibus Germanicis, Gallicis, & Gallia Delphinatu affertur, quàm quæ maioribus mittebat Agria Sarmatiæ regio (à qua illi nomē) & Galacia, & Cilicia. Pōticus Andromacho iuniori in Theriaca probatur. Mendum igitur uideri iure queat in sine lib. 9. comp. ph. par. ubi suffocatis ab utero datur uncia una cū uino pro drachma una. Corrigitur uino, zingibere, caryophyllis, nuce muscata, uel alijs stomachicis. Seruatur anis quinq; integer præcipue cum dauco, libysico, polypodio: non solum autem sumitur, sed etiam foris admoetur, ut Galenus docet li. 6. simp. ph. & in fin. li. 10. comp. ph. part. in ischiadicis remedijs.

Gal. li. i. ant.

Agaricus Galeno & Dioscoridi radix dicitur, cum potius fungus sit aut uelut fungus quidam, candidus, odoratus, nocte lucens, truncis ilicum et aliarum arborum glandiferarum truncis innatus.

## Rhaponticum. Cap. II.

**R**ha, aliqui rheum, latini Rhaponticum uocant, provenit in ijs q̄ supra Bosphorū sunt regionib. ex quibus affertur. Radix nigra, centaurio magno similis, sed minor & rufior, fungosa, aliquantū læuis, sine odore. Optimum habetur quod teredines nō sensir, si gustatu cū remissa adstrictione lētescat, nō ducatūq; colorem reddat pallidum, aut ad crocum inclināte. Id epotū facit ad inflatōnes, stomachi imbecillitatem, & omne genus

R 2





dolores, ad conuulsa, lienofos, hepaticos, tormina, ad renum, uesicæ, & pectoris uitia, aduersus intenta præcordia, & uulnæ mala, coxendicum dolores, sanguinis excreationes, suspiria, singultus, dysenterias, & cœliacorum affectus, contra febrium circuitus, & uenenatorum morsus. datur in singulis ualentinis. eodem quo agaricum pondere, & cum eisdem liquoribus si febri careant, in mulso: sin aliter, ex aqua mulla. si tabem experiuntur, ex passo, si lienis exercet, in aceto mulso. si dissolutio est stomachi, id est, cum cibi tenax non est, manditur, & sine forbitione uulsa deuoratur. liuentia lichenasq; tollit, cum aceto illitum. inflammationes cunctis ueteres ex aqua oblitum dissipat. summa eius uis adstringens, cum aliquanto calore.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Rha, Rhaon, Rheon, Rhion. radix nigra, costis nigro foris, cœnureo magno intus similis, sed minor & rufior, fungosa & laxa, aliquantum leuis, sine odore, teredinibus non exesa, quæ manifesta colorem reddit pallidum, ad crocum inclinantem, facile fragilis, amara, ut à Dioscoride præfem i capite describitur, sed præter hæc legi in Dioscoride Separio: adstringens, plusculum manditur, subacris.

Ex riguis ad Rha fluuium supra pontum (unde Rha ponticum Græcis & Latinis, & radix pontica Celso dicitur) & Bosphorum septentrionali tractu affertur: parum purgatorium, experientia posteriorum, licet inuentum sit rarissimum, & hodie prope ignotum: obscuratum opinor à Rhabarbaro seu Indico, quod ex India meridionali in totam prope Europam quæstui maximo conuenitur, odoratum, grauitate insigni commendabile, resstringens, amarum, cholagogum: magis, colore dum manditur plane croceo. Quod siue idem sit genere cum Pontico, uiribus tamen, colore, odore, pondere nonnihil distimile soli & cœli ratione: siue omnino diuersum, alijs disquirendum relinquo, quibus plus est olij & faeculatis: cum præsertim etiam celebres medici hodie, in ea conuersa sibi non consistunt, et nunc idem nunc diuersum affirmant. Manardus namq; in epistolis nunc idem, nunc diuersum censet. Mesue & Serapio suo Rhabarbaro tribuunt omnia, quæ Dioscorides & Galenus Rheo. Mihi satis fuerit adnunc re, in locum Pontici iam prope desiti indicum uiribus proximum: & ubiq; copiosum potius esse suffici-

Gentiana.



endum, tanto tamen parcius, quanto efficacius, in Græcorum compositionibus, quam Cœnureij magni radicem minimo uirium commercio cum Pontico conuenientem. Præsertim autem sufficiens est, quod in Indico est, adstringens magis, minusq; purgatorium, quale multum inuenitur: aut saltem eius macerati, uel asini magna, prout Medicus iudicauerit. In Arabum autem compositionibus, utrumq; distinguitur, illud Rheu pontici, hoc Rha ned Seni appellatum. Rhion uel ῥήιον Ponticum, uel Rhiu Pontici radix ferè Galeno dicitur in composit. medic. part. 7. & 8. & in antid. ῥήιον πόντιον, & ῥήιον ῥαβδάριον. Actuarius: & Rheu pontici radix, idem Pontica radix in Esdra antidoto, ῥήιον ῥαβδάριον Actuarius, in diaclydyo pro Rhaed Seni Mesue. Seruatur annis. 3. 4. psillio, milio, cera oblitum sola, uel cum tercbintina.

Quod autem uulgo Europæ pro Rhabarbaro in hortis passim ferit, cuius picitur à damus, nomine Rha Germanici Lapathi genus omnino uideatur, licet radicis colore Rhabarbaro nonnihil sit affine, uiribus autem inbecillius est. At cum reliqua Rheu utriusq; historia nunc scribatur, sed radicis solius, conuincere ne queas, congenerem plantam uel degenerem & diuersam, nisi ex partis unius natura.

Gentiana.

Cap. III.

Inuentio Gentianæ prima assignatur Gentio Illyriorum regi, à quo cognomentum habuit. folijs partim proximè radicè, iuglandi plantaginiue similib. subrubris, partim à medio caule, et præsertim iuxta cacumè, paulum distans: caule cauo, & leui, digiti crassitudine, geniculato, & ex interuallis maioribus foliato binum sæpe cubitorum: semine in calycibus lato sine pondere, aceroso, satis ad sphondylii semen accedente: radice longæ aristolechiæ, crassa, amara. Nascitur in sublimibus montium iugis, umbrosis locis, aqua fuscq;. Vis radicis ex calfactoria, & adstringens, contra morsus serpentium, dual. drachmis



drachmis, cum pipere, ruta & uino pota, auxiliatur. extracti succi drachma, late-  
rum doloribus, & ex sublimi deturbatis. ruptis & conuulsis, prodest. hepaticis et  
stomachicis, pota cum aqua subuenit. radix collyrii modo subdita, partus eijcit.  
imposita, ut lycium, uulneraria est. & ulcerum cuniculatim depascit. medela.  
succus præcipue eodem effectui prodest, oculis inflammatione laborantibus illi-  
nuitur. pro meconio collyrii acris immiscetur. radix uiriliginem absterget. Suc-  
ci extrahendi ratio hæc est: Contusa radix quinque diebus aqua maceratur: postea  
in eadem tantisper decoquitur, dum extent radices: & ubi refrixit aqua, linteo ex-  
colatur: mox discoquitur, dum mellis crassitudo fiat, siciliq; reconditur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *Γεντιανή*. Latine Gentiana. Officinis Latinum nomen integrum seruauit.

Germanis prima littera ablata, *Genian*. Gallis de la Genienne.

Huius genus maximum Sabaudi uocant *Verlache*: minimum (Germanis, *Reckwurz*, & *Witte*  
*wurz* appellatum.) du peret.

Gentiana radice est ob multam amaritudinem efficaci, ad tergendum, tenuandum, purgandum, ob-  
struenda liberandum: propter quam aloë Gallica dicitur: à illiricorum rege inuenta, & dicta, ut ipse Dio-  
scorides testatur.

## Aristolochia.

## Cap. IIII.

**A**ristolochia nomen ex eo sibi adopravit, quod existimetur optimè puerpe-  
ris opitulari. Tria eius genera traduntur. Rotunda, quæ foemina uocatur, fo-  
liis hederaeis, præstanti odore, cum acrimonia, mollibus, subrotundis, multis ab  
una radice germinibus, prælongisq; palmatibus, floribus candidis, pilei similitu-  
dine, in quibus quod rubrum est, grauiter olet. Longa, mascula appellatur, non-  
nullis dactylitis, longiore quam rotunda folio, tenuibus ramulis, dodrantalibus:  
flore purpureo, grauiter olente, qui marcescens in pyri similitudinem turbatur.  
radix rotunda, in orbem conglobata, rapi modo, longè uerò radix digiti crassitu-  
dinem, & dodrantis longitudinem implet, nonnunquam paulò maiorem, ambæ  
colore intus buxæo, gustu amaro & graui. Est etiamnum tertia longa, quæ clem-  
atidis uocatur, ramulos habens tenues, refertos foliis subrotundis, minori semper-  
uiuo similibus: flores rursus: radices longiores, tenues, crasso cortice odoratoq; ue-  
stitas, priuatim unguentorum spissamentis conueni-  
entes. Rotunda ceteris uenenis resistit. Longa uerò  
aduersus angues & uenena, drachmæ pōdere ex uino  
bibitur, & illinitur. pota cum pipere & myrrha, men-  
ses, partus, et omnia uuluarum onera eijcit, eadem effi-  
cit subdita in pello. Rotunda ad eadem pollet, insuper  
singultibus, suspiriis, horribus, lieni, conuulsis, late-  
rum doloribus, pota cū aqua, singulariter auxiliatur.  
aculeos & spicula extrahit. ossium squamas illitti ad-  
mit, ulcera putrida exest, & sordida expurgat, caua cū  
iri & melle explet, gingiuas et dentes extergit. Clem-  
atidis ad eadem pollere creditur, uiribus tamen inferti-  
or est.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Aristolochia, quia sit *ἀρίστη λοχούσας*, id est, parturientibus  
optima & salubris. Dioscoridi & Galeno triplex, radiceis figura  
præcipue distincta. Quæ primo generi est tuberum modo rotunda.  
Græcis *Αριστολόχια σπογγύλη*. Latinis malum terræ ob id dicitur.  
tamen non est ea quæ sic officinis & Germanis dicitur: secunda ba-  
culi crassitudine, digitos quatuor longa: unde (opinor) dactylitis diei  
tur lib. 2. comp. ph. guer. & lib. 7. comp. ph. part. in arctiæ  
Andromachi 16. Græcis *Αριστολόχια μακρά*.

R 3





Arist. rotunda officinarum.



Plin. lib. 25.  
ca. 8.  
Gal. lib. 10.  
com. ph. put.

Tertia longissima, quasi uitium nouellarum, ob quam clematis, id est, sarmentosa dicitur. Huius fructus putatur quibusdam nonkoi orientis, uulgo Gallorum coques deleuant. Germanis Fisch R. Siner dictus, stupefaciendis piscibus efficax, quam uim Plinius tribuit rotunda, hac Græcis Apis oloxia κληματίτις. Officinis longa, Germanis Osterlueci dicitur.

Quartum genus ostendit Plinius Pistolochiam seu Polyrrhizon omnium tenuissimum, densis radicis capillamentis iuncti plenioris crassitudine; hanc Euchsiu falso putat officinarum esse rotundam aristolocchiam, longe deceptus, cum prorsus nulla in ea nota cum hac conueniat, quæ potius Capnos Chelidonia, seu Capnos Phragmitis fuerit, ut Cordus iunior, harum rerum expertissimus, asserit.

Omnes ualent tantum radice amara et subacri, sed rotunda omnium est substantia tenuissima: longa uero terget moderatiu: clematis quia odore est gratiores, et cortice carnosio, ad unguenta (nardina Plinio) est, quam ad medicationes aptior. Prefertur Pomica, et huic Cretensis li. 10. comp. ph. part. Effodienda est mensibus, et desquamato terreno seruanda.

Dulcis radix.



Cap. V.

Dulcis radix plurima gignit in Capadocia & Ponto: fruticosa est, ramis binum cubitorum altitudine assurgentibus: folijs lentilici, densis, pinguibus, tactuque gummosis: flore hyacinthi, fructu plularum platani magnitudinis, asperiore, qui siliquas lentium modo habet rufas, et paruas: radicibus longis, ut gentianæ, coloris buxei, subacerbis & dulcibus, quæ densantur in succum, lycij exemplo. Isin arteriæ scabritia efficax habetur. uerum oportet ut linguæ subditus eliquescat. et situanti stomacho, thoraci, ac iecinori conuenit. sanat uescica scabiem, & renum dolores, cum passo potus. idem eliquatus sitim sedat, uulneribus illitus accommodatur; commanducatus ori prodest. recentis radicis decoctum ad eadem conuenit. eiusdem farina pterygijs commodissime inspargitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè γλυκύριζα.

Latine Glycyrrhiza, et dulcis radix.

Officinis corrupte Liquiritia.

Germanis Licritz, et Süßholz.

Gallis Reclisse, Raygalisse.

Hispanis Alcanix dicitur.

Lib. 7. com. part. Galeno dicitur. Radice sola et succo ex hac recenti expresso, dulci et leuiter astringente ualens, tepida, temperato proxima, modice humida, unde quia sitim sedat, æduspes quoque dicitur. Asperitatem lenit arteriæ et uescica scabra. Melior nigricans et lenta, quam buxica et fragilis. Hac bodis abundat ager Pabenbergenfis, ubi copiosissime prouenit.

Centaurium



## Centaurium magnum. Cap. VI.



**C**entaureum magnum folia habet iuglandis, oblonga, viridibrassicarum colore, serrata in ambitu, caulem, ceu rumicis, binum aut ternum cubitorum, multis ab radice adnatis, in quibus capita, ceu papaverum, in rotunditate oblonga: flos coeruleus: semen enim cosimile, ceu laneis floccis quibusdam involutum: radix crassa, grauis, solida tripudialis, succo pragnas, cum ad strictione aliqua & dulcedine acris, & rubescens. Amat solum pingue & apricum, ac sylvas & colles, copiosissima est in Lycia & Peloponneso, in Arcadia, Helide et Messenia, pluribusque locis circa Pheloen, Lyciam, & Symirnam. Radix conuenit ruptis, coxillis, pleuritidis, spirandi difficultati, ueteri tussi, sanguinem ex-puentibus, drachmis duabus trita datur, si febris sit, in aqua: ceteris in uino, item ad tormina, & uulua dolores ramenta eius in collyrii formam uulua subdita, menses atque partus extrahunt. Succus eadem prestat, uulneribus prodest, nam recens tusa, aut arida ante madefacta, ea glutinat & coniungit, carnes coalescunt, si tusa simul decoquatur. In Lycia succum exprimunt, quo pro lycio utuntur.

Græcè Κενταύριον τὸ μέγα. Latine Centaurium maius.

Officinae perperam Rhaponticum.

Germani errore officinarum decepti, ut Galli reupōtic appellat.

Centaurei magni radix acris, astringens, subdulcis, & subamarum: uel cera glutinat, sanguinem reicientibus prodest: à Chirone centauro sagitta a Herculis uulnerato inuentum, et nominatum Centaurium. Aitnis decem seruatur Theophrasto.

## Centaurium minus.

## Cap. VII.



**C**entaureum, limnesio aliqui uocauere, quoniam rigum amaret loca, herba origani aut hyperici similis, caule anguloso, palmum excedente: flore lichnidis, è puniceo in purpuram uergente: folijs rutæ, prelongis & paruis: fructu tritico simili: radice pusilla, laui, & superuacua, quæ gustanti amaritudinem adfert. Herba recens tusa, suo illitu uulnera coaglutinat, uetera ulcera purgat, & cicatrice obducit, bilem crassosque humores per aluum exigit, si decocta deuoretur, ius decocti ischiadicis conuenientissime infundit: trahit enim sanguinem & dolorē leuat, succus oculorum medicamentis perque utilis: siquidē cum melle caliginem oculorum expurgat, in uellere appositus, menses & partus extrahit, epotus peculiariter neruorum uitij succurrit. Succus extrahendi ratio: Legitur herba semine pregnans, et dieb. quinque madefacta, decoquitur donec superemineat aqua, mox ubi refriguit, linteolo exprimitur, & eiecta herba, iterum decoquitur, usque dum mellis crassitudinem habeat. Nonnulli eam recentem grauidamque contundunt, atque succum fistili non picato exprimunt, & in sole, lignea rude assidue mouentes, inspissant, quod si quid concretum faucibus uasis adhærescat, deradunt, reliquosque humori permiscet, noctu diligenter operiunt,

R 4



nam quos nocturnus liquores coalescere non sinit. Quæ autem siccis radicibus aut herbis liquamenta exprimuntur, decocta, ut in gentiana mentione retulimus, præparantur. sed quæ ex corticibus humidis, aut confusis herbis factitantur, in sole, uti antè dictum est, coguntur, sic è thapsia, sic è mandragora, reliquis quæ simili bus succus, sic ex acerbis uvis melligo elicitor. lycium tamen, & absinthium, hypocistis & consimilia, decocta, eo quo diximus modo, coguntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè κενταύριον τὸ μικρόν, κενταύρις. Latine centaurium minus, fil terre, febris, Theodoro Gaze. Officina latinum nomen seruarunt. Germanis Taufent güldin fraut, aurin, edro gallen. Gallis fiel de terre nuncupatur.

Radicem inutilem, ramos, magisque, folia & flores ualere scribunt Dioscorides et Galenus. Si centaurium paruum Gal. amarissimum ac subastringens est, magnum autem acre, astringens, subdulce, quasdam utriusque centaurii qualitates & uires Mesuen confudisse, nihil miri est, cum etiam maius subamarum, & minus subdulce sit, dum recens est, cum etiam Galeno quibusdam conueniat. Succus enim minoris suppositus, menses foetumque educit: maioris autem radix, menses pronocat, mortuo: foetus extrahit, uis uos corrumpit, deicit Galeno. Eadem pota, torminibus medetur, & sputum cruentum sanat cum uino, si febris abest: cum aqua si adest, Dioscoridi. Minoris etiam astringens qualitas ex hoc patet, quod uulnere glutinat, præsertim si recens tusa adhibetur: minor quoque uirens uulnera etiam magna glutinat Diosc. Gal. Maioris herba, adhuc recens, ulcera antiqua ad cicatricem difficillime curia, purgat, & ad cicatricem adducit Diosc. & Gal. quod Mesue minoris pulueri recte etiam tribuit amaro, ob id ter genii & siccamini, & quatenus astringit, glutinat, & cicatricem inducit. Cum etiam Galenus scribat minorem siccum siccantibus & glutinamentis misceri, quæ sinus, & fistulas, & maligna ulcera sanant, & durities molliant: quamuis potionis non meminerit, nisi quod succum à quibusdam bibendum dari scribit in nervorum passionibus, cum siccantem, & absque molestia uacuam: eundem cum melle illitum oculis purgare ea, quæ luminis claritati obstant. Diosc. Gal. ad spirandi difficultatem, & tuum autem quam, & lateris dolores, maius salubre faciunt ambo. Malus ad drachmam duas datur Diosc. & Gal. cum ad drachmam unam & dimidiam coctum ad dimidiam in aquæ coila Paulò. Mesue uero datur à tertia parte unc. unius usque ad sesunciam. Decocto autem ab uncia una ad uncias tres.

## Chamaeleon albus.

## Cap. VIII.

Chamaeleon albus ixia ideo aliquibus uocatur, quod quibusdam in locis uiscum circa radicem eius inueniatur, quo pro mastiche utuntur mulieres. folia habet silybo aut carduo similia, asperiora, acutiora, nigroque chamaeleone ualidiora, caulem non promit, uerum ex medio spinas, echini marini, aut cinaræ modo, erigit, flores purpureos, ueluti papporum lanugines emittit, semen cnici simile: radicem in lætis collibus crassam, in montosis uero graciliorem, in profundo albā aliquatenus aromaticam, graui odore, dulcem. Quæ pota acetabuli mensura, latas in teraneorum tineas pellit, bibitur autem in uino austero, cum origani feruifaci succo, hydropicis commodissime drachma in uino datur, etenim eos extenuat, contra difficultatem urinæ decoctum propinatur, hausta in uino, serpentium uenenis resistit, occidit canes & sues, mures item necat, subacta cum polenta aut aqua, & oleo madefacta.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hunc album chamaelonem nec herbarij nec medici, pace semper cruditorum dixerim, norunt, cum spina non excaulem, sed longo prædita thyrsos demonstrant, ab hoc plurimum abhorrentem. Siquidem in terra serpit, in erinacei modum aculeos erigens, caule prorsus deficiente, sed è medio foliorum complexu statim à radice caput exerit, breui pediculo sultum, et spinis densioribus echinatum, in quo flores emicant capillati, purpurascens, qui se in lanugines uocatos pappos dissoluant, & tandem in auribus abeuntes uolitent: foetu cnico non dissimili, radice candida dulci. In neglectis agrorum limitibus, & montium glabretis passim inuenitur. Quo nihil temere nobis occurrit frequentius, & iter agentibus obuiam offert, nullum tamen apud nos, quod demuror, aliud nomen retulit hernaculum, uulgoque in solo cœsus spinarum reputatur, & wegdistel, miederdistel appellatur.

## Chamaeleon



## Chamaeleon niger,

## Cap. IX.



**C**hamaeleon niger, folijs scolymos similis esset, nisi minora, tenuioraq; ac rubro distincta uiderentur, caulem emittit dodrantalem, crassitudine digitali, subrubrum & in umbella flores spinosos, tenues, hyacinthi æmulos, uersicolores; radice crassa, nigra, dēsa, interdum exesa, quæ dissecta flauescit, commanducata mordet. Prouenit in campestribus, siccis, & cliuosis tractibus, & maritimis. Radix trita, addito atramenti sutorij exiguo, cedrino oleo, & axūgia, scabiem abigit, eadē cum sibi sulphur & bitumen asciuit, & cocta in aceto illinitur, impetiginēs absterget, decoctum collutione dentium dolore mitigat. cum piperis & cera oblita radix, dolenti denti auxiliatur, radice concisa, & in aceto decocta dentes fouentur, eos quoque frangit, si scriptorio stylo ferat.

Crocodilium.

uens ad moueatur. vitia cutis in facie, uittiliginēsq; cum sulphure emendat. erodentibus medicamentis admiscetur. phagedænas, tetraque ulcera illi sanat. Quare chamaeleo uocetur, à uarietate foliorum euenit, mutant enim cum terra colorem: hic uiridia, illic albicantia, aliubicoculea, nonnusquam rubra inueniuntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Chamaeleon niger Latinis. Grecis Χαμαελέον ὁ μέλας.

Officinis Cardopatium & carduus suarius. Germanis Eberwurz.

Recentiores radices cardui suarii siue cardopatij drachmā pōdere in uino sumptū contra pestilentie contagia pōdesse tradunt. Eandē etiā in aceto decoctā. Contra scabiem, impetiginem, & omnes cutis seditates curatu difficiles conferre scribunt, si eius decocto lauentur, idem dentium etiam dolori succurrit. Euchsus hanc radicem Chamaeleonem album facit.

Crocodilium.

## Cap. X.

**C**rocodilion chamaeleontis nigri figuram habet. Nascentur in siluosis, radice longa, leui, aliquantum lata odore





odore, ut nasturtij, acuto. Feruefacta in aqua & pota radix, sanguinem copiosum

per nareis pellit, datur lienosis, eos euidenter adiuuans. Semen ei rotundum inest, duplex uti scutum, quod suapte ui urinam ciet.

#### NOMINA ET EXPLICATIO

Græcè Κροκόδιον. Latine Crocodiliō, uel crocodilia. Officinis. Germanis Weiß oder schwarz garten distel.

Ruellius omnino arbitratur eam esse, quam hodie Carlinam uocant. Cuius picturam exhibemus. Chamæleontis enim nigri figuram habet, cui adeo similis est, ut huius temporis uiri multi eruditi hanc ueram chamæleonem nigrum esse credant.

Dipsacum, siue labrum

Veneris. Ca. XI.

**D**ipsacum aculeatarum generis est. caulem habet altū, spinis horridum, folijs laetue, spinosis, binis, genicula singula complectentibus, prælongis, ceu quasdam bullas intus & extra aculeatas, in dorsi medio habentibus, cōcauo alarum sinu, in quo imber aut ros asseruetur: unde dipsaci, quasi sitientis, nomen traxit, in cacumine caulis singula surculis capitula insunt, oblonga, echinata spinis, quæ arefacta, candida spectantur, dissecta medullatenus, uermiculos ostendunt, Sannat rimas sedis, fistulasq; si tusa & decocta in uino radix, usq; dum sit crassitudo cere, immitatur. Medicamentum græa pyxide recondendum. A iunt fornicationibus, uerrucisq; pensilibus re medio esse. Vermiculi capitulorum in folliculo alligati, collo aut brachio appensi, prodūtur quartanis febribus remedio esse.



#### NOMINA ET EXPLICITIO.

Græcè Δίψακος. Latine Dipsacus, Labrum Veneris. Officinis uirga pastoris, fistula pastoris. Germanis Karden distel, weberkarden. Gallis charbon à cardir nuncupatur.

Dipsacos caespina est, qua rudes pannos, uelut echino quodam expoliunt, detractisq; floccis fibrisque, quas uocant crocydas, concinnant qua etiam detrita uestes mangonio fullonum interpollatur, & in uillum muricatis orbibus restituuntur. hinc fullonius carduus cepit appellari. Germanicè weberkarden dicitur, quod lamsficia unctis uerticibus aculeorum pestantur. Dipsaci singuli echini è rotundo in oblongū quadam tenuiturbinantur, inter quorum spicula punceus flos emicat. his disiectis, in medulla uermiculos identidem nobis licuit inuenire: qui non offenderunt, parua admodū uidentur impenesse diligetiam. hoc uermiculo aliquoties sanauimus uulgari experimento panaritium, quod a pollema Germani den wurm am finger appellant, malignum quidem ac omnem curā nisi mitigetur omnino respuens. Seritur hodie multis in locis magno colentium prouentu, ut pote cum echini fullonum mangonio & complendis pannis oppido quam utiles: in syluestri dipsaco inutiles ac planè inualidi, & ut ita dicam, nullius usus.

Spina alba.

Cap. XII.

**S**pina alba nascitur in montibus & syluosis. folia fert albi chamæleonis, angustiora, & candidiora, aliquantum hispida, & aculeata. caulem supra bina cubita altum, pollicari aut ampliore crassitudine, albicantem, intus cauum, in cacumine capitulum inest spinosum, echini marini æmulum, sed minus, & oblongum, flores purpurei, in quibus semen ceu cnicum, sed rotundius. Huius radix pota, coeliacis, stomachicis, & ijs qui cruenta extulsiunt, efficax est. urinam ciet. tumoribus



Spina alba.



bus illinitur. decocto eius dentes in dolore collui prodest. eorum semen cōuulsis infantibus, & a serpente demorsis auxiliatur. gestatū pro amuleto, serpētes abigere traditur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Grecē ἀκάρδα λευκή. Latine spina alba.

Germanicē Vchdistel / Mariēdistel / frawē distel.

Gallis espine blanche. Italis spinus albus dicitur.

Nobilior officinis Pœno quā patrio nomine, quæ mihi uidentur sponte uel gratis in hanc gentem defecisse: Bedegar hodie uocant spinam illam. Quandoquidē hæc Bedegar spinis infesta heret, folijs Chamæleonis albi, castigatoribus candidioribusq; caule tripedaneo, pollicari crassitudine & inani, ouali super uerticē echino, flore purpureo, enicifætu, sed totidiore & c. Spina alba semen potum recentioribus contra incipientem pleuresim & laterum dolores, remedio est.

## Spina Arabica. Cap. XIII.

**A**rabicam spinam natura albæ spinæ similem esse constat. ipsa siquidē strigit. ad sanguinis reiectiones, mēlium abundantiam, cæterasq; fluxiones radix etianum

## NOMINA ET EXPLICATIO.

ualet. Prouenit in asperis.

Spina Arabica uel Aegyptia, Syria, similis esse creditur albæ spinæ quæ in fruticem assurgit. Duo habet genera, candidum & nigrum, hodie nobis incognita. Arbor tota præterquā caudice spinis horret. Semen in siliquis est. Flos medicamentis utilis, & coronis iucundus, gumi profundus, non cortice sed in uasculo. Hæc ferè eadem de arbore acaciam fundente. Plinius de Arabica & spina acacia seorsim, ut differentium tractauit. Galenus & Paulus eandem & Arabicam & Aegyptiam appellant.

## Carduus.

## Cap. XIII.



**C**arduus, Greci scolymon uocant, folia chamæleonis habet, aut albæ spinæ nigriora, & crassiora. caulem longū ædit foliosum, capite spinoso, radici nigra & crassa, quæ illita, graueolentiā alarū totiusq; corpis emendat. ite si decoctam in uino bibatur, copiosam aut urinā foetidāq; expellit. herba cū recēs tenerescit in olera asparagi modo transit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Grecē Σκόλυμος. Latine carduus. & Strobilus.

Columellæ Cinara dicitur. Officinæ Arcocum cor

rupto nomine uocant. Germanis Strobildora.

Gallis artichault dicitur.

Romani hodie carchiopos nūcupāt, q; ut herba ita &

nomen ab Italis petiitum est. Adhibentur conuiuijs ci

nare asparagi modo iuribus incoctæ, & ex oleo, sale

& aceto. Folia quoq; incūte hyeme obruunt humo non

nulli, sic candorē ascescere & amaritudinē exuere pro

mittunt, ut in hybernos cibos gratius admittantur.

## Poterium. Cap. XV.

**P**oterium, Iones neurada uocant, large fruticat, cortice obductū tenui. spinis horridum, lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus, tra-

ga



Ribes.

Schlehen doorn.



gacanthę proximis:  
folijs parvis, rotun-  
gis: flore exiguo, cā-  
didi coloris: semine  
nullius usus, sed gu-  
stu acuto & odora-  
to. Nascitur in aquo-  
sis, & collibus. radice-  
ces demittit binum  
ternūque cubitorū,  
neruosas & firmas.  
quę proxime terram  
recisæ, dant succum  
gummi similem, tu-  
se, præcisus nervis &

uulneribus glutinandis illinūtur. decoctum quoque eius  
neruorum affectibus prodest,

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Ianus Cornarius doctissimus atque excellentissimus Medicus, Galeni  
ca lectionis summus restaurator, de Poterio ita scribit.

Huius fruticis cuiusque fructus meminerunt & quidem diligenter Diosco-  
rides, Galenus, Paulus, ac Plinius, cūque is (nisi penitus fallor) quem ho-  
die Germani Schlehen doorn. fructum uero Schlehen appellant. Sed Ga-  
lenus quidem & Paulus de fructu penitus silent. Dioscorides autem fru-  
ctum ferre acrem & inutilem dicit, eumque nullo nomine insigniri. Pla-  
nius uero semē pro fructu conuertit, itidemque nullius usus esse, sed ta-  
men gustu acuto & odorato præditum esse, testatus est, palam ostendens  
se non scire quæ res sit Poterion quam describit, ut etiam plarisque om-  
nibus, maxime Dioscoridis interpretibus ansam dederit putandi, her-

bam ab ipso, non spinam & semē describi. Ex Græco autem authore aliquo & fortassis ipso Dio-  
scoride, uel etiam inde, unde etiam Dioscorides sua transcripsit, hæc nobis conuertit, in quibus reddens  
dis quam felix fuerit, ut eumque patere possit utriusque Dioscoridis uidelicet & Plinij uerba apud u-  
trumque authorem legat. Quod igitur ipse quid esse Potirion ignorauit, non difficile est iudicare:  
Græca Dioscoridis uerba, cum ipsius uerbis conferenti. Verum tantum abest, ut nos dubitemus Po-  
terium eum esse fruticem quem Schlehen doorn Germani uocamus, ut si stomachicum pharmacum præ-  
paraturus essem aliorum potiorum inopia, eius fructu uti non dubitarem. Neque auertor aut ex eo  
quod Galenus & Paulus de Poterio asserunt, aut ex eo quod Dioscorides inutilem dixit, cū ad stomā-  
tici medicamenti confectionem, commodissimus sit, & ne esse quidem alius possit, quam is quem indica-  
ui. Poterij fructus alio nomine Brabyla dicitur Galeno lib. 6. comp. ph. part. & lib. 2. de aliment.

Iacobus Syluius arbitratur eum fruticem qui hodie Officinis barbaro nomine Ribes appellatur; Po-  
terium esse Dioscoridis, de quo alij iudicent.

## Acanthium.

## Cap. XVI.

**A**canthium albæ spinæ simile, folijs aculeatis per extremitates, & lanugine  
araneosa obductis, ex qua collecta & neta, uestes bombycinis similes textūt.  
Folia uel radices ad remedia opisthotoni bibuntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Inuenitur in agris propter limites & uias spina candicantibus folijs, albæ spinæ non dissimilibus,  
quæ per ambientem oram tantum aculeos erigunt, & spissa pubescunt lanugine, quæ facile quidem in  
flocculos depecti posset, sed usque eò fragiles, ut inde nec telas ordiri, nec si la ducere quis ualeat. Acan-  
thium sit, nec ne, asserere non ausim.

Acanth.



## Acanthus.



## Caput XVII.

**A**canthus, Romani pæderotam uocāt, nascitur in hortis, petrosus, & riguis: folia habet multò lactuca eis latiora, & longiora, erucæ diuisura, nigricantia, pinguis, læuia: caulem binum cubitorum, digitali crassitudine, læuem, propè uerticem ex interualis circumdatum foliolis, ceu nucamenta quædam oblonga referentibus, spinosis, è quibus flos prodit albus: semè oblongum, luteum: caput thyrsi specie. radicibus nititur longis, mucosis, rubris, & glutinosis: quæ uitis igni & luxatis artubus illitæ subueniunt. potæ urinam ciāt, sed aluum cohibent, ruptis, conuulsis, tabem sentientibus, mirè profunt. Nascitur & syluestris acanthus, scolymo similis, aculeatus, breuior quàm satius, & is qui in hortis prouenit. cuius radix ad eadē ad quæ superior efficax.

## NOMINA ET explicatio.

Græcè ἀκανθὸς. ἢ ἀκανθα.

Latine Acanthus siue Acantha.

Officina à similitudine, quæm eius folia cum anterioribus urforum pedibus habent. Brancam urfinam uocant. Ad quam etiam similitudinem Germani respicientes, Beren Flaw/ Beren in

pen/ Welsch beren Flaw/ nominant, Galli brantze ursine.

Dioscoridis designatio (nec fallor) omnino eam noscitur explicare, cuius nomenclaturam & picturam dedimus, siquidem quinis senisue folijs extenditur, læuica longioribus, multò latioribus, ut quæ nonnunquam cubiti longitudinem æquent, pinguibus, carnosus, erucæ ritu laciniosis, nigro colore nitentibus, caule tripedaneo, digitali crassitudine, læui, cuius uertex foliorum in aculeos molles exeuntium cingitur uallo, & uelut in æbiscentem paniculam nucamentumue fastigiat. Summatim scapus erumpit thyrsi figura, flores candidi, semen oblongum, luteū, radicibus oblongis, pinguibus, lenis. Hæc folijs liras urcorum, puluinos & porcas obuclat: nec alia nobis adhuc uisa fuit, cui descriptio ad amussim magis respondeat.

Hæc non ita esset in aculeatarum censu, nisi foliorum extrema per caulem in spinulis occalescerent & cet.

Acanthus uel acantha, folijs modicè digerit, radice siccatur, incidit, est tenuium partium, emolliendæ alio iniectionibus hodie destinata.

## Anonis.

## Cap. VIII.

**A**nonis, quam aliqui ononida appellant, ramos habet fruticosos, dodrante maiores, frequentibus geniculis cinctos, cauis alarum multis, capitibus rotundis, folijs lenticulæ pusillis, ad rutæ aut pratensis loti folia accedentibus, subhirsutis, odoratis, non iniucundè olentibus. Muria conditur antè quàm spinosa fiat, cibus gratissima, rami acutioribus spinis, & ueluti spiculis firmioribus horrent, radicem mittit candidam, quæ ex calfacit, & extenuat. huius cortex ex uiuo potus urinam ciet, calculos comminuit, margines ulcerum erodit, radix cum decoquitur in posca, dolorem dentium collutione mitigat, decoctum eius potum hæmorrhoidas sanare creditur.

S



DIOSCORIDIS  
NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ὄνωρις, uel ἄνωρις.

Latine Ononis, aliter anonis, ut Theophrasto de Galeno.

Officinis acutella, resta bouis, remora aratri.

Germanis Sawhede/ Stallfrant/ Ochsenbrech/ Katzenper/ Weystein frant.

Gallis Bugraues, Bugrundes dicitur.

Nihil in aruis hac peste frequentius occurrit, sed cultus maxime gaudet. Hac uiret post menses restibilis aer, quæ non modo ingredientium pedes offendit, sed aratrum remoratur, illi se tam pertinaciter inuoluit, ut uix possit explicari. Latior tamen in proscisso, iteratoq; solo cõsurgit, plurimum alieno frugum labore proficiens.

A salgamarijs olim sale condiebatur, ut Dioscorides testatur, sibi gratissima, qui modus hodie prorsus obsoleuit.

Leucacantha. Caput XIX.


**L**euacantha prædita est radice cyperi, ualida & amara. quæ manducata dolorem dentium sedat. ueteri laterum dolori, atq; ischiadicis prodest, decocto cyathis tribus ex uino potio, eadem ruptis & conuulsis medetur. radice epotus succus eisdem præbet effectus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Λευκάκωντα Græcis, Latinis alba spina. Eius radix cypero similis, amara solidaq; differt ab ea quæ diuissim ἀκωντα λευκὴ, id est, spina alba nominatur, hodie incognita.

Tragacantha.

Caput XX.



**T**ragacantha radix lata & lignosa, summo cespite nititur, unde furculos humiles, robustos, latissime fundit, in quibus minuta folia, multa, nonnunquam tenuia exoriuntur, quæ sub se spinas albas, rectas & firmas occultant. Est etiam nuda tragacantha lachryma, quæ uulnerata radice manans concreuit. Præstat pellucens, gracilis, læuis, syncera & subdulcis. Cutis spiracula, ut gummi, obstruit. huius increbuit usus ad oculorum medicamenta, ad tussim, exasperatas fauces, retusas uoces, cæterasq; destillationes, cum melle in delinctu. subdita quoq; linguæ liquefcit. in passo madafacta drachmæ pondere bibitur contra renum dolorem, & uesicæ roliones, mixto cornu cerui uiso & eloto, aut scissi aluminis momento.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Lib. 8. simp. Herb. ut pote peregrinam Germanis, & prorsus exoticam nostrates herbarij nō norunt, lachry  
Lib. 7. sim. mantamen nulla non cognoscunt Officinæ, interpellato nomine dragacum gummi nunc aspellant, in cancano. cuius innumerus propemodum inoleuit medicis usus. hæc lachryma tragacanthos, tragacantha, uel tra  
Lib. 7. com. gaganton, radicibus inestis Dioscoridi, sponte Theophrasto profluens: uim habet similem gummi em-  
pharm. par. plasticam quandam siccantem, acrimoniam leuiorem, arterie asperitatem lenit cum uino macerata & leuigata, ut cancani radix, uel in aqua die uno. Tragacantha fructus, lib. 10. compo. pharm. part.  
Tragacantha alba Actuarius sepe.

Eryngium.

Caput XXI.

**E**ryngion a culeatarum generis est. Cuius folia in principio, sale cõdita, in cibos recipiuntur. lata autem sunt, & extremo ambitu aspera, gustu aromatica. Eryngio, cum adoleuerit, complures ramulorum striæ rubet. in quorum summitatibus globosa capitula, durarum acutissimarumq; spinarum ambitu stellatim circūuallantur, quorum colos aliàs uiridis, aliàs albus, interdū cæruleus inuenitur.





nitur. radix oblonga, lata, foris nigra, internè candi-  
da, pollicis crassitudine, odorata. Nascitur in asperis  
& campestribus. Vim habet calfactoriam. pota menses  
& urinas pellit. tormina inflationesq; discutit. contra  
iecinorum uitia, serpentium morsus, & hausta uenena,  
cum uino prodest. Bibitur aduersus plurima, cum semi-  
nis pastinacæ drachma una. appesa illitaue, tuberculâ  
discutere præditur. pota cum hydromelite radix, opi-  
sthotonicis & comitialibus medetur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἔρυγγιον.

Latine Eryngium.

Officinis cœcum capita, quibusdam falso Secacul.

Germanis Brachen dystel/ Wallen dystel/ Wans trew/ Ra-  
dendystel.

Gallis panicault dicitur.

Dioscorides una Eryngij specie contentus est. Plinius albi & atrii  
discrimina fecit, eryngem statuens duram, fruticosam, spinosis folijs,  
caule geniculato, cubitali & maiore aliquando, aliam albicanem,  
aliâ nigricantem, radice odorata. Satius, ut inquit, quædam est, & d  
& sponte nascitur in asperis & saxosis: in littoribus maris durior, nē

priorq; folio apij. Ex ijs candidum Latinis dicit cœcum capita uocari.

Eryngij radix longissima, intus alba, foris nigra, odorata: calida, ad primū ordinem, sicca ad secun-  
dum: tenuium partium, ciet menses & urinas, moribus uenenatis resistit, status dissipat.

## Aloe.

## Caput XXII.



Loës folium scille similitudinem ha-  
bet, crassum, pingue, modicè latum,  
rotundum, retrorsus pandum. folia utrin-  
que gerit ex obliquo spinosa, rariusculè  
striata, breuia & curta. caulis emittitur  
nō dissimilis antherico. flos albus, fructus  
hastulæ regię cognatus. graui tota est odo-  
re, & gustu amarissima radice una, ceu pa-  
lo, in terrâ depacta. Plurima præpinguisq;  
in India gignitur, ex qua coactus succus ad-  
fertur. Nascitur etiâ in Asia & Arabia, in  
locis quibusdam maritimis: & in insulis, ut  
in Andro. non ualde succo extrahēdo ido-  
nea, sed ad glutinanda uulnera sanē quā-  
utilis, si detrita illinatur. Duo succi gene-  
ra. quoddam arenosum, quod sedimentum  
purissimæ esse uidetur. alterum ad iecino-  
ris imaginem uergit. Eligi debet boni odoris, syncera, quæ nihil doli sensit, niti-  
da, calculorum expers, rufi coloris, friabilis, ac iecinoris modo coacta, facile li-  
quescent, eximia amaritudinis. improbatur nigra & fractu contumax. Gummi  
eam adulterant. quod deprehēditur gustu, amaritudine, & ualido odore: eoq; ar-  
gumēto, quod digitis friata nō ad minima usq; frustra resoluitur. Nec desunt qui  
acaciam immisceant. Natura eius est spissare, exiccare, somnū allicere, & corpo-  
ra densare, aluum resoluerē. stomachum repurgat binum cōchlearium mensura,  
in aqua frigida aut egelida pota. sanguinis reiectiones sistit. regium morbū pur-  
gat, tribus obolis ex aqua, aut drachmæ pondere in potu. deuorata cum resina,  
aut cum aqua, uel melle cocto sumpta, aluum soluit. purgationis perfectæ causa,  
tribus drachmis sumitur. alijs purgatorijs medicaminibus admista, præstat ut



minus stomachum infestent. sic caglutinādis uulneribus inspargitur. ulcera ad cicatricem perducit. cohibetq; eadem peculiariter exulceratis genitalibus medetur. disrupta puerorum præputia iungit. condylomata, rimasq; sedis ex passo sanat. hæmorrhoidum abundantiam & sanguinis eruptiones sistit. pterygia ad cicatricem ducit. liuores & insignita, ex melle tollit. priuatim scabras lippitudines, pruriginēq; angulorum permulcet. dolorem capitis sedat, temporibus & fronti illita ex aceto & rosaceo. Capillum fluentem continet, cum uino. tonsillis, gingiuis, & omnibus oris ulceribus, cum melle & uino proficit, oculorum medicamentis torretur, in munda & candenti testa, peninaq; subinde uersatur, ut possit æqualiter torreri. Lauatur, ut quod sit arenosissimum, tanquam inutile sublidat, & leue ac pinguiissimum assumatur.

\*Ligula que  
ferrea sit.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἄλoε. Latine Aloë.

Officinis genuinum nomen seruauit. Germanis Alepatic/Butter Aloes.

Gallis Aloës, & perroquet.

Aloë herba semper uiuens, nunc in multis Gallie occiduae domibus, ad ostentationem appendisolarita, & eius herba succus calidus in fine ordinis primi, aut initio secundi, sicans orā dīne totius, uas lenter amara est, astringit modicè, idq; sine morsu, eccoprotica est, id est, stercus deducens, & eustomachos, præcipue clota: repellit, digerit, terget parum, quantum scilicet ulceribus paris non sit molestum, serius glutinat, ulcera dyspepilotica, præsertim sedis, puēndi, oris, glutinat: & hic gmo

Lib. 5. Simp. nas harum partium sanat, aqua subacta. Sæpta sepe hæmorrhoides uenas aperit, uel à tota substantia, uel quia calida: crasse essentia, & pro modo terfionis mordax, quamuis anastomatica sint: acris, ter

Aph. 47. li. rea, adnota autem sanguinis fluxorem cohibet, quia effringit, & emplastica est, ob id emphrastica, id

6. est, obstruens dicitur, cap. 11. lib. 5. simpl. nihil enim sumptum & adnotum uires habet easdem lib. 1.

Lib. 5. simp. Tem de sinapi, & lib. 8. methodi de mulsis. Aloë ut rose, mista est facultatis: nā amara substantia ter

cap. 11. gunt, astringente uera contrahunt, & cicatrice legum. Optimæ est pinguis & Indica. Velut etiam

Lib. 4. com. ex Cælosyria, & Arabia. Ex magna Syria humidior, Arabicam tamen tanquam omnium uilissimā,

phar. part. & solis mulomedicis usurpandam damnauit Mesues: Et inde caballinam uocant, nigram, obcuram,

Lib. 6. simp. feci simillimā, amarissimā, odore tetro, arenosam ut optima sedimētū, tertiā Armeniā, u. dicitur.

lib. 8. comp. Primā succotrinā, secundā hepaticā seu Persicā, quartā bonitate Arabicā statuunt, Mesues et alij. A-

pharm. part. Aloë lota minus alui ducit: multū enim uirtutis medicamentosa lauando deponit, magis tamē uētrō

Li. 7. metho. borat, Aloë etiā lota his maximè aduersa est, quæ citra paucos humores intemperie calida sicca laborat.

Lib. comp.

phar. part.



#### Abſinthium. Caput XXIII.

Abſinthium, aliqui bathypicron, herba uulgo cognita. Præstantius in Ponto & Cappadocia, in mōte Tauro nascitur. Vim habet calfaciendi & astringendi. bilem expurgat, quæ & stomacho & uentri inhæsit. urinam cit. crapulam præsumptum arcet. ad inflationes uentris, & stomachi dolores prodest, cum fesele & nardo galli copotum. fastidia discurit. arquatos sanat made facti dilutum, aut decocti ius, quotidie tribus cyathis haustum. menses cit potum, aut cum melle appositum. Contra fungorum strangulationes conuenienter ex aceto bibitur. aduersatur ixiæ uenenis cum uino. item ci cutæ, & muris aranei morſibus, & draconi marino. anginæ eo cū melle & niſtro perungitur, & epinyctides ex aqua. ad fugilata & oculorū caligines ex melle illimitur: item auribus, si manat sanies, dentium auriumq; dolores decoctum uaporis suffitu compeſcit. decoctū in passo dolentibus oculis oblinitur: item præcordijs & iecinori, tritum cum cerato cyprino: stomacho quoq; longa ualitudine laboranti, cum rosaceo



rosaceo. cum ficis autē, aceto & loliacea farina, aquæ inter cutē lienosisq; subue-  
nit. Vinū ex eo fit, quod absinthiten uocat, præsertim in Propontide & Thracia,  
quo ad antē dicta utuntur, cū febris carēat: alioquin in æstate propināt, & acceptā  
huic uino incolumitatē referāt. Insparsum arcis absinthii, uestes ab erodentium  
iniuria uindicat, culices ex oleo perunctum abigit, & à corpore ardet. atramen-  
tū librariū diluto eius temperatū, literas à muris erosionē tuetur. Existimatur li-  
quamentū eisdem præstare effectus. Attramē portionibus improbat, quoniam  
stomachum malè habet, & capitis ciet dolorem. Sunt qui cocta amurca, liquamen-  
tum adulterant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè & ἰδιότῳ. Latine Absinthium. Officinæ Latinum nomen seruant.

Germanis Wermutt, & Elz. Gallis alcyne, absince dicitur.

Absinthium triplex, forma, sapore, facultate planè diuersum, ut interim natales omittam. Primū ge- Lib. 2. Me-  
neris nomine dicitur, quale præstantissimum est Ponticum. Id folio et lore est multò minore, quàm cetera thodij.  
ra absinthia, & odore non insuauis, sed aromaticum quid præferente, qui reliquis omnibus plane cædus:  
qua propter hæc fugienda. Utendum autem semper Pontico, ad uentriculi, & hepatis phlegmonas, ad Lib. 8. com-  
tergendum, purgandum, subducendum prauos humores stomacho hærentes, roborandum dictas partes pharm. part.  
contrahendo & astringendo. Cum enim omni absinthio duplex sit facultas & qualitas, in Pontico a- Gal. 6. simp.  
stringens quidem plurima est, amara uerò exigua: ob id calidum est excessu primo, siccum tertio. In cæ-  
teris absinthijs, ut abrotano, amara est uehementissima, astringitio autem obscura, aut prorsus nulla gu-  
stus sentitur, ob id hæc stomacho sunt inimicissima. Ponticum præterea terget sordes tunicarum uentri Lib. 6. Sant-  
culi, non tamen si quid aliud in eo inbitum est foras extrahit, aut expellit: aut saltem parum id præsta-  
re ualeat. ob iunctam insignem astringendi facultatem. Hiera autem picra propter id excogitata salu-  
briter, illud ipsum potest. Ponticum autem uidetur esse, quod Romanū Mesues uocat, quodq; passim ho-  
die uisitur, & cuius picturam exhibemus. Diuersus enim Mesues Galeno tantum est, quod siccum ter-  
tio gradu hic, ille secundo scribit. Quæ controuersia in alijs simplicibus

Accipitrima.

multis est inter medicos etiam doctissimos: quorum unus in fine, uerbi  
gratia, primi uel secundi, alter in principio secundi uel terij intelli-  
git: quæ ambiguitas etiam Galeno ipsi est in anetho, prasio, ruta agrestis,  
& alijs permixtis. Nam quod succum eius dicit Mesues obnitrosam qua-  
litatem nocere stomacho, ipsi Galeno id nō aduersatur scribenti, succum  
longè ipsa herba esse calidiorē. Nostrum autem uulgare absinthiū sar-  
mentosum, folio & flore multo maiore, quàm cetera tria absinthia: uete-  
ribus inter absinthia comprehensum non uidetur, nisi esse uelis absinthiū  
primum Dioscoridis, quod uulgo aloina dicit, & Βαλάνιον, uel po-  
tius Βαγόνιον uocari à multa amaritudine, qualis in aloë, cui subcri-  
bitur. Dioscoridi à qua uulgo Gallorū aloinum appellat. Id autem si pri-  
mum in Dioscoride recipias, quæ nam alia in eo statues? Tamen id ad lum-  
bricos, uti & santonicum, est efficacissimum, sumptum & admotum.

## Marinum absinthium. Cap. XXIII.

Absinthium marinum, quod aliqui seriphum uocat, copiosissimū in Tauro mōre, iuxta Cappadociam, & in Taphorisi Aegypti gignitur, quo Isiaci pro oliuæ ra-  
mo utuntur. Herba est tenuis, abrotoni parui similitudi-  
ne, repleta minutulis seminibus, sub amara, stomacho ini-  
mica. Ea grauius olet, & cum quadam calfactiōe adstrin-  
git. per se aut cū oryza cocta, interaneorū animalia, te-  
retesq; tineas, adiecto melle, enecat. aluū leuigat. cū edu-  
lio\* autem uel lenticula decocta, eadem præstare potest. \*De fruto.  
pecora maximè pinguescūt hoc pabulo. Tertium genus  
absinthio assignatur, quo Gallia alpius finitima scatet:  
id patrio nomine Santonicum uocant, regionis in qua na-  
scitur cognomento, absinthio non dissimile, uerum suba-

S 3





marum est, non adeo seminis fecundum. Eadem quæ seriphium potest.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Marum Absinthium aliqui, Dioscoride teste, Seriphium uocant, herba est fruticosa, prætenibus cirris, paruo similis abrotono, exiguo semine, prægnansq; subamara, stomacho inimica, graui odore, linguam astringens, et leniter exalaciens. Huius semine medici tinctis, uermibus, nec moluntur, ob id semine contra lubricos uocant, Ger. Wurm samen. Galli Barbotine appellant, nonnunquam uero morie uermi.

Officine ipsi norunt appellationibus. ea uero herba cuius pictura Euchsus falso pro Seriphio absinthio exhibet, accipitrima herba est, à graui odore herba foetida, Ger. Babich samen nuncupata.

Abrotonum. Caput XXV.

**A**brotonum duorum est generum, femina quædam arboris specie fruticans, candicat, circum multos folijs, seriphi modo, minutim incisis. floribus referta est, comatibus in summo, fulgore auri, corymbis, quod per æstatem prodijit, suauiter olet, cum graui tate quadam, & amaro gustu. Id genus Siculum esse constat. Alterum mas uocatur, sarmentolum, gracilibus ramulis\* uti absinthium. Plurimum in Cappadocia cognitur, & Galatia Asiatica, atque in Syria Hierapoli. Crudum semen tritum & feruifacitum ex aqua, in potu auxiliatur orthopnoicis, conuulsis, ruptis, coxendicibus, urinæ angustis, mensibus suppressis, aut remorantibus. in uino potum exitialem uenenorum antidotum est. horribus ex oleo illinitur. serpentes & substratu & nidore fugat. contra ictus eorum cum uino porum prodest, priuatim efficax contra scorpionum & phalangiorum uenena. oculorum inflammationibus comode illinitur, cum cotoneo cocto, aut pane. tritum cum farina hordeacea, decoctumq; tubercula discutit. irini compositionibus admiscetur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἀβρότονον. Latine abrotonum.

Officinae genuinum nomen retinuerunt.

Germanis Stabwurz / Schofwurz / Gertwurz.

Gallis Auron, auronne.


Abrotonum femina folijs seriphio, & cypresso proximis albioribus. Mas uero abrotonum generis nomen tenet, calidum siccu tertio recessu à medijs, admodum amarum, coma cum floribus utile, ut absinthium, & cineribus suorum sarmentorum ad pilos reddendos. Sum qui arbutur chamæcyparissu abrotoni specie esse, uidelicet feminam, quod affirmare non ausim.

Hyssopum. Caput XXVI.

**H**yssopum, herba nulli non cognita, duum generum est, montanum & hortense. Optimum est Cilicium. Vim habet extenuandi & calfaciendi. decoctum cum fencis, aqua, melle, & ruta, potumq; peripneumonicis, diuturnæ tussis, suspiriosis, destillationibus, & orthopnoicis auxiliatur tinea enecat. idem facit, si cum melle delingatur. crassum humorem per aluum extrahit, decoctum ex aceto multo epotum. ad subducendam aluum, cum ficis uiridibus detritis manditur. uehementius, addita iri, cardamomo\*, aut irione, deijcit. colorem in corpore fouet. lieni, & aquæ inter cutem, cum fico nitroq; inflammationibus quoq; ex uino illinitur cum feruente aqua impositum, sugillata discutit. cum decocto ficorum, optime angina garga



\* tenui semine.



Lib. 6. simp.

\* alij nasturtio.



gargarizatur decoctum cum aceto, dentium dolorem in collutione sedat, inflammationes auricularum uaporis suffitu discutit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.


Græcè ὕσσωπος. Latine Hyssopus.

Officinæ genuinum nomen scruiant.


Germanis Fench hyssop/ Floster hyssop. Gallis de hyssope dicitur.

Hyssopum calidum siccum ordine tertio, tenuium partium: crassa & lenta ex pulmonibus extrahit, humorem crassum per aluum etiam purgat, obstructions tergit: monentū est efficacius bortenſi: Cilicū præfert Dioscorides, Creticum uero commendatur Archigeni, lib. 8. comp. ph. part. Gal. lib. 8. c. 8. le. in Chrysocome, & origano Heracleotico. Quædam à Dioscoride Hyssopo tribuuntur, quæ in nostro desiderari uidentur. Cum florum spica legendum est, aut cum semine turgēt.

Gal. lib. 8. c. 8. ph. part.



Spica. Lauendula.



## Stoechas.

## Cap. XXVIII.

Stoechas, iuxta Galliam in insulis eiusdem nominis è regione Massiliæ gignitur, unde cognomen tum accepit. herba tenuibus furculis, coma thymi, longiore folio, subamara gustu, & aliquantum acris. Cuius decoctum, hyssopi modo, ad pectoris uitia efficax est antidotis miscetur. uiscera omnia & uniuersum animantis habitum extenuat. ab obstructionibus & fæculis liberat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Στοίχες nascitur multa ubiq; terrarum, copiosissima in Cretæ insula, & dictis Stoechadibus insulis, in mari iberico, à quibus appellata est: nascitur & in Arabia, unde & Arabica uocatur: prouenit etiam hodie in multis Germaniæ hortis. Amara est, modicè astringit, proinde tenuat, terget, obstructa liberat, roborat uiscera, & corpus reliquum, putredinem arcet. Habitat atque melior nutrita & præstantior ex insula Creta petitur lib. 1. antid.

Gal. lib. 1. antid.

Est in Gallia narbonensi & multis Germaniæ locis stoechas Cetrina uulgo dicta, à comæ & corymbi floris colore luteo. Dioscoridis Heliochrysum, et Galeni Amaranthus uidetur: a terra autem flore purpureo, de quibus plura in sequentibus.

Hic locus postulat ut de nostro Germanico nardo, quæ omnino Stoechadis speciem esse arbitramur, differamus, quæ ubique nascens fruticat, folio crassiore, carnoso, angusto, colore lægundo in candidum uergente, frequentibus spicis in aristas parvis, floculis purpureis. Gaudet apricis & petrosis, tanta suauitatis fragrantia, ut omnes flores odoris iucunditate prouocet, qua docti uestibus inseritur. Duum cernitur generum, Vnum procerius adoleſcit, & maiorem spirat odorem: quod quia non minus quam nardum placet, sibi spicæ nomē apud nos arrogauit, Germani spica nardi, Galli aspice appellant. Alterum cum amplitudine, tum odore minus. quod quia balneis, & hominum lauacris expetitur, elotaque omnia, si permisceatur, odoris suauitate, comendat, & lauanda uulgo uel Lauendæ cepti nominari ceterum similima.


Vtraque perpetua coma canescit, exitu ueris, Iunio & Iulio mense spicatur. Vis ei calfactoria & resiccans abscessu secundo, tenuibusque constat particulis, nec multò à natura & forma Stoechadis distans.

Hallucinatur qui pseudonardum arbitrentur, falsi quædam nominis cognatione.



## Origanum.

## Cap. XXVIII.



**O**rganum Heracleoticum, quod & cunilam uocat, folium habet hyssopo non dissimile, umbellamque non in rotæ speciem orbiculatam, sed ueluti multifidam, semine in summis uirgis haudquaquam denso. Ex calfacit. unde decoctum cum uino potum, demorsis à serpente conuenit. si cicutam aut meconion hauserunt, ex passo: si gypsum aut ephemerum, ex aceto mulso propinatur. ruptis, conuulsis, hydropicis, cum fico esui datur. aridum acetabuli mensura potum in aqua mulsa, atros humores per aluum extrahit. menses ciet, & tussi cum melle linctum medetur. ad pruriginem, psoras, regiumq; morbum, decocti ius in balneis prodest. Succus uirentis tonsillas, uuam, & oris ulcera sanat. & per nares, ex oleo irino infusum, trahit. aurium dolores cum lacte mulcet. conficitur ex eo, & ceptis, & rhois frutice quo ad obsonia utuntur, uomitorium medicamentum, his omnibus in cupreo uase per dies bis uicenos insolat, dum canicula sydus flagrat. herbæ autem substratu serpentes fugantur. Quæ onitis appellatur, candidiore est folio, & hyssopo similior. Semen ueluti coniunctos corymbos habet. Vis ei organi heraclei, sed multo inefficacior. Syluestre origanum, aliqui panaces heraclion, alij cunilam uocant, ex quibus est Nicander Colophonius: folijs est origani, ramis tenuibus, dodrantem altis, in quibus umbellæ anethi insunt, flores candidi: radix tenuis, superua cua. Peculiariter percussis à serpente, folia & flores ex uino poti auxiliantur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ὀρίαννον. Latine Origanum.

Officine g. nuinum nomen seruarunt.

Germanis wol gemüt, rott dosten / Costenz. Gallis de lorigan, dicitur.

Organi Dioscoridi hoc loco plura produntur genera, omne uerò genus calidum siccū tertio ordine, incidit ac tenuat. Tragoriganum etiam substringit: præfertur montanum, uel Creticū, uel Heracleoticum.

## Tragoriganum.

## Cap. XXIX.

**T**ragoriganum tenuis frutex est, syluestri serpyllo aut origano similis, folio & ramulis. quibusdā in locis lætius uirentiusq; inuenitur, latiorib; folijs, <sup>\*Gymnosum.</sup> satis glutinosum. \* alterum exilibus furculis, ac tenuibus folijs, quod aliqui præsum uocauere. Optimum est Cilicium, & Cretense, & Smyrneum, & in Chio Chooq; proueniens. Omnia ex calfaciunt. urinam cient. aluo accommodantur. decocto potu bilem deiciunt. lienosis ex aceto bibere prodest. contra pota ixiæ uenena in uino bibuntur. menses trahunt. peripneumonicis, tussientibus, ex melle in eclegmate dantur, grata ac mitis eorum potio est: quare cibum fastidientibus & stomacho acida ructanti, imbecillōque traditur. item si à marina iactatione nausea, & æstus præcordiorum excitetur. tumores uerò cum polenta illita discutunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Tragoriganū Dioscorides in duo genera dispefcit, quæ à Plin. tribuuntur Heraclio. Ruellius suspicatur hanc Gallis mastichinam herbam dici, quoniam lentore quodam interdum madescit, aut quòd iucundum mastices spicet odorem, studiose nuper in hortis coeptam feri, frutico serpylli uel origani, eolicis ramisq; non dissimilibus, folijs samplici, flore paruo, odorato, in umbella, in qua propendunt incani hircorum uilli: unde ductum Tragorigani nomen existimo. Odore samplicis non cedit. Gero manis adhuc incognita, Herba masticha officinis Gallicis appellatur.

Pulegium



## Pulegium.

## Cap. XXX.



**P**ulegium herba vulgaris notitiæ. Extenuat, calfacit, decoquit. menstrua, secundas ac partus eijcit. pulmōnis vitia ex melle & aloë potum extrahit. conuulsis auxiliatur. nauscas stomachiq; intercisiones, ex posca permulcet. atram bilem per aluum exigit. bibitur in vino utilissimè contra serpentium morsus. defectos animo recreat, cum aceto naribus obiectum. gingiuas arefacti cinere corroborat. illitum cum polenta inflammationes omneis sedat. podagris per se subuenit, impositum usque dum rubescat locus. cum cerato uaros extinguit. lienosis cum sale utiliter illinitur. decoctum eius ablutas pruriges mitigat. conuersas uulvas corrigit. contra inflationes duritiassq; uulua, in defecsiōnes conuenienter adijciatur. Vocant aliqui blechona, quoniam dum floret gustatum à pecoribus, balatum concirat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè γλῆχυρ. Latine pulegium poleum.

Officinis non retinet.

Germanis poley, Hertz poley.


Gallis du poultot dicitur.

Pulegium nota herba est. Huius natura ut lib. 19. testatur Plinius, in carnarijs res florens est. Vnde idem libro 18. dixerat: miretur hoc qui non meminit ipso brumali die pulegium in carnarijs florere, idè nihil esse occultum natura uoluit. Et lib. 2. ait: floret ipso brumali die suspensam in testis arentis herba pulegij. Est autem calefaciens, & concoctiones adiuuat. Efficax ad recreandos defectos animo cum surculis suis in ampullas utreas aceti deiecitum. Quæ de reussa dignior è pulegio corona uertigini quam è rosis cubiculis nostris pronuciata est. Nam & capitis dolores imposita dicitur leuare. Quin et olfactu capita tueri cōtra frigorum assusq; iniuriam.

## Dictamnus.

## Cap. XXXI.

## Dictamnus officinarum.



**D**ictamnus, aliquibus syluestre pulegiū uocatur, Creticis herba est, acris, læuis, pulegio similis, sed maioribus folijs, quæ tomento quodā spissaq; lanugine pubescunt. florem nullū aut semen profert. Præstat omnia quæ satium pulegium, sed efficacius multò. non potum modò, sed appositum quoq; aut suffusū, defunctos partus eijcit. Prodeunt in Creta capras sagittis percussas, huius herbae pastu eas excutere, purgandum.



diuim habet succus, illius, aut cum polenta tritus. herba impactos pedibus reli-  
quoue corpori aculeos, illitu refigit, ad lienis dolorem efficax habetur, siquidem  
ipsum imminuit. Metunt aestate & autumnu. Radix eius gustu talfacit. partus ac-  
celerat. succus cum uino potus, contra serpentium morsus praesidio est, tanta her-  
bae facultas est, ut olfacta abigat bestias quae uenenato ictu sauiant, appensaq; co-  
tactu exanimet. uulneribus ferro illatis, & uenenatis moribus, infusus succus  
praesentaneo est remedio, si etiã ab instillatione statim in potu assumatur. Quod  
pseudodictamnium uocant, multis in terris nascitur, ante dicto simile, sed mi-  
nus quàm illud acre. Eosdem effectus praebet, sed inefficacius multò. Defer-  
tur à Creta alterum dictamni genus, folijs sisymbrij, ramis maioribus: in quibus  
flores syluestris origani, nigri, molles. odor foliorum inter sisymbrium & saluiã  
iucundissimus. Efficax ad eadem, sed minus nares ferit. miscetur emplastris et me-  
dicaminibus quae aduersus serpentium iniurias confinguntur, theriaca uocant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Veri dictamni descriptioni Dioscoridis ad omnia respondens hodie in magna copia ad nos defer-  
tur. Quae autem uulgo circumsertur dictamni radix est potius pseudodictamni aut Peroniæ maris, ut  
uir doctissimus Hieronymus Trigaui testatur. Creticus laudatur potus & appositus. Metitur aestate  
& autumnu.

Dictamnium quod è Creta deferitur, Dioscoride teste, folio sisymbrij, ramis maioribus, flore sylue-  
stris origani, nigro, molliq;. id hodie Galli tum diptamnũ, tum hortensẽm gigeberim appellam, quod  
a suo saui statim os adurat, & linguam uellicet &c.

Saluia.

Cap. XXXII.



**S**alvia siue ele-  
lisphacon, fru-  
tex est ramo-  
sus, longus, uirga  
habens quadran-  
gulas, & canas: fo-  
lia mali coronei  
effigie, sed longio-  
ra, asperiora, cras-  
siora, & quae sen-  
sum attritã quali-  
uestium scabritie  
referant, hirsuta,  
subalbida, perquam  
iucundo odore, sed  
grauis. semen sum-  
mis in caulib. syl-  
uestri ormino si-  
mile gerit. In aspe-  
ris nascitur. Men-  
ses cit et urinas, de-  
coctum foliorum  
ramorumq; potũ.  
partus extrahit.  
pastinacæ marinæ  
ictibus auxiliatur  
capillos denigrat,  
uulnerũ sanguinẽ  
cohibet. tetra ul-  
cera purgat. testium pruritus sedant rami foliaque, si  
decoctoeorum foueantur,

NOMI



Græcè ἑλελίοφαν. Latine Salvia.

Officinis genuinum nomen seruauit.

Germanis Salbey. Gallis Saulge dicitur.

Salvia quod ad multa, præcipue fecunditatem sit salutaris, ἑλελίοφαν. Græcis, quasi filuestris lens dicitur, folio est maiore, squalidior, scabriore. hæc Germanus hauren salbey dicitur: Sphacelus uero breuiore & tenuiore. Quæ Theophrasti uerba nostram Saluiam feminam. Germanis edel salbey, ðrecht salbey uidentur exprimere. Calfacit euidenter, & astringit ἑλελίοφανος.

Mentha.

Cap. XXXIII.

Sisymbrium.



**M**entha, cognita herba est. Calfaciendi, astringendi, atque exiccandi uim habet. Sifit sanguinem, potio ex aceto succo. tincas in uentre teretes enecat. uenerem stimulat. singultus, uomitões, choleraeque sedant terni ramuli cum acidi granati succo poti. suppurationes discutit, si cum polsta illinatur. imposita fronti, capitis dolores mulcet, mammas, si tendantur, aut lacte turgent, compescit cum sale canum moribus illinitur. auribus doloribus cum aqua mulsa subuenit: uulua ante coitum admota, conceptio

Strawen mintz.



nresit. it. linguae scabritiem conficta laungat. coire lac, densarique in caseum non patitur, si folia potionibus lactis immergantur. in summa, stomacho utilis est, & incondimentis peculiarem gratiam habet. Syluestris mentha, Latini mentha firum uocant, hirsutior est folio, & prorsus maiore quam sisymbrii, grauiori odore: quare minus ad sanorum usus expetitur.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἑλελίοφανος μινθῶν.

Latine mentha.

Officinis nomen seruat.

Germanis Mintz, balsamkrent.

Gallis de la mente dicitur.

Menthae in uniuersum duo sunt genera. Una enim satiuæ & hortensis est, altera syluestris & fira. Satiuæ iterum quatuor præcipua sunt genera una est quam Germani deymment, impliter, uel, frans deymment uocant.

Alte: a



Balsam münz.



Bergmünz.



Altera quam iidem Brachy balsam.

Tertia quæ iisdem Balsam münz appellatur, & vñser Frauen münz, uel spitz münz, à nostris  
etatis herbarijs Romana, uel Saracena.

Quartam Germani quidam hertz Kraut, nonnulli balsam Kraut uocant. Per me tamen licebit hæc  
species, quandoquidem facultatibus similes sint, ut cuius placuerit nominare. Nobis autem ut cer-  
tius discernerentur prædictis nominibus appellare placuit.

Nō ignoramus plures esse menthe species, nos tamē eas duntaxat quas uidimus, pictas exhibemus.  
Sylvestris mentha Græcis ὀδύσμος ἁγίου.

Officinis Latino nomine Menthastrum. Germanis / wild münz / fisch münz / bach münz /  
ros münz / wentzen Kraut / nam habet & hæc plures species. Gallis de la mente saulage dicitur.

Menthe nomen, ut Plinius tradit lib. 19. suauitas odoris apud Græcos mutauit, cum alioqui mint  
uocaretur: (Hædiosmo illi nomen est) unde ueteres nostri nomen declinauerunt. Omnis mentha spe-  
cies tam hortensis quàm sylvestris, gustu acris, & facultate calida est, ex tertio ordine exaltatione-  
tium. Infirrior tamen est hortensis, minusque calefacit. Exiccat autem in secundo ordine: illi enim ex  
cultura aliquid humiditatis accedit. Grato mentha menses odore percurrit in rusticis dapibus ut

Plinius scribit lib. 2. quod Mentha odor animum excitet, & sapor auiditatem in cibis. Celsus eam  
inter urinam mouentia nūmerat inquit: Vrinam autem mouent quæ curque in horto nascentia boni  
odoris sunt, ut apium, ruta, acetum, ocimum, mentha.

Calamintha



## Calamintha

## Cap. XXXIII.




**E**X calamintha generibus quedam montibus familiaris, folia ocimi habens, incana, furculos aridos, & caules angulosos, purpureum florem. Altera pulegio similis est, sed maior: quam sylvestre pulegium ideo appellant, quod odore ipsum æmuletur. nepetam Latini uocitant. Tertia menthastrum cognata est, folijs oblongioribus, caule & ramis maiorib. quam superioris, sed uirib. inefficacior. omnium folia gustu impense feruentia & acris, radix superuacua. Nascitur in cæpistris, asperis & aquosis. Potu aut illitu demorsis à serpente opitulatur. decoctum potu menses & urinas expellit, ruptis, cõuulsis, orthopnoe, torminibus, choleris, horroribusq; auxiliatur, regium morbum expurgat, presumpta in uino uenenis resistit. tinea ceteraq; interaneorum animalia, cum sale & melle pota, enecat, nec secus cocta crudæ si teratur. elephanticos esitata adiuuat, si postea serum lactis ebibatur. Folia detrita si in uellere subiiciantur menses extrahunt, & partus enecant. accensa aut substrata, serpentes fugant, nigris cicatricibus candorem reddunt, in uino cocta & illita, sugillata tollunt. Calamintha ischiadicis imponitur, ut ex alto humores euocet, summam cutem exurens, uermes necat succus auribus instillatus.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Calamintha, uel cum Nicanoro Calamentum, Galeno duplex est: domestica, & efficacior mō. lib. 6. comp. ph. part. & Thymum. uocari in suatheriace, cum cætera Græcè appellari. Dioscoridi triplex lib. 7. simpl. lib. 1. aotid.

## Thymum.



est, prima montana, uulgare calamentum: secunda pulegium sylvestre, Germanis Wilder poley. Gallis du poulliot sauage. Tertia herba cattaria, Officinis Romanum nomen retinens, Nepita: Germanis Trypt & Fagen münz. Gallis de l'herbe au chat dicitur, ut Ruellio uidetur. Musc uero contrā, tertia uulgare calamentum, secunda cattaria putatur. Ob imperfectum omnium historiarum in hac sententiarum uarietate iudicium difficile, nec æquiuocum uocem addit Aduarius. Galeopsis, que uulgo herba cattaria putatur esse, urtica foetida purpureis floribus uidetur.

Calaminthe calida sicca gradu tertio, acris, parum amara, tenui substantia, cutim calfacit, mordet, sugit, postremo ulcerat: tamen eius succum uulnericam cerebri meningas diuidenti in fusum, nulli farina sicca superiecta glutinare affirmat Archigenes apud Galen. lib. 2. comp. phar. part. lib. 7. simpl.

## Thymum.

## Cap. XXXV.

**T**Hymū ab omnibus cognoscitur, furculosus frutex, exilibus folijs multis & angustis circumdatus: capitulis in cacumine, flore purpureo refertis. Gracili solo & petroso provenit. Vim habet hanc, ut cum sale & aceto potum, pituitam per aluū detrahat. decocti us prodest orthopnoeis, & anhelatoribus. tinea uentris exigit, menses, partus, & secundas pellit, urinas ciet, cum melle et eclegmate faciles facit excreationes, recētes tumores diluit, cum aceto

T



ilitum, concretum sanguinem dissoluit, uerrucas thymi colorem reddentes, pen-  
silesq; tollit, ischiadicis cū uino & polenta impositum subuenit, heberib, oculis in  
cibo prodest, perquā utile pro cōdimento, duntaxat ad usus corū qui rectē ualēt.

## N O M I N A E T E X P L I C A T I O.

Græcè θυμ. Latine Thymus. Officinis genuinum nomen seruaui. Germanis Thymian  
Edelbalsamkraut/welscher quendel. Gallis duthym, maiorana Anglica dicitur.

Thymum cōmendatur maximē Atticum, aut ex locis siccis & editis: calidū siccum ordine tertio, in-  
cidit, menses & urinas mouet, crassa & lenia ex pulmone & thorace expectorat. Epithymum Græ-  
corū est flos thymi saturæ similis, calidus siccus gradu tertio, omnia potest que thymus, sed efficacius,  
ob id illius penuria hoc uti licet, mensura tamen maiore. Datur Epithymū drach. quatuor cum sero la-  
ctis uel mulsæ, ad educendū humorem melancholicū. Hortū loco si Arabū Epithymo, hoc est, casta thy-

mo innata, ut saturæ seu thymbræ epithymbrū Asturario dictū, & hyssopo  
et maiorana, epysopiu: et orobo orobāthe; & lino linanche, uti libet, quia uires  
cū thymi flore easdē illi Plinius ueterū solus tribuit, dabitur cū Mesue ob imbec-  
cillitatē à drachmis 14. ad drach. 20. Epithymus aut Arabū, ut thymus, est duo-  
plex, hortensis, & hoc calidior, siccior montanus.

## Satureia.

## Cap. XXXVI.

Satureia triuialis notitiæ est, gignit in asperis locis, & tenui  
solo, thymo similis, minor tñ & tenerior, defert spicā florum  
plenā, coloris herbacei. Eadē potest que thymū, si modo cōsimi-  
li sumptetur. Aptus senis usus. Est etiamnū quedā fatiua, syl-  
uestri prorsus minor, quæ propter mīoriē acrimoniā, com-  
modius in cibos recepta est.

## E X P L I C A T I O.

Græcè θυμ. Latine Satureia, hortensis thymbra. Mart. in pluralimen-  
tro est usus. Improba nec prosum iam satureia tibi.

Officinis latinum nomen retinuit. Germanis Gartenhyssop/swibel hyss-  
op/saturey/sadaney. Gallis sarrieta, quasi satureia. Satrea.

Satureia herba est fragrantis odoris, & alio nomine thymbra uocata, & in-  
ter cunilæ numerata. Columella lib. 9. cap. 4. Tum etiā thymbræ, uel nostratæ  
cunilæ, quam satureiam rustici uocant; & paulo post, Nostræ cunilæ, quā dixi  
satureiam. Plin. lib. 19. 8. Thymbra uerò quæ sit cunilæ, hoc apud nos habet uoca-  
bulū. & aliud satureia dictam condimentario genere. Columella tamen thymbrā  
à satureia discrepare semit hoc senariolo.

Et satureia thymu referens, thymbræq; saporem.


Columella itaq; thymbrā à satureia discreuit, et nostratē cunilam esse docuit  
quā rustici uocant satureiā colore floris purpureo, thymbrā uerius herbaceo.

## Serpillum.

## Cap. XXXVII.

Serpillum duorum generum est, Hortense odore sampsu-  
schū imitatur, atq; in coronas addi solet, cui à serpēdo nomē  
inditū est: quoniam si qua eius particula terrā attingat, inibi ra-  
dices demittet, folia & ramulos origani habet, sed candidiores  
sin maceris multo procerius assurgit, Syluestre, zygis appella-  
rū, non serpit, sed in altitudinē increfcit, ramulos ædens tenues  
surculosos, folijs refertos longioribus quā rutæ, & duriori-  
bus, angustis, flores iucundē olent, gustati acres, radicis nullus u-  
sus. Nascit in petris, satiuo efficacius, atq; magis ex calfaciens,  
& ad medēdi usum aptius, Menses trahit, urinā potu ciet, tormi-  
nib, ruptis, uulsi, & iecinoris inflāmationibus auxiliatur, & ad  
uersus serpentes potu illitūue, capitis dolores mulcet coctū, ad-  
iecto rosaceo, & madefactum in aceto, maximē uerò phreniti-  
cis & lethargicis conuenit, cruentos uomitus sedat succus, dra-  
chmis quatuor ex aceto potus,

N O M I -





## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἑρπύλλιον

Latinè Serpillum.

Germanicè Quendel/hünerkül.

Gallis Serpouillet, pillolet.

Officinæ latinum nomen servauit.

ἑρπύλλιον Græcorum, & inde serpillum Latinorū, dictum est à serpendo, tum quia per terrā, quā illud contingens radicatū, serpit: tum quia iuxta sepes plantatū, aut ex altiore loco deorsum demissum adiecto illi pedamento, in longum protrahitur, ut hoc loco Dioscorides & libr. 6. de plantis Theophrastus testatur. Serpillum gustu acre est, ob id calidum ualde. ita ut menses & urinam moueat.

Sampsuchum.

Cap. XXXVIII.



Sampsuchum in Cypro et Cyziceno laudatissimū. secundum sibi locū uendicauit Aegyptium. Amara cū gens Sicula & Cyzicena appellat. Herba est ramosa, per terram repēs, folijs eius calaminthe quæ tenui folio constat, leptophyllos appellatur, hirsutis et rotundis, suauissimum odorem spirat, ideo coronis inferitur. Vis eius exalfaciens. succus decocti potus, conuenit incipientibus hydropicis, & ijs quos urine difficultas, aut tormina excruciant, illita ex melle arida folia, sugillata tollunt. menses subditi in pessio trahunt. contra scorpionis ictum ex aceto & sale illinuntur. luxatis tumoribusq; cerato excepta imponuntur. aduersus oculorum inflammationes, tumoresq; cum polline polentæ illini prodest. acopis malagmatisq; calfaciens digratia, commiscetur.


## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἄμαρυλλον ἢ ἄμαρυλλον.

Latinè Sampsucus, uel sampsychon, amaracus.

Officinæ Maiorana. Germanis Mayeron. Gallis Mariolaine dicitur.

Melilotus Italica.



Maiorana, Amaracus, sampsychus, Dioscoridi, Theophrasto, Plinio eadem sunt herba: unguentum tamen amaracinum à sampsychino cur diuersum sit Dioscoridi, supra ostendimus libr. i. Calida est herba & sicca ordine tertio, & tenuium partium sampsychū, Gal. li. 8. simpl. Amaracum uero calidum ordine tertio, sic eum secundo, idem lib. 6. simpl. Ex qua temperamenti uarietate, & quod scorsim de his agit, Amaracum Galeno, & post eum Paulo esse dictū uulgo Matricariam suspicantur Hermolaus, Manardus, quæ ipsæ autem uulgo & Parthenium; sed Amaracū Galeni non esse Matricariā uulgarem odore aspernabili, sapore amarissimo, conuincit quæ de Maiorana & Amaraco. Cap. 40. sequenti proficimus. Ad hæc Amaracum se uidisse in Italia crescere scribit Galenus, lib. 1. antidot. tanquam plāta esset italie rara, cum tamen Romæ familiarem esse Matricariā Musæ Ferrariensis affirmat. Nec satis ad confirmandam ipsorū sententiam est, Galenum bis de eadem re non scripsisse, cum bis de absinthio, de aslere, seu bubonio, de chalice scripserit. Parui prater ea est momenti uarietas ordinum siccitatis, quod scilicet amaracus sit secundus ordine secundo, sampsuchus autem tertio: ille enim completo, hic incipiente esse possit, ut in absinthio dixi. Quo fit ut ex his plantis esse uarias nemo possit colligere.

Gal. li. 8. simpl.

Gal. li. 9. antid.

Melilotos, siue sertula campana.

Cap. XXXIX.

Sertula Campana laudatissima in Attica & Cizico & Chaleedone nata. cuius odor uicinus est cro-

T 2



# DIOSCORIDIS

co, boni odoris. Nascitur & in Campania circa Nolam, colore in luteum langue  
sciente, odore infirmo. Vim habet adstrictoriam, inflammationem omnem emol-  
lit, præsertim quæ in oculis, uulua, sede aut testibus erumpat, si ex passò cocta il-  
linatur: interdum autem addito oui luteo affato, aut scœnigræci farina, lini semine  
aut polline, aut capitulis papaueris, intyboue, recentes meliceridas per se cū aqua  
& ulcera manantia in capite, illita cum creta Chia, uino aut galla sanat. stomahi do-  
lores & cruda & cocta cum aliquo ex antedictis leuat. doloribus aurium mitigan-  
dis cruda ex passò instillatur. in aceto aut rosaceo madefacta, capitis dolor lenit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Dioscorides hanc, utpote truialem, non depinxit, circa Nolam tamen Italiae ggni, coloris lutei, o-  
dore languido tradit. Verum tria eius inueniuntur rei herbarie prudenter fastigia, uulgare statim  
ab radice fruticosum, cubitale, flagellus exilibus, coma trifolij, minuta, ac lente simbriata, stofculo melino,  
odoris eiusdem cuius & herba, nempe suavis, tereti ac per ramos diffuso semine. Alterum aspectu ca-  
no, croci odore, ac flore, pinguisimis ac breuissimis folijs. Tertium, cuius picturam tanquam ueri ac ge-  
nuini meliloti damus, simile scœnogræco, folio raro, semine in lunata siliqua, glauco, rotundo, infra sine  
pis amplitudinem, flore luteo, odorato. Nascitur ubiq; Græco nomine Officinis nobilior, ac Latino.  
Germani, Welsch, oder Italianisch steinflee. Galli patellum, & coronam regiam appellant.

Melilotum coquit, digerit, & parum astringit, ut crocus, largior enim est in eo substantia calida  
quàm frigida.

## Marum.

## Cap. XL.

**M**arum herba cognita uulgò, surculosa, flore origani, folijs multū longioribus, flore odoratiore. Vim habet sisymbrio confimilem. Substringit enim  
& modicè calfacit. qua de causa illitu serpentia ulcera sistit, & in calidas illitiones  
additur. iuxta Magnesiam & Tralleis copiosissima gignitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

### Acinas.

Marum herba surculosa, flore origani, sed odora-  
tiore, planta est uehementer odorata & amara, amara  
raco proxima, quo tamen est multò odoratior & amara-  
rior, minus tamè co est acris. Vnguento amaracino fortè  
dicto, quòd amaraci plurimum olim reciperet, nunc so-  
lum marum inmutant: satius tamen est, æqualem amara-  
ci & mari portionem imponere, ut hedychoi composi-  
tioni. qua mistione minus quidem odorum, non tamen mi-  
nus efficax erit. Hec Galenus. Suspicio nobis est uehe-  
mens Marum esse herbam apud Gallos Mastice uulgò dis-  
ctam, Maiorana simillimam, flore tamen muscoso in pe-  
pos abeunte.

### Acinos.

### Cap. XLI.

**A**cinos aut aconos à Græcis dicitur, te-  
nui siccoq; ramulo herba, ocimo simi-  
lis, odorata, sed hirsutior, qua coronæ facili-  
tantur. à nonnullis olitoribus colitur. Men-  
ses & aluum pota sistit. illita panos ignemq;  
sacrum sanat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἀκύνος

Latine Acinus herba.

Officinis incognita

Germanis Kleine basilien

Gallis basilic menue.

Acinos



lib. i. antid.



Acinon Paulus ocimo consimilem prodit, mediocres astringendi vires possidere, quare uentrem & menses potu sistere. Ad panos & ignem sacrum utiliter illinitur. Differt acinos ab acano, quod acinos ocimastrum est, cuius picturam exhibentus: acanos uero spinosa, breuis, & lata herba, eringo qui busdam contributa, spinis latoribus &c.

## Bacharis.

## Cap. XLII.

**B**accharis herba fruticosa, quæ in coronas additur, cuius folia aspera sunt, media uiolæ & uerbasci magnitudine: caulis angulosus, cubiti altitudinem petens, aliquantulum asper, non sine appendicibus adnatis: flore putpureo, subalbicante, odorato: radicibus ueratro nigro similibus, quibus odor inest cinnamomo proximus. Asperum squalidumque solum amat. Radix in aqua decocta ruptis, uulsis, ex alto præcipitatis, spirandi difficultati, salutaris. item diuturnæ tussis, & urinæ difficili, menses pellit. contra serpentium morsus utilissimè datur in uino, recens radix apposita, partum extrahit, puerperis eius decoctum in defensionibus prodest, in diaphanata utiliter inferitur, iucundi odoris gratia, folia utpote quæ adstringant, capitis doloribus illitu profunt. oculorum inflammationibus, mammarum tumentibus à partu, ægilopijs incipientibus, ignibusque sacris auxiliantur, odor somnum gignit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Nostrates officinæ Baccharim non norunt. Rura apud Gallos diuæ Mariæ chiroterat. Germanicè Unser frauen hnedtschüch appellant, eamque neſciunt in coronas. Baccharim esse facile potest intelligi, cum fruticosa sit herba, cuius folia quandam referunt asperitatem, media uiolæ uerbascique magnitudine, caule anguloso, cubiti altitudinem petente, agnatis appendicibus quadamtenus scabris, flore putpureo, subalbicante, radicibus nigro ueratro similibus, Cinamomum subolentibus, asperum squalidumque solum amat. Paulus odoratam esse tradit herbam, odore cinamomum imitantem, quæ coronis dicari solet. Bacchare siscinum depelli Virgilius author est, ita canens.

Bacchare frontem

Cingite, ne uati noceat mala lingua futuro.

## Ruta.

## Cap. XLIII.



**R**uta mōtana syluestrisque, satiuæ et hortensis acrior est, et in cibis dānata, satiuæ uerò quæ sub ficu arborescitur, magis in cibos admittitur. Vtraque urit, calfacit, exulcerat, urinam ciet, menstrua pellit, alui sistit potu cibique, letalium medicamentorum antidotum est, si sescimen ex uino, acetabuli mensura, ebibatur. folia per se præsumpta, aut cum nuce iuglandæ, aridisque ficis, inefficaces uenenorum vires reddunt. contra serpentes simili modo sumere conuenit, genituram cibo potius extinguit, cum anetho sicco decocta, tormina sedat. facit ad pectoris laterumque dolores, difficultatem spirandi, tussis, pulmonis inflammationem, coxendicum articulorumque cruciatus & horrores febrium circuitu repetentes, pota ut antè dictum est. item ad inflationes coli, uulvæ, rectique intestini, cum oleo decocta & infusa. foeminas uulvæ strangulatu liberat, si à genitali sedetenus cum melle subijciatur. feruesfacta ex oleo, & pota, uentris tineas excutit. articularum doloribus ex melle, aquæ inter cutem cum ficis illinitur. eisdem in potu auxiliatur, decocta in uino ad dimidias partes et oblita. cruda conditaque cibo, uisus aciem excitat. dolores oculorum illita cum polenta lenit. doloribus capitis cum rosaceo & aceto illita auxiliatur. proflu-

entem naribus sanguinem sistit, trita & indita, testium inflammationibus cum lau-



reis folijs imposita, & eruptionibus papularum cum myrto & cerato prodest. Cum pipere autem uino & nitro affricta, albæ utiligini medetur. cum eisdem illa fornicationes tollit, & uerrucas quæ thymi florem repræsentant. contra impetigines cum alumine & melle utilissimè imponitur. Succus in mali punici calce calfactus, aurium dolori efficaciter infunditur. hebetudinem oculi qui sensere, ruta cum fœniculi succo ac melle peruncti iuuantur. ignem sacrum, ulcera quæ serpunt, aut in capite manant, cum aceto rosaceo & cerusa per sanat, mansa, aliorum ceparumq; acrimoniam domat. Montana si copiosius estur, interficit. dum florè promit, & ad murias colligitur, cutem inflat, & rubore quodam inficit, cum pruritu ac uehementi inflammatione. oportet itaq; eam unctis antea manibus & facie colligere. Tradunt succum gallinaceis pullis insparsum feles arcere. Adijciunt eam quæ in Macedonia circa Haliacmon amnem prodeat, comedentes interimere. Montosus autem is locus, uiperis scatet. Semen eius potum contra intestina uicia efficax est, in antidota commodè additur. contra incontinentiam urinæ totum, semen septenis diebus potui datur. Radix huius montanum moly uocatur. Syluestris ruta satiuæ similis est. Prodest comitialibus & coxendicū doloribus, menstrua mouet. partus enecat. acrior est uiribus quàm hortensis, et ualidior. syluestris, utpote noxia, cibis abdicatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ῥύτιον. Latine Ruta.

Officinis latinum nomen seruit.

Germanis Weinraut, & simpliciter Raue.

Gallis Rue appellatur.



Ruta hortensis est imbecillior agresti: hæc enim calida ordine quarto (tantum tertio dicitur lib. 6. comp. phar. part. in stomachica Diabesasa) illa tertio: utraq; acris, amara, tenuium partium, ualenter siccans, incidit, digerit ualenter crassos & lenes humores, urinas mouet: flatus & ueneris appetitum cohibet.

## Syluestris ruta. Cap. XLIII.

**V**Ocant etiamnū syluestrem rutam, quod in Cappadocia & Galatia Asiae finitima moly dicitur. Frutex est qui ab una radice multos emittit cauliculos: folijs multo quàm alterius rutæ longioribus, tenerioribusq; odore graui: flore candido: capitulis in cacumine paulo maioribus quàm satiuæ rutæ, quæ tribus maximè partibus constat: in quibus triangulum semen, subrufum, gustu amarum recluditur, cuius est usus, semen autumnō maturascit, quod cum melle, uino, croco & fœniculi succo, ac gallinaceo felle, teritur contra retusam oculorum aciem.

Sunt qui eam harmalam uocent, Syriæ sasan, qui Cappadociam incolunt, moly, quoniam quandam cum moly seruet similitudinem: radice nigra, flore candido: In collibus ex læto prouenit.

ROMB



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè τριφυλλὸν ἀγριοῦ. Latine Sylvestris ruta, Moly, Besanum, Besasa: Officinis & Syris Harmola. Germanis Wild Rauten. Gallis Rue sauvage dicitur.

Ruta sylvestris cuius pictura exhibemus, Hieronymo Trago uiro in simpliciū recta cognitione ex acutissimo fide dignissimoq; è monte Pessulano ab amicis transmissa, adeo legitimæ huius delineationis ei per omnia respondet, ut uerum ac genuinam sylvestrem rutam esse, nemo sanæ mentis dubitare possit. Moly, quod nonnulli rutam sylvestrem, alij Zarmalam dicunt, tertio calefacientium ordini annumeratur, substantia tenui, hinc crassos humores viscososq; incidit, discutit, & urinam promouet.

Nomenclationes quæ contra Dioscoridis morem in calce huius capituli, quod sylvestri Ruta dicatur, subditæ sunt, ad sequens moly magis uidentur pertinere.

Moly.

Cap. XLV.

**M**oly folia habet graminis latiora, humi sparsa: florem albæ uiolæ similem, sed minorem, lactei coloris: caulem candidum, quaternum cubitorum, in cuius cacumine inest aliquid quod alij speciem referat, radix parua, bulbosa, quæ mirum in modum ualet ad aperiendas uulvas, si trita cum irino unguento, in pelulo subiiciatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Moly Galenus Dioscoridis uerba citans μύλλω appellat. Ruta etiam sylvestris (ut supra ostendimus) idem nomen habet. Molon quoq; non alia uidetur, quàm Moly. Laudatissima herbarum fuit, Homero teste, cuius inuentionem Mercurio assignauit, contraq; summa Circeæ ueneficia demonstrauit, de cuius Odyssææ hapodia. Hodie & medicis & officinis planè incognita.

Panaces.

Cap. XLVI.

**P**anaces nonnullis heracleum dicitur, ex quo opopanax colligi solet. plurimum in Boeotia & in Phocidæ\* Arcadiæ nascitur: ibiq; compendij & quæ-  
 stus, qui ex eo liquore facitur, gratia studiose colitur. folijs est asperis, in terra iacentibus, herbaei coloris, multum ad ficulnea accedentibus, in ambitu quinque par-  
 titis diuisis; caule, ut ferule, altissimo, qui lanugine quadam incanescit, folijs etiam  
 minoribus obsitis, muscarijs, ceu anethi, in cacumine: flore luteo, & semine o-  
 dorato feruentem. radices habet multas ab origine una, candidas, graueolentes,  
 crassi corticis, & iuramari gustus. Nascitur in Cyrene Libyæ, & Macedonia.  
 Excipitur succus incisa radice, recenti caulium pullulatu, ea candidum succum e-  
 mittit, qui siccatus, in summa cute croceum colorem contrahit. Effluentem au-  
 tem succum excipiunt, folijs excavato solo stratis, quæ siccata tolluntur. Simili  
 modo caule mellebus inciso, profluentem succum eximunt. Meliores ex radici-  
 bus, albæ, rigentes, distentemq; siccæ, quæ cariem non sentiant, aromaticæ, feruen-  
 tes gustu. Fructus ex media ferula cibo idoneus est: sed ex agnatis stolonibus, ab  
 usus cibario abhorret. Maxime in hoc succi genere probatur quàm amarissimus,  
 internè albus, aut subfuluus, foris ad croci colorem inclinans, laxus, pinguis, fri-  
 bilis, tener, statim in aqua eliquescent, graui odore, niger improbatur, ac mollis.  
 Adulteratur ammoniaco aut cera. Sed synceri experimentum est, si digitis in a-  
 qua friatus resoluitur, & lactescat. Ex calfacit, mollit, extenuat. horribus febris  
 um circuitibusq; uulsi, ruptis, laterum dolori, torminibus, stillicidio urinæ con-  
 uenit. contra uescicæ scabiem ex aqua mulla aut uino bibitur, menses trahit. foe-  
 cum enecat, inflationes quæ uulvam male habent, duritiasq; ex melle dilutus, di-  
 scutit, ischiadicis illinitur. acopis & capitis medicaminibus admiscetur. carbuncu-  
 los rumpit. podagricis cum una passa illitus subuenit, dolore dentium liberat, ca-  
 uis inditus, oculorum aciem illitu excitat. ex eo & pice optimum fit emplastrum  
 contra bestiarum morsus quæ in rabiem efferantur. Radix in ramenta confissa,  
 uulvæ admodum, partus extrahit, ad uetera ulcera efficax est, nudata ossa, corpore o-  
 perit, si trita cum melle illinatur. Semen cum absinthio sumptum, menses pellit.  
 cum aristolochia, prodest aduersus animalia quæ uenenum ei aculantur. contra  
 uulvæ strangulatus in uino bibitur.



# D I O S C O R I D I S

## NOMINA ET EXPLICATIO.

**Panaces** (πᾶνες) nomine statim morborum omnium remedium se pollicetur. Communis est pluribus herbis nomenclatura, Centaury, Ligustico, Tithymallo, Origano Heracleotico. Dioscoridi tamen priuatim sic nominantur tria solum genera, proximè sequentiā primum de quo presenti capite agi, Graecis πᾶνες ἰσχυροί, Latinis Panaces Heracleum, id est, Herculeum dicitur. Oppopanax liquor è Panacis Heraclij radice incisa emanans, cum caulis primum erumpit, aut uulnerato caule mēsis: calidus ordine tertio, siccus secundo, emollit, digerit, modicè terget, ob hoc ossa nuda uestit carne, ulcera maligna & contumacia sanat. Recens est candidus, ubi aruit, colore foris est croceo. Nostrum quod habemus, aliqua amaritudine insignitur, non tamen amarissimum est, & graui odore sentitur. Propterea cum nostro aliquid mixtum arbitror, quod intensam amaritudinem tollit, uel opus est quantitatē notatu dignam mandere, si intensa amaritudo sentiri debeat: in reliquis notis penitus conuenit.

**Panaces Asclepij.**

**Cap. XLVII.**

**P**anaces Asclepij, caulem à solo emittit tenuem, cubitalem, geniculatum, maioribus quàm fœniculi folijs, hirsutioribus, odoratis: aureo flore, acris, odorato, ex muscarijs dependente, radix parua est & tenuis. Auxiliarem uim habent flores & semina, contra ulcera, phagedænas, & tubercula, si trita cum melle imponantur, aduersus serpentes ex uino bibuntur, & cum oleo illinuntur. Alii qui Panaces syluestre origanum uocant, alij cunilam, de qua in origani mentione diximus.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

**Panaces Asclepion** dictum aiunt, quoniam filium Aesculapij Panacium uocauerit. Huius radicem Theophrastus multi & salsi corticis haberi dixit, quod quidem priori generi à Dioscoride tribuitur. Ligusticum.

Est & hec Medicis cum officinis hodie incognita.

**Chironium Panaces. Ca. XLVIII.**

**C**hironium Panaces in Pelio monte maximè provenit, folium eius amara co\* simile, flos aureus, radix parua, quæ nō altè demittitur, gustu acris. Pota radix serpentium ueneno resistit, illita coma, eadem præstat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Et hoc ab inuentore nomen retinet, cui folium rui micis Theophrastus et Plinius reddunt, maius tamen, hirsutius, radice parua. Nascitur pinguibus, flore ad supradicta efficaci, nobis hodie incognita.

**Ligusticum. Cap. XLIX.**

**L**igusticum, quod alij panaceam, alij panaces uocant, plurimum in Liguria nascitur, in monte Apennino, Alpibus cō termino, unde nomen traxit. Panaces incole non ab re appellant, quoniam & radice & caule, heracleotico panaci simile sit, & uiribus eisdem præditum. Gignitur in altissimis asperisq; montibus, ac umbrōsis, maximè iuxta fluenta, cauliculum fert anethi, geniculatum, tenuem, & in circuitu folia fertulæ campanæ, molliora, odorata, prope uerticem graciliora, et longè magis diuisa: in cacumine muscarium, in quo semen dependet nigrum, solidum & oblongum, fœniculo proximum, quantiacre, sit & aroma

\*Lapathos,  
Theoph.





& aroma olens: radix candida, heracleotici panacis similis, odorata. Radicis semina quibus excofactoria, concoquens, prodest ad intestinos dolores, tumores, concoctiones. item a flatulationibus, præsertim quibus stomachus turgat, & contra serpentium ictus, urinas & menses potu trahit. Eosdem præstat effectus appositæ radix. Semen cum radice oxyporis & medicamentis decoquentibus admiscetur, ori perquam utile, quare pro pipere utuntur eo indigenæ ad obsonia. Adulteratur semine quodam simili, quod facile gustu discernitur: amarum enim est. Alij semen foeniculi aut fœnelis admiscentes ligusticum dolo vitiant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *Λιγυστιδόν, Λιβυστιδόν.*

Latine Ligusticum, Galenus Libysticum.

Officinæ corrupto uocabulo Leuisticum.

Germani Liebstickel vocant. Gallis Leuistic appellatur.

Ligusticum à Ligusticis alpinis, in quibus frequens nascitur, Galeno & Actuarius unius literæ mutatione Libisticum, sylvestre, hodie rarum, semine solo usum Manardo, radix imperatoria vocatur Leoniceo & Muse. Hoc autem accipiendum in compositionibus Arabum pro Keisin seu Liusico, aperte docet Diatrion pipereon, & dia Calanthes, à Nicolao & Mesue ex Galeno paucis admodum mutatis descripta. In quibus & alijs non paucis Arabum descriptionibus, ut diacymino, diamoscho, lybisticum reposuit Actuarius. Vulgarè autem Leuisticum, sativum est, ob id minus efficax: nec Smyrniacum est cum Ruellio, aut apij, vel dauci genus, cum Manardo, Smyrniacum putante petroselinum Alexandrinum vel Macedonicum, nam quod folia latiora aliquantulum, radixq; foris non adeo ater, cultura ad scribendum nam cætero similissima est.

## Pastinaca.

## Cap. L.

## Pastinaca vulgaris.

Pastinaca Gallica sylvestre genus, cuius semine pro Dauco utuntur officinæ

Pastinaca Gallica, Germanis Sammarzen / Rot & Gelbrüden appellata.





**P**astinaca sylvestris folia gingidij habet, latiora, sub amara: caulem rectum, scabrum: umbellam similem anethi, in qua flores insunt candidi, & in medio purpureum quiddam, ferme croceum, radix digiti crassitudine, dodrantalis, odorata, quæ cocta manditur. Semen potum uel impositum, menstrua mouet, ipsi conuenit in potione, quos urinæ difficultas torquet, aut lateralis dolor excruciat, aut si aqua cutem subijt. serpentium moribus ictibusq; prodest. presumentes id nulla affici iniuria à serpentibus traduntur. conceptus adiuuat. Radix urinam pellit, uenerem stimulat, partus apposita eijcit. Folia trita, & cum melle imposita, phagedænas ulcerum purgant. Satiua ad eadem pollet, inefficacior tamen, & cilior aptior.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Pastinacæ duo generat traduntur unum satium *ἑταφυλίον κνίανος*, Græcis: pastinaca satia Latinis: Pasteney, dicitur Germanis. alterum agreste, quod Daucus etiam appellatur, aut hore Galieno et paulo Aegineta hoc græcis *σαφυλίου ἀγρίου*, Latinis semper cum addito pastinaca erratica. Wild pasteney / Vogels nesten / Gallis uero Carottes sauuage appellatur. Est & alterum genus in eodem similitudine pastinacæ quam Gallicam pastinacam uocant, Germani Gelb & Rot Rüblin / uel Moren. Galli Caryottes, præ dulci radice, odorata, rufa: uel interdum purpurea, cuius generat etiam quatuor fecere. De quibus etiam Dioscorides agit sub dauci nomine infra cap. 67.

Pastinacæ omni calens natura est. Efficacior sylvestris, magisq; in petrosis nata.

Seseli.

Cap. LI.



**S**eseli Massiliense folia Fœniculi habet, crassiora: caulem uegetiorem: umbellam anethi, in qua semen oblongum, angulosum, degustanti statim acre. radix longa est, iucundi odoris. Semen & radix ex calfacienti uim habent. potu stranguriæ & orthopnœæ medentur, suffocationibus mulierum comitialibusq; profunt. menses & partus trahunt. ad omnia interna mala pollent. tussim ueterem sanant. semen cum uino potum, concoquit, & tormina discutit, epialis febribus utile. contra perfrictiones in itineribus, cum pipere & uino bibitur. capris, cæterisq; pedibus datur in potu, quod facilius suos foetus enitantur. Aethiopicum Seseli, folia habet hederæ, minora, & ad periclymeni modum oblonga. frutex nigricat, palmitibus in bina cubita extensis: ramis sesquipedalibus: capitulo anethi: semine in tritici morem denso, nigro, amaro, Massiliensi odoratiore, & acriore, multum suauis. Peloponense folia habet cicutæ, latiora, & crassiora: caulem supra Massiliensis magnitudinem, ferulaceum, & latum: in cacumine umbellam, in qua semen

latius odoratum, & carnosum pendet. Eisdem uiribus præditum est. nascitur in asperis, riguis & collibus. inuenitur etiamnum in insulis.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis *Σέσλι μασιλιαντικόν*. Latinis Seseli Massiliense. Officinis Siler montanum. Herbarijs quibusdam maior saxifraga. Germanis Sesel / Welscher Steinbrech. Gallis Ser montan apud Allobroges.

Sil siue file herba est alio nomine Seseli appellata, cuius radice uel semine olim uina condiebant, quæ ante meridianum tempore sumebant. Vnde silatam ueteres dixerunt, quod nunc isemaculum uocamus.

Seseli



Seseli fructa & radice, id est, semine, ualde calet, ac tenuum est partium, quare urinam mouet, epilepsia & orthopnea confert: Laudatur Masiliense. Et alterum etiam Aethiopium, & tertium Creticum de quo in capite sequenti. &c.

## Creticum seseli.

## Cap. LII.



Sison.



**T**ordylum, quod aliqui Creticum seseli uocant, iuxta Ciliciam in Amano monte nascitur, herbula surculosa, semine duplici, rotundo, scutulorum effigie, odorato, subacri. Contra urinæ difficultatem bibitur, potu cit menses. succo seminis caulisque uirentis, renis obolis ex passo decem diebus hausto, renes sanantur, efficax est radix ad ciendas pectoris excreationes, in delinctu cum melle.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Τορδύλιον, Tordilium uel Tordylon, & Seseli cretica cum Paulo Gordylon: & Tortilen aliqui semen Seselis esse dixerunt, alij herbam per se, quam & Syreon uocauerunt, de qua nihil aliud proditum inuenisse scietur Plinius quam quod in montibus nascitur, ambusiam citere menses &c.

Item est Tordylon quod latius hoc loco à Dioscoride representatur in Amano Cilicie mone, breuis & fruticosus herba, semine paruo orbiculato, duplici, clypeolis simili, modicè acri, & aromatum modo odorato. hodie herbarijs (in fallor) incognita. quod Fuchsius falso exhibet pro Cretico Seseli, cuius picturam damus, M cum est.

## Sison.

## Cap. LIII.

**S**ison exiguum semen est, in Syria natum, sapio simile, nigrum, feruens, oblongum. Contra lienis uitia bibitur urinæ difficultatem potu emendat. remoratos menses citat, quo in condimentis, cum cucurbita, & aceteto, indigenæ utuntur, in cacumine granula multa gerit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Σίσυρις

Latine Sison.

Officinis falso semen Anom.

Germanis Frembder petersilien dicitur.

Officina eius herba cuius picturam damus semine habet, pro uero Græcorum Anomo usi sunt, non tamen sine errore, cum hæc herba cum Anomi planta nihil habeat commune, ut facile iudicium feret qui utriusque historiam conferre uoluerit, & uerum esse Sison cernere si quoque diligenter, & huius delineationem examinauerit.

## Anisum.



## Anisum.

## Cap. LIII.

\* Addit alij:  
Diffundendi  
nim habet.



Gal. li. 6. sim.

Gal. li. 6. sim.

tho autem semen latum & foliatum Ruellius tribuit: ex quo scriptore nescio, nisi forte Anethum no-  
strum pinxit, non descriptum ueteribus.

## Carum.

## Cap. LV.



Carum, semen est uulgaris notitia. Excalfacit, uri-  
nam concitat. stomacho utile. os commendat.  
concoctionem adiuuat. utiliter miscetur antidotis &  
oxyporis, anisi uicem præbet, radix cocta, pastinacæ  
modo manditur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Κάρος, Et recentioribus Græcis Carnabum, uel Carnaba-  
dium, ut quibusdam placet:

Latine Carum, Carium, Karos.

Officinis & herbarijs tantum paterno casu cognitum, carui enim  
omnibus ore uno dicitur.

Germani Wattenmümel, Wisentmümel.

Galli Carui uocitant.

Cari semē calidum siccum ordine tertio, mediocriter acre, urinas  
mouet, flatum discutit: planta etiam reliqua ab hoc utilis à Caria re-  
gione laudatissimum afferebatur: unde illi nomen multiplex, Carum,  
Carion, Careon, Caraon, Carota, siue ut nunc pronunciant careota.  
Cari siue Carci, unde nomen traxit, radix est: quam Athenæus dipno-  
sophistarum lib. 9. celebrans, maiorem pastinacæ falso appellat,  
uulgari & cotodiana illa meliorem: quæ etiam elixa Pastinacæ mo-  
do estur, ut hoc loco Dioscorides quoq; testatur, licet seorsim etiam  
sub sisari nomine de eadē agere quibusdam uideatur supra ca. 104.  
li. 2. his uerbis. Suauis in cibo ori elixa sisari radix est, stomacho u-  
tilis. Vrinam cit, & cibi appetentiam excitat.

Præterea Paulus Aegineta lib. 1. cap. de ijs quæ edendo sunt radicibus, hanc tanquam congenerem  
astinacæ & dauco simul iungit, inquit: σαυλίρις δ' ἐστὶ καὶ δ' αὐτὰ καὶ κάρος & μέγιστον, id est,  
Staphilin




Staphylini uerò, quæ pastinaca est, & dauci & cari radices. Vbi cari radice, sifer transferunt inter pretes, errore manifesto: nã hæc genera nos ita distrahimus ut pastinaca, quæ Staphylini Græcis dicitur, sit nostra uulgaris pastinaca, Germanicè pasteney dicta. Dauci uerò radix sit uulgaris illa radix, Germanis Maren/ Gel oder rot rüben dicta. Sifer autem, cuius Plinius meminit lib. 19. Germanorum Geyerlein & Carota Cari radix Germanicè Matt Fymmel wurz: quod multi docti uiri nõ animaduertentes, has radices magno errore confundunt.

## Anethum.



Cuminum satium.



## Cap. LVI.

**A**Ridi anethi comæ seminisq; decoctum, potulac euocat, inflationes, & tormina sedat. aluum, uomitionesq; sistit urinas ciet, singultus lenit, oculorum aciem hebetat, geniturâ retinguit, assidue potum, sceminis uulua malo opportunis, ad defelsiones utile, condylomata illitus eius cinis tollit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci ἀνῆθον. Latine Anethum.

Officinis latinum ac genuinum nomen seruauit.

Germanis Dyll. Gallis Anete dicitur.

Anethum calidum secundo ordine, siccum primo, tenuium partium, digerit, ex oleo decoctum dolores sedat, somnum conciliat, crudos humores coquit, præsertim uiride, quia minus calidum & humidius est. Vñum autem calidum siccum gradu tertio fit, ulcera præhumida, præcipue pudendorû et præputij cicatrice tegit. Coma florum odoratissima, & semine nobis consuetissimum est.

## Cuminum satium. Cap. LVII.

**C**Vminum satium ori gratum est: sed multo magis Aethiopicum, quod Hippocrates regi um appellauit. secundum locum tenet Aegyptium. reliqua sequuntur. Prouenit in Galatia, in Asia, Cilicia, & Terentia, & plerisque alijs tractibus. Excalfacit, adstringit, exsiccat. ad tormina inflationesque conuenit, coctum & cum oleo inditum aut cum hordeacea farina illitum. orthopnoicis datur in posca: demorsis à serpente, in uino. testium collectionibus auxiliatur, impositum cum uua passa, aut lolij farina ceratoue. mensum abundantiam inhibet. contritum autem in aceto, & naribus obiectum, sanguinis profluvia sistit. colorem bibentiũ aut perunctorũ mutat in pallorem.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci κύμινον. Latine Cuminum.

Officina Romanum cognominant.

Germanis Römischer Fymmel/ Pfeffer Fymmel.

Gallis Comin dicitur.

Cumini semine utile magis, calfacit ordine tertio, siccatur, astringere addit Dioscorides, urinã mouet, statim extinguit: satium est ac syluestre, idq; Dioscoridi duplex: laudatur Aethiopicũ, deinde Aegyptiũ. Aethiopicũ Hippocrates regiũ appellauit. Sic ad calefaciendiq; vires habet. Plin. li. 19. Condimentorum tamẽ, omniumq; fastidij cuminum amicissimum. Idem lib. 20. In eo magnus usus stomachi præcipue remedijs. Discutit pituitas & inflationes, tormina quoq; & intestinorum dolores. Verum tamen omnem pallorem bibentibus gignit.



## Sylvestre cuminum.

Kitter sporen.

Cap: LVIII.



S. Catharinen blumen.



**S**ylvestre cuminum, plurimū efficaciusq; in Lycia & Galatię Asia, atq; Carthagine Hispanię gignitur: frutice paruo, dodrantali caule, ac tenui, quaternis aut quinis folijs tenuibus, ueluti ferratis, & gingidij diuisura. in cacumine capitula quina, aut sena habet, mollia, rotunda, in qbus est fermen a cerosum, gustu satiuo acriore: nascitur in collibus. Bibitur semen ex aqua, aduersus rormina inflationesq; item contra uenenatas bestias, ex uino. singultus ex aceto sedatur. stomacho utile, quem humor uexat. fugillata tollit, si manducatum cū melle & uua passa illinatur. testium inflammationibus, adiectis eisdem illitum medetur.

Est & aliud sylvestris cumini genus, satiuo nō dissimile, quod à singulis floribus pens



penfilia promit cornicula. in quibus semen est melanthio simile: quod potum omnium serpentium moribus praesidio est calculosis & ijs qui urinæ stillicidio vexantur, aut coneretur sanguinem cum lotio reddunt, auxiliatur. sed apij semen feruefactum postea bibendum est.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Cumini sylvestris primum genus Græcis *κύνιον ἄγριον*. Latinis *sylvestre Cuminum*.

Officinis *Consolida regalis*. Germanis *Ritter spörlein*.

Gallis *cornucuta*, dicitur.

In segetibus inuenitur, caule singulari, ramoso, folio prope fœniculi, semine nigro in corniculatâ filiquula concluso. hodie in hortis seritur & Germani



*Coriandrum.*



ce *S. Catharinen blümen* dicitur, herba ad defecationem primi generis generis *sylvestris cumini* frere propius accedens, Germaniæ alioqui peregrina herba, ac nuper ex Italia allata, eius figurâ præcedens pictura ostendit. Alterum *Cuminum sylvestris* genus Græcis *κύνιον ἄγριον ἔρεπον*. Officinis nig. *lla sylvestris*.

Germanis *wild schwarzer Coriander* nominatur.

Folia arcthi habet, flores nigelle sativæ similes, nisi quodd colore sint elegatiores. Capiulū planè aquilegiæ respondet, atq; in se semina nig. a & odorata cōtinet.

*Ammi.* Cap. LIX.

**A**mmi Aethiopicū cuminum appellat. plerique hoc natura diuersum esse ab illo existimant. Vulgo notum est semen ex illo, multò minus cumino, originū respiciens. Eligendum est purū, minimè furtuosum. Vis ei excafactoria, feruens & exiccans. facit ad tormina, urinæ difficultatem, serpentium ictus, cum uino potum, menstrua ciet. miscetur derodentibus cantharidum medicamentis, quæ eccloria uocant, ut inde exortis urinæ difficultatibus resistat sugillata cum melle tollit. colorē potu aut illitu mutat in pallorē. suffitū cum uua passa aut resina, uulvas purgant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *ἀμμή*. Latine *Ammi*. Romanis *Cuminum Alexandrinum*, quidam Aethiopicum cuminum id esse putant, alij regium cuminum appellant, pleriq; alterius naturæ in totum existimant Aethiopicum cuminum ab eo quod uocatur ammi.

Officinis *Ameos* corrupte.

Germanis *Ammeysamen* dicitur.

*Ameos* semen calidum siccum in fine ordinis tertij, tenuium partium, album, subamarum, acre, digerit, uirinam mouet. Ammi commendatur. Illiricum, lib. 9 cōp. Lib. 6. simp. ph. part. alij Aegyptium laudant. Nasctur & hodie Lib. 9. cōp. in Germania nostra, & magna copia prouenit, sicut ph. part. deinceps extirpari uix queat.

*Coriandrum.* Cap. LX.

**C**oriandrum aut corianum uulgaris est notitiæ, uim refrigeratorem habens. Quare illitū cū pane aut polenta, ignibus,



sa cris, & ulceribus quæ serpunt, medetur. epinyctidas cum melle uel uua passa, testium inflammationes, carbunculosq; sanat. cum faba fresa, strumas & tubercula discutit. tinea interaneorum expellit semen, cum passo potum. genituram adauget. largius tamen sumptum, mentem non sine periculo mouet: quare continuo & copiosiore usu abstinendum. Succus cum cerussa spumaue argenti, nec non aceto & rosaceo illitus, ardentes summæ cutis inflammationes emendat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè κόριον, κορίαννον. Latine coriandrum, corianum, corium.

Officinis Latinum nomen seruauit. Germanis Coriander / Coleander.

Gallis coriander dicitur.

Coriandrum essentia amara habet plurimum, parum humiditatis aqueæ tepentis, pauxillum astrictionis, à qua refrigerat, ut ab amarore calfacit, terget, digerit, tenuium est partium, lumbricos necat, sed largius sumptum memem mouet non sine periculo, ob id aceto maceramus, post siccamus. Officinas coriandrum præparatum uocant ita emaceratum.

## Hieracium.

## Cap. LXI.

Dens Leonis. Hieraceum minus.



**H**ieraciū magnum, caulem emittit asperum, subrubrum, spinosum, cauum: folia ex interuallis rariuscule diuisa, similia soncho per ambitum: luteos flores in oblongis capitulis. Vim refrigerandi habet, & modice substringendi. unde illitum, stomacho æstuantis, inflammationibusque prodest. succus erosionem stomachi

forbitione mitigat. herba cum radice illita, uibrætis à scorpione ictibus auxiliatur. Hieracium paruum, folia ex interuallis habet, diuisa in ambitu: cauliculos teneros, uirentes, in quibus lutei flores orbem circinantes emicant. Vim suam ad eadem ad quæ superior impendit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hieraceū Dioscorides in duo genera distribuit, maius scilicet & minus. Hieraceū maius nusq; non in pratis emicat, officina & herbarij Cichoreā luteam aut cichoream appellant, Germani ad Græcam alludentes appellationem, habich Frant uocant. facie tota, præterquam flore, qui luteus conspicitur, cichoream æmulatur, namque caulem emittit asperum, subrubrum, spiculis horrentem, intus cauum, folia ex interuallis rariuscule

laciniata per ambitum flore in oblongis capitulis luteo. Hieracium Græci uocant, quoniam accipitres scalpendo eam, succoq; oculos tingendo obscuritatem cum sensere discutiant. Hieraceum paruum Græcis ἱερῶν ἔργον. Officinis dens leonis, quod folium sinuatim per lucinas denticulatum sit. Sunt qui Barbara uoce Taraxicon & Altaraxacon uocant, & morachi caput.

Germanis Röl Frant / pssfen röl / pssfen blatt dicitur. Râc Fuschius salsô pro Hedypnoide pingit. folijs multis constat, utrinq; denticulatis in terra se silihus, cauliculis dodrantalibus, còcauis leuibz & enodibus, flore luteo, stipantibus in circuitum foliolis coronato, qui senescens euanesce in lanuginem, quæ cum aura rapim fertur &c.

## Apium



## Apium.

## Cap. LXII.

Apium hortense.



**H**ortensis apij herba ad eadem ad quæ corianum conuenit. inflammationibus oculorum, cum pane aut polenta illinitur. æstuantem stomachum mulcet, mæmarum duritiā ex lacte concreto cōtractam reprimi. urinam ciet, siue crudum, siue coctum edatur. decoctum eius radiceq; potum, uenenorum noxæ resistit, quum uomitiones excitet. aluum cohibet. semen uehementius urinam pellit. contra serpentium uenena, aut epotam argenti spumā auxiliatur. inflationes discutit. admiscetur medicamentis quæ dolorum leuamenta præstant, theriacis quoq; ac tussis remedijs. Eleoselinum in humidis nascitur, satiuo grandius, & ad eadem efficax. Oreoselinum, caule est dodrantem alto, ab radice tenui exeunte: per cu-

ius ambitum rami & capitula ci cutæ, multò tamen tenuiora: semine cumini, oblongo, acri, & odorato, tenui. nascitur in petrosis & montibus. Vrinam ciet, semine ac radice in uino potis. menses trahit. antidotis, nec non medicamentis urinā cientibus & ex calfactorijs inferitur. Nec hallucinari nos oportet, existimantes oreoselinum esse, quod in saxis prouenit. aliud enim est petroselinum. Petroselinum in Macedonia prouenit, in præruptis locis: semine ammi, odoratiore, sapo- re acri, aroma olente. Vrinam citat menstrua. cōtra stomachi & coli inflationes, & tormina prodest laterum, renum, & uesicæ doloribus in potu subuenit admi- scetur antidotis urinam cientibus. Hipposelinum, Latini olustrum appellant, aliqui smyrnion, quāuis aliud sit quod propriè smyrnion dicitur, ut paulò post referemus. Est autem maius & satiuo apio candidius: caule alto, cauo, molli, ha- bente ueluti lineas: folijs latioribus, in puni ceum uergentibus: coma roriflari- ni, florum plena, dependentibus in cacumine corymbis, antè quàm deflorescat, ea semine turget nigro, oblògo, acri, solido, aromatico. radix dimittitur tenuis, odorata, candida, quæ os commendat. In umbrosis & palustribus enascitur. ole- rum generis, ut apium radix cruda coctæ ue estur. folia cū caulibus decocta man- duntur, & per se aut cum piscibus præparantur, crudaq; muria coniunguntur. Vim hanc habet, ut poro semine ex mulso uino menses ciet, argentes calfacit potu aut illitu. urinæ stillicidio auxiliatur, radix eosdem præstat effectus.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Apium satiuum est, cuius gratia uulgo est, cuiusq; rami largis portionibus per iura innatant, & in condimentis peculiarem gratiam habent. Quæ Plinij uerba nostrum uulgare petroselinum magis indicant. Germanis peterlin & peterilien, Gallis persill appellatum: atque idem σάλιον ἑσπο- τικόν, id est, odoratum. Theocritus 3 ἐσποτικόν uocat.

Nostrum uerò uulgare apium est Dioscoridis & Galeni Eleoselinum, hoc est cum Saza, paluda- pium, quia in paludibus & secundum aquæ ductus nascitur. Græci ἐλαιοσέλινον, Latini apium palu- stre, uulgo simpliciter apium, ut aliqui sentiunt. Italiam tamen Maceroneum, aut Cannicam uocare sci- bit Ruellius, Germani epfich & eppen. Galli Esgrur persil uocant, ut Ruellius arbitrat.

Petroselinum autem uerum ex Macedonia aspersis & præruptis petendum ut Galenus docet lib. 1. de antidotis his uerbis. Petroselinū, id est, apium petrosū omnibus notum, in regione Macedonia præcipiti nec inigna laudatissimum nascitur, hoc est, acerrimum & amariss. maxime si recens fuerit, sed paruum, à qua Estreaticum dicitur & Macedonicum. Plurimum uero in Epiro gignitur, ex qua in Macedonia importatum, & propè totum in Thesalonicensi, inde tanquàm Macedonicū à merca- toribus deuehiunt: alioqui uniuersis gentibus non sufficiat. Quomodo mel Atticum melle ex Cycladi- bus locupletant, proq; Attico uendunt: & uinum salernum in parua quadam Italia regione paruum geniū, sic ab indigenis adulteratur, ut in omnem Romanorum imperio subditam regionem feratur.

Si autem Estreaticum Macedonicum petroselinum desideras, nihil peior sed minus amara erit the- riace, & alia antidotus, si alterum iniicias. Non enim deleterijs pharmacis, aut uirulentarum bestia- rum moribus adeò aduersatur, quod principalissimum est theriacis promissum: sed id hydropicis, im- becillibus, & alijs quibusdam sinibus affectibus succurrit.



Eleoselinum: apud Vulgare.

Ostrutium. Meister wort.



Pimpinella. Bibinel.



Hodie de petroselino etiam inter doctissimos poru constat. Conrado Gesnero Medico perusino id uidetur quod hodie Ostrutium, alij imperatoriam uocant, in montibus & Saxosis nascens, figura apij, amarissimum acerrimumque inter omnia apij genera, quod Galenus de petroselino Macedonico & Estratico scribit, quod sane nomen etiam ad Ostrutium accedit. Alij Astrantiam, quidam magis corrumpendo Magstrantiam uocant. Ea dem omino uires uulgus nostrum de eo pollicentur, quas de petroselino ueteres. Alpini ad omne morborum genus quasi panacea utuntur. Germanis Meister wort dicitur.

Heronymus Tragus in uera cognitione simplicium nulli secundus, aliam herbam pro ueterum petroselino nobis ostendit, uidelicet nostram uulgarem pimpinellam, quam Germani Bibinel uocant, & haec sane non longe a legitima ueterum petroselini deliniatione abscedit, quid uero in tanta sententiarum uarietate statuendum sit, doctioribus & quibus plus otij fuerit iudicandum relinquo.

Leonhardus fuchsius imperitis nouam erroris ansam praebuit, cum scilicet herbam, quae semen illud profert, Dioscoridi cap. 53 huius libri Sison appellatum, omnibus tamen reclamantibus notis, errore manifestum nobis obtrudens,

Quod



Quod uero Macedonicum petroselinum uulgo dicitur, est hipposelinū, quod olus atrū, seu pullum à Latinis appellari Hermolaus, Ruellius, Marcellus in Dioscoride inscripserūt, quod meus codex Græcus nō habet, Galenus autē uerū Smyrniū ὀλὸς ἄτρον Romæ uocari iam consueiū scribit lib. 2. Alimēt. Græci ἵπποσελίνον. Latini Hipposelinū, olusatrū ut diximus. Officinæ petroselinū Macedonicū. Ger. à magnitudine Großepfich, uel Großepff. Galli Meicherō Alexandri uocant. Paludapium Wassermaerck.

Hipposelinon.

Est & aliud genus apij, ἡλεοσελίνον, ἢ ὕψοσελίνον Græcis. Paludapium & palustre apium (ut uulgare apium) & Rusticū apium Latinis. Germanis Wasser eph, & Bauren eph dictum, nascitur in paludibus, & ipsa aqua, Apio hortulano maius, caule tenero, concauo, folio molli, raro nec hirsuto, simile apio sapore, floribus, semine & radice. Sunt tamen qui genera

apij ita distinguūt, uidelicet, ut primū apij genus, quod Dioscorides hortense appellat, nostrū uulgare apium sit uulgo Eph & Eppich appellatum.

Eleoselinum uero de quo ultimo egimus, scilicet palustre apium. Germanis Wasser & Bauren eppich dictum.

Oroselinum uero arbitrantur hortulanum nostrū apij. Germanis Petersilien, Gallis persil dictum.

De Petroselino nihil certū constat.

Hipposelinū quartū genus apij erit, quod Officinæ petroselinū Macedonicū appellari falsū, supra monuimus.

Omnia hæc Selinorum, id est, apiorum genera idem pollent tota, sed semine sunt potentiora, & in his præcipuè Macedonicū calidū siccū ordine tertio &c.

### Smyrniū. Caput LXIII.

**S**Myrnion, quod in Cilicia petroselinū uocant, passim in Amano monte gignitur. caulē habet apij, & stolones multos: folia latiora, subpinguia, ad terrā infracta, robusta, odore medicato, cū quadam acrimonia, iucunda, colore in luteū læguescere. capitibus caulium orbiculatis, ut anethi, semine brassicæ, rotundo, nigro, acri, myrrhæ sapore, ita ut alterū alterius loco cedat. radix quoque odorata, gustu acri, fauces mordet, succosa, mollis. cortex eius foris niger, intus uiridis, aut subalbidus. Nascitur in saxosis, & collibus, atque squalidis, & limitibus

terrenis. Vis radices, herbæ & seminis, ex calfacere. folijs muria maceratis ad obsonia utuntur. aluum sistunt. radicem contra serpentium ictus bibere conuenit. rufles & orthopneas mitigat. urinæ difficultati medetur. recētes tumores, collectiones, duritiasque discutit. illita, uulnera ad cicatricē perducit. partus abortui uiuat, si feruefacta subijciat. Semē, lienis, renū & uesicę uitij prodest. menses & secūdus pellit. comodē dāsi schiadicis in uino. inflatiōes stomachi lenit. sudores ciet, & ructus. peculiariter datur hydropicis in potu, & contra febrium circuitus.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Proximē ad sententiā Dioscoridis Plinius Smyrnion depinxit. folia apij tradēs habere, latiora, & maximē circa stolones multos, quorū à sinu exiliunt pinguia, ad terrā infracta, odore medicato, cum



quidam sermone iucunda colorem in luteum languescente capitibus, caulium orbiculatis, ut ap<sup>h</sup>  
 semine rotundo, nigro, qui arescunt incipiente astate. Si cuiq; tam celebres nomen libet explicare,  
 facile perpendet, eam esse herbam quam nostri herbarij, Angelicam & sancti spiritus radicem, à sua  
 missimo eius radice odore, quem spirat: aut ab immensa contrauenena facultate, et pulchritudine, Germanis  
 Angelic, Heylig geystis wurz, & Bist wurz uocatur. Duo huius planta inueniuntur genera, unum  
 Wild angelic. Sam angelic.



in hortis, hac spec  
 cie uisitur & sam  
 angelica uocatur,  
 radix crassa est, et  
 multa, foris nigri  
 cans, intus candida  
 da, tuber in ea qua  
 super terram emi  
 net. Caulis ei foenic  
 culaceus, folium  
 p<sup>i</sup>j in aurei colore  
 languescens, semen  
 foliaceum, latum, um  
 pe quod figura exi  
 le foliolum expri  
 mit, in umbello  
 pio simili aut ane  
 tho: hoc mira fra  
 grat iucunditate:  
 Altera foliis  
 in montosis proue

niens, odore illo suau cum radix tum semen caret. Satiua angelica  
 quam uerum esse Smyrnum non dubitamus, unice uenenis aduersa  
 tur. quam uim illi Dioscorides quoq; tribuit, cum radicem eius contra  
 serpentium ictus bibere docet. Pestilentie populi uim sciens in arce  
 contagia. Corpora ab hac pestifera uindicat: fit autem, ut adfirmant

in ore teneatur. Per hunc ciceris magnitudinem in uino, per esse  
 sem exst. Ulatio rosarum liquore sumpsisse satis est. Nec sensurum ea die contagionem pollicemur  
 qua quis d. uor. rit. nam urina & sudore uenenum abigit.

Weyßhurg wurz.

### Elaphoboscum. Caput LXIII.

**E**laphobosco foeniculaceus caulis est, aut rorima  
 rino similis, geniculatus: folijs duum digitorum la  
 titudine, ut terebinthi, prelongis, aliquantum alperis, cir  
 cū fractis adnata multa habet, ferit umbellas anethi  
 similes, & semina eiusdem: flore subluteum: radice ternu  
 digitorum longitudinis, & crassitudinis unius, candida  
 dulci, esui apta. Caulis tener pro olere maditur, contra  
 serpentium ictus, datur semen in uino. Fama autem est,  
 hoc pabulo ceruas serpentium moribus resistere.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Paucis hodie cognoscitur elaphoboscon, et si frequens ubiq; repe  
 riatur, Romani Cerui ocellum appellant, officinae Gallie simul &  
 herbarij, ut rei ipsius noua, nouum indiderunt uenem. gratiam dei uo  
 cantes. Suefionensis uerger, herbam copariam nominat, quod ea utat  
 tur ad uulsa, rupta. Nempe gratia Dei, caule proflit foeniculaceo  
 geniculato, folijs ferme duorum digitorum latitudine, prelongis sub  
 asperis, infractis. Adnata multa caulis spargit, umbellas anethi simi  
 les ostendens. & semina eiusdem, florem subluteum, radice ternu  
 digitorum longitudinis, & crassitudinis unius, candida, dulci, apta  
 esui.





cibo, Dioscoridis pictura ad ungum profectio representat, nulla reclamante nota, herbanquam modo diximus tam insigni nomine gratia dei uocari, forte ea quam hodie Weiss hirtz wurz Ger. uocat.

Foeniculum.

Caput LXV.  
Hippomarathrum.

**F**oeniculum si herba edatur, aut semē cū ptisana bibatur, mamas lacte replet. comæ decoctū in renū dolorib. subditū proficit, quippe quod urinā excitet. cōtra serpentium ictus in uino cōueniēter bibit. mēses ciet. in febr. nausē & stomachi feruorē, ex aqua frigida potū sedat. cōtritæ radices & cū melle illitæ, moribus canum medent. Succus caule & folijs exprimit, & in sole siccatus, in medicamēta adiicitur, quæ ad excitandā oculorum aciem cōmodè rēperantur. Extrahitur succus ad eadē ualens, etiā semine uiridi, ramulisq; & radicibus prima germi natione incisis. In lberia quæ ad occidentē spectat, succū reddit gūmi simile. Caulē medium, dum herba floret, rustici demetunt, igniq; adimouēt, quod facilius uī caloris exudans gūmi remittat: qd efficacius succo est, ad medicamēta oculorū.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis *μαράθρον*. Latinis *foeniculum*, *Marathrum*. Officinis Latinum nomen seruauit.  
Germanis *Senchel*. Gallis *du fenail*.

Foeniculum



## DIOSCORIDIS

~ Fœniculus calidus ordine tertio, siccus primo, semine magis quàm radice, minus folijs, quibus læguntur illis urina, & menses magis ciet. Cortex radice in usu est frequenti, lib. 8. comp. pbar. par. *μαλακροσπέρμω* per Arabiq; scribit Actuarius, id est, marathri semen.

Fœniculum erraticum, siue hippomarathrum.

Caput LXVI.

**E**st & sylvestre fœniculum, magnum, fert autem semen cachryi simile, cuius radix iucundè olet, potaq; stranguriæ medetur. menses imposita ciet. uentrem sistit, radice aut semine potio. contra serpentium morsus auxiliatur. calculos comminuit, regium morbum expurgat. lactis abundantiam facit. decoctum fo-  
liorum haustum, fœminas à partu purgat. Traditur aliud hippomarathri genus, longo, exili, & angusto folio, semine coriandri, rotundo, acri, & odorato. Excal-  
faciendi naturam habet, & uiribus fœniculo respondet ad omnia infirmius.

NOMINA ET EXPLICATIO.

*Græcè* ἵππομαράθρου. Latine fœniculum sylvestre.

Officinis incognitum. Germanis Wilder fenchel.

Gallis fenol bastard dicitur.

Satino procerius est, brachiali crassamento, folijs etiamnum maioribus, semine mliaceo, radice al-  
ba, odorata, in apricis, & petrosis inuenitur.

Diocles alterum sylvestris fœniculi genus, Dioscoridi ἵππομαράθρου ἑρέπον dictum longo &  
angusto folio, semine coriandri representauit. Medicinæ cum eo genere priore communes; uerum infe-  
rioris operæ.

Daucum.

Caput LXVII.

**D**aucum aliqui Daucium uocant. Creticum folijs fœniculo simile, minori-  
bus & tenuioribus: caule dodrantali: umbella coriandri: flore albo: semine  
ne acri, candido, hirsuto, suauissimi odoris in mandendo. radix digitali crassitu-  
dine & dodrantis longitudine adolescit in saxosis nascitur, & locis sole illu-  
stratis. Aliud eius genus sylvestri apio simile, acre, odoratum, aroma olens, fer-  
uentis gustus. Probabilissimum Creticum. Tertium assignatur genus folijs cori-  
andri, floribus albis, capite & semine anethi, muscario pastinacæ: semine oblongo,  
ceu cumini, acri. Omnium semen ex calfacit potum. urinam, menses, & partus ex-  
trahit. torminibus liberat. ueterè tussim mi-  
tigat. phalangiorum moribus potum in ui-  
no auxiliatur. tumores illitu discutit. Semi-  
nis duntaxat in alijs generibus inualuit u-  
sus. in Cretico, etiam radice, quæ maximè  
contra uenenatorum iniuriã in uino bibitur.

Daucus.



NOMINA ET EXPLICATIO.

Dauco genera tria Creticum Latinis, Gallica pas-  
tinaca dicitur, uulgo (falso tamē) sylvestris carota, in offi-  
cinis principē retinet appellationē, ea namq; caule as-  
surgit pedali, folijs fœniculi, sed candidiusculis minori-  
busq; coriani muscario, in quo semen hispidum, mli se-  
rè capacitare, albu, firuens, acre, odoratum, radice di-  
gtali crassitudine, bipalmū longa, in apricis petrosisq;  
nascitur, Germanis Vogels nesten, Veld moeren dicitur.  
Alterum ubiq; prouenit, præcipuè in terrenis, li-  
mitibusq; & pingui solo, apio simile, firuens, acre, &  
gustanti odoratum.

Tertium genus pastinacæ non dissimile, opacante sa-  
stigum anethi umbella, semine oblongo, odoratu graui,  
sapore, ut cumini acri, utriq; genus asininū daucū herba-  
rijs audio uocari. Galen et Paulus daucū nihil aliud esse  
uoluerunt, q̃ staphilinū sylvestre. Hippocrates daucum  
Aethiopicum



Athiopicum laudat. Daucum refert Galenus agrestem pasinacam nonnullis nominari. Euchsus & Sylvestre, & satium genus pasinacae, Dauci, cui radice sisari, & cari confundit.

## Delphinium.

## Caput LXVIII.

**D**elphinium surculos emittit à radice una sesquipedales, aut maiores, à quibus folia exeunt parua, tenuia, diuisa, praelonga, quae delphinorū effigiem repraesentant: unde tractum nomen est. flos uiolae albae non dissimilis, purpureus: & semen in siliquis milio proximum, quo non aliud utilius bibi potest ab scorpio. ne percussis. Aiunt enim obiecta herba scorpiōes resolui, atque ignauos torpescere: semora uero ea, sese recolligere. Prouenit in asperis & apricis. Alterum est delphiniū, quod Romani buccinum uocant, superiori simile, sed folijs & ramis longioribus, gracilioribus. Viribus eiusdem pollet, sed non ita efficacibus.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Herbarij quidam Delphinium esse putant, quam filium ante patrem, uulgo appellant, quod siliqua & intus semen ante floris exitum ostendat, rectius si partus ante conceptum, ab eis appellaretur. A maudio aptius ab teretis siliquulae per extremum in expansum florem exeunte, buccinaria quadam similitudine dici, siquidē ea surculis à radice una pedibus funditur, folijs paruis, tenuibus intersectis, incuruis longiuscula delphinis effigie, flore uiolae matronalis, suppurpureo, semine in ualuis teretibus exiguo, milio non dissimili. Inuenitur frequēs in asperis, & locis totius diei solem accipientibus.

## Pyrethrum.

## Caput LXIX.

Sylvestre Pyrethrum.



**P**yrethrum saluarem uocant, folia caulēque emittit ut daucum sylvestre & feniculum: umbellamque anethi, circinatae rotunditatis\*. radix longa est, pollicis crassitudine, gustu feruidissimo. Pituita elicit, ideo in dolore dentium, decocta in aceto, colluto inde ore, auxiliatur. mansa pituitam extrahit, sudores ciet, peruncto ex oleo corpore. diuturnis horroribus efficax. contra perfrictiones membrorum, resolutionesque eximie conducit.

\*capillacea, alij.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè πύρεθρον.

Latine pyrethrum à fernido sapore dicta.

Officinis genuinū nomen seruauit.

Germanis Bertram.

Gallis pes Alexandrinus dicitur.

Pyrethrum ab ignea, &amp; caustica urēteque, uel dictum, quia mansu saluam potentius, quam pro caloris

modo elicit: unde & saluaris quoque. Latine dicitur, ut Dioscorides testatur in Apennino frequens, quāuis quing. seruatur: affectibus omnibus frigidis efficax.

Rosma



## Rosmarinus.

## Caput LXX.

**D**vo rosmarini genera. unum fecundum frugiferumq; cuius semē cachrys uocatur. folia sceniculi habet, crassiora & latiora, in rotæ speciem, humi sparsa, succundè olentia, caulem cubiti altitudine, aut maiorem, multis concavum alis in cacumine umbellam, in qua semen copiosum, candidum, sphondylo simile, rotundum, angulosum, resinaceum, quod in mandendo linguam exurit. radix thus redolet, candida, prægrandis. Est & alterum omnino consimile, semen ferens latum, nigrum uti sphondylion, odoratum, minimè exurens, radice foris nigra, intus si frangatur, alba. Verum id quod sterile dicitur, illorum planè similitudinem refert: sed neq; caulem, neq; florem, neq; semen promittit nascitur in saxosis & asperis. Trita omnium herba communiter hæmorrhoidum profluua sistit, sed inflammationes & condylomata mitigat, concoquit strumas & abscessus qui ad maturationem ægrè perducuntur. Siccæ radices cum melle ulcera purgant, torminibus medentur cum uino potæ: & contra serpentium morsus conueniunt mentes & urinas cient, ueteres tumores illitu discutunt. Tam radices quàm herbæ succus, adiecto melle illitus, oculorum aciem exacuit. Potum semē ad eadem pollet, si comitiale malum sentiatur, aut uetus pectoris uitium, auxilio est. regio morbo laborantibus cum uino & pipere datur sudores mouet, cum oleo perunctum, ruptis & conuulsis prodest. podagris, cum loliacea farina & aceto tritum, illinitur, purgat uirilignes, addito aceto quàm acerrimo. Semine in potionibus utendum, eius quidem quod Cachryn nō ferat, quippe illud sua acrimonia arteriam exasperat. Rosmarinum cum erica nasci, folijs lactucæ syluestris amaræ asperioribus, candidioribusq; radice breui, Theophrastus autor est, potuq; id ipsum aliter utra parte purgare. Cachrys uim habet ex calfaciendi, & uehementer excitandi, quare abstergentibus medicamentis inferitur, contra oculorum fluxiones capiti illinitur, ita ut tertio die soluatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

## Schwarz hirtz wurz.



Libanotidis siue rosmarini Dioscorides tria genera facit, unum sterile, hodie nobis planè incognitum, alterum fecundum, quod duplex est. alterum est cuius semē cachrys dicitur, sceniculi folio, crassiore, orbiculato, in terram iacente, caule cubitali, aliquando etiam maiore, stolonibus multis, quorum à capitibus umbellæ exstantur, seminis plena candidi & sphondylio similis, rotundi, angulosi, gustu acuto, resinacci, accendentis os cum manditur. Radix alba magnitudinis iustæ, thus redolet, & hoc genus, quod equidem sciam, hodie prorsus nulli cognitum. Alterum simile superiori per omnia, sed lato semine atq; nigro, sphondylion imitante, odorato, neq; feruente, radice foris atra, intus si frangatur albidæ, hæc est quam Germani Schwarz hirtz wurz appellant, à radice nigra. hanc Fuchsius falsò inter Dauici genera numerauit, eius picturam hic exhibemus.

## Rosmarinum coronarium.

## Caput LXXI.

**R**osmarinum quo coronarii utuntur, ramos mittit tenues, & circa eos folia minura, densa, longa, exilia, subter incana, supernè uirentia, graui odore. Excalfactoria ui præditum est, regium sanat morbum, si decoctum in aqua, ante exercitationes bibatur; & ubi laborans exercitationi se crediderit.



## Rosmarinus.



Spondylium.



derit, in balnea descēdat, & merum potet. ac opis, gleu-  
cinoq; unguento admisceri solet.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Ῥοσάριος seu Ῥοσμάριος.

Latine Libanotis coronaria.

Officinis rosmarinus. Germanis Rosmarin.

Gallis rosmarin dicitur.

Libanotis ea quā Romani appellant Rosmarinum, & qua nectena-  
tes coronas utuntur, in exilibus uirgis folium fert tenue, crebrū, oblon-  
gum, & gracile, intus cādicās, & extrā uiride, odore graui, quo Nar-  
bonēsis provincie tractus adeo scatet, ut haud temere lignū aliud urāt.  
Apuđ nos areæ horticulorum, elegantē et topiario conueſit opere, utilis fo-  
lio et flore, quem uulguſ abſolute ῥοσμάριον male uocat. nec amidotus dicitur  
ῥοσμάριον Aſuarij folium Roſmarini florem recipit, ſed aliorum.

## Spondylium. Caput LXXII.

Spondylium folia quadamtenus platani & panacis  
habet. caules ſceniculaceos, cubitali altitudine aut  
amplius aſurgentes, in quorum cacumine ſemen du-  
plex, ſefeli ſimile, ſed latius, candidius, & magis palea-  
cum, grauiſ odoris. flores eius albi, aut pallētes: radice  
raphani, candida. naſcitur in paluſtribus & aquoſis.  
Potum ſemen pituitam per alium extrahit. mēdetur  
iecinoris uitijſ, regio morbo, comitialibus, ortho-  
pnoicis, uuluarum ſtrangulationi. ueternoſoſ ſuſſitu  
reuocat. cū oleo cōmode infunditur capitiſ phre-  
niticorum, & lethargicorū. item capitiſ doloribus.  
cum ruta illitum, ſerpentia ulcera cohibet. Datur ra-  
dix contra regium morbum, & iecinoris uitia cū cum  
raſa eadem & iniecta callos fiſtularū derodit. Recen-  
tiſ floriſ ſuccuſ exulceratiſ auribuſ, puſulentiſq; ac-  
commodatur: qui ceterorum ſuccorum more expri-  
mi, dein recondi ſolet.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Σπονδύλιον. Latinis ſpondylium & ſpondylium.

Officinis Oſtrutium, Aſtrens, Maſſſtrantia.

Germanis Weiſſer wurz. Gallis b auſtruce. dicitur.

Hanc plantā quam uerum ſpondylium eſſe non dubitamus. etiā  
uiri docti miſerè diſtraxerunt, ut tandem inuenirent, cui capitulorum Dioſc. recte aptari poſſit. Alij  
enim, ut ſuprà oſtendimus, hanc uerum eſſe petroſelinum Macedonicum contendunt, alij Leſerpitium  
Germanicum, alij pro uero Smirnio habent. Sunt & alij, qui hunc ad Panaces Dioſcoridiſ referunt, ex  
Panacis adprobantēſ deſcriptionibuſ, ex odore, ſucco & gummi, quæ omnia Panacis radicibuſ cōue-  
niunt. ſed ſicilicet erroris conuincuntur, ſi ad legitimam delimitationem Spondylii conſertur, nulla peni-  
tus reclamante nota. Adde quod eaſdem omneſ uireſ uulguſ noſtrum de hac pollicetur, quæ de ſpondy-  
lio ueterēſ, atq; hoc loco Dioſcorideſ deſcribit.

## Ferula.

## Caput LXXIII.

Viridi ferula medulla pota utilis eſt ad cruentas ex creatiōēſ, cœliacoſq; cō-  
tra uiperarum morſuſ in uino datur. erumpentēſ naribuſ ſanguinem indi-  
ta ſiſtit. ſemen potum torminoſiſ auxiliatur. ſudoreſ ciet, uncto ex oleo corpore.  
Cauleſ, ſi edantur, capitiſ doloreſ faciunt. muria cōdiuntur. Ferula itaq; caulem  
profert ternum ſēpe cubito rum: folia ſceni culi, longē aſperiora & latiora. qua ab  
imo caule uulnera ſaga penum efficitur.

Calidiſ ferula naſcitur lociſ, atq; tranſ maria, hodie planē incognita.



Peucedanum.

Cap. LXXIII.



**P**eucedanum caulem emittit tenuem, gracile  
lentum, sceniculo similem. comā habet sta-  
tim à terra foliosam, spissamq. flore luteo,  
radice nigra, crassa, plena, graui odore, succosa.  
gignitur in montibus opacis. Tendra radix cul-  
tello conciditur, profluensq. è plaga succum  
bræ mandatur: in sole siquidem cōfestim euane-  
scit. Colligitur capite prius & naribus rosaceo  
perfusis, ne capitis dolor premat, & uertigo sen-  
tiatur. affationi radix inutilis fit. Tam lac quā  
succus radice & caulibus extrahi solet. sicuti è  
mandragora: uerum inefficacior succo lachry-  
ma habetur, & uelocius expirat. Interdum etiā  
concreta inuenitur lachryma, thuris similitudi-  
ne, caulibus radicibusq. adhærens. Præfertur  
succus è Sardinia & Samothrace, colore rufes-  
cente, odore graui, feruens gustu. Ex oleo & rosaceo  
illitum peucedanum prodest lethargicis, phre-  
niticis, uertiginosis, comitialibus, & longis ca-  
pitis doloribus. resolutis, ischiadicis, conuul-  
sis, omnibus in uniuersum uitijis neruorū, ex o-  
leo & aceto illitū, prodest eius olfactu respirat-  
uulæ strangulatus, & ueternosi reuocatur. in-  
censum serpentes abigit aurium doloribus cō-  
uenienter ex rosaceo instillatur. cauernis deno-  
tium inditum, mitigat dolorē. cōtra tussim effi-  
cacissimè ex ouo alliumitur. suspirijs, torminib.

& inflationibus subuenit. uentrem leniter emollit. lienem absomit. difficiles par-  
tus mirè adiuuat. facit ad uescicæ cruciatus, & renum distentiones potum. uulnam  
aperit. Radix ad eadē utilis est, sed inefficacior. eius decoctū bibitur. farina eius  
sordida ulcera purgat, & uetera cicatrice obducit. squamas ossium extrahit. in ce-  
rata & calfacientia malagmata additur. Radix eligi debet recens, quæ cariem nō  
senferit, firma, odoris plena. Succus ad potiones amaris nucibus aut ruta aut pa-  
ne calido aut anetho resoluitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *πευκεδάριον*. Latine *peucedanum*. Officinis genuinū nomen seruauit. Germanis  
Cal. li. 3. sim. *Barstrang* dicitur. Peucedani radix calida ordine secundo, sicca tertio: incidit, tenuat, digerit,  
effectibus neruorum frigidis, lieni indurato, pulmōi sarto, pituitæ crassæ, leniæ, ulceribus contumaci-  
bus auxilio est. Succus ex hac expressus uiolentiore est.

Gith, seu Melanthium.

Caput LXXV.

**G**ith exilibus surculis fruticat, sæpe binos dodrantes excedens. folijs ut fe-  
netiōis minutis, sed multò tenuioribus: capitulo in cacumine tenui, paruo,  
ceu papaueris, oblongo, intercurfantibus intus membranarum quibus semē includi-  
tur nigrum, acre, odoratū, quod panibus inspargitur. Capitis doloribus illitum  
fronti, subuenit. discutit recētes oculorum suffusiones, tritū ex irino, & infusum  
naribus. rollit lepras, lentigines, duritias, tumoresq. uetustos, cū aceto illitū cir-  
cumscarificatos clauos excutit, cū uetere urina impositum. dentiū doloribus, de-  
coctum cum aceto & tēda, prodest. teretes uentris tineas expellit, peruncto ex a-  
qua umbilico destillatione laborantes adiuuat, tritum in linteo & olfactū. urinā  
& mēstrua ciet, multis diebus sumptum. & lac extrahit. difficultatē spirandi cū  
uino potum leuat phalangiorum moribus ex aqua drachmæ pondere haustum  
auxiliatur. incenso serpentes fugantur, Tradunt largius epotum enecare.

NOMINA



Nigella Damascena.



Nigella vulgaris.



Pseudomelanthium.



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Grecis μελάνθιον. Latine Melanthium, gith, nigella.  
 Officinis nigella Romana. Germanis Schwarz Römisch  
 woltrichend Coicander. Schabab. Gallis poiurette, à piperis  
 sapore Nielle, ou nigelle poiurette.

Melanthium est gith, quamvis flore sit ex ceruleo albicante, se-  
 mine nunc nigro, nunc rufo, calidum sicum tertio gradu, tenuium  
 partium, amarum, asiduo olfactu catharrhos sanat, orthopnoeam iu-  
 vat, lumbricos necat, lepras tergit, menses obcrassitum, & lemos  
 rem retentos mouet. Quæ uerò in segetibus alius adolescit, Ni-  
 gella uulgo dicta, Germanis Ratten/inodora, pseudomelanthium,  
 & Githago uocari possit, hæc à Fuchsio falso prololio pingitur.

Laserpitium, &amp; Laser.

Caput LXXVI.

**L**aserpitium in Syria, Armenia, Media, & Libya nascitur, caule ferulaceo,  
 quem maspetum uocant: folijs apio similibus, lato semine. Radix ex calfacit,  
 incibus agrè concoquitur, uesicæ noxia, sugillatis illita cū oleo, & strumis, ac tu-



berculis cum cerato, medetur. ischiadici conuenit cū irino aut cyprino & erato, excrecentibus circa sedem tollēdis illinitur, cū putamine mali punici, & aceto decocta. uenenis pota resistit. os cōmendat, cibis aut salī permitta. Lafer ē radice atq; caule scarificatis colligitur prāfertur autem rufum, translucēs, myrrhæ æmulum, non porraceū, odore ualens, suauī gustu, quod dilutum facīle albescit. Cyrenaicum si quis degustarit, humorē toto corpore ciet. blandissimo odore, a deo ut ne os quidem gustanti nisi paululum spiret. Medicū & Syriacū minus uiribus ualēt, & magis uirosum reddunt odorē. Lafer omne antequā siccescat adulteratur sagapeno, aut fabæ lomento, quod maleficiū deprehēditur, gustu, odore, uisu, & dilutiōe. Caulem aliqui silphion, radicem magudarī, & folia maspeton uocauere. Efficacissimum lafer, mox folia, postremo caulis. Acrem uim habet. inflammationes facit. perunctas cū aceto, pipere & uino alopecias sanat. o colorū aciem exacuit. incipientes suffusiones, illitū cum melle, dissipat. cauernis dentium in dolore inditur, aut cum thure in linteo circūligatur, aut cum hisopo, ficis coctis in posca, os colluitur. ijs prodest quos bestia in rabie efferata momorderit, uulneribus immisum. ualet aduersus uenena telorū, & animalia omnia, quæ uirus eia culantur, potum aut illitum. scorpionum plagis oleo dilutū circumlinitur. gangrænis præcoerctis immittitur. & cū ruta, nitro & melle, uel per se, carbunculis, clauos callosq; prius circumrasos uellit. cerato aut aridorum ficuum carne præmolitum, recentes lichenas ex aceto sanat. & excrecentia in carne, polyposq; si aliquot diebus cum atramento futorio, aut ærugine illinatur. extuberantia cū forficē extrahit. Veteribus faucium scabritijs opitulatur. grauē, subitoq; irrauescentem uocē, dilutum aqua, sorbitione confestim expedit. uulū illitum cum melle reprimat. anginis ex aqua mulsa utilissimē gargarizatur. uescentes lætiore colore māgonizat. tussi cōmodē in sorbili ouo datur, & pleuriticis, in sorbitionibus: in pere, & thure potum. neruorū cōtractionibus, opisthotonicisq; datur oboli pondere deuorandum, hæretes gulæ hirudines, gargarizatum cum aceto decutit. ad lac intus coagulatum bibitur. comitialibus ex aceto mulso proficit. menses ciet, cum pipere & myrrha potum. celiacos adiuuat, in acino uue sumptum. cum lixiuio aut potui datum, repente cōuulsis ruptisq; prodest. ad potiones resoluitur, nucibus amaris, aut ruta, aut calido pane. Foliorum succo ad eadem proficitur, sed multo inefficacius. cum aceto mulso manditur, ad expediēdam arteriā, maxime cum uox retunditur. eo cum lactucis utuntur, exitq; in uicem erucæ. Fertur & altera magudarī in Libya nasci: radix laserpitio similis, sed minus crassa, acris & fungosa, ex qua non profluit succus: eiusdem cum laferē facultatis.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

ὄπρος liquor est, crassum illud & lentū, quod ex uulnere effluit, uel radice incisa, qui inde p̄s̄as dicitur. uel caule etiam usq; ad medullā secto, terebrato, castrato, qui λαυλίας dicitur, altero puriore, & perlucidiorē, specialius tamē, & per excellentiā ὄπρος, Cyrenaicus et Medicus, & Syriacus intelligitur, qui omnes caliditate & tenuitate exuperat: ob id omnium maxime digerit per haliū, quanquā reliqui liquores sint multū calidi, & spirituosī, & plurima horū pars essentia aeris, & ignis. ὄπρος tamen, λαυλίας, ὄπρος, Græcis sepe cōfunduntur, & Latinis succus, lachryma, liquor. Præstantissimus autem ex Aphrica est Cyrenaicus Galeno, Indicus & Armenius Mesuæ: imbecillior Medicus & Syriacus: uterq; enim uirus, & putrilagnem respiciens, ut & Parthicus, & Persicus. Est autem laseris seu laserpitij, seu Silphij herbe liquor. E Tabrobana maris Indici, insula omnium maxima conuecti hodie præstantissimū, Belzoy uulgo dictū, scribit Ludouicus Romanus patricius. Opus Cyrenaicus est saluberrimus phlegmōe Gargareonis, & aliorum partium, non incipienti, sed ueterata, & in scirrū durefcenti. Est enim acerrimū & maxime calfaciēs medicamentum.

## Sagapenium.

## Caput LXXVII.

Sagapenium ferulae herbae succus est, quæ in Media nascitur. Optimū est, translucens, fuluo forinsecus colore, & intus albo, nescio quid inter lafer & galbanum redolens, gustu acri. Prodest laterum & pectoris doloribus, tussibus uetustis, cōuulsis & ruptis, crassam pulmonis pituitam expurgat. datur comitialibus



bus, opisthotonicis, lienosis, item contra neruorum resolutionem, perfrictiones, & februm circuitus\* in potu, in unguenta probè admittitur. menses pellit, sed fce \* Alij, perfrictum exanimat, cum hydromelite potum. prodest ex uino haustum, serpentium citiones, quas ictibus, olfactum ex aceto uuluarum strangulatus excitat, oculorum cicatrices, februm circuitus, offusam caliginem, hebetudines, suffusionesq; detergit. Resoluitur ut laser, ruta, cuitus facit. aqua, & amaris nucibus, aut melle, aut calido pane.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sagapenum est frutex ferulaceus, seu ferula similis planta, lib. 8. sim. seu ferula quædam panaci similis, lib. 1. antid. in Media regione, & abusiue ex ea succus: qui etiam οὐδὲς ὅρατος dicitur, lib. antid. calidus, tenuium partium, ut alij opi, seu liquores: modice terget, oculorum cicatrices purgat, & terget, suffusiones, & oculorum hebetudines à crasso humore leuat. Laudatur præ lucidum, foris rufum, intus candidum, acre, odore porri, seu medio inter laseris liquorem, & galbanum, quibus adulteratur. Opopanacium nihil est simile, sed galbano albiori. Nam spumosa coherēs, albior, leuiusq; pars galbani in Sagapenum degenerat: pars altera densior, & multò quàm aliud galbanum constrictior, fit Galbanum optimum, Sagapenum respiciens, eaq; tanquàm præstantissima utendum lib. 1. antid. Si uerum est, uino aut aqua statim dissoluitur, adulteratum non liquefit.

## Euphorbium.

## Caput LXXVIII.

Euphorbia Libyca arbor est, ferulæ speciem habens, quæ in monte Atlante\* Alij, Tmolo, iuxta Mauritaniam, inuenitur. ea acerrimo succo turget, cuius eximium feruorem expauescentes in colas, ouillos uentres eluros arbori circumligant, & eminus caulem contis incidunt, cōfestimq; è plaga, perinde atq; uase quodam, in uentriculos copiosus lactis humor effluit, præter id quod humi sparsum, uulnus eiā culatur. Duo succi genera, unum orobi magnitudine, sarco collæ modo emicat: alterum in uentriculis concreuit, atq; uitreum spectatur. Eligendum est translucens, & acre, Euphorbium adulteratur sarco collæ & glutini mistione, sed difficile quidem experimentum: quippe cum leui gustu, os a censum diu detineat, adeò ut quicquid ori obijciatur, planè euphorbium respiciat. eius inuētio tempore lubè regis Libyæ cognita extitit. Succus illitu suffusiones discutit, potus tota die exurit, quare melli collyrijsq; pro a crimonix ratione admisceri debet. coxarum doloribus prodest in odorifera potionē haustus. squamas ossium eadem die eximit. uerum eo utentes, necesse est linamētis aut ceratis cōmunire corpus quo ossa cōuestiunt. Aliqui memoriæ prodiderūt, percussos à serpēte nihil molesti passuros, si incisa osse tenus capitis cute, intritus succus infundat, uulnusq; postea cōsuatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Euphorbium & Euphorbia arbor, unde liquor emanat, qui ex occiduis regionibus affertur, ut Sagapenum ex orientibus, lib. 3. comp. phar. gener. Euphorbium liquor est stirpis cuiusdam spumosa in Maurusiorum terra prouenientis, in uentre ouium reponitur, quoniam hunc solum non erodit. Bi. Gal. lib. 9. mum aut trimum mediocre uiribus adhuc est (taliquē utitur Galenus lib. 1. comp. pharm. part. in alopec. com. ph. par. cia) interdum & quadrimum. Quarto autem uel sexto anno exoluitur, deinde procedente tempore intotum elanguescit, Gal. ne putes cum uulgo annis decem posse seruari: etiam cum milio, semibus, fabis: Adulteratur lacte caprimo, sarco colla, glutino, id igni iniectum odorem edit fistulidum. Pituita purgat Euphorbium, a luba rege inuentum, ab Euphorbo suo Medico, Antonij Musæ fratre, uocatum, sed magis aquam. Euphorbium cum Mastiche, & tragacantho coctum, in pane dedit in morbo Italico Man. d. us, & sine manifesta noxa iuuat. Cum melle tantum Diosc. cum melle cocto Paulus præbet. Paulus dat si quis quinq; uel septem, imo drachmam unam, ad quam Dioscorides quoq; accedit, Auicenna tres obolos. Serapion duos.

## Galbanum.

## Caput LXXIX.

Galbanum succus est nascentis in Syria ferulæ, quod nonnulli metopiū uocant. Maximè laudatur cartilaginofum, merum, thuris effigis præbens, pingue, minimè lignofum, retinens nonnihil adiecti seminis & ferulæ, graui odore, neq; ualde humidum, neq; nimis aridum. Adulteratur faba fresa, resina & ammonia. Galbanum excalfacit, urit, extrahit, discutit. menses ac parcus trahit. appositum uel suffitu, lentigines aceto & nitro perunctas tollit. deuoratur ad tussim ueterem, difficultatem spirandi, suspiria, rupta, conuulsa, aduersatur toxicis, potum



cum uino & myrrha. simili modo sumptum mortuos partus extrahit. impositus lateris doloribus, & furunculis. comitiales & uulnæ strangulatus, & uertiginosus olfactu suscitatur. si uratur, fugat nidore serpentes, & perunctos feriri non patitur. serpentes cum oleo & sphōdylo circumpositum, necat. dentium dolorē oblitum aut cauernis inditum, mitigat. urinæ difficili prodesse existimatur. Resoluitur ad potiones amararum nucibus, aqua, aut ruta, aut calido pane, mulsaue: aliis meconio, ære uiso, aut felle liquido. Si purgare galbanum uoles, in feruentem aquam demittito. namque cum liquefactum fuerit, eius sordes fluitabunt: quas hoc modo facile separabis: mundo linteo raroque alligatum in fictili aut ærea pyxide ita pendeat, ut imum uasis ne tangat: opertoque uase in feruidam aquam demittito: sic enim syncerum, ueluti per colum eliquescet, & lignosum in linteo remanebit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Galbanum liquor ferulæ Syriacæ, seu plantæ ferulacæ in Syria frequentis, calidus in fine ordinis secundi, aut principio tertij, sicus initio secundi: mollit, digerit, addit Dioscorides, trahit, urit. De hoc pauca supra in sagapeno. Laudatur purum ligno, aliquid tamen seminis mistum habens, odore graui, sapore abominabili, humidi & sicci medium, pingue, & in ammoniaci aut thuris similitudine cartilagineosum. Eius obolos tres muscet Andromachus arteriacæ. 12. alteri drach sex lib. 7. comp. pharmaceut. part. Purgandi eius sordibus ratio Dioscoridi traditur. Vitiatur resina, saba fracta, Hammoniaco, ut idem Dioscorides testatur.

Gal. lib. 7.

ph. par. cōp.

## Ammoniacum.

## Caput LXXX.

Ammoniacum ferulæ succus est, quam iuxta Cyrenem Aphrica gignit. cuius fruticem cum radice agasyllim uocant. Probatum bene coloratum, ligni & calculorum expers, thuris similitudine, minutis glebis, densum, syncerum, nulla sordibus spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. hoc genus thrausma, id est, friaturam appellant: quod uero terram & calculos collegit, phryama gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculum, succum stillante ferulacæ arboris. Mollit, extrahit, calfacit. tubercula duritiasque discutit. potum, aluum soluit. partus extrahit. lienem consumit, drachmæ pondere\* haurit. articulos comenditque doloribus liberat. auxilio est anhelatoribus, orthopnoicis, comitialibus. item quibus humor in pectore coit, si cum melle delingatur, aut cum pistranæ succo forbeatur. cruentam urinam pellit. albugines oculorum absterget. genarum scabritiam absument. tritum autem cum aceto, & impositum, iccino ris lienisque duritias sedat. discutit tofos, qui in artubus concalluerunt, cum melle aut cum pice illitum. lassitudines & coxendicum dolores eo perungi utile est, cum nitro & cyprino oleo, uice acopi.

\*Adde, cum aceto,

## EXPLICATIO.

Hammoniacum seu Ammoniacum. Galbanum, emolliunt, mitigant emplastica sunt: ut opopanax, sed illis ualentius Gal. lib. 10. simp.

## Sarcocolla.

## Caput LXXXI.

Sarcocolla, la chryma est arboris in Perside nascentis, pollini thuris similis, rufa, gustu amara. Vulnere glutinat. oculorum fluxiones inhibet. emplastris inferitur. Adulteratur admisto gummi.

## NOMINA ET EXPLICATIO

Sarcocolla quod carnem glutinet, Græcè dicta, tanquam sit carnis colla. nam uulnera glutinat, & sine morfu siccatur. Albam rufam præfert Plin. & annis nigrescere scribit. primo gradu aut circiter calida uidetur, nam Dioscoridi subamara, Plinio cum quadam acrimonia dulcis. Gal. emplastica, & parum amara dicitur. siccans sine morfu. Ophthalmias discutere expertus est. Manardus, ubi hæc constitunt, in tio enim cum uino fluxiones oculorum sistit, Dioscor. & Plinio. Sarcocolla ueteres tantum foris usi sunt: purgatricem uim, ut Medici Arabes, non dederunt, quæ etiam hodie parum est cognita. Si purgat & ueniculo est noxia calido, impinguare uidetur tantum per accidens: uacuatis scilicet excrementis. proham nutritionem impediens, id quod alijs purgantibus est commune: sed dum correctæ est lacte asinino: calida humida euadit, ob id semen augere, & promouere potest. Hanc dies quinque asinino lacte indies mutando macerant. post aqua rosarum dissoluunt, ut castigent.

Glaucium



## Glaucium.

## Cap. LXXXII.

**G**laucium, succus est herbae quae ad Hierapolim Syriae nascitur, folijs ferè corniculati papaueris, pinguioribus tamen, in terram sparsis, odoris terribilis, gustus amari, tota croceo succo madet. Folia in olla fictili semisfrigidis clibanis calfaciunt indigenae, usque dum flaccescant, deinde confusis succum exprimunt: cuius est usus ad oculorum medicamenta, utpote cum inter initia refrigeret.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Quantum hic succus differat à succo Papaueris corniculati hic docet Dioscorides, & succum extrahendi rationem. Graecis in usu multo & Arabibus, nunc ignoratur: ualenter astringit, & insigniter refrigerat. Officina Barbaro nomine Memithe appellatur.

## Glutinum.

## Cap. LXXXIII.

**G**lutinum, quod xylocollan, alij taurocollan uocant, praestantissimum Rhodiaceum, quod ex bubulis corijs conficitur, id candidum est & translucens.

Nigrum uerò minus probatur. Resolutum in aceto, impetigines leprasque cutis delet. ambustis igni ex aqua calida dilutum illitumque, pustulas erumpere non patitur. uulneribus prodest, melle aut aceto madefactum.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Glutinum siue gluten, Germanicè Lëym. Gallicè non aliter quàm Graeco uocabulo colla dicitur. Praestantissimum est ex auribus taurorum & genitalibus, sed adulteratur nihil & què, quibusuis pellibus inueteratis & decoctis, Rhodianum uerò Dioscoride teste fidelissimum, eoque medici & pictores utuntur. Lignosum improbat. Contexti par est & reliqua glutinum genera, Auro glutinum est santeria, ferro argilla, eris maffis cadmia, laminis alumè, stagnum eramentis, stagno argentum, marmori & plumbo resina, plumbum nigrum albo, album ipsum sibi. Est & glutinum auri cum inducitur ligno Leucoporon siue leucopheon Germanis goldt grundt uocatum, habetur & glutè librariorum ex similia & polline Bäch binder bapp, Germanicè appellatum &c.

## Glutinum piscium.

## Cap. LXXXIII.

**I**chthyocolla, gluten pisciū, uenter est piscis cetacei. Praestat candicans, natione Ponticum, subasperum, minimè scabrum, & quod celerimè liquefcit. Vtile emplastris, capitis & leprarum medicaminibus, & tetanotris, quae cutem faciei erugant & extendunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hanc Galli collam buccae, hoc est, colle de la bouche appellant. Germani mundt lëym, quod oris salina diluere glutinandis rebus soleant. Alij collam Moruae, ita enim cetaceum uocant piscem. Germani hausen blasen, piscem uerò em hausen, quo frequentissimè nescuntur, cuius glutinoso uentre & corio glutinum fieri inter omnes conuenit.

## Viscum.

## Viscum. Cap. LXXXV.

**V**iscum optimū est recens, intus porraceum, extra fuluum, quod asperi nihil, aut furfurosi conceperit. Fit acinis in robore nascentibus, buxæ fruticis folio, confusum acinum lauant, & postea in aqua decoquant. sunt qui commanducando ipsum efficiant. gignitur quoque in malo, pyro, & plerisque alijs arboribus. quintiam inuenitur in quorundam fruticum radicibus. Emollit, discutit, extrahit, parotidas, tubercula,





ceterasq; collectiones ad maturationem perducit. cum resina autem & cera pari, epinyctidas in splenio sanat. uetera ulcera abscessusq; quos cacoethes uocant, ex thure mollit. lienem cum calce, gagate, aut asio lapide coctum & impositum absomit. cum sandaracha, aut auripigmento illitum, ungues extrahit. mistum cum calce & uini fece, suam uim intendit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè  $\iota\gamma\epsilon$ .

Latine Viscum, de planta intelligitur cuius picturam damus, uel eius granis expresso glutino.

Officinis uiscum quercinum dicitur, & non sine graui errore interdum ad emplastra puluere ligni pro uisci glutino utuntur. Germanis Mystel, Affotler. Glutinum uero vogel leim.

Gallis du guy appellatur.

Quidam putant lignum uisci è robore aut ilice si terram non attigerit comitalibus mederi, conceptumq; sceminarum adiuuare, si omnino secum habeant. uulgo eydhen mystel dicitur: de uisco uide plura lib. 1. Fit & uiscum in Syria ex acinis, quos ab Augusti, ut arbitror, honore, sebastos appellauerunt, & hodie quoq; officinis adhuc Sebeste ubiq; dicuntur: ueteribus fuisse myxa coniectio, quæ & per diminutionem quoque myxaria recentioribus Græcis nominantur  $\alpha\omega\delta$   $\mu\upsilon\gamma\epsilon\varsigma$ , id est, à multo lento è naribus fluens: cum simili hi fructus abundant, bilem detrudere, & sitim sedare dicuntur. humida primo gradu, calido frigido temperata.

Iuiue. rot brust berle.

Sebeste, schwarz brust berle.



Iuiube, Zizypha Græcis, Zizipha etiam Actuarii, fructus Myxarijs affinis facultate, nam calidus humidus primo gradu, etiam pulmonarius: id duplex. sericum, id est rufum, Gallie frequens, & candidum adhuc ignotum, ad fluxiones calidas, acres, tenues, in pectus salubre: ut alimentum uero à Galeno damatur lib. 2. alimentorum, quem locum Auicenna. Sauanora la citant in suis iuibis. horum picturâ libuit hic exhibere cum in usu officinarum sint frequentissimo, nulla uero eorum apud Dioscoridem fiat mentio.

Aparinæ.

**A** Parinæ ramis multis & paruis fruticat, asperis, quadrangulis, per interval la orbiculato foliorum ambitu, ut in rubia. flos albus: semen durum, rotundum,

Cap. LXXXVI.





dum, concauum, album, umbilici figura, asperitate uestium tenaci. Ea pastores coli uice utuntur, ad eximendos è lacte pilos. seminis, caulium, ac foliorum succus, potu contra uiperarum phalangio tumque morsus auxiliatur. infusu aurium dolori medetur. Herba cum axungia trita strumas discutit.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἀμαρίν.

Latine a parine.

Officinis & Herbarijs Aspegula. alijs Ruella.

Germanis Fleb Frant/lidde.

Geng.

Gallis grateron dicitur.

Ramosa est herba, quadrangula ex interuallis orbiculato, foliorum ambitu, & ueluti stellatum decussato, ut in rubia. Flos albus, semen durum, rotundum, concauum, album, umbilici figura. Omphalocorpon inde dici putatur Dioscoridi, ab umbilici similitudine, quâ semen præfert. Et philantrapos à nonnullis dicta, (quia uelut amicus solem)

vomuentium lacinijs adhaereat. Hippocrates, ut Galenus putat, philinon & philuerion appellat &c.

#### Alyssum.

#### Cap. LXXXVII.

**A**lysson fruticosa herbula est, unicaulis, subaspera, rotundis folijs: fructu duplicium scutorum effigie, in quo est semen quadamtenus latum in montiosis & asperis locis emicat. Eius decoctum singultus sine febre, potu discutit. Idem efficit si quis eam aut teneat, aut odoretur, cum melle trita, uita cutis in facie, & lentigines emendat contusa in edulio rabiei canis mederi putatur domibus appensa salutaris esse creditur, & hominibus atque animalibus fascini amuletum, purpureo linteo circumligata, pecorum morbos abigit.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἄλυσος.

Latine Alyssum.

Officinis & herbarijs mater sylua.

Germanis Waldt meyster, Waldt manlin.

Gallis rubra minor.

Alysson



Alysson.



Asclepias.



Atractylis.

**A**tractylis, spina est cnico similis, folia multo longiora ferens in summis uirgis, magna parte nuda, aspera quoque, qua foeminae pro fusis utuntur, capitula in cacumine

Alysson Plinio distat à rubea, folijs tantum ramisque minoribus quippe nomen accepit, quod emorsos à cane rabiem sentire non patitur potum ex acetato alligatumque. In montibus & asperis emicat, inuenitur etiam in pratis, locis humidis & opacis. Dioscoridis uero Alysson propius accedere uidetur ad eam quam rusticam cannabim uocant Herbarij. Siquidem fruticosa herbula est, unicaulis, folijs per initia satis rotundis, ubi adoleuit oblongis, & per ambitum leuiter serratis, fructu duplicum scutorum effigie, in quo esse semen quoddamtenus latum, in montibus & asperis emicat, inuenitur quoque in pratis frequenter.

Asclepias.

Cap. LXXXVIII.

**A**sclepias, ramos emittit longos: folia hederæ, longa: radices numerosas, renues, odoratas. floris uirus graue. semen securidacæ. nascitur in montibus. Radices ex uino potæ torminibus auxiliantur, & contra serpentium ictus. Folia aduersus uulnè mammarumque ulcera, quæ cacoëthe uocant, illinuntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἀσκληπιάδα. Latine Asclepias.

Officinis Vincetoxicum, hirundinaria. Germanis Schwalmen wurz.

Gallis Hederæ apud aliquos appellatur.

Recentiores radice eius magna efficacia ad mensium prouocationem utuntur & ad rabidi canis morsum, uenenisque potenter resistere assident, unde etiam haud temere uictrix toxici ab iisdem appellata est.

Hydropicis etiam radicem in uino maceratam & subinde costam, mistic auxiliari tradunt. Flores præterea foliaque siccata, mox trita, uulneribus utiliter inspergi aiunt. Sordida enim ulcera purgat, & ad cicatricem perducit, genitaliumque uitij et rupturis egregie mederi docet. Quæ in uniuersum oēs facultates cum ijs quas Asclepias obtinet, pulchre quadrat ut eandem esse Hirundinariam officinis, Gema. uero Schwalmen wurz uocatam herbam, nullus deinceps dubitare debeat.

Carduus Brnedictus.



Cap. LXXXIX.



cacumine spinis horrent. flos luteus: quibusdam in locis purpureus inuenitur. radix tenuis, superuacua. Coma, semen & folia cum pipere & uino teruntur uti-  
lissimè contra scorpionum ictus. percussos tradunt quamdiu ea teneatur herba,  
nullum experiri dolorem, ipsumq; deposita statim recrudescere.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Ἀτράκτυλιν ἑρπῆα. Latine atractylis alter. Officinis carduus benedictus.

Germanis Carden benedicten. Gallis chardon benoyt.

Carduus à nostris benedictus, ob singularem plantæ totius amarissimæ facultatē aduersus pestilen-  
tes, putresq; alios affectus. præterea contra serpentium & scorpionū morsus ualere omnib. in confesso  
est. reiectiones contra capitis uehementissimos dolores, uertiginem, memoriā anussam, in cibi aut po-  
tu sumptum ualere tradunt. Idē ad putrescentia ulcera, mammarū potissimū, si in puluere redactus in-  
spargatur. Atractylis spinaenico similis canō est q̄ Euschiu falsō depingit omnib. reclamantibus notis.

## Polycnemum.

## Cap. XC.

**P**olycnemon, frutex est surculosus, folijs origani: caule, ut pulegij, geniculis  
multis intercepto, sine umbella, tenui tamen in cacumine corymbo, boni  
odoris & acris. Vulneribus agglutinandis recens, aut aridum cum aqua,  
efficaciter illinitur: sed quinto die solui debet. ad urinæ stillicidia ruptaq; cum ui-  
no bibitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hæc herba hodie incognita adhuc, Plinio cum le bubale appingitur similis, semine pulegij, surcu-  
losa, multis geniculis, corymbo odorato, acris & dulci odore, quæ ferro factis uulneribus commanda-  
cata imponitur, quinto die soluitur.

## Clinopodium.

## Cap. XCI.

**C**linopodium frutex est folijs serpyllo similis, surculosus, duum dodrantum  
altitudine, nascitur in petrosis. flores, marrubij modo, ex interuallis distin-  
cti speciem lecti pedum præbent. Bibitur herba & succi eius decoctum, ad con-  
uulsa, rupta, strangurias, serpentium ictus, menses & partus pellit, & peniles uer-  
rucas, quas acrochordonas uocant, eiicit, aliquot diebus potum, aluum sistit de-  
coctum ad tertias, potumq; si febrim sentiunt, ex aqua, alioquin ex uino.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè κλινωπόδιον. Latine Clinopodium, herba orbiculata.

Officinis pulegium montanum, lecti pes. Germanis wirbel doß, dicitur.

Folij est serpylli, floribus per interualla surculos coronantibus, ut in marrubio, altitudine fræ  
pedali, passim in Saxonia in petrosis nascens.

## Leontopetalum.

## Cap. XCII.

**L**eontopetalon caulem emittit dodrantalem, aut altiozem, plurimis alis con-  
cauum, & in cacumine semina parua duo aut tria, in siliquis, ciceris modo:  
flores anemonæ similes, punice coloris: folia brassicæ, sed papaueris diuisura:  
radicibus nigris, rapæ similibus, strumosis. nascitur in aruis & fegetibus. Radix  
auxiliatur serpentium ictibus, ex uino pota. nec alia res celerius dolorem finit,  
miscetur ischiadicorum clysteribus.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Leontopetalon Italia papauerculum, & leoninum semen appellat, caule semipedali, aut etiam  
maiore, alis numerosis, quarum cacumine in siliqua semina ciceris modo bina ternaq; continentur. flo-  
re puniceo, simili anemonæ, folio brassicæ, diuiso, papaueris forma, radix nigra similis rapæ, strumosa  
stuberculis quibusdam cœu nodis articulorum eminens: nascitur in aruis frumentario agro. Pa-  
ta leonis officinis & herbarij. Germanis Lewen tapp / lewen tapp. Gallis pate de lyon dicitur.

## Teucrium.

## Cap. XCIII.

**T**eucrium, siue ut alijs placet teucriis, herba est uirgæ referens effigiem, trisa-  
ginis similitudine, tenui folio, non multum à cicere alieno. hæc in Cili-  
cia iuxta Gentiadem Cissademq; ubertim prouenit. Recens cum posca, aut aridæ  
feruæ facte ius, potu lienem potenter absumit. lienosis cum aceto & ficis illinitur.  
item serpentium moribus ex aceto solo, sine ficis.

## NOMI-



DIOSCORIDIS  
NOMINA ET EXPLICATIO.

Teucrium.



Veronica. Erenpreis.

Græcè *τεῦκροπ*. Latine Teucrium.  
Officinis incognitum.

Germanis Grosse bathengel dicitur.

Teucrium uocatum est Græcis pariter & Latinis, quod Teucer Atacis frater hoc inuenit ut Plinius refert, (De Hemionitide, quam Teucer quoque inuenit, & ideo Teucrion cognominata, scribendum alibi nobis erit) Recentioribus planè uulneraria herba est, ui no incocta & epota. Hieronymus Tragus uir in re herbaria exercitatus fide dignissimusque, aliam herbam Herbarijs & Officinis Veronicam, Germanis uero Erenpreis appellatam, uerum esse Teucrion Dioscoridis scribit, quæ sua descriptione Teucrij faciem, non malè exprimit, sed nihil definitio, eruditioribus iudiciu in hac relinquens. Hæc mirificè ad crenta ac uetera uulnera & ulcera sananda confert.

Scabiei denique & omnibus cutis uitij medetur. Tumores etiam in quacunque parte corporis fuerint, potissimum autem in ceruice, discutere potest. Recentiores huius usum unicè commendant in febribus pestentialibus, iecoris & lienis obstructionibus, potissimum uero pulmonis exulcerationibus. Ob mirificam sanandi ulcera & uulnera facultatem, Germani Grundheyluoant.

Trifago.

Cap. XCIII.

\*chamedrops



Chamedrys Græcis, alij chamedrops\*. Latine trifago dicitur. sunt qui eam teucrion appellauerunt, propter eam quam cum teucrio seruat similitudinem. Nascitur in petrosis & asperis, frutex dracentalis, folia habens exigua, amara, effigie & diuisura quercus: flore paruo, penè purpureo. Carpitur semine prægnans. Recens in aqua decocta, potu tussibus, indurato lieni, urinae difficultati, incipientibus hydropicis, auxiliatur. citius menses partus extrahit. licet nem ex aceto pota confusum, aduersus serpentiu uenenam ex uino, potu illius efficacissima. trita digeritur in pastillos ad supra dicta. purgat ulcera, cum mel

le. cum oleo illira caliginem oculorum discutit. natura eius est calfacere.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *χάμεδρος*. Latine Chamedrys. Trifago. Officinis corruptè Chamedreos, quercula, ser ratula. Germanis Fleyr bethonis, gamander. Gallis petit chesne, gelimander.

Chamedrys



## Vera Chamaedrys.



Chamaedrys, id est, quercula, amara, subacris, calida sicca tertio gradu, sub calidior paulo quam siccor. Ex Creta (que nunc Candia) Cesari adferebatur ad theriaces compositionem, tamen ubique nascitur, etiam in Romae suburbij, odore & gustu quam Cretica uchemenior, presertim si multo imbre non fuerit irrorata, quamvis hac campestris sit melior. Pregnans semine cum Dioscoride, aut succo cum Plinio, aut etiam flore cum Galeno carpitur.

## Leucas. Cap. XCV.

Leucas montana, latioribus quam urbana folijs, semine acriore, amariore, ori ingrato, efficacior tamen quam sativa habetur. Vtraque ex uino contra animalium uenena, precipue marinarum opitulatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Leucas cui eadem Leuce uidetur hodie incognita. In quo genere apparet grandior que in syluis euocat, a triplicem rusticam Herbarij uocant.

Tunica.

Donderneglin.

Lychnis coronaria.

Mergenslin.

## Lychnis. Ca. XCVI.

Lychnis coronaria, flore est albæ uiolæ simili, quo corollæ factitantur. Contra scorpionum ictus semen in uino potum auxiliatur. Lychnis syluestris, omnia urbanæ similis. Bilem per aluum detrahit, semine duabus drachmis poto. ictis à scorpione subuenit. Aiunt huius herbæ appositum scorpiones torpescere, & inertes prorsus reddi.

## NOMINA ET EXPLI.

Græcè Λυχνίς, seu Λυχνία.

Latine Lychnis coronaria, Gaza lucernulam uocat, Plinius Rosam Græcam, uel Græculam.

Officinæ herba Tunica.

Germanis Donderneglin/ Wild neglin/ Feld neglin/ Blütsrüpflin.

Gallis Giroffles sauages dicitur.

Folia habet porracea, oblonga, statim quo medium diuiditur puniceo ac rubente cum resto calamo triangula,





floribus in uertice purpureis albæ uiolæ similibus: syluestris *Lychnis* meminit *Hermolaus* in corollario in herba *Lychne*, sibi tamen ignotæ. Eam uenetijs hepaticæ nomine in littoribus passim nasci scribit, olitorio sive ieiuniorum tempore quo nascitur uenalem. hæderaceo sive folio flore purpureo, lilij pusilli effigie. Conuoluit herba sese quibus appropinquat. Ciet aluum cocta et cruda oleris modo accepta. Hæc *Hermolaus* uerba *Lychne* eandem esse liquido coniectantur. *Plinius* quodam loco *Lychne* flammeam cognominat, et omnino ea uidetur esse, quam Germani uocant *Fräwen rößlin*, flore albæ uiolæ simili, inodoro, nec nisi coloris gratia coronamentis additus. Nam æstius is flos, cauliculis incanis, calice quadrangulo, purpureo flore, betonicæ altilis, aculeatis apicibus, folijs circa terram frequentius, semipedali longitudine, sesquiunciali latitudine, mollibus ac lanuginosis, radice numero capillitio fibrato: hanc ego potius *Lychne* coronariam satiuam seu hortulanam crediderim quamuis et altera superius descripta à legitima delineatione non longe abscedat.

*Lilium album.*

*Lilium rubens.*

*Lilium.* Cap. XCVII.



**L**ilia coronamentis se dedunt, *Liria* à quibusdam uocata. E quib. unguentum temperatur quod aliqui *lirinum*, alij *fusinum* appellant, neruos et priuatim uulug duricias emolliens. Folia herbarum illita contra serpentium ictus auxiliantur. feruefacta, ambustis proficiunt. aceto condita uulneribus opitulantur. Succus adiecto melle aut aceto, in æreo uase coquitur, conuenienti medicamento uetustati ulcerum, & ad recentia uulnera. Inassata radix & ex rosaceo trita, igni ambusta sanati uuluum emollit. menses ciet. ulcera cicatrice obducit, cum melle detrita neruis præcis, luxatisq; medetur. utiligines, furfures & lepras emendat, ulceraq; in capite manantia expurgat. abstergit faciem & ex rugat. teritur in aceto cum hyoscymi folijs, & farina tritici, mulcendis testium inflammationibus. Semen potum moribus serpentium aduersatur.

ignibus sacris semen & folia cum uino illinuntur. Tradunt & rubra esse *Lilia*. In Syria autem & Pisdia Pamphylia, efficacissima unguentis nascuntur.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Κεϊβοϋ.

Latine *Lilium*, *lunonia* Rosa.

Officinis græuinum nomen retinuit.

Germanis Gilgen/ Lilgen.

Gallis Fleur de lis. lyß, dicitur.

*Lilium* uero rubens apud nos frequens, flore tantum ab albo diuersum, aliam simile, Græcis Κεϊβοϋ ερυθρον, Germanis Rot lilgen/ Gallis Rouge lyß appellatur.

Gale. lib. 7. simpl.

*Lilij* radix terget primo ordine, digerit moderate, emollit, menses ciet, uulnera glutinat, etiam in capitibus musculorum cum melle mista. Eadem præstat folium, sed imbecillius. Flos uero substantia constat mista ex tenui et terrea, et aquea: coctus ex oleo mollit, et citra morsum digerit &c. Plura *Lilij* genera uide apud *Theophrastum* cum nostris in eundem annotationibus.

Ballote.

Cap. XCVIII.

**B**alloten, nomine alio nigrum *Marrubium* uocant. caules adit quadrangulos, nigros, subhirsutos, complures ex una radice: folijs maioribus, quam *marrubij*, hispidis, intercedente spacio, subrotundis, graueolentibus, apiastro proximis: unde aliqui apiastrum eam uocauerunt. candidi flores uniuersi uerticillato ambitu caulæ coronant.



Ballote.



coronant. Vis eius efficac̃ aduersus canis morsus, folijs ex sale illitis: feruenti cinere flaccescunt folia, ut condylomata reprimant: purgant & sordida ulcera cum melle.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Βαλλοτὴ.

Latine Ballote, Marrubiastrum.

Officinis Marrubium nigrum.

Germanis Schwarz Andorn dicitur.

Ballotem alio nomine melanprason Græcis appellari Plinius tradit, herbam fruticosam, angulosis caulibus, nigris, hirsutis, folijs uesticulis, maioribus quam porri, et nigrioribus, graueolentibus. Sed deceptum hic Plinium constat similitudine nominis prason pro præson legemem, nam Marrubio folia sunt non porri sed Marrubij albi, aut apiastrum.

## Apiastrum. Cap. XCIX.

**M**elissophyllon siue Melitæna, id est, Apiastrum, id sibi nomen usurpauit, quoniam apes ipsa herba delectantur, cauliculi & folia ballotæ, de qua paulo antè diximus, similia essent, nisi maiora, tenuiora quæ, nec ita hirsuta spectarentur, citreum malum olent. Folia cum uino pota aut illita prosunt contra ictus

Melissa. Citrago.



Apiastrum.



phalangiorum, scorpionumque, item aduersus canis morsum, decocto eorum demgratia, soteri prodest, de sessionibus febriarum ad citreos menses conuenit, dentes eodem in dolore colluuntur, dysentericis infunditur, Fungorum stragulationibus folia, addito nitro, potu auxiliantur: torminibus & orthopneicis, delinctum illita cum sale strumas discutunt, ulcera purgant, articulares dolores illita sedant.

Y z



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Μελισσόφυλλον.

Latine Melissophyllum, Citrargo.

Officinis Melissa.

Germanis Mutterkraut / Wangen Kraut.

Gallis De la Melisse poniceade.

Duo Melissophylli genera exhibemus depicta, unum passim in hortis colitur, alterum nascitur in suis odor multo, suaviori: hoc genus uerè Melissophyllum, id est, apii folium, quod herba hæc præsertim florentes apes plurimum gaudeant, unde Apiastrum Latinis dicitur: alterum uero à citri odore Citrargo. Folia & cauliculi sylvestris Melissophylli (quia in sylvestribus nascitur) Balloti seu Marrubionis.

Gale. lib. 7. 2<sup>o</sup> similia sunt, maiora tamen & tenuiora, nec ita hirsuta, iam etiam in hortis scri capis. Melissophyllum uiribus est Marrubio simile, sed imbecillius, ob id etiam usu rarus.

simpl.

## Marrubium:

Ca. C.



**M**arrubium, frutex est ab radice ramosus, candicans, subhirsutus, quadrangularibus ramis. folium pollicem æquat, subrotundum, hirsutum, rugosum, gustu amaro, semen in caulibus, & ex interuallis. flores uerticillato ambitu, asperi. Nascitur propter ædificia, ruinas, & ruina. huius folia sicca, cum semine decocta in aqua, aut uiridium succus datur cum melle suspiriosis, tussientibus, & ad tabitudinem redactis. crassam è pectore pituitam, cum sicca iri eiecit. mulieribus à partu non purgatis datur, ut menstrua & secundas extrahat. item in difficili partu, & his qui uenena hauserunt, aut à serpentibus demorsi sunt. uesciam renesque lædit. Folia cum melle illinuntur sordidis ulceribus purgandis. pterygia nomasque sistunt. laterum dolores mitigant. Succus folijs contusis expressus, & sole coactus, ad eadem pollet. cum uino & melle illitus, oculorum claritatem adiuuat. naribus regium morbum expurgat. aurium doloribus conuenienter instillatur, per se aut cum rosaceo.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Ράριον.

Latine Marrubium.

Officinis Marrubium album, Prasium album.

Germanis Andorn / Gottes vergess / Lungen Kraut.

Gallis Du marrubium dicitur.

Marrubium seu prasium album. sapore amaro, calidum ordine secundo, siccum tertio: lienis & hepatis obstructions soluit, pulmonem & thoracem purgat, menses ciat, ad motum terget, digrit, & cum melle oculorum aciem claram reddit.

Marrubium nascitur circa domicilia collapsa, & inter rudera. Colligitur herbam æstate Iunio & Iulio potissimum mense, dum semine est prægnans.

Theophrastus duplex genus constituit, unum folio herbaceo, et incisuris altioribus serrato, unguentâ rijs, ut idem ait, ad quædam quæ sita: huius picturâ supra exhibuimus, alterum folio rotundiore, uerementes squalido, ut salua, & obscurus serrato: hoc candidum interpretor, de hoc capiti præfermi agi Diocorides.

stachys



## Stachys.

## Cap. CI.



Lingua Cervina.



Huius folia, semen, flos cum uino pota, auxiliantur contra scorpionum phalangiorumq; ictus, rormina quoq; discutunt.

Phalangium uel Phalangis, herba hodie incognita.

**S**tachys frutex est marrubio similis, sed longior: folia ferens numerosa, hirsuta, rara, praedura, cana, odoris iucundi, & complures uirgas ab radice exeuntes, marrubio candidiores, nascitur in montibus & asperis. Vim habet excofactoriam & a crem. foliorum decoctum potu peli menstrua & secundas.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Graecè *Στάχυς*.

Latine *Stachys*.

Officinis nomen nullum inuenit.

Germanis *Niechender Andorn*.

Gallis *salina mollis* appellatur.

*Stachys marrubio similis, paulo tamen longioribus folijs pluribusq; modice hirsutis durisq; iucundi odoris: uirgulis ab una radice pluribus, quam marrubij candidioribus: montes & aspera diligit. Stachys gustu acri & amaro est, tertijq; ordinis excofactorium.*

## Phyllitis. Ca. CII.

**P**hyllitis, folia promiscue rumici similis, longiora, & uiridiora, sena aut septena, recta, quae parte anteriore laeua cernuntur, a tergo autem pensiles, quasi uermiculos terues ostendunt, in umbrosis & opacis horarum locis emicat, gustu acerbos, neque caulem, neque florem, neque semen profert. Folia in uino pota serpentium moribus aduersantur, quadrupedibus per os infusa auxilio sunt, & si dysenteria aut resoluta aluus exercet, potui datur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

*Phyllitis Euphratica Cordo, quam uulgo linguam Cervinam dicit, esse uisa est, Ruellius uero Hemionium linguam cerui facit, cui Gesnerus subscribit, sed de hac re copiosius in annotationibus nostris, mca. 128.*

## Phalangium. Cap. CIII.

**P**halangium a quibusdam phalangites uocatur, ramuli sunt ei duo, aut tres, pluresue, in diuersa tendentes: flos candidus, lilio similis, multas incisuras habens. semine nigro, lato, ad lentacula dimidiatam figuram, multo tenuiore. radice parua, tenui, herbacei coloris dum a terra eruitur, provenit in collibus.



## Trifolium.

## Cap. CIII.



Album.



**T**rifolium, Græci Triphyllon, alij oxytriphylon, alij menyanthes, alij asphaltion uocant. frutex supra cubiti altitudinem attollitur, uirgas habens tenues, iuncas & nigras, unde ramulares enascuntur appendiculæ, in quibus terna singulis germinationibus exeunt folia, lota arborisimilia. hys recenter enatis rutæ odor inest: ubi autem adoleuerunt, bitumen olent, florem edit purpureum, semen quadamtenus latum, subhirsutum, ex altera extremitate exertum, antennæ modo corniculum gerens. radix tenuis, longa, ualida. Semen & folia in aqua pota pleuritidis, urinæ difficultati, comitialibus, & hys qui aquæ inter cutem principia sentiunt, foeminis quoque uulvæ uitio opportunis, auxiliantur. menses ciunt. ternæ drachmæ & semine dari debent, & folijs uerò quaternæ. Contra serpentium ictus trita folia, & ex aceto mulso pota, præsidio sunt. Tradunt aliqui, totius fruticis, radices, foliorumque decoctum soti dolores eorum finire, quos serpentes percusserint. qua autem aqua sanatus quis fuerit, si ea quispiam alius foueatur, qui ulcus habuerit, perinde afficitur ut à serpente demorsus. Quidam terna folia aut semina in tertianis, cum uino potu dedere, & in quartanis, quaternana, ut quæ febrim circuitus discuterent. Radix antidotis inseritur.

## EXPLICATIO.

## Luteum.



## Purpureum.





Græcè Τριφύλλον. Latine Trifolium odoratum. Officinis inusitatum.

Germanis Siben gezezt, propterea quod singulis diebus septies odorem (ut aiunt) suum habeat, & toties etiam amittat, quamdiu in horto creuerit. Decerptum autem & exiccatum, odorem suum perpetuo retinet. Qui certe pluuiosa temporis constitutione, ac tepestate instante multo uehementior,

Oxytriphylon.



sic sanè ut totas aedes, in quibus herba reposita est, odore suo cõpleat. Potest etiam imitatione latina cõmodissime adpellari wolricchender Flee. Sponte sua in Germania non promittit, faciem uerò nulla difficultate prodit. Calidū est & siccum in tertio ordine. Debet autē huius trifolij odorati usus esse subinde in omnibus officinis, quod mirificè aduersetur uenenis, & ad ulcera malefica sananda perquam utile sit. Ceterū ad huc tria apud nos passim in pratis proueniens accernuntur trifolij genera, quorū primum a florib. purpureis. Trifolium pratense purpureum, Germanicè brauner wysen Flee, braun fleisch blümen. Gallicè treuifle incarnat, alterū itidem a floribus suis candidis Trifolium pratense album, Germanis weis wisen Flee, weis fleisch blümen. Gallis treuifle blanc : & tertium luteum, Germanicè gel wysen Flee. Gallis treuifle iaulne appellatur. Quod ad folia ipsa attinet, non admodum differunt: quoduis enim horum generū tribus constat folijs, quæ in primo sunt latiora & herbacea, in secundo autem longiora & angustiora, magisque pallescentia candidantia: in tertio sunt parua & rotundata, adque foenugraeci folia accedentia. Adstrictorie cuiusdam qualitatis sensum in gustu præ se ferunt, non tamen multum admodum, nihilominus sunt tenuium partium & exicatoria, quandoquidem etiam exigua acrimonia prædita uidetur. Trifolium acutum, quod oxytriphylon appellatur (ut Scribonius Largus scriptum reliquit) nascitur in Sicilia plantatum, nam Italiae regionib. nunquā eam uidit herbā, nisi in Luciae portu cum Britannia peteret cum Claudio Casare. Quod uerò apud nos oxyis siue oxytriphylon dicitur, Officinae, herbarii panem cuculi & alleluia uoce barbara uocant. Germani Gaudybot / saur Flee, büch ampffer / hasen ampffer / gaudy Flee appellant, humile, longis tantum pediculis, trifolium præferens acetoso sapore, flore candido, rufo in lunatis siliquis fectis, radice intransuersum longa & fruticosa. Hoc in acetarijs utuntur iucundo sapore, id quod ab acido sapore Plinio oxyis dicitur, folia habet lenta, unde illi trifolij nomen apud Ger. Officinis.

#### Polium. Cap. CV.

**D**uo genera polij. montanū, cui theu trio nomē est, & cuius est usus, tenuis, frutex est, candidus, dodratalis, semine refer tus: capitulo in cacumine quandā corymborū speciē præferente. puo, canis hominis simili, grauiter olēte, nō sine quadā suauitate. Alterū fruticosius, nō usq; adeo ualens odore, & uirib. infirmis. Potū feruefacti ius auxiliat serpentium ictib. hydropicis, morbo re gio, & lienosis ex aceto. stomachū malè habet, caput dolorib. afficit, aluium et menses ciet, substratū suffitūue serpētes abigit, uul nera cõglutinat.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Polium montanum, quod odore effectūq; præfertur, in Narbonensi prouincia Gallie frequēs, unde ad nos defer tur, surculis palmis, teretibus, canis, per interuallā foliatis, thymi carnosiore mollioriq; coma, et ea quoq; incana, flosculo pallido, capitellis corymborū effigie, fructu plenis. huic delineationi adanussim respondet nostrū germanicū poliu cuius picturā dānus, Germ. Je lenger ye lieber weible appellatum. Fuchsis filso Chamepi



305 prima dicta, Polium astringit & cohibet uulnera, prohibetq; serpēre.

X 4



## Scordium.

## Cap. CVI.

\* dudum



Int: hanc ut permulta alia Valerius Cordus doctissimus iuuenis et restauranda prisca medicina strenuus indagator, primus nullo demonstrante in Germania nostra inuenit. Scordium autem ab odore et acrimonia scorodi, id est, allij dictum est: subamarum, acre, acerbum, calfacit, purgatque viscera, obstructions liberat, urinas et menses mouet: uiride magna uulnera glutinat: seculi autem sordida purgat, contumacia cicatrice tergit. Optimum ex Creta petiitur, quale etiam Andromachus ueneris sue theriacae miscet: non malum tamen in alijs regionibus possis inuenire. Putrefactis animalium ueneris et phar macis deleterijs succurrit. Quae uis eius inde est coniectata, quod quae in bello occisa fuerant corpora, diuque insepulta super Scordium iacuerunt, minus putrefacta sunt inuenta, quod a uiris quibusdam fide dignis acceptum tradit Gal. lib. 1. antid. Nobis hodie in Germania locis riguis est largissimum uerum scordiū, Valerio Cordo, ut diximus, primo demonstrante.



Scordium in montibus & palustribus nascitur, folijs trifaginis, maioribus, nō sic in ambitu diuisis, aliquantum allia redolentibus, gustu amaris & astringentibus: quadrāgulis caulibus: subrubro flore. Herba uim excafactoriam habet. urinam cit. cocta recēs, aridaue cum uino, aduersus uenenatos serpentium morsus bibitur. ad stonachi quoque rosiones, dysenteriam, & urinae difficultatē, binis drach. cum hydromelite, crassamen purulentū pectore expellit. facit aridē farina ad ueterem tussim, rupta, conuulsa, si cū nasturtio, melle & resina misceatur in eclegmate, inflāmata modo dicē praecordia, cerato excepta, recreat. cum aceto aut acri aut aqua, podagris conuenienter illinitur. menses imposita mouet. uulnera conglutinat. uetera ulcera purgat, et ex melle cicatricem perducit. sicca excrectias in carne cohibet. Succus ad eadem uicia bibitur. Inter prima efficax Ponticum natione, Creticumq;

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *Σκόρδιον*. Latine Scordium. Trixago palustris. Officinis longo tempore incognitum. Germanis aliusiue quādam ad Romanam appellationem aptē *Wasserbateng* et *Enobloch* sicut nominabitur.

Gallis *Chamarā*, uoce à *chamedryos* similitudine deflexa appellata indagator, primus nullo demonstrante in Germania nostra inuenit. Scordium autem ab odore et acrimonia scorodi, id est, allij dictum est: subamarum, acre, acerbum, calfacit, purgatque viscera, obstructions liberat, urinas et menses mouet: uiride magna uulnera glutinat: seculi autem sordida purgat, contumacia cicatrice tergit. Optimum ex Creta petiitur, quale etiam Andromachus ueneris sue theriacae miscet: non malum tamen in alijs regionibus possis inuenire. Putrefactis animalium ueneris et phar macis deleterijs succurrit. Quae uis eius inde est coniectata, quod quae in bello occisa fuerant corpora, diuque insepulta super Scordium iacuerunt, minus putrefacta sunt inuenta, quod a uiris quibusdam fide dignis acceptum tradit Gal. lib. 1. antid. Nobis hodie in Germania locis riguis est largissimum uerum scordiū, Valerio Cordo, ut diximus, primo demonstrante.

Falsi sunt hactenus officinae et herbarij, qui Scordion esse putauerunt herbam cubit ali proceritate, folijs urticae, parcius fimbriatis, à pediculo latioribus, allij cum teruntur odoratu, flosculo lacteo, exili in pelticulis semine, radice oblonga, eiusdem cum folijs odoris, ideo alliariae nomen sibi uedicauit. Germani uero *Lauch* sunder *lauch*, hoc est, allium sine allio uocant. sed haec est terete cauliculo, illa quadrato: huic flos candicat, illi subrubet: huic folia urticae fimbriata, *chamedryos* siue trixaginis querna, quae olfacta suboleant allia, huius non nisi terantur.

Tussilago.



## Tussilago. Ca. CVII



**T**ussilaginis folia sunt maiuscula quam hederæ, sex aut septem à radice, subalbida à terra, supernè uirentia, in plures angulos exeuntia. caulis palmū altius, flos luteus in uere, flore & caule cōfestim exiit: inde nonnulli his uacare existimauerunt. radix tenuis est et superuacua. nascitur in amoenis & riguis. Folia ex melle trita ignisacro & omniū inflammationibus illitu medentur. aridæ fumus per infundibulū hianti ore raptus, hos sanat qui sicca tussi atq; orthopnæa infestantur, pectoris uomicas rūpit. Eundē effectum præbet suffusa radix, decocta in hydromelite, & pota, emortuos partus eiicit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè βήχιον. Latine Tussilago. Bechium.

Officinis Vngula caballina. alijs jārjāra nonnullis populago. Germanis Ros hüb/brant lartich/efels hüb/hüß lartich. Gallis pas d'asne: & in montibus supra lacum Lemannum tacomete dicitur.

Plinius hanc aliter atq; Dioscorides describit, folia ei tribuens maiuscula quam hederæ quinque aut sex tem, sublata à terra, supernè pallida, sine caule, sine flore, sine semine, radice tenui. Quidam eadē esse bechiō & alio nomine chameleuten putant. Sed hic obseruandum diligenter, caulem & flores Tussilaginis esse fississimos, ijsq; enatis breui uigor uitæq; durat, longissimāq; mora (quantum nihilicuit deprehender) biduum post quod illico tempus flaccescere euascent, &

caduci marcent. Quare non nisi ijs, qui uere medio sese fortuna seruit obuiā, & flos et caulis cernitur, namq; die uno locū uniuersum caule & floribus pubescere uidebis, post ridie prorsus eos concubuisse, frondēq; sola uirescere. quapropter sine caule & floribus nasci plerisq; qui tam citam caulis iacturam non conspexerunt, creditum est.

## Artemisia.

## Cap. CVIII.

**A**rtemisia magna ex parte in maritimis nascit, absinthij modo fruticosa, maioribus & pinguioribus folijs, ramisq; huius quidem genera duo, unum lætius habitiusq; folijs uirgisque latioribus, alterū tenuius, flore paruo, tenui, cādido, graueolente. æstate floret. Sunt qui in mediterraneis unicaulis nomine appellēt, tenuē herbulā, simplici caule & minuto, florib. scatente, flauo colore. hæc iucundiorē quā præcedens efflat odorē. Vtraq; exalfacit, extenuat, seruæfactæ cōuenienter in muliebres desessus adijciuntur, ad detrahendos menses, partus, secundasq; item ad præclusiores uuluar, & eiusdem inflammationes, calculos committunt, remorata urinam cient, menses pellunt pubi illitæ. Succus uuluar inditus ex myrrha, eadem quæ infessio trahit, Coma tribus drachmis eorundem educendorum gratia bibitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Ἀρtemisia. Latine Artemisia. Officinis Latinum nomen seruauit.

Germanis Baisus. Rot oder weißbuck. Sanct Johans gurtel.

Gallis Armoise dicitur.

Nūcupata autē est artemisia herba, ut aliqui uolunt, ab Artemisia Mausoli regis cōiuge, quæ ipsam ad opitādō cognominē sibi fecit, in herbe & nonnisi & gloriæ suæ memoriā & monumentū naturæ æque uū ad posteros



Rot buck.



Weiß buck.



ad posteros transmitteret. Siue ut alij uolunt, non ab hoc, sed à Diana, quæ Græcè artemis dicebatur, non  
men hoc adeptæ est, eò quòd ipsa primò eam repperisse & uirtutes eius demonstrasse dicitur. Et quem-  
admodum prægnantibus & parturientibus, ut foetum sine aliqua interiorum locorum noxa facillè in  
lucem edere liceret, auxilio & adiumento esse credebatur de ailla uotis & precibus inuocata: sic  
etià eiusdem deæ beneficio idem præstat hæc herba, & foeminarum malis, menses, secundas, foetusq; tra-  
hendo, & matricis conclusiones inflammationesq; sanando, priuatim medetur. Arthemisia alia monoclo-  
nos est, alia policlonos Germani tantummodo colore distinguunt, hæc Rot buck oder beyßbüß, alteram  
weiß buck oder beyßbüß appellant. hodie quidè & tertiu arthemisia genus addunt id simplici caule  
còsurgit, folijs minutim scissis, colore sub pallido, flore luteo, odore nõ ingrato, gustu amaro. hæc officio-  
nis athanasia, quòd immortalis flore nec citò marcescente fastigetur, alijs tanacetum Germanis Rheinfaria  
dicitur. Flores copiosi erumpunt cum uua maturæ sit, medijs ambemdis floribus non dissimiles. coman-  
tibus auri fulgore bullis, idèo diligenter ad hybernas referuantur corollas.

## Ambrosia.

## Cap. CIX.

**A**mbrosia tenuis frutèx est, ramosus, trium ferè palmorum: folijs rute, circa  
imæ caulem exiguis: cauliculi seminibus, perinde quasi racemulis graui-  
di, qui nunquam florem pariunt, odore uinoso, suauit: radice tenui, sesquipedali.  
Coronantur ea Cappadoces. Vis eius reprimere ac repellere, & illi adstringe-  
re humores, qui in aliquam partem incumbunt.

Non est Ambrosia quæ ab Officinis ita & herbarijs demonstratur, ramis exilibus, patulis, folio ne-  
pete multo rutila aut sanguinaria longiore ac maiore, in quorum cacuminibus corymbi dependent, ni-  
gro somne, radice cubitali, subalbida, & radicle hoc est struthio simili, inuenitur in montosis ac macris.  
nauatur autè apud nos uel copiosa inter exiles & madidas segetes, quæ mulieres se coronant, ut in so-  
luta diu capita iucundo & uinoso simul odore recreent, & sic frondosa coma sese uindicent ab æstu.

Pueris



Botrys.

Geranium rubrum, quibusdam  
Behen rubrum.

Pueris rusticis optime cognita, qui uertices racemosos lanugine molli per initia resitos, minores uocant. Vinosi herbariis dicitur. Alio quibusdam uinaceam rutam, Germanice Weintrauten, quod folio rutam, et odore uinum imitetur, nomenari. Siquidem ea dodrantali assurgit frutice, ramoso, folijs rutaceis, circa inum caulem minoribus, cauliculis seminibus racematim collectis, grauidi nam quam florē pariunt, setu in uertice racemoso et odore uinoso, radice tenui, nec se squipalmo longiore. Superior longa radice nititur, hac breui illa floret, hac minime illa ramis niget, hac inualida sese, ut fertur, adminiculis quibusque inuoluit: hac uinum, illa herbaceum uirus olet.

## Botrys. Cap. CX.

Botrys fruticosa herba est, lutea tota, & in multas alas sparsa. semen circa totos ramulos prouenit: folia cichorio similia. tota suauem odorem spirat: quare uehementis interponitur, inuenitur in torrentium ripis, & conuallibus. Pota orthopneccas mulcet. Hanc Cappadoces ambrosiam uocant, alij amissiam.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Βότρυς.

Latine Botrys.

Officinis ignota.

Germanis Traubenkraut / Krottenkraut.

Gallis Pymen, Sabaudis la miraine.

Botrys Parisiensibus matronis, melius quam officinis aut herbarijs noscitur. Hanc odoris gratia, uentimentis, pannis, et linteis curiose nimirum interponunt, ut odoris suauitatem contrahant. Describitur Augusto et Septembri mense uenalis per urbem, pymen, magno clamore denunciant, portantes corbibus rusticis, inde nomen hoc pymen manauit in uulgus. nam hac facie conspicitur, fruticosa herba, luteis ramulis ex interuallo brachiatis, folijs cichorii, odoratis, erumpente passim senne in racemulos collecto, quod per maturitatem gumoso lentore pellucet, coeuntibus fulgore auri simul acinulis, unde nomen Græcis ductum. Pymen, uel potius pygmen uulgo Gallis putauerim nominari, quod ex se pigmentarij institoris uice faceret unguentum. nam si prægnaus suo liquore premeretur, in gummy lente sceret.

## Geranium. Cap. CXI.

Geranium folijs anemones, diuisuris longioribus: radice subrotunda, cum estur dulci: Quæ drachmæ potere in uino pota, uulue inflationes discutit.

Geranium alterum, caulibus minutis & pilosis, sesquipedalibus: folijs maluarum: in summis alis sursum spectantia gruum capitula insunt, cum suis rostris, aut canini dentes. Nullius in medicina usus.

## NOMINA



Acus pastoris.

Herba Roberti.



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Duo Geranij Dioscorides tradit genera. Primum quod longioribus rostris, & in mucronem acuminatis constat. Hoc hodie officinis & herbarijs Acus pastoris et Muscata, Germanis uero Streich & Schmalz bel dicitur. Alterum quod malae folia habet, Pres-

corinus uulgo nominatur, & Officinis Germanicè Krause füss, & Scharten Kraut appellatur: praeter haec duo alia adiecimus genera, inter quae unum folijs Cherephylo simile existit, herba Roberti & Robertiana. Gallis de l'erbe au chancre, germanicè Rapprechts Kraut.

Quartum folia obtinens laciniata, germanicè pro certiori discrimine Krause halß uocari potest.

Quintum quod folia ranunculi habet, gratia dei nominatur. Germanicè Gottes gnad.

Sextum quod forma quarti generi simillimum est, nec fere ab illo nisi sola magnitudine foliorum, florum & radice distat. Germanicè Blät wurz, à rubro colore aut mirifica in siccato sanguinis profusa uio siccitate uocatur.

Omnium folia & radices, primo excepto, cuius radix dulcis est quodammodo, atq; discutiendi adeo ui praedita, adstringunt & sicant.

## Gnaphalium.

## Cap. CXII.

Gnaphalij folijs mollibus minutisque pro tomento utuntur. Bibuntur efficaciter folia in uino austero ad dysenteriam.

NOMINA



LIBER TERTIUS.  
NOMINA ET EXPLICATIO.

Moss Folben.

Gnaphalium.  
Eurt Kraut/matten flachs



Græc γναφαλίον.  
Latine Gnaphalium, tomentum.  
Officinis Centunculum, centuncularis herba.

Germanis rür Kraut/Matten flachs/wysen wollen.

Gnaphalium uocata est hæc herba, Galeno autore, à candidis mollibusq; eius folijs, quibus ævri γναφαλίον, hoc est, pro tomentis utitur. Gnaphalia itaq; dicitur quasi tomentita. Centunculum autem dixerunt, quod centonibus cum tomento maxima sit cognatio. Germanicam priorem nomenclaturam ab eius facultate aduersus dysenteriam illi inditam esse nemini non notum est.

Typha. Cap. CXIII.  
Typha folium ædit cypetridi simile: caulem albū, leuem, æquabilem: florem in cacumine ambientem, densum, qui in pappos soluitur, quod in paniculam aliqui nominant. Huius herbæ flos, suillo adipe eloto exceptus, ambustis medetur. Gignitur in palustribus & aquis stagnantibus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græc τύφη, ἡ τίφη.

Latine Typha apud Theophrastum aquaticus frutex, nec radice numerosa coherens, sine geniculis, et folio scirpi modo prosiliens, Orchameneō circa lacum, parte caudici proxima, esu præcipuè pueris tenera. Sunt qui solius literæ mutatione à cereali typha putet differre, tiphâ scribentes. Germanicè, ut Euritius Cordus tradit, moss Folben/narrê Folbe/dietzel colbe, lies Enospen Gal. mache, uel masse, ab similitudine insignis illius clauæ argenteæ, uel aureæ, quæ ante primos magistratus gestatur, dicitur. Nâq; in paludib. et stagnantib. agserupit, folio cypetridi proximo, caule alto, leui, plano, enodi, cuius cacumē dēsa florū cōgerie stipatur, et ueluti spissa capitatur lanugine, quæ in pappos tandē euanesceat. Galli masas apposite dixerūt, qđ scepra regū, machas uulgo dicta per politus caulis lanosa floccorū densitate summam fastigatus emuletur.

Cap. XCIII.

Circea, quam & dirceam aliqui uocant, folijs est horuensis solani, agnatis crebris: flore nigro, pusillo copioso: semine milij, nascente in quibusdā ueluti corniculis: dodrantali radice, triplici fermè aut quadruplici, candida, odorata, ex calfaciente nascitur in apricis, faxis, & uento perflatis. Radicis tusæ pōdo quatuor. in sextarijs tribus uini dulcis, per diē & noctē maceratur, potuq; triduo uulvas expurgat. Semen in sorbitionib. datum, lacte mammas nutricum explet.

Circea hodie incognita, fortè à Circe dicta.

Z



## Oenanthe.

Filipendula.



Conyza.



Conyza.

## Cap. CXV.

**O**enanthe folia habet pastinacæ: florem candidum: caulem crassum, palmi altitudine: fermen atriplicis: radicem magnā in multa rotunda capitula extuberantē nascitur in petris. Caulis eius & folia, cum mulso uino pota, secundas eiciunt. Radix ē uino urinæ stillicidio conuenit.

## NOMINA ET EXPLICAT.

Græcè οὐρανὸν ἄσπερον.

Latine oenanthe herba. officinis filipendula. Saxifraga rubra.

Germanis Rot steinbrech, dicitur.

Oenāthe herba nascitur, ut Plinius ait, in petris, folio pastinacæ, radice magna numerosa. Caulis eius et folia cum melle ac uino nigro pota facilitatem parienti præstare, secundasq; purgant, tuſum ē melle tollunt, urinam cient. Recentiores in loci stillicidio, & urinæ remoratu, neq; non renum doloribus, atq; lapide eorundem confringendo utuntur. Eandem stomachi inflammationes discutere, mederi & suspiriosis & anhelantibus, & omnibus morbis quos causa frigida concitari tradunt. Farinam eiusdem cibus comitialium ingerunt.

## Cap. CXVI.

\*Addit Marcel. amarigustus.

**C**onyzæ duo genera, quæ parua uocatur, odore præstantior est. maior uero frutice altior & folijs latioribus, graui odore. utriusque folia oliuæ similia, hirsuta, pingua, in maiore caulis binum cubitorum altitudine attollitur. in minore pedē æquat. flos fragilis, lutei aut fului coloris\*, qui in pappi abit. radices superua cuæ. Suffitu substratūq; frutex totus serpentes fugat, culices abigit, & pulueribus. Flores & folia cum uino ad menses partusq; eiciendos bibuntur. item contra urinæ stillicidia, arquatū morbum, & tormina comitiales pota ex accento adiuuant. Decoctum in deflectionibus medetur uulua malis. Impositus succus abortum facit. ex oleo efficaciter horroribus oblinitur. Capitis dolores tenuis illita sanat. Est & tertium conyzæ genus, caule crassiore, ac molliore, folijs quàm parua maiusculis, minimè pinguis, & maiore minor, multò grauioris odoris & inuicundioris, sed inefficacior. Prouenit locis non riguis.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Plinio ut Dioscoridi duo conyzæ in coronamentis. differentia in folio: tenuius femine confectius angustiusq; rubricatum maris & ramosius, flos quodq; magis splendet, eius, ferotinus, utiq; post Arcturum, mas odore grauior: femina acrior, & ideo contra bestiarum morsus aptior. Folia femina mellis odorem habent. Mascule radix à quibusdam libanotis appellatur. Theophrasto maior dicitur mascula, torosiore caule magisque ramoso, folio ampliore ac pinguiore, nec non splendidiori flore. femina tenuiori folio, & compressiore. Manipulo eius abiecto omnes etiam à tota domo blattæ conueniunt ad eam. In coronamentis folio uenit & flore, maior & minor appellata, qui odor



odorus sentitur, cuius audifima sunt apes. Germanis Geelenwurz: & ut Trago placet durr wurz appellatur.

*Hemerocallis.*



*Leucoium luteum  
heiri.*



*Leucoium purpureum,  
Negel blämlin.*



*Hemerocallis, siue lilium sylvestre.*

Cap. CXVII.

**H**emerocallis folium & caulem habet lilij, porraceo colore. flores in caule per singulos exortus, terni aut quaterni erumpunt, lilij diuifura, quoties dehiscere cœperunt, colore perquàm pallido. radix magna est atq; bulbosa: quæ pota, aut cum melle & lana in pefso appofita, aqua meducit & sanguinem. Folia trita mammaram inflammationes à partu contractas, oculorumq; collectiones mitigant. Radix & folia igni ambuftis utiliffimè illinuntur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *ἡμεροκαλλίς*. Latine *Hemerocallis*. Officinis falfò *Asphodelus*.

Germanis *Goldt wurz* / *heydnifch lilien* dicitur.

Hanc *fuschius* communi errore ductus, falfò pro uero *asphodelo* depinxit, omnibus reclamantibus notis, nam radix huius nec amara nec acris est, ut *Dioscorides*, *Galenus* & *Plinius* de *asphodelo* scriptum reliquerunt. Desinant ergo Officinae quæ hætenus communi errore huius radice pro uero *asphodelo* ufi sunt, et alterum cuius picturâ suo loco dedimus, quod legitime delineationi ad omnia reſpondet, in uarios ufus suis *narthecij*s recondant. Inde *hemerocallis* nomen traxiſſe uidetur Græcis, quòd flos fugax pulchritudinem ſuam interdum tueatur, appetente nocte languidus effaceſcat.

*Leucoium, siue uiola alba.*


Cap. CXVIII.

**L**eucoion uulgaris est notitiæ, ſed in floribus differentia quædam namq; aut cœrulei, aut albi, aut purpurei, aut lutei inueniuntur. Lutea uerò præcipui

Z z



Leucoium album.



Leucoium Theophrasti, Weiss homungs blüm.



in medicina usus. Huius aridi flores seruefacti in deflectionibus valent contra uulux inflammationes, & menstrua expellunt. sanant oris ulcera, cum melle: cum cerato, rimas sedis. semen duum drachmarum pondere ex uino potum, aut cum melle inditum, menses, secundas & partus extrahit. Radices cum a ceto illitæ, lienem reprimunt, & podagricos iuuant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

λευκοῖον. Latine Leucoium. Viola matronales.

Officinus, keyri, quod flore aureo est.

Germanis Gelb Violē, braun/weyß/rodt/Leibfarb/neglin / Straßburger negel blüm.

lin. Gallis Violettes giroffles, dicuntur.

λευκοῖον quamuis uiolam albam significet, ad omnes tamen uiolas, præsertim eas, quæ primo uere nascuntur, siue albæ, siue luteæ, siue purpureæ fuerint, seu nigre cum Hippocrate, seu cerulæ, ut quidam Dioscoridis codices habent (quod expungendum putant plerique, præsertim Plinius lib. 20. & Paulus de oleo toto, id est, uiolaceo, album, luteum, purpureum, leucoion tantum commemorant) extenditur. In his efficacissimæ sunt luteæ, keiri Arabibus dictæ. Tamen cæteræ tres aut due caryophyllatæ, à floris figura caryophyllū imitantes nobis dictæ, nō sunt inefficaces: linguam enim ualenter calfaciunt, & acrimonia sua mordent folio, sed magis flore, qui in his colore plurimum uariat, arte optimior quæ sita, ut in floribus alijs. λευκοῖον uerò Theophrasti, quod florum primū se ostendit, etiam nondum exacta hyeme: radice bulbosa, an sit ea quæ nobis circa natalem Christianum florem album pulcherrimū trifolium intus uirentem ostendat, Germanis homungs blüm dicta, ab alijs malo diuinari, quam à me rem non satis compertam pro uera pronunciari. De quo multa Masarius in librum nostrum Plinij.

## Cratægonum.

## Cap. CXIX.

Cratægonum, siue ut alijs placet cratægonon, folijs melampyro simile est, multis calamis ex una radice emicantibus, multorumq; geniculorū, semine, myli.



Cratægonon.



mylij. nascitur in opacis & fruticosis, sum mopere acre. Traditum est quibusdā, hoc si bibat ieiuno ore, ter die post menses purgatos, tribus obulis, in cyathis aquæ duobus mulier, ante conceptum quadraginta diebus: & uir modo consimili, totidem diebus ante coitum hauriat, uirilis sexus partum futurum.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè κραταγόνη.

Latine Cratægonum, Hippocrati Polycriton: uel ut alias legitur Polycarpon.

Officinis Persicaria. Germanis stöck Fraut.

Gallis Rasel, Curaige appellatur.

Dioscorides Cratægonon melampyro similem folio demonstrat. Plinius spicæ tritici, Theophrastus lino pyryo, id est, lino triticeo, intelligens fortasse quod Plinius culmum siue spicam tritici. Sed suspicor melampyron in Theophrasto, unde id Dioscorides uidetur sumpsisse, legendum, cum statim adiungat fructum tanquam milium ferre, uimq; genitalem roborare: nisi quis linopyron, id est, lino triticeum scribendū putet pro melampyro, quod lino folio satis inmitetur. Et reuera Gallicum uulguè chamelinum melampyrō solet uocare, quo oleum Gallia ad lumina lucernarum exprimit. Sed ad rem ipsam accedamus. reuera omnes persicariæ notæ uidentur cratægono suffragari, quod ex una radice multis calamis, multorūq; geniculorum prosilit, breuib; internodijs, foetu quasi Melij in uuis pendente, aspero gustu, quod etiam opacis gaudeat. Ista Persicariæ maiori, quam germanicè stöck Fraut. Galli curaige uocant, mihi uidentur astipulari: sed quod caput totius rei est, persicariæ folium tam simile est melampyro, ut alterum pro altero salutat. Quod ad saporem pertinet, admodum asper in ali quo persicariæ genere sentitur, in altero lenis sit. Hæc sexmina, illa mascula. Quod si quis per imprudentiam sedi confricat, rabiosos solet mouere cruciatus. Cratægonum Græcis creditur appellari, quod genitalem uim roboret, ita ut diu præsumptum mares figurare prodatur.

Phyllum.

Cap. CXX.


**P**hyllum, quod elcophyllon uocatur, in saxosis nascitur. duum generum est. quod autem thelygonum appellant, uuas habet floribus oleæ humiles, pallidiores tamen. folijs itidem oliuæ est, caule tenui, breui, radice exili. florem album profert: semen papaueris maiusculum. Sed arrhenogonum cætera huic simile, solo fructu distat: habet enim racemosum quiddam deflorentibus oleis non dissimile. Arrhenogonon potu, masculi sexus facere partus, ut thelygonon fecimine, proditur. horum Cratæas autor est. sed huiusmodi historia tenuis, mihi produxisse uisum est.

## NOMINA ET EXPLICATIO.


Herba hodie planè incognita. Phyllon Libycum & Aethiopicum Hippocrati silphij semen est. solet etiam pro malobatro accipi, de quo plura in lib. 1.



Testiculus.  
Orchis.



Cynosorchis.



Cap. CXXI.

**T**esticulus, quæ  
Græci cynosor-  
chin uocant, folijs  
circa caulem mollis  
oleæ similibus, in  
terra stratis, longio-  
ribus, angustiori-  
bus, lauibus: caule  
dodrantali: flori-  
bus purpureis: ra-  
dice bulbosa, oblon-  
ga, oliuæ modo an-  
gusta, duplici ordi-  
ne: superiore, quæ  
plenior est: inferio-  
re, quæ mollior ac  
rugosior. Eduntur  
radices coctæ, ut  
bulbi. ex quibus si  
maiores edant ui-  
ri, mares generari  
dicuntur: si minorem  
fœminæ, alterum se-  
xum. Addunt, in  
Thessalia mollē mu-  
lieres in lacte capri  
no bibere, ad stimu-  
landos coitus: ari-  
dam uerò, ad inhi-  
bendos: & alterum  
alterius potu resol-  
ui. Nasceitur in pe-  
trosis & sabuletis.  
Testiculus alio no-  
mine serapias, An-  
drea autore, uoca-  
tur, quoniam radix  
ad multa utilis sit: fo-  
lijs est porri, latiori-  
bus, oblongis, pin-  
guibus, ex alarum si-

nu inflexis: caule palmeo: floribus penè purpureis, radice testiculis simili. quæ il-  
lita tumores discutit, ulcera purgat, & serpere eadem non patitur. abolet fistulas.  
& illitu inflammationes lenit. aridæ radices nomas inhibent: sanantq; putreda-  
nes, & oris ulcera cacoethe. aluum sistunt è uino potæ. De hac, eadem quæ de testi-  
culo canis, produntur:

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis duorū generum est: unus qui cynosorchis dicitur, qui folia habet circa caule, & in ima eius  
parte per terrā strata, molli, oleæ similia, angustiora tantū longiora q;: siue ut Theoph. tradit, folia ha-  
bet scyllacea, minora tamē, et minore leuore nitentia: caule dodrantalē, in quo purpureus flos pādatur:  
radicē bulbosam, oblongā, duplicē, mutuo cōtactu coherentē oliuæ figuræ, superiorem alterā quæ ma-  
ior, uegeta et distenta est, alterā uerò inferiorem quæ minor, languida & rugosa est. Nasceitur planta  
hæc petrosis et sabulosis locis, Germani vixer strawen trāhen / Stendel frant / Ragerwurz dicuntur.  
Alit.



Alter autem, quem Serapiadem uocant, & triorchin, folia habet porro similia, oblonga, latiora tantum, pinguiusq; ex alarum cauis emicatia & inflexa: coliculos dodrantales, & purpurascens flores: radix est illi minimis testiculis similis. Germanicè ut prior, Gallicè du coullon de chien appellatur. est autem Latine & Græcè sic appellata herba, à Sarapi Aegyptiorum deo, propter lasciuia impudendam, qua is deus Canopi, ubi templum, & cultu & religione excellens habebat, colebatur, uti Strabo tradit Geographiæ lib. 17. Radix eius maior calida, & humida est, gustatibus dulcior aparet. Minor admodum elaborata est, ad calidius sicciusq; tendit.

## Satyrium.

## Caput CXXII.

Satyrium Bassifemina.

Satyrium basilicum mas.

Satyrium.





\*al. multū.

272.

# DIOSCORIDIS

**S**atyrium aliqui trifolium uocant, quoniam tria fert folia, ad terram\* infra-  
cta, rumici aut lilio similia, minora tamen, ac rubra: caulem cubitalem, nu-  
dum: florem liliij effigie, candidum: radicem bulbosam, mali magnitudine, ful-  
uam, intus ut otum candidam, gustanti dulcem, & ori non ingrati. quam in ui-  
no nigro austero bibere conuenit, contra opisthotonum. utendum ea dum con-  
cumbendi incessit cupiditas, siquidem ea proniores ad uenerem fieri affirmant.

Est & alterum satyrium erythronium siue erythrai con, id rubrum, semine li-  
ni, maiore, duro, leui, splendente, quod fertur non secus atq; scincus, libidinem  
excitare. cortice radice gracili, rufo: intus autem album includitur: sapore dul-  
ci, non ingrato ori. in montosis & apricis enascitur. Venerem, ut produnt, si om-  
nino manu teneatur radix, stimulat: eoq; magis, si bibatur in uino.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Satyrium duū generū est. Vnū quod à foliorū numero triphyllū, id est, trifoliū uocat tribus plerūq;  
folijs fractis uiret, rumici, lilioque similibus, minorib; taniū & rubentibus: caulem habet glabrū, cubitale:  
florem liliij figura et cādidū: radicē bulbosam, pomo similē, foris ruffo, intus cādido oui colore, gustu sua-  
uē, & in cibo ori grātā, Ger. ut Orchis Stendel wurz, & Rag wurz dicitur. Alterū uero quod  
erythron dicitur, lini semine aequale semē habet, maius tamē firmitusq; cū leuore splendēs: radice cor-  
tex exterior tenuis & rufus, interiora uero cādida sunt, grata in cibo, & dulcia uescētibus. Nascitur  
apricis montanis locis. Et utriq; horum generis sunt radices geminae, sed priori inaequales, nam maior  
semper altera: posteriori uero aequales, & sibi inuicem pares. Habent hodie & Syri herbam simili es-  
sectu. Bucheidemq; nominant, & Indicum Satyrium, radice candida & dura, cōmendatiore, quo cras-  
sior, rugosior, & albius fuerit, podagris utili. Graeci ferē herbas omnes libidinem stimulantes satyri-  
uoce cognominarunt. Non est omittendum genus hoc, quod Basilicon Graeci, Officina Christi palmam  
dicunt, folijs nigra Plumbagine maculosis, reliqua superficie cynosorchii similis. Radix subest lutea,  
Horminum satyrium. Syluestre, ac instar manus effige  
ramosa.



Postremo quod ad  
nominis Satyrii ratio-  
nē attinet, dictum est  
satyriū à Satyris dijs  
syluestribus in Vene-  
rem propēsis, eo quod  
primi ad libidinē con-  
citandam eam uenue-  
rint & ostēderint. Si  
ue quod quēmadmodū  
ipsi natura sua in eam  
uoluptatem sunt po-  
tētiōres, sic herbae  
homines etiam ad eam  
dem durent, & concia-  
tatiōnes firmioresq;  
reddat.

Horminum.  
Ca. CXXIII.

**H**orminum  
herba est,  
folijs marrubio  
similis, caule se-  
micubitali, qua-  
drangulo, circa  
quem eminentia  
folijs similes proe-  
deunt.



deunt, quæ ad radicem spectant, in quibus diuersum semen recluditur: siquidem in syluestri rotundum, fuscumq; inuenitur: in altero, nigrum, & oblongum, cuius est usus. Ad uenerem stimulam, cum uino bibi uolunt, purgat cum melle argemas albuginesq; illitum ex aqua tumores discutit. eo etiam extrahitur aculei ex corpore. idem effectus est illitæ herbæ. Syluestre magis uiribus pollet: quæ unguentis, præsertim gleucino, permiscetur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hortense ὀρνινοῦ λευκίνου. Latinis orminum, & Geminalis

Officinis Gallitrichum. Germanis Scharlach.

Gallis oruala dicitur. Syluestre autem Græci ὀρνινοῦ ἄγριου.

Latini & officinæ saluam agrestem. Germani Wild salbey.

Galli Brodon, oruala, toutes bone, appellant.

Ne quæpiam nomenclationis aucupium remoretur, est notandum aliquod esse cereale hordinum, de quo Theophrastus, Galenus, & item Plinius inter fruges differunt, quod amarum nigrumq; est, nec cummo penitus ab simile, doctriantali Plinio altitudine. de hac supra quædā annotauimus inter segetes.

Crimini calidū & sicci mediocriter est, id quod amaritudo atq; astrictio in gustu satis monstrat.

Recentiores easdem facultates suo Gallitricho attribuum, quas illi ueteres ascripserunt. potissimum autem conferre ad albugines, & oculorum caliginem tradunt, ut hinc etiam colligi possit, herbam hanc Orminon Dioscoridis esse, quamuis nonnullis legitime delineationi in quibusdam repugnare uidetur.

## Securidaca.

## Caput CXXIII.

**H**edyfaron, unguentarii pelecinum, id est, securidacam uocant. fruticosa est, folijs ciceris. semen rufum in siliquis fert, corniculorum modo aduncis, quod ancipitem securim æmulatur, unde nomen accepit. amarum gustu. Stomacho utile in potu. additur in antidota. cum melle ante coitus subditum, concipiendi spem adimit. Nascitur in segetibus & hordeis.

## NOMINA ET EXPLICATIO

Græcè ἡδύφαρον, ἡδύφυρον. Latine Pelecinus securidaca, hedyfaron.

Officinis incognita. Germanis Vntraut der linsen.

Gallis faba lupina. alijs herbum, uulgo graua, quod (ut existimo) tritico & hordeo, cum quibus altius suo complexu grauis sit & molesta.

Ab una radice multis flagellis emicat, ciceris similitudine, quam & folijs æmulatur. Siliquæ corniculorum modo aduncæ curuantur, in quæis flauum, pallidumq; & amarum semen concipitur, quod ancipitis securicula speciem gerit &c.

## Onosma.

## Caput CXXV.

**O**nosma, oblonga folia habet, ad similitudinem anchusæ, longitudine quatuor digitorum. & unius latitudine, mollia, in terra iacentia, sine caule, sine semine, sine flore, radice nititur longa, tenui, infirma, rubescere, gignitur in asperis. Folia in uino pota partus extrahunt. Prægnans si eam supergrediatur, abortum facere dicitur.

## EXPLICATIO.

Onosma hoc tempore incognita, Plinio folia habet ferè ad tres digitos, in aterra iacentia, tria, ad similitudinem anchusæ incisa, sine caule, sine flore, sine semine.

## Nymphæa.

## Caput CXXVI.

**N**ymphæa nascitur in paludibus & stagnatibus aquis, folijs fabæ Aegyptiæ, minoribus, & longioribus, alijs in summa aqua, alijs demersis pluribus ex radice eadem prodeuntibus: flore lilio simili, albo, & in medio crocos habente, cum defloruerit, ut rotundum malum, aut papaueris caput, extuberat nigro semine, denso & lato, lenti gustus, caulis est leuis, niger, minimè crassus, ciborio cognatus. radix nigra, scabra, clauæ similis, quæ autumnis secatur. Sicca cum uino pota coeliacis, dysentericisq; auxiliatur. lienem absorbit. Radix stomachi ac uentriculi doloribus illinitur. uisiliginis ex aqua emēdat. imposita cum piçe, alopecijis medetur. eadem contra ueneris insomnia bibitur, siquidem ea prorsus adimit.

pota



*Nymphaea lutea.**Nymphaea alba.*

potius assidue aliquot diebus, genitale infirmat. Idem semen potum efficit. *Nymphaea* nomen sibi uendicasse uidetur, quoniam aquosa amet, plurima inuenitur in Elide, in Anygro amne, & in Berothæ Aliarto. Est & altera *nymphaea*, cuius flos blephara dicitur, folijs antedictæ, radice alba, scabra, flore luteo, nitente, rosæ simili. Huius semen & radix contra foeminarum profluvia efficaciter ex uino nigro bibuntur. Nascitur in Thessalia, amne Peneo.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Νυμφαία, καὶ ῥοδαίς. Latine *Nymphaea*, quædam luteo, quædam albo flore est.

Officinis uocem Arabicam *Nenuphar* adhuc retinuit.

Germanis Gelb & weisse see blumen / Sarwurz.

Gallis *Nenusfar* iudne & blanc. Italis turco, nel tarte azo de aqua.

Lusitanis *Gelphano* dicitur.

*Nymphaea*, quod aquosa amat, dicta: una est flore albo, radice nigra, & semine nigro: altera flore luteo, radice alba. Vtriusque radix & semen frigidum, siccans sine morfu, parum parum detergens, proinde alui profluvia, & dysenterias cohibent: semen in modicum profluens, siue per insomnia, siue aliter, ro  
cin: me



vincent ex uino nigro dulcero pota: in id efficacior lutea, ad eò ut medeatur muliebri profuntio, ut ad tergendum alba prepollet, quæ aqua macerata alphas, pice liquida alopecias sanat. Autumno radices exciduntur: uerum facultatis florum, quibus hodie fere solis utimur, non meminerunt ueteres.

## Androsaces.

## Caput CXXVII.

**A**ndrosaces herba est amara, tenues spargens iuncos, sine folijs, folliculos in capitulis habens, in quibus semē continetur. gignitur in Syriæ maritimis. Ea drachmis duabus in uino pota, copiosam hydropicis urinam ciet, idem effectus est semini pota, & herbæ decocto. podagris utiliter illinitur.

## EXPLICATIO.

Plinio androsaces herba est alba, amara, sine folijs, folliculos in cirris habens, & in ijs semen. Nascitur in maritimis Histrie, Germanis planè incognita.

## Asplenium.

## Caput CXXVIII.

Lingua Cerruina.

Citerach.



**A**splenū, aliqui scolopendrium uocāt, alij splenion, alij Hemionium: folijs est multis, scolopēdræ animalī similibus, ab radice una prodeuntibus. Nascitur in parietibus, faxisq; filiceis, & opacis, nec caulem, nec florem, nec semen habet. folia filiculæ

modo diuiduntur, subter flauescencia hirsutaq; supernè uiridia. Vim hanc habēt folia in aceto feruefacta, ut per dies quadraginta pota lienem absument. quibus etiam contritis lienem ex uino illini oportet. straguriæ & regio morbo prodest. singultum sedat, calculos in uesica comminuit. conceptum adimere creditur, per sese aut cum muli liene appensa. Tradunt noctu, silente luna, huius rei gratia ef-  
fodiendam.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Asplenium idem cum Scolopendrio continentur, Musa & Massarius in librum nonum Plinij: tamen Galenus ait, maiores lienis obstructions uehementiora postulare remedia, eapparit corticem, tamaricis radices, scolopendrium, & seillam, & eam herbam, quæ asplenos appellatur, effectum id uocine re presentans. Vbi aperte scolopendrium ab aspleno separat, licet postea in censu simplicium aspleni uires describat, scolopendrij nō meminerit. Libro tamen methodi, 13. scolopendrium quoq; lienī cōueniri scribit, nulla mentione aspleni facta: quamquā ibi alia quoq; eius remedia attingat. Diuersas etiam herbas facere uidetur in spleneticis lib. 9. comp. pharm. part. μύρρινος λεγόμενός, βοτάνης ἀπὸ λήνου λεγόμενης σκολοπενδρίον, ἢ ἡμιονίτιδος ἀνὰ: tamen paulo antè in Andromachi spleneticis scribebat, ἡμιονίτις & βοτάνης, ἢ οἱ μὲν ἀπὸ λήνου, οἱ δὲ σκολοπενδρεῖον λεγόμεναι. Ex quibus colligere possis, herbas esse affines, non uiribus modo, sed forma & habitu, unde nominum hæc incertitudo nata sit. Quod & in Dioscoride passim obseruabis, & in Aspleno quoq; qd hoc capite statim ab initio ab alijs quibus σκολοπενδρίον, ab alijs ἡμιονίτις uocari ait, non tamen ἡμιονίτις dixit, quod hæc folio sit diuersissimo, quā tam ἀπὸ λήνου, quoq; uocari scribit. Vnde Massarius & ex Theophrasto affirmat, Hemioniciū uel Hemionii esse uulgatū nobis Ceterach: Asplenon uerò suū scolopendrium plantā esse aliam, ex foliorū & radicū pictura persuadere conatur. Quæ autem uulgo est Scolopēdria, Germanis

hirs



hirci iung appellata. Dioscoridis est *quadrifida*, à multis lingua ceruina iustius appellata, quam à Ga-  
za Scolopendrium Theophrasti, quem rectius centipedariam uertisset. Siue autem Ceterach sit Asple-  
non aut Scolopendrium, siue Hemionitis dicta, quod mule hac herba plurimū delectamur, parui est mo-  
menti, quā hae omnes lienem diminuunt, et liquant, et substantia tenui sine calore lapides etiam in ue-  
sica frangant: phyllitis cum acerbis sit, diarrheas et dysenterias pota iuuat.

## Hemionitis.

## Caput CXXIX.

**H**emionitis, quam aliqui splenion uocant, folium emittit dracunculi, luna-  
rum, radicibus cohaeret multis, tenuibus. nunquam flores, neque semen, neque  
caulem gignit. in petrosis nascens, austero sapore. Ea ex aceto pota lienem ab-  
sumit.

Vide Annotationes nostras in caput proximè præcedens.

## Anthyllis.

## Cap. CXXX.

**A**nthyllis duplex est. quædam enim lenti simillima, folijs mollibus, rectis  
ramulis, palmi altitudine: radice parua, tenui. Nascitur in salsis terris, & à  
sole illustratis, non in fulso gustu. Altera est folijs ramulisque aiugæ similis, hirsu-  
tioribus tamē, breuioribus & asperioribus: flore purpureo, odoris admodū gra-  
uis: radice cichorii. Pota drachmis quatuor urinæ difficultati, renibusque pluri-  
mum prodest. trita, uulua pituitas\* emolliunt, cum rosaceo & lacte impostæ, uul-  
neribus medentur. quæ autem aiugæ similitudinem refert, præter alia, pota cum  
aceto mulso comitiales sanat.

\* Inflammatio  
ves.

Chamomilla satius.

Chamomilla vulgaris.

NOMINA ET  
Explicatio.

Anthyllis Dioscoridi duorum ge-  
nerū est, primū hodie incognitum.  
Alterum Græcis ἀνθύλλης ἑστῆρα.

Latinis Anthyllis altera.

Officinis sua non muscata.

Germanica appellatione adhuc  
caret.

Gallis sua non muscate dicitur.

Altera quæ chamæpitios, hoc  
est, aiugæ similitudinem refert, Pau-  
lus in tumore pedum utitur macera-  
ta. Eam ex iuarū genere putare esse  
quæ pinum non oleat, arthriticam  
inde dictam, quod tumemibus arti-  
culis medatur.

## Anthemis. Cap.

## CXXXI.

**A**nthemidis genera  
tria, tantum flore di-  
stantia: rami dodrantes,  
fruticosi, alii multis conca-  
ui: tenuibus foliolis, paruis,  
numerosis: rotundis capitulis:  
floribus in medio aureis,  
forinsecus orbiculato ambi-  
tu candidis, melinis, aut pur-  
pureis, magnitudine foliorum

rum rutæ, nascitur in asperis, & iuxta semitas. colligitur uere. Vim habent radi-  
ces, flores & herba excalfaciendi, extenuandi que potu, & in fessione, pellunt men-  
strua, partus, urinam, calculosque aduersus inflationes, & ilci tormenta bibuntur.  
bilem suffusam expurgant, iecinorum uitia sanant. decocto earū uesicæ fouentur.  
Ex





Chrysanthemon.



Parthenium.



Ex omnibus his generibus ad calculos efficacissima est quæ florem purpureum habet, cuius amplitudo maiuscula est. hæc propriè heranthemō uocāt. Ea cui leucathemo nomen est, itē quæ chrysanthemō dicitur, uehementius urinam ciunt, ægilopijs illitæ medentur. cōmandu catæ ulcerum eruptiōes in ore sanāt. nōnulli in clysteribus ex oleo utuntur. teruntur in farinā, ad abigēdos febriliū circuitus. Flores & folia recondi debent, & priuatim tusa, in pastillos digerit: radix quoq; siccare, dumq; ingruit necessitas, binæ partes herbæ dari, modo floris aut radicis pars una, modo contrā, floris partes duæ, & herbæ una, permutatim duplicato pondere, alternis diebus. bibere autem oportet in uino mulso, diluto.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἀνθεμῖς, χαμαίμελον. Latinis Chamæmelon, anthemis. officinis Camomilla. Germanis Camillen. Gallis Camomille dicitur.

Anthemidis tria genera Dioscoridi flore tantū distant, palmū nō excedentia paruisq; floribus, candidis, melinis, aut purpureis, quæ foris in orbem cādida folia obtinet, ea est quæ à Dioscoride propriè λευκάνθεμον. & uulgo hodie Camomilla uocatur. hæc duplex est una hortensis odoris mali maturi suauissimi hybernū frigus illa se perferens, & ad nouū uer ex radice repullulascēs in hortis colitur: altera uulgaris Camomilla, palmi altitudine, furculosa cauliculis exilibus, capitellis primum uirentibus, mox luteis, in aspero, sicco, macroq; solo, & iuxta semitas atq; itinera proveniens. Quæ uerō luteis per ambitum folijs constat, ea haud dubie est, quam priuatim Dioscorides à suis floribus λευκάνθεμον nominat. Germani autē pulchrē ad Græcā appellationem alludentes Goldtblām / Gell Camillen / Schreytblām / appellāt. Tertia species, si Hieronymo Trago rei herbariæ diligentissimo indagatori credimus, nulla alia est nisi ea quam hodie uulgo Schartenkraut appellat, & Schartenblāmen, eius historiam & delineationem uide in Commentarijs Tragi. Tenuiū partium est anthemis, quā obrem digerēdi, rarefaciēdi, & laxandi facultatem obtinet.

## Parthenium, Cap. CXXXII.

**P**arthenium, aliqui amaracon uocant, folijs est coriandri, tenuibus: flore per ambitū albo, intus melino, odore graui, sapore amaro. Siccatum, cum a ceto mulso aut sale potum, non secus atq; epithimum, & bilē & pituitam detrahit. suspiriosis prodest & melancholicis. herba sine flore à calculosis & anhelatoribus magna utilitate bibitur. Valet decoctū ad insidendū in duritia uuluarū, & inflammationib. illini sacro igni, & collectionib. cū flore.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Parthenium aliqui amaracū uocant, folijs coriandri, tenuibus flores per ambitū albo, intus melino, odore graui, sapore amaro, officina simul & herbarij hodie matricariam & febrifugam. Germani Wettram matrenā uocāt. Nasitur in sepibus & alijs permultis locis. Matricariam inde dictā putauerim, quod mulierib. uteri causarijs, & strangulationi uulue oportuni suo uiro o odore medeatur. Nec aliter à Galeno, Pauloq; quā amaracus uocatur, quod & parthenion aliquibus amaracum dici testatur.



Cotula foetida.



Celsus apud nos muralem herbā parthenion ex perdition appellari perhibet, ego de alio parthenio muralem herbā dixisse autumo, quā nō in sepibus, sed in muris parietibusq; nascitur, ob id parietaria vulgo nominata. Hallucinatur qui cotulam vulgo dictam Partheniū esse putant, cum folium ei foeniculi, parthenio coriandri tribuatur. Sapore etiā dissident, qui in parthenio amarus est, non in cotula.

## Bupthalmum. Caput CXXXIII.

**B**upthalmum, quidam cachlam uocant, tenues emittit cauliculos, mollesq; folia fœnici culi: luteū florem, anthemide maiorem, oculi similitudine, unde

Bupthalmus. nomen traxit. circa oppida nascitur, & in campestribus. Flores cū cerato tritū, tumores duritiasq; discutit. Aīūt epotam post exitum à balneis, regio morbo correptis colorē tractu tēporis reddere.

Græcè Βούφαλμος. Latine Bupthalmus.

Officinis inusitatū. Cotula nō foetida quibusdā.

Germanis Bu dyll / Rinds aug / Bue aug / dicitur. Hæc herba cuius picturā damus delineationi bupthalmi admodum responderet. si flores ut chrysanthemi lutei essent, quare intelligendum est, Dioscor. ad discū mediumve floris respexisse, qđ luteū est, nō ad ambitū, in quo folia radiata candida, ut in Chamælo, exisunt, alioq; flos à Diosc. pictura dissentire cognoscetur. flores bupthalmi acriores sunt Chamæli florib. ob id calidiores.

Peonia fœmina.

## Peonia. Cap. CXX XIII.

**P**æonia siue glycyfide, Græcis aliquibus pentoboron dicitur. sunt qui id eos dactylos, radicem pæoniam uocāt. caulis altitudine sesquipedis adolefcit. comitantibus multis stolonibus. Huius duo genera. mas folia iuglandis habet: in fœmina uerò smyrnij more diuiduntur. summo caule filiquas emittit, ueluti græcas nucas: in quibus, quū dehiscunt, multa granula rubra acinis puni corum similia inueniuntur, & in medio nigra, quinq; aut sex, purpurea, radix maris tenuis, digitali crassitudine, & palmi longitudine, gustu astringens, alba: fœminæ radicibus ceu glandes circiter septē aut octo inherent, ut in hastula regia. Fœminis à partu non purgatis sicca radix datur. ciet menses nucis græcæ magnitudine pota. sic uētris doloribus cum uino auxiliatur. ualet contra regium morbum, & renum ac uesicæ dolores. decocta in uino aluum sistit. Rubra grana rubenteis






Peoniamas.



Lithospermum.



benteis menses sistunt, decem uel duodecim pota in uino austero & nigro, stomachicis & erosionibus ea esse prodest. à pueris pota, initia calculorum eximunt. Grana nigra auxiliantur suppressionibus nocturnis, uulua strangulationibus, & matricis doloribus, quindecim numero pota, in aqua mulsâ, aut uino\*. Nascitur in altissimis montibus & præruptis.

\*Hæc clausula, est addititia.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè παωνία. Latine Peonia. Officinis Latinum nomen serauit. Germanis Beningen rosen / Venedische rosen / Gicht wurz / Pfingst rosen / Benedicten rosen. Gallis Penoe, se dicitur.

Peonie maris radix longa alba, ea Hieronymo Trago creditur quæ hodie officinis falso diptami radix, Germ. Weisse diptam. dicitur, cui siquidem notæ omnes quibus peonia mas apud Dioscoridem & alios ueteres Græcos delineatur, ad amissum respondem, quare eandem esse neminem dubitare credimus. Contra epilepsia Peonie radix, & Melancholiam recens collo appendenda. Luna autem decrescens hanc legi uoluit, marem quoque femina præstantiorem: leuiter astringit, subamara est, cum quadâ dulcedine et acrimonia, si diutius mandas, menses ciet, obstructa hepatis & renum expurgat.

## Lithospermum. Caput CXXXV.

Lithospermon à seminis duritia nomen accepit. folijs est olea longioribus, & latioribus, mollioribus: iacent humi, quæ ab radice exiliunt, ramulis furculosis, rectis, tenuibus, firmis, crassitudine acuti iunci, in quorum cacumine bifidi exortus, cauliculorum speciem exhibent. folijs longis\*, inter quæ paruum semen, rotundum, erui magnitudine, duritia lapidea. Nascitur in asperis & aridis locis. Vim hanc habet, ut semine cum uino albo potu calculos frangat, pellatque urinam.

\*Paruis, aliqui.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè λιθόσπερμον.

Latine lithospermum.

Officinis milium solis.

Germanis Weithirs, dicitur.

Dicitur autem ab omnibus tum officinis tum medicis hodie milium solis, quod, ut reor, semen cædore solaris ac lucis splendore fulgeat. Superantem astringentiam qualitatem, adeoque exiccatoriam uim obtinet.

## Phalaris. Caput

## CXXXVI.

Phalaris cauliculos emittit zæ culmis similes, minutis, ac nullius usus radicibus, multos, duum palmorum, geniculis cinctos, graciliores tamen, ac dulces: semen candidum, oblongum, milij magnitudine. Tunditur, & in aqua aut uino succus ad uesciæ cruciatus utilissimè bibitur. Semen cochlearis mensura potum, ad eadem efficax est.



## DIOSCORIDIS

## EXPLICATIO.

Phalaris Germaniæ peregrina, ac nisi hortis sata, ea forma qua depinximus provenit, thirsulos tenues, fundens à radicib. frequentes, geniculatos, bipalmesq; calamos similes xæ, graciliores tamē, atq; dulces, folia quoq; similitudinem eius habent. Semē amplitudine milij oblongum. nomen apud Germanos nondū inuenit.

Phalaris.

Rubia.

Rubia. Cap.  
CXXXVII.



\* Alij. Succū  
ex uino.

duntur differentiam spectare. aduersus serpentium morsus, ramulos cum folijs uino\* bibere prodest. Semen ex aceto potum, lienem absumit. Imposita radix trahit partus, menses, secundasq; albæ uilitigini illita ex aceto medetur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἐρυθρόδανον. Latine Erythronium. Rubca.

Officinis rubca tinctorum. Germanis Serber rött.

Gallis garence dicitur.

Dioscoridi Rubia altera sponte provenit, altera seritur, in primis tingendis lanis & corijs necessaria. Serpit humi ut gramē, locis umbrosis conspiciēda. Semen eius rubrū est, & radix rubra, altitudinis tantæ, ut rarò tota queat effodi. Rubca satiuæ radice acerba, & amara, lienem et iecur expurgat, urinas crassas, multas, sæpe etiam cruentas, & menses mouet, albos cum aceto terget. Cortex rubie recipitur in Antidoto ad lienem. Actuario.


## Lonchitis.

## Caput CXXXVIII.

Lonchitis folia habet porri, latiora, rubentia, plurima, ad radicem circumfracta, ueluti in terram procumbentia, pauca in caule, in quo flores, ceu galericuli, hiantibus comicis personis similes, nigri, & è ritu albam exerentes uelut linguam, quæ ad labrum inferius spectet: semen in uolucris clausum lanceæ simile, triangulum, unde sibi cognomentum arrogauit. radix dauci. Nascitur in stentibus & asperis. Radix ex uino pota urinam ciet. Altera est lonchitis, quam aliqui



Lonchitis aspera.



aliqui asperā lonchitin dicunt: folia scolopendrij emitit, sed asperiora maioraq; ac multo magis diuisa. Vulneribus mirum in modum prodest, in eisq; inflammationes excitari non patitur: pora ex aceto lienem absūmit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Lonchitis Dioscoridi duplex est, prima habet folia porri, ut Dioscorides tradit, rubentia ad radicem, et plura quā in caule, caputula personis comicis similis, parua excrentibus linguam, radicibus prelongis. Nascitur in sitientibus, sepe in aridis & petrosiss inuenitur: sed nullum succurrit nomen dignum quo inscribatur. Pueri qui montibus oberrant, nigros capillos, quasi Galeos. Germanicè Schwartz Pappen/ nominant. Altera lonchitis cuius picturam damus, quam asperam cognominant, Romani longnam aut colubrinā. Germani Stein facen/ Spicant/ folijs scolopendrij scabrioribus, amplioribus, diuisuris quoq; maioribus, vulneraria herba, plagsq; inflammationes abigit, nec eas cingere uel morsu patitur, at Dioscorides quoq; affirmat. Pota cum aceto lienem absūmit. Hanc hodie quidam uerum esse scolopendrium falsò contendunt.

Althæa.

## Caput CXXXIX.



**A**lthæa, quam alij Ibisum uocant, in syluestrium maluarum genere est, cui folia ut cyclamini, rotunda, lanugine canescunt: flore rosaceo: bicubitali caule: radice lenta, intus alba. Althæa appellatur, quod inter primas sit utilis, & pluribus polleat remedijs. Decocta enim in uino aut aqua mulsa, & per se cum imponitur tu sa, effica est contra uulnera item ad strumas, parotidas, abscessus, mammarum inflammationes, fracta sedis, inflammationes, neruorum rigores: siquidem discutit, & excoquit, rumpit, & ad cicatricem perducit. cocta ut dictum est, adiecto suillo adipe, aut anserino, terebinthinaue, ut malagmatis lentor fiat, facit ad uulnæ inflammationes, preclusionesq; in pectus subdita. decoctum eodem fungitur munere. onera uulnæ, reliquiasq; à partu extrahit. decoctæ succus ex uino potus, succurrit urinæ difficultrati, calculosorum cruditatibus, dysentericis, ischiadicis, tremulis, ruptis, dentium mulcet dolorem, cum aceto decocta, colluto inde ore. Viride semen siccumq; tritum, uitioligines in sole perunctas emēdat. eodem cum oleo & acetato peruncti, à uenenatis nō feriuntur. ualet contra dysenteriam & sanguinis reiectiones, aluiq; profluuiū. in posca aut uino decoctum bibitur, contra omnes uesparrum, apum, similibumq; aculeatos ictus. Folia cū olei momento, moribus, & igni ambustis illinuntur. Constat aquam trita radice addita, sub diuo addensari.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Ἄλθαα. Latine althæa. Ibisus.

Officinis Euisus, bismalua, maluaniscus. Germanis Ibisch.

Gallis de guimaues dicitur.

Althæa siue Ebisus est malua agrestis, folijs ut cyclaminus rotundis, radice lenta, intus alba, subastrim etc. Partibus suis omnibus digerit, laxat, phlegmōe leuat, mitigat, coct abscessus coctū difficles, adhibus incocta & subacta. Radice autē & semine tenuiorū est partium, magisq; tū siccata, tum terget.

*sylius to m. d. g. e.*



Alcea.

Caput CXL.

**A**lcea sylvestrium maluarum generi assignatur. folia habet diuisa, uerbena-  
ca proxima: caules treis aut quatuor, cortice cannabino uestitos: florem ro-  
sa, paruum: radices albas, lata, quinque aut sex, cum plurimum cubitales, quæ cum  
uino aut aqua potæ, dysentericis ruptisq; medentur.

Herba Vngarica.

Alcea.



NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἄλκεα. Latine Alcea. Officinis bis malua,  
seu althea sylvestris, herba Simeonis. Germanis Felsiß/  
Lewenzien-/Hochleuchten-/Sygmars wurz, Simons wurzell. Italis herba Vngarica.

Gallis Bimauue, ou guimauue sauvage. Alter apud nos inuenitur in syluis, caulibus foliosis, cano-  
bino cortice, minutis, fronde maluæ quasi circinata, et strigmentis uerbenacæ profundioribus lacini-  
ta, flore rosea, paruo, radicibus obliquis, quinque sensue cubitalibus albis. Hic notandū quod ea herba  
quam Itali herbā Vngaricā uocant, et Manardus uerā Alceam esse putat, à nostra uulgari Alcea di-  
uersa est, ut præcedens ipsius pictura clarè ostendit. Hæc nisi malua hortensis fuerit, nusquam eā apud  
nos sponte proueniēte uidi, sed ex Italia allatam, in hortis cultam, omnino uerā esse Alceā, et Diosco-  
ridis delineationi proximè accedentem, arbitramur, cuius usus esse debet in medicinis.

Cannabis.

Caput CXLI.

**C**annabis satiuæ planta magni in uita usus ad robustissimos funes factitan-  
do: folijs fraxini, graui odore: caulibus proceris, inanibus: semine rotun-  
do, quod largiore cibo genituram extinguit. Succus ex ea recente, conuenienter  
aurium doloribus instillatur. Sylvestris cannabis uirgas fert althææ similes,  
minores, nigriores & asperiores, cubiti altitudinem æquantes: folio satiuæ, nig-  
riore & asperiore. flore lychnitis, subrubro: semine & radice althææ. Decocta  
radix, illitu inflammationes mulcet, tumores discutit, tofos articulorum dissipa-  
pat. Huius cortex torquendis funibus accommodatus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè κάνναβις. Latine Cannabis. Officinis Latinum nomen seruauit.


Germania



Canabis.



Anagyris.



NOMINA ET EXPLICATIO.

Anagyris recentioribus malua terrestris, quod humi malua modo iaceat dicitur, rusticis putidum lignum. Arboris instar fruticat, folijs et ramis amerinae, foedo odore, flore brassicae, siliqua terete, qua semen continetur rebus simile, cum menses maturefcens &c.

Cepæ.

Capæa portulacæ similis est, sed nigriora habet folia, & radicem tenuem. Folia in uino pota, urinæ stillicidio, & uescicæ scabie laborantibus opitulantur.

Aa 4

Germanis Hanff. Gallis chanvre appellatur.

Canabis leguminibus assignatur. Huius semen, ut Galenus est author, magno negotio concoquitur, stomacho & capiti aduersatur. prauos creat humores. Sunt tamen qui hoc quoque totum insitumque cum bellarijs, quæ secundis mensis præbentur, usurpant. Admodum exaltat, & caput æstuoso halitu sursum misso tætat. Syluestris Canabis nascitur in syluis, uirgulas Altea fundens diuersam ab hac quam Germ. Wilden hanff appellât.

Anagyris.

Cap. CXLII.

**A** Nagyris, frutex est arboris instar, grauis odore: folijs agni, uirgisq; flore brassicae. semen in corniculis non breuib; gignit, subrotundum, firmum, uersicolori faciei, simile renibus, quod

Cepæ.

durefcit uua maturefcen-  
te. Tena fo-  
lio trita tumo-  
res illitu re-  
primūt. si par-  
tus hæreat, &  
secundæ men-  
sesq; moren-  
tur, drachme  
pondere bibū-  
tur in passo.  
sic & suspirio-  
sis dantur, &  
contra capi-  
tis dolores in  
uino difficul-  
ter parientib;  
adalligantur,  
ita ut à partu  
statim afe-  
rantur. Radi-  
cis cortex\* cō-  
coquendis di-  
scutiēdisque  
adhibetur. Se-  
men comman-  
ducatum uo-  
mitiones ue-  
hementer  
ciet.

\* Alij succum

Cap. CXLIII.



maximè id præstat, si cum decocto radicum asparagi eius quem myacanthos, hoc est corrudam uocant, bibatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Καταὰ Græcis: Latini Cepæ a quibusdam ea putatur quam Germani Bachbungen uocant, scitur in aquis & littoribus arenosis.

## Alisma.

Plantago Italica.



Plantago aquatica.



## Cap. CXLIII.

**A**lisma, alijs damasfonion appellatur. folia ei plantaginis, nisi angustiora essent, la ciniosa, conuexa que in terram: caule simpliciter tenui: cubito altiore: capitibus thyrso: si flore tenui, candido, pallescen-  
te: radicibus tenuibus, ut uera tri nigri, acribus, odoratis, modicè pingui-  
bus. aquosos amat tractus. Radix, si drachma una aut altera bibatur, his conuenit qui leporum marinum deuorarunt, aut à rubetis ranis demorfi sunt, aut opium hauserunt torminibus

atq; dysentericis. p se aut cū pari modo seminis dauci, potui datur. Cōuulsis, & cōtra uitia uulgu prodest. Herba sistit alui. menstrua pellit. tumores illita mitigat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Multi hactenus pro uera Alisma plantaginem aquaticā, quæ & barbasyluana, & Germani Wasserwegrich / dicitur, alij uero eā herbam quam Herbarij & Officinæ pastorum fistulā, Germani hyeten pseyff appellāt nobis obtrusere. Sed harū neutra legitime Dioscoridis delineationi respondet, quare noster tiam, scilicet uerā Alismā per amicum quendā ex Italia adferri curauimus, cū in Germania quod equidē sciā nō proueniat, cuius picturā damus nomine Plātaginis Italica. Hāc restē Italianisch & wegrich Germanicè dixeris. folio arnoglosi est, sed angustiore, et semper in terrā demisso, caule unico, sesquipedali, in cuius fastigio uiride alabastricolū in caulē cōcoloris floris dehiscit, radicibus & bris, ut ellebori nigri tenuibus, acribus, pinguiibus, flore tenui in madidum pallescente: aquosos amat sitis.

## Onobrychis.

## Cap. CXLV.


**O**nobrychis, folia habet lentis, longiora paulò: caulem dodrantalem: florem purpureum: radicem paruum. nascitur in uliginosis & in cultis. Herba sua pteui, si trita illinatur, tubercula dissipat. cum uino pota, stranguria sanat. illita ex oleo, sudores mouet.

Hec herba quæ sit non constat.

Hypericum



## Hypericum.



## Cap. CXLVI.

**H**yperici, alij androsæmō, (alij coriō, alij cha<sup>\*Hæc abund-</sup>  
mepityn<sup>\*)</sup> appellant, quoniā semen odore resi-  
nam imitatur, surculaceo frutice, dodrantali, ruben-  
te, folio rutæ: flore albæ uiolæ, luteo, qui digitis tri-  
tus sanguineum succum remittit, qua ex causa andro-  
sæmon cognominatur: subhirsuta siliqua, & tereti,  
hordei magnitudine: semine intus nigro, resinosi o-  
doris. gignitur in cultis & asperis. Urinam cit. men-  
strua pellit appositum. tertianis, quartanisq; cum ui-  
no potum liberat. Semen quadraginta diebus hau-  
stum, ischiadicis medetur. Folia cum semine illita,  
ambusta sanant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *Ἑργασίον*. Latine *Hypericum*.

Officinis perforata. Gallis millepertuis.

Germanis *S. Johans Kraut* dicitur.

Hæc herba cuius picturam damus omnino Dioscoridis deline-  
ationi respōdet, ut nemo nisi talpæ cæcior *Hypericum* esse deinceps  
reclamare possit. Siquidem surculosa est herba, dodrantalis, sub-  
rubens, folio rutæ, flore luteo, quem si digitis libeat terrere, ma-  
nus profectō sanguineo succo cruentantur. Siliqua deniq; tere-  
te, hordei magnitudine, semine intus nigro, resinam olente. Duo  
itaq; in hac herba inueniuntur, quæ esse *hypericum* manifestè con-  
vincunt, cruentus nēpe floris triti succus, odorq; seminis resinaceus.

## Ascyron.

## Cap. CXLVII.

**A**scyrum siue ascyroides, hyperici genus est, ma-  
gnitudine distans, fruti colius, maiores habens  
ramos, surculosiores, rubentesq;: folia tenuia: flores lu-  
teos, & fructū resinofum, hyperico non absimilem. cu-  
ius attritu digiti ferè cruentantur, qua de causa andro-  
sæmon uo cauere. Vfus feminis ad ischiadicos. potū  
hydromelitis sextario, biliosa recrementa amplissimè  
detrahit. sed assidue dare oportet, donec sanitati resti-  
tuantur. illinitur & ambustis efficaciter.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *Ἀσκύρον*, ἢ *Ἀσκυροδὴς*.

*Ascyron* Latine.

Officina & Galli cū cæteris, *Hypericonis* speciebus cōfundunt.

Germani *Saxthew* appellant, pulchrè ad Græcā appellationem  
alludentes. Græci enim à contrario, huic herbe nomen imposuisse  
videntur, *Ἀσκύρον* enim illis asperitatem significat.

*Hyperici* species est *Ascyron*, magnitudine differens, maiori-  
bus ramis fruticosius, puniceo colore, rubens. Flores fert luteos, se-  
men *Hyperico* simile, odore resinæ, quod cum attritur digitos fe-  
rè cruentat.


## Androsæmum.

## Cap. CXLVIII.

**A**ndrosæmon ab hyperico, ascyroq; differt, q̃  
fruticet ramulis surculosis, ac tenuibus: rubenti-  
tib. uirgis, & folijs rutæ, triplo aut quadruplo maiorib.  
quæ trita uinoso succo manāt. cōplureis alas habet in cacumine, utrinq; expāsas,  
pinnatasq;: circa quas flores pusilli, lutei: et in calyculis semē papaueris nigri,  
infigne



## Androsæmon.



\*Omnia hæc  
ad finem usq;  
capitis à qui  
busdā omiſſa.

## DIOSCORIDIS

inſigne lineis. huius comæ trita refinofum odorem red-  
dunt. Semen tritum drachmis duabus potum, bilioſa al-  
ui excrementa pellit. iſchiadicis maximè medetur: ſed à  
purgatione aquam exorbere oportet. Herba ambuſtis  
illita medetur. uulneribus ſanguinem cohibet.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis ἀνδρόσεμον. Latinis Androſemum.

Officinæ & Gallicum uulguſ cum hypericone confundunt.

Germanis Rünradt dicitur.

Diſtum Androſemon, quod aut coma, aut floribus eius tritis, homi-  
nis ſanguinem reſerat. Differt ab Hyperico & Aſcyro Androſemon.

Frutex eſt prætenubus ramis, ſurculofiſ, puniceo colore rubenti-  
bus uirgiſ, folijs triplo quadruploûe maioribus quàm rutæ, quæ con-  
trita ſanguineum ſuccum remittunt. Alarum caua habet plura, in  
ſummo alarum auium modo pennata expenſaue, circa quas ſtoſculi pu-  
ſilli lutei. Semen in calice, nigro papaueri ſimile, ueluti punctiſ depiſitū  
deſtinctumue. Coma trita refinofum odorem reddit.

## Coris.

## Cap. CXLIX.

**C**oris, quod aliqui hypericon uocant, frutex eſt ſo-  
lio ericæ, rubro, pinguiore, ac minore, non altior  
dodrante, ſuauiſ, odoratuſ, acriſ. Potum ſemen menſes  
trahit & urinaſ. contra phalangiorum morſuſ iſchiadi-  
coſ & opiſthotonicoſ ex uino potum auxilio eſt horro-  
ribuſ ex pipere, ſed opiſthotoniciſ ex olco, aptiſſimè il-  
linitur\*. Radix uino decocta potaq; deſectiſ opem fer-  
re creditur. ſed laborantem inter potandum quàm opti-  
mè cooperiri licet: ſiquidem corpus totum deſudabit, ex  
qua re priſtinam agilitatem recuperabit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Plinius ſupradicta genera hyperici appellatione completitur, duo  
buſ tantum ſaſtigijſ contentuſ, cum tradat aliud hypericon eſſe, quod  
aliq corin uel corion appellane, folijs tamariciſ, & ſub ea naſcitur,  
ſed pinguioribuſ, et minus rubentibuſ, odoratuſ, palmo altiuſ, ſuauiſ,

leuiter aculeatuſ. Dioſcoridi uerò Coriſ, quam hypericon, ut ipſe tradit, quidam uocant, frutex  
eſt folio cruceæ, ſed minore, pinguiore ac rubente, palmuſ altuſ, ſapore grato, acri, odorato. Hippo-  
crateſ Corè hanc uocauit, ut Galenuſ inquit, argumento ſeminis quod pupillæ oculi ſimilitudinem re-  
preſentat: quæ ſit hodie eiſ facieſ, aut quo nomine appelletur hodie, nemini cognitum.

Sunt qui Officinaruſ Carpopoſaſum unum genus Hiperici maximum ſcilicet faciunt, ita quæ  
tuor genera conſtituenteſ. quemadmodum & Dioſcorideſ diſlinxit &c.

## Aiuga, ſiue Chamæpityſ.

## Cap. CL.

**A**iuga herba in terra repenſ, incuruæ ſimiliſ: folijs ſemper uiui minoris, mul-  
to tenuioribuſ, hiriſutiſ & pinguioribuſ, circum ramoſ denſiſ, odore pi-  
nuſ: flore tenui, luteo, uel candido: radicibuſ cichorij. Folia ſeptem diebuſ in ui-  
no pota, regio morbo medentur: & quadraginta diebuſ ex hydromelite, iſchia-  
dicoſ ſanant. dantur peculiariter urinæ difficultatibuſ, iecinoriſ & renum uiriſ.  
torminoſiſ profunt. Ea apud Heracleam Ponticam, perinde atque antidoto con-  
tra aconituſ utuntur, bibenteſ decoctuſ. ad antedicta illinitur, cum polenta iu-  
re decocti ſubacta. trita in farinam, & cum ſico in piluliſ ſumpta, aluum emollit.  
excepta melle, cum aris ſquama & refina deſcit. appoſita ex melle, uuluſ uicia  
extrahit. mammaruſ duritiſ diſcutit. uulnera glutinat. ulcera quæ ſerpunt,  
cum melle illita, cohibet. Alteruſ eſt genuſ aiugæ cubitalibuſ ramis, in ancho-  
ræ ſpeciẽ incuruatiſ, prætenuiſ, coma ſupradictæ: flore candido: ſemine  
nigro. hæc etiam pinuſ redolet. Tertia maſ nominatur, paruula folijs exilibuſ  
albiſ



Chamepitys



albis, scabris: caule aspero, candido: luteis floribus, semine iuxta alas. Resipit & hæc pinum. Hæc duæ uim superioris obtinent, sed non usq; adeo efficacem.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè χαμαιπύτυς.

Latine parua pinus, Chamepitys.

Officinis lue arthetica.


Germanis Re lenger ye lieber, quamuis hoc nomen huic herbe à Euscho falsò attribuitur, potius ad amaram dulcem aut unam speciem eustragiæ pertinet.

Galli lue arthetices cognominant.

Chamepitys, id est, pinus pumila, quòd odore ex folijs emimitatur. Aiuga Idea Scribonio dicitur, alijs Abiga, Officinis lue, calida secundo gradu, sicca tertio: amarior quàm acrior, terget, purgat, obstruendi iecur liberat, ictericis, ischiadicis cum mellicrato pota succurrit, menses, urinas, ciet, uiridis uulnera magna glutinat, ulcera putrescentia sanat, mammarum durities discutit. Huius radicem usurpat Ascleapiades succo tamen decocto, semine, puluere, idem pollet, Galenus libro octauo comp. pharma. part.

Hæc herba cuius picturam exhibemus hic nomine Chamepitys foemina, uerum polium montanum est, cuius loco perperam superius posita fuit uera Chamepitys.

Chamepitys foemina.



Finis Libri Tertij.



# PEDANII DIOSCORI DIS ANAZARBEI DE MEDICINALI MA-

teria Liber Quartus, Ioanne Ruellio Suefsionensi interprete. Cum figura  
rum debita appositione, & annotationibus in singula capita. Per  
Gualtherum . H. Ryff. Argentinum. Medicum, ex doctis.  
uironum lucubrationibus adiectis.

## PRAEFATIO.



**R**IBVS antè libris, amantissime Arce, tradidimus odoramen-  
ta, olea, arbores, unguenta, animalia, frumenta, olera, radices,  
succos, herbas, seminaquæ. In hoc autem quarto disseremus de ra-  
dicibus, & eis quæ restant herbis.

### Betonica.

### Cap. I.



**C**estronpsychotrophon uocitatur, quoniã fri-  
gidis locis inueniatur. Latini betonicam ap-  
pellant herba est caulem ferens tenuem, cubiti alti-  
tudine, aut maiorẽ, quadratum: folia quercus, mola,  
lia, longa, in ambitu diuisa, odorata, prope radicem  
maiora. in summis caulibus semen ueluti satyreia  
spicatum inest. decerptra huius folia siccantur, plu-  
rimos ad usus. radicibus nititur, ut ueratri, tenui-  
bus, quæ ex hydromelite in potu, pituitosam uomi-  
tionem euocant. Folia dari debent ruptis, conuul-  
sis, mulieribus uulua malo opportunis, & ad laxan-  
dos uteri strangulatus, denarij pondere cum hydro-  
melite, tres in uini sextario drachmæ, contra serpen-  
tium morsus ebibuntur. Herba magna utilitate illa  
tis à serpente uulneribus illinitur. aduersus etiam  
uenena drachma ex uino pota cõuenit. præsumpta  
ea, si uenenum hauriatur, nihil nocebit. urinam  
ciet, aluum subducit. medetur comitialibus & insa-  
nis, pota ex aqua: & iecinoris. lienisquæ uitij, dra-  
chmæ pondere in aceto mulso. cõcoctionem adiu-  
uat, si quis eam fabæ magnitudine secundum cenā  
cum melle cocto deuorarit. modo consimili acida  
ructantibus propinatur. stomachi cis eam mandu-  
care et succum deuorare proderit, si postea dilutum  
uinum sorbeatur. datur sanguinem excreantibus,  
tribus obolis, cum diluti uini egelidi cyatho: ischi-  
adicis, renum & uesicæ doloribus, ex aqua. aquæ in-  
tercutem binis drachmis ex hydromelite, si febrici-  
tant: sin aliter, ex mulso. regio morbo laborantes  
recreat. menses pellit, drachmæ pondere cum ui-  
no pota. aluum purgant drachmæ quatuor potæ, in  
hydromelitis decem cyathis. facit cum melle ad-  
tabem & purulentam excreationem. Folia sicca tri-  
taque fictili uase reconduntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè κίσπος, ψυχότροφον. Latine Betonica.

officinæ





Colubrina.



Officinis genuinum nomen seruauit. Germanis Betonien/  
bium betonien/ & weis betonien. Inuenitur enim etiam flo-  
ribus candidis. Gallis de la Betoesne.

Betonica seu Vetonica herba est nota, satis ab autore descri-  
pta, et quotidiani ac laudatissimi usus nostro tempore contra  
capitis morbos. praesertim flosculi ipsius saccharo conditi. Dicitur  
autem est Vetonica ab inuentoribus, ut Pli. lib. 25. cap. 8. testatur,  
inquiens: Inuenerunt Vetones in Hispania eam quae Betonica dici-  
tur in Gallia, in Italia autem serratula. a Graecis cestron aut psy-  
chotropho, ante cunctas laudatissima. Cestro uero uocata est grae-  
cis à uarietate et copia remedium, uarijs enim & plurimis mor-  
bis accommodata est. Psychotropho autem causa ab autore satis reddita  
est. Betonica amaruscula, subacris, incidit, calculos reni haurit,  
pulmonē, thoracē hepatis, purgat ac tergit, menses mouet, epilepti-  
cis, acidū ruit, ischiadicis, pota prodest, ad metum autem ulcers,  
omnibus bestiarum moribus. Betonica, de qua praesentem cap. Diosco-  
rides agit, Σαρξυφάρον grecorū esse inde patet: κες πορὺ λυχ-  
πορ πορ (quod locis asiosius gaudet) πορὰσι δὲ Βετονικῆς, a-  
maruscula est, ac subacris, incidit, calculos reni ruit, etc. lib.  
7. simp. & hoc loco apud Diosc. ὡς δὲ τῶν ἰσχυρῶν καὶ ἐκ-  
τομικῶν πῶς αὖτις πορὰ, & κες πορὺ πᾶσι τοῖς κελ-  
τοῖς γένεσι, καὶ ὁδοῖς δὲ τῶν βοτάνων τῶν τῶν σαρκῶν  
φαρμάκων, li. 5. sanitatis tuendae in sene calculoso. nisi quod hic Be-  
tonica à cestro uidetur separare, si pura lectio, aut & pro siue  
uel id est, accipiendum. Hac opinor causa Ruellius etatis nostrae  
doctissimus medicus ex hoc 4. li. Dioscoridis caput de sarxipha-  
go diuersum à capite de Betonica expunxit. Est aliud et Betoni-  
ca genus ut Pli. li. 22. ca. 8. abunde docet, & in aliquibus Diosco-  
ridis codicibus huius quoque secunda Betonica mentio fit, haec Be-

tonica siue Vetonica altilis aut coronaria dicitur. Germanis Graß blü-  
men/ & Tegel blümen/ graß neglin. Gallis girophles. oycelles. hanc tamen  
officina quam herbarij, medicis, tuncam detractis, à Betonica duabus  
literis prioribus, nominare. Siquidem ut eius pictura ostendit, folijs est por-  
raceis, oblongis, per extremum mucronatis, concoloratucisq; teretibus  
cauliculis, sequecubitalibus, geniculatis, coeuntibus pyxidatim interno-  
dijs, floribus omnium speciosissimis, cariphyllorū odoratu, sed longe sua-  
uissimo, quandoquidem alius cocco rutilat, alius saturata nictet purpura,  
alius emaculato blauditur colore, alius uersicolore uariatur conspectu. Om-  
nibus teres longiusculusq; calyx spectatur, orbiculo superiore denticula-  
tus, à quo quina senae folia prodeunt, lente quidem fimbriata. Nonnulla ta-  
men flores frequentiore coma stipantur, geminis utrinque emicantibus sta-  
minaceis apicibus radice promissa, simplici geniculata. Vnus eorum in coro-  
nis propemodum. Vires habet primae Betonicae. Sunt qui Pauli Aegi-  
netae Betonicae etiam herbam esse arbitrantur, quam Germani & Renpreitz  
& à mura sanandi uulnera facillitate, Gruntheyl appellare.

Britannica.

Cap. II.

**B**ritannica aut uetonica, folia habet syluestris lapa-  
thi, sed nigriora, & densiora, gustu adstringentia: ra-  
diem tenuem & breuem; caulem paruum emittit. Folijs  
exprimitur succus, qui igni aut sole cogitur. Vim habet  
adstringentem, priuatim depascentibus oris & tonsilla-  
rum ulceribus accommodatam. ualeat etiam ad reliqua,  
quibus adstrictione est opus,

Bb



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Britanicam hodie Italia piata manam appellat, quidam Lapathum acutum, quod folia rumicis habeat. Ceterum & longiora sunt & nigriora, carnosiora & lanuginosiora, radice nigra & uesca. Sunt qui putant eam esse herbam quae officinis bistorta, Germanis *Wasser wurz*, Genßampfer dici tur, cuius picturam supra damus.

Etenim folio est rumicis, à terra cespicio, superne uiridi, flore rubro, radice concolori, contorta, nigri cante, cui eadem quae Britannica uires à medicis tribuuntur, sed nihil desinio.

Purpurea.

Lysimachia.

Cap. III.



**L**ysimachia, quam aliqui *lytro* appellant, caules emittit cubitales altiores uel, fructuosos, tenues, prodeuntibus geniculatim folijs, tenuibus, salicis figura, gustu adstringentibus flore rufo, aut aureo. gignitur in aquosis & palustribus. foliorum succus adstringente sua uis sanguinis reiectionem supprimit, dysentericis potui datur, aut infunditur. mensium abundantiam sistit, in pesto sanguinis pfluuiio subuenit, si nares ea herba obturentur. uulnerum cruorem cohibet, acerrimum nidorem suffusa reddit, qua de causa serpentes fugat, et muscas interficit.

NOMINA ET EXPLICATIO.  
Græcè *Λυσιμάχια*.

Latine Lysimachia, uel Lysimachium.

Officinis Salicaria.

Germanis Rot &amp; gelb weyde rich appellatur.

Lysimachia duo esse genera ex Dioscoride hoc loco & Plinio satis liquet. Plinij enim purpureum florem habet, hinc nos illam purpuream appellauimus. Germanice *Braun weyde rich*. Dioscoridis uero rufos, hoc est, aureos, ut metipse interpretatur, flores obtinet, ideoque luteam nominauimus. Germanice *Geel weyde rich*. Et hæc quidem altera magis astringit, inq. usu medico hoc nomine eadem præferenda.

Sanguinaria, seu Polygonum.

Cap. IIII.

**P**olygonum mas ramos habet teneros & molles, frequētib. gentculis cinctos, & per terrā, ut gramē, repūt. folia rutæ, sed molliora longiora q̃ semine sub folijs cur.



Myppurk.



Polygonatum.



Polygonum. Weggras.



bus per horam ante significationes. foeminarum profluua im-  
positu sistit. idem succus purulentis auribus instillatur. facit exi-  
mie ad genitalium ulcera, cum uino, adiecto melle, decoctus  
Stomachi feruori, sanguinis reiectionibus, ulceribus quæ ser-  
punt, ignibus sacris, collectionibus, tumoribus, & recentibus  
uulneribus folia illinuntur. Sanguinaria foemina fruticat uuo  
caule, arundini teneræ simili, densis geniculis, & in se tubarum  
modo factis. articulos in orbem cingunt apices foliolis piceæ  
similes. radicis nullus usus: nascitur in riguis. Huic quoque  
spissandi refrigerandi que natura, ad eadem ualens, sed ineffica-  
cior.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè πολύγονον.

Latine Polygonum. Sanguinaria, Sennalis.

Officinis Corrigolet & Centum nodia.

Germanis Weggras, Weggras, Weggras.

Gallis de la corrigiole dicitur.

Vim adstrictoriam quandam obtinet Polygonum, ita sanè uincit in eo aquæ  
um frigidam, ut uidelicet secundum sit ordinis medicaminum refrigerantium, aut  
etiam quodammodo in initio tertij. Est etiam exiccatoriam.

Polygonum seminam ruræ Gallie aquaticam pinam nouerunt nominare, nã  
que ea in humidis fruticat uuo caule arundini teneri simili, de his geniculis in  
se tubarum modo factis, quorum torulos folia pinus in orbem cingunt, radice nul-  
lius usus. inuenitur in riguis. Germani uocant Klein Eichen wädel & Bant  
ten Kraut.

Hinc quoque spissandi refrigerandi que natura ad eadem que superior, sed in-  
efficacius pollens.

## Polygonatum.

## Cap. V.

Polygonatum nascitur in montibus, frutice cubito altio-  
re: folijs lauri, latioribus & lauioribus. sapore mali coto-  
nei, aut punici, cum quâdam adstrictione. flores per singulos  
foliorum exortus promit, candidos, folijs numerosiores, ince-  
pta à radice supputatione, radicem habet albam, mollem, lon-  
gam, crebro geniculatam, densam, graueolentem, digitum  
crassitudine æquantem: quæ uulneribus efficaciter illinitur.

quin etiam maculas in facie delet.



NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè πολυγόνατον. Latine Polygonatum.

Officinis & herbarijs Sigillum Salomonis.

Germanis Weis wurtz. Gallis Geniculiere, quasi geniculata.

Nomen traxit, quod radix frequentibus geniculorum nodis interuallata tumet. nam caulis nullis cingitur articulis, sed enodis attollitur nullis brachiatis ramis. Galenus prior. & eo posterior Paulus, odorem et quendam asignant sine gustu fastidendo, qui ne explicari quidem recte possit. Duo eius genera damus. Vnū uerū, latioribus folijs: alterū multo angustioribus. Valerij Cordi inuentum. A folijs utriq; nomina sunt induta.

Clematis.

Cap. VI.

**C**lematis humi serpit. læto, pinguiq; solo provenit. Cuiticulas spargens crassitudine iunci, exiguas: folio laurifigura & colore, multo minora. Ea cū caulibus, in uino pota, alui, pluuia & dysenterias sedant, subdita in pello cū lacte & rosaceo, aut cyprino, cruciatibus, uulnū medent. Dolores dentiū cōmanducata finit, imposita serpentū morsibus, iuuamentū prestat, fertur etiam contra aspidū ictus ex aceto pota opiulari. Gignitur in terrenis. Est & altera clematis, quæ uiticulosum emittit ramulū, rubescētē, lentū: foliū gustu admodū acre, ac exulcerans. repitq; arbores, ut smilax. Semen tritum, pituitam bilemq; detrahit, in aqua aut hydromelite potum, folia eius illita lepras purgant. Cum lepidio conditur ad cibos.



Clematis altera.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Κλημῆς δαφνοειδής. Latine Clematis daphnoides.

Officinis Vincaperuincia.

Germanis Ingerin / Streyt / Todten violen.

Gallis du petit lyseron, peruincia dicitur.

Clematis daphnoides si quis imaginem, naturam effigiem ex qua sitius exploret, ea censebitur esse quæ officinis & herbarijs uincaperuincia nominatur, nāq; præ longos spargit iuncos, folia lauricolore & figura, multo minora, pingui lætoq; provenit solo, geniculatis reptans flagellis, gracili & in terrā sparso iunco. floribus uiolaceis, colore hyacinthino, interdū sed rarō suppurpureo, obuia queq; uincens, unde uincæ peruincæ nomen ductū putatur. Es semper uiret, in modū lineæ folijs geniculatim circūdata, topiaria herba, inopiam tamen florū aliquando supplet. Siccitas in clematide. Paulo Aegnetate teste, ceteris qualitatibus præualet, id quod gustus etiam ostēdit: gustanti enim adstrictionem quandam & amarorem habere uidetur. Adstringe autem modicē, sed fortiter amara est. Siccit itaq; at citra mordicationem.

Altera Clematis cuius Dioscorides meminit. Græcè κλημῆς ἑτέρα. Latine Clematis altera. Germanis Zeyelen / waldreben. Gallis Viorna, hardea dicitur. Eius picturam hic damus.

Clematis altera mihi omnino ea uidetur cuius nomenclaturam posuimus, quod ramorum fuscæ ea peinde quasi uinculo ligentes distringant nāq; uiticulis prælongis asperisq; cernitur et lignosis, rimoso cortice, folijs hortensi solum longioribus ac latioribus, flore muscoso et capillaceo, fructu exiguis, uuis simili, post maturitatem rubesceme, acinis ferē pmici mali, quadam tenus rotundis &c.

Polemonia.

Cap. VII.

**P**OLEMONIAM aliq; philæteriam, Capadoces





Behen album.



Behen rubrum.



padoces chilitodynamin appellat, ramis exilibus, utrinque pinnatis, folijs paulo  
quàm rutæ maioribus, ac longioribus, calaminthæ aut sanguinariæ proximis, qui  
bus in summis uelut corymbi dependent, nigro semine: radice cubitali, albicante  
radiculæ simili. nascitur in montosis & asperis. Bibitur in uino radix contra ser-  
pentes et dysenteriam, & ex aqua, aduersus urinæ difficultatem, & coxendicum  
cruciatus. datur ex aceto drachmæ pondere lienosis, eadem scorpionis plagæ al-  
ligatur. Tradunt, eum qui radicem gestauerit, à scorpione non feriri: eumque si is-  
tus sit, nihil molesti passurum. dentium dolorem mansa mitigat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè πολέμωνιον Latine Polemonia, uel polemonium herba.

Officinis Behen album.

Germanis Druben & opff (sed à sumaria diuersa) Lidweyeh/ wider Ross/ splyßpettel.

Sabaudiclag; uocant.

Polemoniam à certamine regum inuentionis appellant, radix eius alba oblonga, flos albus, folliculo  
inclusus, folia polygonum multo maiora. huius radice hodie in officinis frequentissimus usus, nā hanc acida  
tis cōfectionibusq; suis miscem. Loco Behen Arabū, quod Serapioni duplex, albū & rubrum, magnitu-  
dine radicis caryotæ, calida, humida, odora, semen augens: ex Armenia defertur. Eius loco ego, si id so-  
lum possunt, Etingij radicem substituere potius, quàm hanc polemonij radicem. Alterum behen rubrū  
Serapioni dictum.



Symphytum petreum.

Symphytum, siue alus. Cap. VIII.

\* Alij addunt  
rutaceis simi-  
les, præter  
rem.



**S**ymphyton petræon, id est alus, nascitur in petris, ramis tenuibus, paruis, origano similibus: capitulis thymi: surculosum totum, odoratum, gustu dulce, saluam ciens: longa radice, subrufo, digitali crassitudine. Decoctum in aqua multa & potum pulmonis uitia purgat, sanguinem reijciuntibus, & renum malis, ex aqua datur, ad dysenteriam, rubraque foeminarum profluuiâ, in uino decoctum: ad conuulsâ uerò & rupta, ex aceto mulso bibitur. quin & comman-ducatum sitim sedat, faucibus asperis subuenit. uulnera recentia enterocelasque cõglutinat, & illitu cohibet. carnes autem cum symphyto decoctæ coalescunt. Est & alterum symphyton, quod aliqui pecton uocant: id caulem emittit bicubitalem, aut maiorem, crassum, leuè, angulosum, ut sonchi inanem, circa quem breuiter interuacante spacio, folia exeunt angusta, linguae bubulae proxima, oblonga, hirsuta: caule secundum angulos quosdam striato: folijs tenuibus ex alarum sinu prodeuntibus, in quibus flores lutei & circa caule uelut herbasci semina emicant, tam caulis quam folia, asperanugine horrent, tactuque pruritum cõcitant, radices demittuntur foris nigrae, intus candidae, uiscosae: quarum est usus. Trita & pota cruentis excreationibus, ruptisque proficiunt.

Symphytum maius.



Holoostium.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Graeci Συμψυτον πέτραιον.

Latine Symphytum petreum.

Officinis Prunella.

Germanis Prunellen dicitur.

Vulnerariam herbam esse euidentissimū est, quare etiā si non uerum Symphytū petreum fuerit, tamen illi uiribus omnino simile. Succum eius cum aceto & rosaceo mixtum, uerbementes capitis dolores sedare recentiores uno cõsensu tradunt, si tēpora ex eo inungantur. Aphthas & oris ulcera, faciumque uitia succus eiusdem sanat.

Symphytum alterum. Graeci Συμψυτον ἑτραγον.

Officinis consolida maior.

Germanis Schwarz wurtz / Wallwurtz. Schmetwurtz / Beynwell.

Sunt qui in Gallia oreille dasne, id est, a fini auriculam uocant. Apud nos Symphytum frequentius flore subrubro, uel leuiter purpurascēte, aut candido quā luteo Symphytum conspicitur: quamuis & melino nonnunquam inueniatur, hoc, ut reor, facit soli diuersitas.

Modicè ordine scilicet secundo, calfacit, exiccat & contrahit.



## Holoſtium.

## Cap. IX.

**H**oloſtion quadrantalıs herbula eſt, humi repens: folijs uiticuliſq; coronopo aut graminĩ proximis. guſtu adſtringentibus: radice alba, prætenui uſque in capillamenti ſpeciem, longitudine quatuor digitorum. naſcitur in collibus terrenis. Uſus eius ad rupta, in uino potæ. nam & carnes coguntur, decoctionibus addita.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sine duriciã herba eſt holoſtreon ex aduerſo appellata, ſicut ſcilicet dulce, tenuis uſq; in capillamenti ſpeciem, longitudine quatuor digitorum ceu gramen, folijs anguſtis, aſtringens guſtu: naſcitur in collibus terrenis. hodie prout incognita.

## Scabioſa.

## Stœbe.

## Cap. X.



**S**tœbe uulgaris eſt noticiã. cuius ſemen & folia ſtringunt, quapropter decoctum dyſentericis infunditur. auribus quoq; purulentis inſtillatur. illita folia oculis ab icteru cruentis profunt, erumpentis ſanguinis impetus cohibent.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Stœbe herba quæ apud nos naſcitur, fruticoſa eſt, calida, acris, adoratam quippam reſpiens, ad uini conſeruationem ne acceſcat, aptiſſima, ſi calor huius folijs admotæ ignis calore excitatus, una crudiora percoxit.

Stœbe, quæ & Phleas dicitur, ſpinam habet in folio & caule Plinio lib. 21. cap. 15. lib. autem 22. cap. 11. omnia ex hoc Dioſcoridis capite mutuatur, quod aſtringat folijs & ſemine, ob id hæmorrhagiæ, dyſentericiæ, oculis cruentis, auribus purulentis conueniat, quæ uires Galeni Stœbe acris & calide non conueniunt, neutratamen harum noſtra eſt Scabioſa uulgo & officiis dicta (cuius picturam damus) quod ſcabiei ſananda ſit idonea.

Folio eſt cruce cùm adoleuit hirsuto, aculeis tamen non horrente, flore ceruleo, quæ pulmonĩ purgando & hepati conſert, et carbunculum recens admotæ horis tribus perrumpit.

ſſeram autem Actij non eſſe noſtrã Scabioſam hinc apparet, quod huius uſtæ ſumo arborum cruce non moriantur, imo non moueri eas magis quàm ſtipularum ſumo expertum ſe ſcribit Syluius, quam tamen ſacultatem Actius Pſoræ tribuit.

## Clymenum.

## Cap. XI.

**C**lymenum caulem fert fabæ, quadratum: folia plantaginis, folliculis ſupra caulem in ſeſe inflexis, ut in polyporum cirris. Probatiffimum eſt è montibus. E frutice toto cum radice ſuccus exprimitur, qui ad ſanguinis reiectiones in potu efficax eſt. cœliacos, rubraq; ſæminarum profluuiã, refrigerando infrenat. ſanguinem naribus erumpentem ſupprimat. Trita folia, aut ſiliquæ recentibus uulneribus impoſitæ, ea ad cicatricem perducunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Clymenon Ruellius eam eſſe arbitratur, quam officinæ & herbarij partim cypriam, partim ſaponalem, argumento, quod elota pinguitudinem quandam in aqua ſaponis modo remittat. Vulgus Gallorum Duſtege appellat, non ignotam ijs è uulgo qui uetuftis ulceribus medentur, extremam oram leuiſſime ſimbriatam, folliculis ſupra caulem in ſeſe inflexis, ut in iride, & crebro irretientibus inuicem polyporum cirris &c.



## Periclymenum.



## Cap. XII.

**P**ericlymenon, simplex fruticat, ex intervallis parua folia habens ipsum amplectentia, subcandida, hederacea, inter folia surculi exeunt; in quibus baccæ, hederæ similes: flos fabæ, candidus, aliquantum rotundus, & quasi in folium procumbens: semen durum, & quod difficile euellatur: radice rotunda, crassa, nascitur in aruis ac sepibus, conuoluens se adminiculis propter assiduitibus. Semen eius postquam ematuruit collectum, & in umbra siccatum, si drachmæ pondere detur in uino quadragenis diebus, lienem absumit, lassitudinem discutit, sed urinâ ciet statim à sexto die cruentam, orthopnoeæ & singultui prodest, parum accelerat. Folia sunt eisdem uiribus prædita, que tricenis septenis diebus epota, sterilitatem facere produntur, perunctis ex oleo, februm algores abigunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Περικλῦμενον. Latine Periclymenum. Officinis Caprifolium, mater sylua, licet confundatur hoc nomen à multis. Germanis Gilgen consfort, multis corruptæ uocatur, Teunling / Speck tilgen / Waldtilgen. Gallis Vimboscum dicitur. nascitur in aruis ac sepibus, conuoluens se adminiculis quibuscumque, eminuo ea amplexi caulibus suis, ramulis lignosis, rufis, geminis per intervalla, umbilicatis folijs, à terra caesijs, supernè herbosis, mollibus, baccis syluestris myrti, uel quod idem est, rusci, in cactu mine duobus folijs tunicato, ita ut difficulter eruatur, radice crassa.



Porriclymeni fructus & folia subamara, tandè acris, adeo ualenter calfaciunt, & incidunt, ut multò usu cruentas urinas educant, liuosos, agrè spirantes, ex oleo ad mota iuuat. Vides quàm forè labantur, qui Lycium ueterum ex hoc fructu representant. Nunc flore ferè utimur, et ex eo uel flore ligustri aqua capitello desiliata, ad oris & faucium aphthas & nomas colluendas.

## Tribulus. Cap. XIII.

**T**ribuli genus unum terrestre, folijs ad effigiem portulacæ, tenuioribus uitticulis, in terra stratis, spinis secundum folia rigidis, præduris, iuxta amnes & rudera nascitur. Est & alterum genus, aquis familiare, quod in fluminibus natum comam ex erit, aculeos condens: folijs latis, & pediculo longo: caule parte summa quàm ima crassiori, capitula lamenta quædam indidem exorta spicantur, semen durum, ab altero non abhorrens. Vterque refrigerantis & inspissantis est naturæ: ideo inflammationes omnes cataplasmate adiuuat, ulcera in ore erumpentia, putredines, gingiuas, tonsillasque perlanat. Succus ex his colligitur ad ocelorum medicinas. Semen durum



dum recens bibitur, calculosis iuramentum affert. Drachma terrestris tribuli pota, illitatur, ictos à uipera recreat. contra uenena cum uino apertissime bibitur, decoctum eius sparsum pulices necat. Phraces quia ad Strymona amnem habitant, uirenti tribulo equos saginant, & è dulci semine & esculento panem quo uescuntur faciunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Terrestri tribulo ut Dioscorides tradit, folia sunt portulacæ, tenuiora, et rami lacetres in terra exiunt, iuxta quos spinæ difficiles prædure. Germani Wedgdom appellant, secundum fluuios & in rudibus prouenit.

Alterum genus Aquaticum, Græcè Τριβύλλος & Ψυδρῶς. Officinis tribulus marinus. Germanis, Wasser nisse. Gallis Macors dicitur.

Hoc genus uulgu nostrum satis nouit, quod sit apud nos palustribus & residibus saquis familiare, si quidem cubitorum quinum & amplius in uado consurgit, ulmeo super aquas extante folio, longo pediculo, capitulis sub aqua mersis, caule per summa crassiori, inferne graciliori, qui capillamentis quibusdam amplexu fruticat, semine atro, duro, nucis si re magnitudine, retusis aculeis aliquot cincto, cuius nucleo accole non secus atq; castaneis uescuntur &c.

Ex hoc etiam in farina molito per inopiam annonæ, fiunt panes, ob id à Ferrariensem castaneam Galiam Padanam audio uocare. Terrestre quibusdam esse uidetur quod uulgu Wedgdom, officinæ calcatrippam uocant, quod cacumen ueluti muricibus muricatur, & spinarum aculeis insigniter armatur, ramis humi procumbentibus, siliqua spinarum uallo muricata, in qua semen rotundum, nigram, rudera, septa uillarum obsidens &c.

## Limonium.

## Cap. XIII.

**L**imonium folia habet betæ, tenuiora & longiora, decem, sæpe plura; caulem tenuem, rectum, lilio æqualem, seminibus rubris scatentem, quæ gustata adstringunt. Semen tritum, & ex uino acetabuli mensura epotum, dysentericis coeliacisq; prodest. rubra foeminarum profluvia sistit. Nascitur in pratis palustribus.

\* Μυγότρεπ  
non μυκρό  
τρεπ, λεγέται  
dum forte ex  
Plinij lib. 20.  
cap. 8.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Λιμόνιον.


Latine Limonium.

Officinis pyrola.

Germanis Wintergrün dicitur, & Waldemangolt.

In umbris & syluestribus locis prouenit, folia & semen gustu uehementer adstringunt, ita ut in tertio ordine siccitatis illud recte recentiores collocent qui eius decocto ad interna & externa uulnera potandum utiliter præbent.

Semen acetabuli mensura dysentericis prodest, hæc uires à Limonio uiribus non discrepant, adstringit enim et uulneraria herba est, ut Limonium, pyrola: floribus & folijs quoq; huic omnino similis, quare citra ullum discrimen Pyrolam cuius pisturam damus Dioscoridis esse Limonium asserere licet.



## Lagopus.

## Cap. XV.

**L**agopus herba sistit alium in uino pota: aut in febris, ex aqua, eadem inguinalligatur, in inflammatione. Nascitur in segetibus.

## NOMINA



## Lagopus.



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Λαγώπους, Λαγώπους.

Latine pes Leporis, Lagopus, Leporina herba, Lagopyros

Hypocrati. Officinis inusitata,

Germanus Katzen Fleckenpfötlin.

Gallis Lherbe de la trinite, ou pied de lieure dicitur.

A nullo, quod sciam, Lagopus describitur. Herba autem quam pro eo exhibemus, caules habet rotundos, hirsutos, folia lato trifoliatæ in pratis gignitur similia, semen in paniculis muscosis lanuginosisq; leporino pedi similibus admodum, adstringentis gustus, exico candi uim obtinet. Galeno teste.

## Medium.

## Cap. XVI.

**M**edion in faxis & opacis nascitur. folia habet iridis: caulem tricubitalem, & in eo florem grandem, purpureum, rotundum; semine cnici, minuto, radice dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo. Quæ trita in farinam, & ex melle decocta, rubros menses foeminarum sistit, eclegmate per aliquot dies sumpto. Semen in uino potum, menstrua pellit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Medion Plinio folia habet iridis sativæ, caulem tripedalem, & in eo florem grandem, purpureum, rotundum, minuto semine ad magnum cnici radicem semipedalē. Exemplaria sunt in quibus ei folia iridis redduntur. Verum cum Plinius iridis fronde scripsit, cū sativæ adiecerit, non de iride quam nemo sativam legit esse, sed de seride putatur intellexisse, cuius constat duo esse genera, sativum & sylvestre. Nam auctore Theophrasto, iris nullum desiderat. Medium hac ratione plantæ incognitum est.

## Epimedium.

## Cap. XVII.

**E**pimedium, caulis est non magnus, hederæ folijs, denis atq; duodenis, neque florem, neq; fructum ferens: radice tenui, nigra, graui odore, gustu satuo. nascitur in humidis. folia cum oleo trita, imposito cataplasmate, mammas incrementum non sinunt. Radix conceptum admittit. Folia trita quinque diebus in uino pota præstant mulieribus ne concipiant.

Forsan idem Epimæron Theophrasti fuerit, hodie incognitum est.

## Gladiolus.

## Cap. XVIII.

**X**iphion, alij Phasganon, alij machæronion, Romanigla diolum uocant. Nomen inde accepit, quod folium gladij præbeat speciem. iridi simile erat, nisi minus & angustius uideretur, & gladij modo mucronatum, nervosumq; in caulem exit cubitalem, in quo purpurei flores, in ordinem digesti, inter se distant: rotundo semine; radicibus geminis, una, bulbosorum modo, super alteram insidente: quarum inferior gracilis est, superna uberior. nascitur in aruis. Superior cum iure illita, admisto uino, spicula & aculeos e corpore extrahit. panos cum lolij farina & hydromelite discutit: qua de re huiusmodi emplastris inseri solet, menses imposita trahit. superior radice ex uino pota, uenerem stimulari, & inferiore sumpta steriles tradunt. superiorum quoq; utiliter infantium enterocolicis, cum aqua potui dari præcipiunt.



## NOMINA



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *ἑρπύριον*. Latine *Erpynis Gladiolus*. Germanis *Fleinblae Schwertel*.

Gallis *Glais ou glaitel* dicitur.

Folia *Xiphio* ut *Theophrastus* scribit lata, ad ensis effigiem exeunt, unde nomen herbe inditum. *Scolopendrea* in eam herbam frequenter conuertunt, mirumque in modum gaudere huius consuetudine frui. Floret cum uiola nigra, hodie nullius usus.

Sparganium:

Cap. XIX.

**S**parganium, aliqui *Xiphidion* uocant, folia habet gladioli, sed arctiora, & in terram magis procumbentia, in summo caule ueluti pilulæ prominent, in quibus semen. Contra serpentis uenena, radix cum uino datur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sunt qui cotulam foetidam sparganium esse arbitrantur, sed errant, sparganium enim adhuc inco-

gnitum.

Xyris.

Cap. XX.



**X**yris, folia habet iridis, latiora, & in turbinem mucronata: quorum medio caulis erumpit crassus, cubitalis, ex quo filiquæ triangulares dependent, in quibus purpureus flos, in medio puniceus: semen in folliculis, simile fabis, rotundum, rubrum, acre: radix longa, geniculata, rufa. Contra capitis uulnera, fracta; & efficax est, aculeos & spicula omnia citra molestiam extrahit, adiecta floris æris tertia parte, & radices centaury ac mellis quinta. tumoribus & collectionibus illita cum aceto medetur. Radix ex passo bibitur, ad conuulsa, rupta, coxendicium dolores, strangurias & alui profluvia. Semen tribus obolis potum, urinam uehementius impellit: & cum aceto, lienem absumit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *ξυρίς*. Latine *Xyris*. Officinis *spatula foetida*. Germanis *Wandelstein* frant dicitur.

A necandis cimicibus appellant, circa sepes & dumeta nascitur, Itali frequens, nusquam tamen in Germania, nisi fata, prouenit, uehementer acrem qualitatem obtinet, adeo ut gustata, fauces quasi urere uideatur: proinde calidum & siccum admodum esse constat.

Anchusa.

Cap. XXI.

**A**nchusa, quæ alio nomine calyx, aut onoclia appellatur, folia habet lactuce, in acumen fastigiata, hirsuta, aspera, nigra, multa, quoquo uersum humis sparsa, spinis horrida: radici crassitudo digitalis, quæ æstate prouenit, manus inficit sanguineo colore. læto solo nascitur. Radix adstringit, ad ambusta & uetera ulcera, ex oleo & cera efficax est. igni sacro cum polenta medetur, lepris & uirilignibus illinitur ex aceto. par tus extrahit, uulnæ indita, eius decoctum renum uitij, lienis, & bile suffusus datur: & si febris sit, ex aqua multa. Siftunt aluum folia in uino pota. Radice pigmentaria utuntur ad unguentorum spissamenta. Est & altera, quam aliqui *alcibiadion*, aut *onochiles* appellarunt. hæc à priore distat, quod minora habeat folia, sed simili modo aspera: ramulos exiles: florem purpureum in puniceum uergentem: radices rubras, oblongas, quæ mellebus sanguineum succum fundunt, in sabulosis nascitur. uis ei solijsque inest, quæ contra uirus cum re-liquorum serpentium, tum maxime uiperarum, auxilietur, siue cibo, siue potu, siue alligatu, nam si quisquam mandens, in serpentis os inspuat, eum necabit.

Est &



Lycopsis.

Aly carda-  
mono.

Est et alia huic haud dissimilis, semine puniceo, minore. Cuius semen manducatum, si in serpentis fauces inspuatur, eam interficiet. radix acetabuli mensura cum hyssopo & nasturtio \*pota, latus uentris tineas excutit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Αἴχουσα. Latine Anchusa. Officinis buglossarubea. Germanis Rodei Ochsensung. Gallis Orchanette dicitur.

Mulieribus non ignota, quæ colorem faciei nativum fuso mentitur, quæq; uernaculum genarum pallorem, genitiuaq; uultus maculas hoc insectu occultum: rectè malas eleganti commendat purpurisso.

Nam hæc caulem habet erectum, folia lactuca, in acumen exeuntia, hirsuta, aspera, nigra, copiosa quoquo uersum humi sparsa: spinis horrida: radicem puniceam, digitali crassitudine, per æstatem manuum inficiemem sanguineo colore, lato solo provenit. Sunt & alia anchusæ species, sed hodie incognitæ.

Lycopsis.

Cap. XXII.

**L**ycopsis, quæ à nonnullis anchusa uocatur, folijs lactucæ longioribus, asperioribus, latioribusq; crassius, ad radicis caput recidentibus: caule longo, recto, scabro, hirsutis adnatis multis, cubitalibus. flore paruo, purpureo: radice rubra, & adstringente, nascitur in campis sribus. Cum oleo radix illita uulneribus medetur: & cum farina hordeacea, ignibus sacris. sudores peruncta mouet, adiecto oleo.

## EXPLICATIO.

Multi Lycopsin hanc esse putant. nec ab re, quod uulgius barbariorum appellat linguam canis, Germani, Linde Sundro sung / nam longioribus quam lactuca folijs, crassius, sub hirsutis, ad radicis caput recidentibus, caule longo, scabro, recto, cubitalibus, adnatis, flore paruo, purpureo, semine in lappacis umbilicis raso & exili, radice rubra.

Echium. Cap.

XXIII.

**E**chion folia habet prælonga, hirsuta, aliquantum tenuia, anchusæ proxima, minora tamē, subrubra, & pigra, spinulis tenuibus, horridula: cauliculos exiles, numerosos: minutaq; utroq; latere folia, expansa, pinnataq; nigra, in summo

Echion domesticum.

Sylvestre.





summo caule minuscula: flores secundum folia purpureos, in quibus semina capi ti uiperarum similia insunt, radix nigricat, digito tenuior, quæ non percussis modo à serpentibus ex uino prodest, sed eos qui antea biberint, feriri non patitur. folia & semen idem præstint munus, lumborum dolores sedat, in uino aut sorbitio ne sumpta, lac extrahit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *ἔχιο*. Latinis *Echium*. Officinis *buglossa* uulgaris. Germanis *gencin* *Ochsenzung*. Gallis *buglosse* *sauuage* dicitur.

Hac officina ferè omnes pro uera ueterum *Buglossa* utuntur. planè relicto *echij* nomine, non tamen sine graui errore, ut per amplius in capite de *echio*, & uera *buglossa*.

## Ocimastrum.

## Cap. XXIII.

**O**cimoides, Latini ocimastrum uocant, folia fert ocimi, & ramos dodrantales, hirsutos, siliquas hyoscyamo similes, semine, ut gith, nigro prægnantes. Vini habet semen in uino potum, qua uiperarum cæterarumq; serpentium moribus medetur, datur ischiadicis cum melle, uino, myrrha, & pipere. Radice nititur tenui & superuacua.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Ocimoides, quod & ocimastrum: uulgo *iacia* alba, & *pocularia* quod *pecillorum* similitudinem pericarpia gerunt, ex Ruelli sententia. Mihi enim certas ob coniecturas esse uidetur ocimoides herba, quam hodie multi *been rubrum* uocant, ob floris colorem, quamuis & albus inueniatur: non autem loquor de radice, quam falso sic uocant, ab Arabum descriptione longe diuersum. Sed erinon quoq; ocimoides aliqui uocant, de quo in capite sequenti plura.

## Erinus.

## Cap. XXV.

**E**rinus nascitur apud fontes & fluuios, folijs ocimi, sed minoribus, parte superna diuisis, quinis, senisue, dodrantalibus furculis: flore candido: semine nigro, & acerbo. folia & caules lacteo succo turgent. Semen drachmis duabus in quatuor mellis cyathis oblitum, oculorum fluxiones cohibet. Succus cum sulphure & nitro instillatus, aurium dolores sedat.

\* Addunt qui dam uino.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

A recentioribus herbarijs *herba lactis* appellatur, à quibusdam *lacteris*, & *militaris*, alijs *ocimum aquaticum*, *trientalibus* ramulis, quinis senisue folijs ocimo longioribus, parte superna diuisis, albo flore, semine atro, pusillo, acris, duro. Herba succo manat lactis, tum colore, tum dulcedine, unde *lactaria* non in apud uulgos inuoluit, Secus fontes & fluuios inuenitur.

## Gramen parnaei.

## Gramen.

## Cap. XXVI.



**G**ramen geniculatis serpit ramulis; à quibus crebrò radices spargit dulces, articulis præcinctas. folia dura, & ut arundinis parua, lata, in exilitatem fastigiantur, eaq; iumenta & boues pascunt. Tritaradix illius uulnera conglutinat, decoctum eius in potu, rotinibus medetur, & urinae difficultatibus, calculosa etiam uescicæ excrementa comminuit. Est et arundinaceum gramen, priore multò maius, quod iumenta necare traditur, præsertim in Babilone: idq; iuxta uias nascitur. Quod in Parnaso monte



\* Alias sag-  
mas sue op-  
plet.

gignitur, densus fruticat; folijs hæderaceis: flore odorato, candido; semine paruo, non inutuli: radicibus quinis aut senis, digitali crassitudine, candidis, mollibus, & admodum dulcibus. Succus si in uino cum melle pari, & myrrhæ dimidio decoquatur, adijcianturq; piperis & thuris tertie portiones, probatissimum erit oculorum medicamentum. id in ærea pyxide reconditur. Decoctum radicis, idem quod herba præstat. Semen uehementius urinam impellit, aluum uomitionesq; fistit. Natum in Cilicia gramen, quod incolæ cinnam appellant, boues inflammat, si eo uirenti sæpe pascantur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Gramen pecori esculentum radice est modice frigida & sicca, parum mordaci, substantiæ tenuitate exiguum sortita, qua calculos potu interdum frangit. Germanè Rech gras / Juncfern grasse. Quod uero in Parnaso gignitur, ea forte est herba quam Germanicè unisolum appellamus.

Sideritis tertia.

Sideritis.

Cap. XXVII.

Aleu Bathengel weible.



Sideritim aliqui heracleam uocant. folia habet marrubij, sed longiora, satis ad frondē quercus aut saluie accedentia, minora tamen, & aspera. caules ædit quadratos, palmum sæpe excedentes, non iniucundi gustus, aliquantūq;

substringentis. in quibus per insterstitia orbiculatæ uertebrae, uti in marrubio, spectantur, & semen in eis nigrum. nascitur in petrosis. Illita folia, suapte ui, uulnera sine inflammationis periculo iungunt. Altera Sideritis binum cubitorum, ramulis exilibus: folio filicis, numerofo, utrinq; per oras diuiso: pediculo longo, prodestibus è summo alarum sinu surculis, longis, tenuibus: capitulo in cacumine orbiculato, aspero, in quo semen continetur, quàm betæ rotundius aliquanto, ac durius. Huius uis, foliorumq; ad uulnera præcipua est. Sideritin aliam esse tradunt, quam Crateuas heracleam uocat, in macerij & uineis nascentem, folijs corini, à radice numerofo: do drantalib. cauliculis, læuibus, teneris, in rubore candicantibus: flore purpureo, paruo gustantia maro & lento. Huius ea uis est, ut quamuis recenti uulneri imposita, sanguinem supprimat.

NO



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sideritis prima Latinis, Græcis Σιδιρις dicitur: magna officinarum pars, hac herba pro chamæpitæ uera utitur, non sine errore, cum satis ex forma ipsius delineationi collata constet, non esse chamæpitæ. Germanis Glidkraut appellatur. Sideritis uerò nominata, quod glutinandis uulneribus apta, precipuum in bello habeat usum. Alterius Sideritidis historiam ac nomenclaturam quære lib. 3. cap. de Geranijs. Tertia sideritis Heraclea, dicta à Eufasio falsò Chamedrys uera foemina, Germanis Flein Wathengel werble dicitur.

Sideritis habet quandam abstergendi facultatem, id quod amaritudo eius satis indicat: et pauculam adstrictionem. Plurima tamen eius pars humida est et mediocriter frigida phlegmonam sedat, et glutinandi uim obtinet.

## Achillea.

## Cap. XXVIII.



Achillea, quibusdam Achillea sideritis, dodrantaes aut maiores gerit scapos, fusorum effigie, quasi minutulis folijs circumdatos, crebris in latere foliorum sectionibus, coriandri similitudine, sub\* fuluo colore, odore multo, non insuauis, medicato & glutinoso, umbella in cacumine rotunda, floribus candidis, purpureis, & aurum æmulantibus. prouenit læto solo. Irita coma sanguinolenta glutinat, & ab inflammationum periculo tue tur. erumpentem sanguinem inhibet, & cruenta uulnæ profluua, in uellere, decocto quoq; insident foeminae fluxione uulnæ laborantes, ad dysenteriam bibitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Ἀχιλλεΐα.

Latine Achillea.

Officinis Millefolium minus.

Germanis groß Garben Kraut / Gerwel / Schaffripp.

Gallis Mille feuille grande dicitur.

Millefolium hæcenus Achilleæ appellationem apud multos etiam eruditos retinuit, cuius delineationi tamen ad singula respondere non uidetur, quare haud immeritò quidam arbitrantur Achilleæ speciem esse eam herbam quam Germani S. Warbren Kraut / Galli uerò carpemariam appellant, nam huius etiam usus glutinandis uulneribus prope nimius.

## Rubus.

## Cap. XXIX.

Rubus, notitiæ uulgaris. Vim habet siccandi & adstringendi: capillum tingit, Ramorum decoctum potu aluum sistit, & foeminarum profluua, praeteris morsui accommodatissimum, gingiuas firmat. Oris uitij folia commandu cata medentur, cohibent ulcera quæ serpunt, ulceribus in capite manantibus, oculisq; procidentibus remedio sunt. condylomatis & hæmorrhoidibus folia illinuntur. cardiakis, & stomachi doloribus, trita conuenienter imponuntur.



caules cum folijs tunduntur, exprimiturq; succus, mox sole cogitur, singulari remedio contra omnia quæ modo dicta sunt. Mori in rubo nascentis quàm optimè maturi succus, ad oris medicamenta conuenit. sistitur aluus præmaturi cibo, necnon flore in uino poto.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Ρόσος. Latine Rubus, frutex spinosus. Officinis geninum nomen seruauit. Germanis ein Römber steud.

Gallis Ronce dicitur.

Cc 4



Rubi, seu Semis, Græcè Βάτος genera Theophrasti tria sunt; magnus seu rectus, humilis & medianus. Batus magnus seu rectus est Dioscoridis & Galeni κνυόσβατος, fructu oblongo, per maturitatem rubente, cythno simili, in quo ceu lana flocci arteriam si deuorentur infestant, hunc Germani Bectrosen on geruch / Galli Englantier sans odeur appellant: huic folijs, fructu, rosa similis est cynosrhoda, Germanis woltrich, nō Bectrosen / nam ipsa planta quoque in diffinitionem alterius odorifera, Gallis Englantier de bon odeur appellatur, Huius generis Rosa omnis, nisi quod ferē gerit folia florum magis multiplici & maiora, arte opinor adiuta: sed Cynosbatos spinis hamatis horridior, rectior, et altior assurgit, odore caret, quem Cynosrhoda tota habet præstantissimum, ut supra diximus, Rosa uero fructu flore solo est adorato, nunc albo, nunc rubeo, nunc amborum medio (Germani Leibfarb / Galli Incarnat appellant) nunc etiam moschato, qui Germanis Rosen von Damasco / Gallis uero Roses de Damasc appellatur. Χαμαίβατος autem, id est, humilis rubus, Dioscoridi hoc loco & Galeno absolutè tantum Βάτος dicitur, folijs multo maioribus quàm Cynobati, bicoloribus, per nodos ternis, larmis longissimis & firmissimis, qua parte terram attingunt, radicem iterum faciētib, flore albo, tenui, racemoso. Cui succedunt mora grandia, racemosa, multis granis coagmentata, per maturitatem nigerrima, Βάτις Galeno dicta. Germanis Bromberen / ædia denique est Βάτος ἰδαῖος de quo plura capite proxime sequenti.

### Rubus Idaeus.



Helxine matius.



### Cap. XXX.

Idæus rubus appellatus est, quoniam passim in Ida proueniāt. Est autem longè tenerior priore, ac minoribus spinis horrens, quanquam & sine spinis inueniatur. insuper eadem præstat quæ supradictus. Ceterum flos cum melle oculorum collectionibus commodissimè illinitur, ignem sacrum extinguit, stomachicisq; ex aqua bibendus datur.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Βάτος ἰδαῖος. Latine Rubus Idaeus. Officinis inusitata. Germanis Bromberen. Gallis Framboiser dicitur.

Βάτος ἰδαῖος Dioscoridis longa tenerior est rubo, qui simpliciter Βάτος dicitur, ac minoribus spinis horrens, quamq; sine spinis inueniatur: frequens est in solis, folia habet chamaebati, sed paulo minora, rectus ferē surgit, ad duo aut tria cubita, sepe gracili & infirmo, & minimum spinoso, flore simili, & fructu, sed minore, & granis quinque aut sex coagmentato, & per maturitatem rubro aut nigerrimo, sed in ceruleum inclinante ob aerium quoddam tectorium, nigris uuis & prunis, & alijs multis fructibus in uasci solita: astringunt, siccant, refrigerant omnia rubi generā maius & minus. Ad rubum Idaeum docti hodie reduci hortensum (cuius pluram damus) rubi recti, breuis, parum spinosus specie, quā Germanicè supra diximus Bromberen appellari, folijs bicolorib, fructu dū maturuit olfactu & gustatu iucundissimo, fragri rubri (est enim etiā albus) æmulo: quæ fructum herba trifolia et bicolor ferē acrem, præsertim semine.

#### Helxine minus.



### Helxine. Cap. XXXI.

Helxine cognomento cissampelos, folijs est hederæ, minoribus: ramulis exilibus, quibus completur quodcunq; contingit adminiculum, nascitur in sepibus, uinetis, & segetibus. foliorum succus potu deiecit aluum. N. O.



Elatine.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Ελγίνχιος ή πελός. Latine Helinx, cissampelos.  
Officinis uolubilis. Germanis Winden & Zaunfloet en. dici.

Hic nota, etiam multos doctos uiros eam herbam quæ officinis peritaria dicitur, cum hac, cuius picturam damus, non sine graui errore, confundere.

Elatine.

Cap. XXXII.

**E**latine folia habet helinxæ minora, rotundiora, pilosa: dodrantalibus ramulis, quinque senisue, a radice foliosis, gustu adstringentibus. nascitur in segetibus & cultis. Oculorum fluxionibus & inflammationibus auxiliatur, folijs cum polenta tritis & impositis, Eadem cocta sorbitionis usu dysenteriam sistit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Ελατίνη.

Latine Elatine.

Officinis falso hederæ terrestris.

Germanis Grundtreben.

Gallis Raue sauuage dicitur.

Officina omnes hactenus hac herba pro terrestrî hederæ usi sunt, omnibus reclamantibus notis, sed qui hanc cum legitima Elatine descriptione contulerit, facile iudicabit eandem esse.

Agrimonia.



Eupatorium.

Cap. XXXIII.

**E**upatorium fruticosa herba est, unicum esse ferens caulem, lignosum, nigricantem, rectum, tenuem, hirsutum, cubitalem, interdum ampliorem: folijs per interualla quinque folijs, aut cannabîs magis similibus, quinque partitò aut amplius diuisis, nigricantibus, per ambitum ferratis. semen medio caule erumpit, pilosum, deorsum spectans, quod siccatum uel stibus inhæret. Contrita huius folia, & cum suillo adipe imposita, ulceribus quæ ægrè cicatricem trahunt, medentur herba aut semen in uino potum, dysenteria, iecinoris uirgæ, & serpentium ictibus liberat. Nec desunt qui aberrantes, argemonem hanc appellarint, cum tamen longe alia sit, uti exposuimus.

Co 3





Græcè Εὐπατορίδιον.

Latine Eupatorium.

Officinæ Agrimonia.

Germanis

Agrimoniën.

Gallis Aigremoine dicitur.

Eupatorium uel Hepatorium, uel Hepatitis, omnino agrimonia uulgaris uidetur Dioscoridē, hos Eupatorium cum Serapionis Agrimonia, & Mesuæ Eupatorio conferre mi.

Corruptum uero nomen ex Argemone apparet, quam falso Eupatorium quidam (ut Dioscorides quoque testatur) putarum incidit, terget, tenuum est partium sine manifesto calore, sub stringit, iccorū ob id obstructions aperit, ipsumque roborat, unde & nomen inuenit: uel cum Ciccone ab Eupatore rege: hanc etiam Pentaphyllum uocari, quod folio sit quinq; partito, scribit Gal. lib. 5. comp. ph. part. Eupatorii nunc folia nunc radicem Actuarius misceat.

Pentaphyllum.

Quinquefolium.

Cap. XXXIII.



Heptaphyllum.



**Q**uinquefolium ramulosum fert furculaceos, tenuis, dodrantes, in quibus semen, folia menthae, quina singulis pediculis, raro plura, in ambitu serrata: florem ex luteo pallefcētem, auri æmulum. nascitur in riguis, & aquarijs ductibus. subrubram habet radicem, oblongam, ueratro nigro crassiorē. Plurimis pollet remedijs eius radices decoctæ ad tertias, si in ore contineatur, dentium dolores sedat, putrida oris ulcera, collutione sistit, arteria scabritias, gangarizatu læuigat, contra alui profluvia, & dysenterias auxilia


tur, item articulorum coxendicumque cruciatibus potum. Cocta in aceto, & illita, serpentina

ulcera cohibet. strumas, tumores, duritias, abscessus & collectiones discutit. ignes sacros, reduuias, condylomata, psorasque sanat. Tenebræ radicis succus, contra tæcinoris, pulmonumque uitiū prodest, item aduersum uenena. Cum hydromelle autem, uel diluto uino, & piperis exiguo, bibuntur folia, contra febrium circuitus, in quartana quidem, quaternum ramulorum; in tertiana uero, ternum; in quotidianā, unius. ea quoque folia, tricenis pota diebus, comitialibus profunt, foliorum succus, tribus cyathis aliquor dies potus, celerrimè regio morbo medetur. illita cum melle & sale, tam uulneribus quam fistulis remedio sunt, enterocelici auxiliū præstant. Quinquefolium sanguinis profluvia & potu & illitu sistit, ad expiationes, castimonias, & incantamenta inciditur.

NOMINA



**Phoenix.**



Græcè *πινυ* & *πυμ*. Latine quinq; folium.  
Officinis genuinum nomen seruauit. Germanis *Sünfinger* trant.  
Gallis quinq; feule dicitur.

Pentaphylli radix siccatur ordine tertio, sine morfu, t. minū est partium, nimium acris, & calida. Tormentilla quæ Germanis Tormentill, & bläwurz. Gallis Tormetille dicitur, putatur. Leoniceo, Manardo, Ruellio, quæ nunc quinq; folia, nunc septem folia, his & nubi sepe uisa est: uti & uulgare quinq; folium etiam septem folium frequenter est: uti & Eupatorium de quo supra, quod etiam pema-phyllon Galeno dicitur, lib. 5. comp. ph. part. Hæc radix inetheriacen recipitur. & nostra Tormentilla uenenis & pesti resistere experientia multa est certissima: munit si non sit eadem, eius loco usupari possit.

**Phoenix.**

**Cap. XXXV.**

**P**hoenix folia habet hordei, sed breuiora, & angustiora, spicam lolio similem: calamos digitorum senum, radici aduolutos: septenas octonasue spicas. In aruis tectisq; recenter illitis nascitur, harum uirium compos, ut in uino austero pota, alui profluuium, & emanantem uulua sanguinem sistat, urinæ impetus infrenet. Sunt qui ad alligatam in puniceo uellere & suspensam, sanguinem suppressere prodant.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Est herba Phœnicea Plinio appellata à Græcis, à Latinis hordeum murinum, Avena sterilis à multis hodie dicitur. Germanis Taub Fom, quandoquidem ea sterilis aena, folia habet hordei, sed breuiora & angustiora, spicam lolio similem, culmos digitorum senum radici in orbem obuolutos, septenas octonasue spicas in subactis coctisq; recenter illitis inuenitur.

**Idea radix.**

**Cap. XXXVI**

**I**dea radici folia sunt ea que rusco. adherent his ueluti exigui pampini, in quibus flos. radix spissandi naturam habet, his conueniens quibus adstrictione opus est pota, citam aluum, mensesq; & omnem abundantiam sanguinis sistit.

Græcè *ιδέα* & *ριζα*. Latine Idea radix, uel Idea herba, folijs rusci, acerbæ gustu, miseri solita luctantium in palestra ad ea que reperiuntur tantū oporteat, ut Paulus Aegi. scribit hodie planè incognita.

**Rhodia radix.**

**Cap. XXXVII.**


**G**ignitur Rhodia radix in Macedonia, costo similis, leuior, iniquabilis, quæ cōtrita, rosas redolet. utilissima capitis doloribus, si madefacta fronti & temporibus cum rosacei momento imponatur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Fuchsius in herbario suo hanc facit, quam Germani radicē uocant rosarum. Rose wurz, ab odore rosarum, quem spirat præsertim uiridis, & cum eruitur.

Recetior suauius olet. Ex Austria & Pannonia ad nos adfertur uirens, & uegeta diutissime seruatur. Inæqualis est, cortice albescente, sapore acerbato, ut bistorta, acorus uulgaris, & ben rubeum Saptasia rorum, quibus omnibus ut sapore, ita ferè crassamento etiam & colore rursus omnibus comparari potest. Folia sunt portulacæ quodammodo, aut telephij, in mucronem exeuntia, fumen crenata, caules ab una radice plures exeunt.

**Rhodia radix.**





Ceterum ex illo nono repertarum insularum orbe, Liburnicarum remigatu, lustrato, delatum nuper ad nos lignum crasso cortice et hiulco multis tuberibus et nodis inaequale, ponderis inani, ita ut immersum aquis pressum eat, nec sed us rursus emergat, tanta pollet gravitate, buxiq; colorem, crassitudinem et duritiam inuitatur, hoc tritum uel in iocobem dera sum rosas odoris suauitate prouocat, quin potius de paritate certans, uincit iucunditate. Hoc rosaceum lignum appellamus, cum barbarum rogonis noaen audire non potuerimus.

## Equisetum.

## Cap. XXXVIII



\* Addidit  
fuit.

Equisetum in riguis et scrobibus nascitur. cauliculi prodeunt inanes, geniculati, in se fracti, rubescentes scabri, & inter circa eos folia, crebra, exilia. in sublime equisetum attollitur uicinos arborum caudices scandens, obuolutumq; dependet, comis multis, nigris, ut equorum cauda, radix lignosa, dura. Vis herbae spissare: quare sanguinem naribus erumpentem succus ipse sistit, prodest dysentericis in uino potus, urinam cit. Sanguinolenta uulnera glutinantur, tritis folijs, & illinis. Radix cum sua herba tussim, orthopneam, rupraque adiuuat. Folijs in aqua potis, dissectiones uentricae & intestinorum, enterocolicq; in unum coalescere, cogique feruntur. Alterum equisetum caulis est rectus, cubitalis, aut maior, inanis, comis per inter ualela breuioribus, candidioribus, & mollioribus. Id cum acetotritum uulneribus remedio est, eademque fungitur facultate.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Graece ἵππουσις. Latine Equisetum.

Officina uerbum uerbo reddentes, cauda equina.


Germanis Schaffthew, Katzen wadel.

Gallis Queue de cheual, ou prela dicitur.

Quae hic a Dioscoride pingitur, uulgo Schaffthew dicitur proprie, non ignota materiarijs fabris, qui ligream pectinam et aliorum minorum operum rudimentum huius herbae scabritia in nitorem expoliunt. Namque ea in sublime scandit, & uicinos arborum fruticumque caudices improbo errorum reptatu complectitur, proxima quaeque uiciniens, ab ramisque dependens instar equinae caudae, calamis geniculatis pyxidatim cornutibus, capillamento potius quam folijs articulo, iuncea cuspidem in riguis et fossis inuenitur. Alterum hyppuris uel equiseti genus, quod equisetum cognominant Germani Katzen wadel, recto caule, equali, cubitum excedente, uacuo, grauioribus per interualla et candidioribus comis mollioribusque assurgit. Faciunt et aliam Graeci Hyppurim grauioribus et mollioribus comis, inuenitur haec in pratis, nec sepe frequenter occurrit inuisa senescis: hanc polygonij foemina esse, ut supra ostendimus, multi arbitrantur.

## Coccum infectorium.

## Cap. XXXIX.



Coccum quo infectores utuntur, frutex est surculus, paruu, cui grana ceu lentes adherent, quae electa congeruntur. Optimum gignitur in Galatia & Armenia, deinde Asia et Cilicia, ultimum ex omnibus Hispanicum. Vis huius spissandi, uulneribus neruisque praecisis, conuenienter ex aceto tritum illinitur. Nascitur quoque in Cilicia, est quercubus, cochlearum exilium similitudine, quod illius regionis mulieres ore legunt, & coccum uocant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Graece Κόκκος & Βαφικῶν. Latine Coccus Baphica.

Officinis Grana tinctorum et Kermes et Albernaes cum Mauris.

Germanis Scharlach beer. Gallis Vermillon dicitur.

Coccus baphica, uel coccum baphicum, bacula est sparsa et amara, folijs innata fruticis aquifoliae ilicis. Theophr. Pl. astringens, amara, sicca.




ficcat sine morfu, ob id ad uulnera magna etiam neruorum congruit, roborat partes sue his qualitatibus manifestis, siue tiam (ut quibusdam placet) lotus substantie similitudine, quam dicunt habere cum corde precipuam.

Tragoceram.



Tragum.



### Tragium.

### Cap. XL.

**T**ragium nascitur in creta tantum insula, lentissimo semine, folio et ramis simile, singulis tamen minoribus. Succus ei lacteus, gummi non dissimilis. Semen, folia, lachrymaque, illius spicula e corpore eijciunt omnia quoque corpori impacta uocant, pora straguriae medentur, calculos uesicae frangunt, menses trahunt, modus in sumptione est, drachma una. Fama est syluestres capras sagittis confossas, eius herbae pabulo spicula excutere. Est et alterum tragium, quod tragoceros aliqui uocant folia scolopendri habet, et radicem syluestris raphani, tenuem, candidam, quam rudam uel coctam esse dysentericis prodest, folia autumno hirci uirus olent, exinde sibi tragi nomen adoptauit. \*Prouenit in montibus & precipitijs.

\*Addititia  
clausula.

#### NOMINA AT EXPLICATIO.

Plinio iuniperi similis, et semine et folio, et ramis, hodie ut pote quam sola Creta insula gignit, passim incognita. Alterum tragium quod tragoceram aliqui uocant Dioscoride teste, huius nulla consentirent quae uulgo bursa pastoris, Germanice Teschel Frank, uel Sedel Frank appellatur, quod et folia ferè scolopendri ferat, radicem syluestri raphano non dissimilem, candidam, quam in dysenterijs salubriter utuntur, nisi natales reclamarent, namque haec nascitur propter uias et in parietinis, illa montibus et precipitijs. haec in foliulis in exiguae uulge similitudinem compressis, turbinata cordis effigie, semen gerit minutum, quod non temere fuisset praetermissum a Dioscoride, diiudicem peritiores.

### Tragum.

### Cap. XLI.

**E**st etiam herba tragos, quam aliqui scorpion aut taganon uocant, maximè in maritimis nascens, palmum alta, aut amplior, fruticosa, humilis, oblonga, sine folijs, pusillis circa ramos acinis, rufis, multis, magnitudine tritici, acuto cacumine, gustu multum adstringente. Racemorum acini decem ex uino poti, coeliacis, & foemina fluxione uulue laborantibus auxiliantur. Tunduntur a pleurisy, & in pastillos digesti asseruant, quibus utuntur cum opus est.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Graece Τράγος.

Latine Tragos.

Officinis uermicularis.

Germanis Ragen treuble. Fuchsius falso Klein hausswurtz, weible.

Tragus herba nascitur in muris et petris, maceris quoque uinearum et parietibus prouenit. Maio et Iunio mensibus, pallidis seu candidis floribus. Desiccatur modice, uehementer autem refrigerat, ideo ad Erisipilata, herpetas, et a fluxione nasas phlegmonas prodest.

### Iuncus.

### Cap. XLII.

**I**unci duo genera, unum laeuis nominati, alterum acuti, qui in mucronem fastigiatur. Cuius etiam duo assignantur genera, unum sterile, reliquum fert semine nigrum, rotundum, et crassiore constat calamo, carnosiore quoque.

Tertius



Scirpus.



\*Euripici.

Iunci palustris genera.



Tertius est iuncus qui uocatur oloschoenos, prioribus carnosior, asperiorq̃, is similem su-  
pradicto fructum in cacumine parit. Semen  
utriusq̃ tostum, ex diluto uino potum, sistit al-  
uum, & rubra foeminarum profluvia, urinam  
cit, capitisq̃ dolores facit. Quæ proxima sunt  
radici folia tenera, conuenienter illinuntur ad  
uersus phalagiorum morsus. Aethiopici \*iunci semine somnus  
allicitur. sed modus in potione seruandus est, ne sopor fiat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Ξοῖσος. Latine iuncus. Officinis latinum nomen seruauit. Germanis Bingen.  
Gallis Iunc dicitur.

Tria genera iunci apud nos inueniuntur, unus in aquis, crassitudine et magnitudine, fungosaq̃; medulla  
insignis, Latinis mariscus, Græcis holoschoenos dicitur. hic ut molliissimus, ita ad uitilia præferunt. Al-  
ter acutus à nostris, Græcis oxyschoenos nominatur, sterilis idem. Omnis, qui regenerat se quotannis,



cacumine in terrâ defixo, ex quo cepit  
radix denuo pullulat. Tertius melancra-  
nis, quasi atriceps dicitur, fructum gerit  
uuarum coherentium modo, in quibus  
cuspidatum semen clauditur. hoc nihil in  
uliginosis occurrit frequentius. vide-  
tur autem palustris iuncus idem cum scir-  
po esse. Nec in fruticum, inquit Plinius,  
nec in ueprium cauliumue, neq; in her-  
barū aliud uel quā suo genere nume-  
rentur iure, leui ac enodi stilo in exile  
cacumen fastigato, fungosa medulla, quæ  
ad lucernarum utuntur lumen, ut plāta  
tota ad operiendas tegetes, neq; non con-  
textus natarum, quallorū, aliorū ui-  
tilium nexus.

## Lichen. Cap. XLIII.

Lichen qui saxis est familiaris, aliquibus bryon appel-  
latur. asperginosis petris adhæ-  
ret, ut muscus. Is illitus sanguine  
nis profluvia sistit, inflammatio-  
nes arceat,







## Chrysogonum.

## Chrysogonum.

## Cap. XLXI.

**C**hrysogonum dense fruticat, quernis folijs: flore coromarij uerbasci, radix ut rapum extuberat, intus ruberrima, foris nigra. Quæ trita cum aceto, atq; imposita, muris aranei moribus auxiliatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè χρυσογον. Latine Chrysogonum.

Officinis Chariophyllata & herba benedicta.

Germani Benedicten wurzel appellant.

Radix eius luto & sordibus clota siccatur & imbre aceti resperfa areæ & uestes iucundo commendat odore. Decoctum huius sumitur ad perficiendas concoctiones, sedandosq; coli dolores. Radix eius pectoris laterisq; dolores & cruditates iucundo sapore discutit. Manuscriptus herbarius facultatem habere dissoluendi, digerendi, & obstructions tollendi scribit. Fomentum idem ex uino decoctiones eius menses ciere. Contra uenena tritam cum uino sumptam ualere. Concoctionem præterea roborare, dolorem uentriculi & intestinorum à frigidityte aut flatibus ortum decoctam in uino sanare ait. Mirificè etiam ad interna uulnera huius herba decoctum confert. Externa uero ex ea collui debent.

## Elichrysum.

## Cap. XLVII.


**E**lichryson quidam chrysanthemon, nonnulli & idama ranton uocant, quo deorum simulacra coronant. ramulū habet candidum, uirentem, rectum, firmum: folia intercedētibz spacijs angusta, abrotano similia: coma aurea lucis, in orbem, umbella rotunda ueluti siccis corymbis dependentibus: radice tenui, nascitur in asperis, & torrentium alueis. Contra serpentium ictus, coxendicum dolores, urinæ stiticia, ruptaq; coma ē uino pota opitulatur, ciēt menses. Sanguinem concretum uētris ac uelica ablumit, pota cum mulso, ieiunis, triū obulorum pondere, sistit destillationes, data in uino albo diluto, uestibus inseritur, ut eas ab erodentiū iniurijs iueatur.

## Elichryson. NOMINA ET EXPLICATIO

Ελὶχρυσον Dioscoridi, Galeno & Paulo Amarantus, officinis & imperitis Stichea citrina, uelut ipsi loquuntur, sticados citrinū. Germani Amarantus purpureus.

manis Rheinblumen, mattenblumen. Helichryson uero dictū, quod ad foliore percussū cōmantibus in orbem florum folijs, fulgorem auri præ se ferat. Alter (duplex enim Amarantus est) purpureus qui hodie flos amoris, et Germanis blümen le von der lieb/ floramor & Samet föhlle dicitur, quibusdam etiam Taufsent schön. Amarantus autem dici ceperunt duo hæc genera, quod flores eorum nunquam marcescunt. Recentiores purpureum amarantum uehementer siccare tradunt, ideoq; cum uino sumptum maxime uero semen, alui fluxiones sistere scribunt. Lutei floribus in uino decoctis, ad lumbricos educendos utuntur, & ad pediculos enecandos in lixiuo coctis.

## Chrysan-





## Chrysanthemum.



## Cap. XVIII.

**C**hrysanthemū aut caltha, nō nullis buphthalmos. herba est tenera, fruticosa, leues proferēs caules, & multifida folia: flores supra modum splendentes, luteos, orbem oculi imitātes, unde buphthalmi nomē traxit, propter oppida nascitur, cuius caules oleris uicē manduntur. flores cum ceratō triti, steatomata discutere produntur, regio morbo correptis, colorē breui reddunt, si sequente lōgo balnei usu, post exitum ebibātur.

## EXPLICATIO.

Græcè χρυσάνθεμον. Latine Chrysanthemum. Officinis incognitum.

Germanis Schmalzblüm à pinguedine, quæ contrito digitis flosculo apparet et Drattblüm et dotterblüm nominatur. Chrysanthemum à flosculis auri splendorē et colorem præ se ferentibus, dictum est. nascitur propē urbes, in pratis humidis, et alijs locis aquosis. Calidum est siccatum.

## Verbenaca.



De re sepius

## Ageratum.

## Cap. XLIX.

**A**geratum fruticosa herba est, palmari longitudine assurgens, simplex, humilis, origano maximè similis, umbellam gerit, in qua flos bullis aureis emicat, elichryso minor. Nomen ei inditū est, quoniam diutissimè flos in sua coloris specie conseruetur. Vis decocti feruens: huius uisæ nidor urinam cit, & uulue duritias emollit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sunt qui Ageratum arbitrantur eam esse herbam, quam supra capite de Heliochryso descripsimus, et amaranthum luteum appellauimus peritioribus indicandum reliquo cui delineationi propius accedat.

## Verbenaca.

## Cap. L.

**P**eristereon, siue uerbenaca nascitur in aquosis. Nomen ex eo duxisse uidetur, quod columbæ circa hanc perquam libenter uersari soleant. dodrantis altitudine & interdum amplius adolescit. folia è caule prodeunt incisa & subalbida, ea singulari ramo, radiceq; sola constat.



\* Verere.  
\* reprimunt  
etc. ad her-  
bā referenda.

re saepius inuenitur. Folia cum suillo adipe recentia, aut rosaceo imposita, uulua-  
rum dolores finire putantur. ignem sacrum illita ex aceto reprimunt\* putrida ul-  
cera cohibent. uulnera glutinant. uetera q̄ ex melle, ad cicatricem perducunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *ωεπισεπεύς* ὀσφίος Latine Verbenaca recta,  
Officinis Verbenaca simpliciter. Germanis *Eisenkraut* Eisenhart.  
Gallis Veruaine appellatur.

Verbenaca recta, id est, *ωεπισεπεύς* ὀσφίος, præsertim uiridis et recens, sed enim sicca, cum radici-  
bus oleo incocta, persusaq; capiti, dolorem eius omnem diuturnum à frigore, aut crassis humoribus o-  
mnium maxime digerit, & caput roborat.

Gal. li. 2. cōp.  
ph. part.

## Sacra herba.

## Cap. LI.



Sacra herba, quæ & peristereon nominatur, ramulos  
emittit cubitales, aut maiusculos, angulosos, in quib;  
ex interuallis folia quercus, sed minora angustiora q̄, eis-  
dem diuisuris in ambitu, colore aliquatenus cæsisio. radix  
lōga, tenuis, flores purpurei, graciles. Folia cū radice in  
uino pota, illitaue, aduersus serpentes possent. eadē dra-  
chma pondere cum thuris obolis tribus, in uini ueteris  
hemina, quadragenis diebus, ieiuno ore, contra reglum  
morbum bibuntur. ueteres tumores & inflammationes  
mitigant. sordida ulcera purgant. Tota in uino decocta,  
tonsillarum crustas abrumpit. oris nomas gargarizati  
cohibet. Aiunt, si aqua spargatur trichinium, quæ madue-  
rit, lactiores conuicius fieri. Datur potandū in tertianis  
febrilib; tertium à terra geniculū, cum folijs circumdanti-  
bus; quartanis, quartū. Sacram uocant herbam, quoniam  
multum ad amuleta, expiationesq; commendetur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *ἰερό βοτάνη*. Latine Verbenaca supina, siue herba sacra.

Officinis consolida media. Germanis *Gilden günsel*, Consolen. Gallis *Console* dicitur.

Caulem habet quadrangulum, lanuginosum, ex quo per interualla folia bina ex singulis geniculis in  
extrematibus laciniata quernis similia, sed minora, angustiora q̄, colore cæsisio, à medio caulis & sin-  
stigma usq; ex singulis foliorum alis flores sex aut septem in purpureo cœrulei exeunt. Radix illi sub-  
est lignosa, quæ multas à se exiguas radices capillamentorum instar per terram late serpentes, prope-  
gat. Gustu astringit, & amara est, ut calidam et siccam esse nemo dubitare possit. Vulnera, ut receptio-  
res tradunt, glutinat. Sanguinis grumos ex casu, uel contusionibus coactos in corpore dissijcit & dis-  
solvit. Præsens remedium est aphthis, & ulceribus in ore serpentibus. Decoctam eius tumoribus  
illitum eos dissijcat. Vfus etiam eius ad intertrigines, ulcera pudendorum, & intestinorum exulcera-  
tiones prodest.

## Astragalus.

## Cap. LII.

\* Pharus.

Astragalus, paruius à terra frutex, folijs & ramis ciceri similis: flore purpu-  
reo, paruo: radice rotunda, raphani modo grandi, quæ adnatas appendices  
firmas habet, nigras, præduras, ueluti cornua inter se implicatas, gustu adstringē-  
tes, nascitur in uentosis, opacis, & in niualibus. eo Memphis\* Arcadiæ scætat. Al-  
uum sistit radix in uino pota. urinā mouet, uetustis ulceribus, sicca efficaciter in-  
spargitur. sanguinem suppressit, ægrè propter duritiā, tunditur.

Astragalus qui à Dioscoride describitur, frequens est in Gallia, rura ciccr montanum uel rusticum ci-  
cer, eorū uerò idiona Cices sauages, ou cices de montaigne nominant, fruticē folio & ramis ciceri simi-  
lē, flore purpureo, paruo, tereti radice, raphani modo grādi, quæ ueluti adnatas habet appendices, præ-  
duras, ueluti cornua inter se implicatas, gustu adstringentes. Inuenitur in petrosis, & locis uento pro-  
flatis. cicerculā esse diceres, nisi radix læua subesset. Germ. *Wrd moren* alij Christiani *wurrt* appellant.

Hyacinthus.



## Hyacinthus.

## Cap. LII.

Medius.



Minor.



Maior.



**H**Yacinthus folia habet bulbi: dodrātatem caulē, minimo digito tenuiorem, herbacei coloris: comā procumbētem, florū purpureorum plenam, incurtam: radicem bulbaceam, quē, ut creditur, pueris cum uino albo illita, pubertatem coercet, & non patitur erumpere, sistit aluum, pota urinam impellit, phalangiorū moribus auxiliatur. Semen adstringentiū est, theriacis expetitur, regium morbum emendat, cum uino potum.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ὕακινθος. Latine Hyacinthus, & ut quidā uolunt, uacciniū. Officinis incognitus. Germanis Grosse bloemerzen blümlein. Gallis uacietum dicitur.

Duplices sunt Hyacinthi, albi & cœrulei, ut ex hoc Columellæ carmine colligi potest. Nec non uel nivosos uel cœruleos hyacinthos, albos uerò non intelligas prorsus candelos, sed eos potius qui, si cū cæteris cœruleis cōferas, pallescere uidetur, quemadmodi pictura affabrè tibi demonstrat. Sunt qui ad etatē hanc differentiā coloris referre uolunt, quorū ego sententiam ueriorē esse existimo, cū enim adolescunt, pallescere incipiunt. Cœruleum autē Hyacinthum nostra triplicē producit, maiorem scilicet, minorē, & medium: in illo enim maiores ac patentiores, in hoc autem minores et quasi orbiculati sunt flores, ut ex eorū pictura cernere licet. Vere mensibus nimirū Februario & Martio, cum uio la purpurea, Theoph. li. 6. d: ἰσρίῃ historia cap. ult. teise, erūpit, hinc Martium florē Germanis dictum esse conijcimus. Hyacinthi radix bulbosa est, ordinis primi in desiccando, secundi uerò completi aut incipietis in refrigerando. Semen autem tertio quadante uis ordine desiccatur, in medio caliditatis & frigiditatis consistens.

Dd 2



## Papauer erraticum. Cap. LIII.

**P**apauer erraticum, quod rhœada uocant, uere quidē in aruis cū hordeo nascitur, flore p̄tinus deciduo, unde & nomen apud Græcos accepit. folia eruce, aut origano, aut cichorio, aut thymo similia spectantur, sed lōgiōra, diuisa, scabra, iunceus ei caulis, rectus, cubitalis, asper: flos sylvestris anemones, puniceus, interdū albus: oblongū caput, sed quā anemones minus: semen rufum, radix lōga, subalbida, minoris digiti crassitudine, gustu amara. Huius capita quinq; aut sex, in uinicyathis trib. ad dimidias decocta, potui dabis quib. somnus exercēdus est. Semina acetabuli mēsurā ex aqua mullāpora, aluū leniter emolliunt. ad idē prestandū mellitis placentulis, & dulciarijs libis admiscuntur. Folia cū calycib. illita, inflāmationes sanant. eorundē fotu & perfulsione, somnus allēcitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Μήκων ἡ πόσις. Latine Papauer erraticum, rhœas.

Officinis Papauer rubrum. Germanis Wild mo. n. glazen/  
Forn rosen, Flapper rosen. Gallis coquelourdeis.

Nos Rhœadis picturas damus. Vnius atq; adeo primi quod eruce folia habet, alterius quod cichorij. florem proferunt puniceum et aliquando candidū. Nascuntur in auenis et segetibus, passim refrigerant ut alia genera papaueris. Recentioribus sacro igni medetur. Mulierum mensura profluuiā cōpescit. Sanguinē enaribus fluentem iccori impositū sistit. Lingua ex decocto eius lota, ardorem faucium sanat. Pudendorum tumores detumescere facit. Temporibus illitum, phreneticis somnū cōciliat. Calidos oculorum dolores luteo impositum mitigat.

## Papauer satium. Cap. LV.

**E** satium papaueris genere, quod hortense est, semen in panē densatur, qui sanis in usu sit, eo etiā ex melle pro sesama utuntur, thyilacitū uocant, capitulū habet longū, & semen candidum. Sylvestre uerō, caput insidens demissumq; & nigrum semen, quod pithitis nominatur, nonnullis tamen & ipsum rhœas dicitur, quoniam eius scapo lacteus succus emanat. Tertium magis sylvestre, & ad medicinas ualentius, multo his lōgius, productiore capitulo. Omnium in cōmune natura refrigeratrix. quare si capita ipsa et folia decoquantur in aqua, somnū fotu cōciliabunt. bibitur decoctū cōtra uigilias. Calyces cū polēta triti, & cataplasmatibus admisti, ignibus sacris, & inflāmationibus presunt, trūduntur quoq; uirides, & digeruntur in pastillos, qui siccati ad usum recondunt. Capita quoq; per se in aqua coquuntur ad dimidias, iterumq; adiecto melle, dū humor coeat in eclegmatis lentorē. id medicamentū intus, arteriæ fluxionibus, et coeliacorū affectu, doloris leuamentū prebet. efficacius tamen redditur, addito hypocistidis succo & acacia. Papaueris nigri semen tritū cum uino bibitur contra citā aluum, & foeminarum profluuiā, inperuigilijs fronti tēporibusq; illinitur, ex aqua. Opium eius magis refrigerat, inspicillat, siccatur. sumptū erū magnitudine, dolorem finit, conco-



Papauer satium.





nit, concoquit, & somnū allicit. tussi atq; coeliacorū ualeitudinī auxiliatur. uerūm si copiosius hauriatur, nocet, cū lethargicos efficiens interimat. ad dolores capitis cū rosaceo perfusum efficax est. aurī dōlōrī, cum amygdalino, myrrha, & croco instillatur. inflāmatiōib; oculorū cū torrefactō \* ouī luteo proficit: igni sacro et uulnerib; cum aceto: podagris, cū lacte mulieris & croco. somnū accerit, subditū sedi pro balano. Optimū habetur graue, & densum, gustu amarū, odoratu sopori ferū, quod facile aqua diluitur, laxue, candidū, neq; asperū, neq; grumosum, quod inter colandū non ut cera coeat, & in sole diffundatur: dein admotū lucernis, nō atra luceat flāma: extinctū deniq; odoris uim conferuet. Sed opion glaucio, gummi, aut syluestris lactuca succo, adulterant. Verū glaucio fucā tū in dilutione croci colorē reddit: lactucaceo succo fictum, exiliter spirat, et asperius spectatur: gummi uitiatū splēdescit, et infirmū est. Nec desunt quī eo demētīe deuenerint, ut adipem ei admiscerent. Fictili nouo torretur ad oculorū medicamētā, dū mollius atq; rufius appareat. Diagoras, ut Erasistratus autor est, usum eius dānauit, oculo rū lippitudinibus & aurium uitijis infundī uetans, quonīa uisus aciem hebetaret, et soporē gigneret. Addidit Andreas, illitōs eo, prius excorari, si nō adultera retur. Mnesidemus usum duntaxat olfactandī probauit, quonīa ad conciliandū somnū cōueniret, alioquī nobis ut noxiō interdicit. Quē cōmentitia esse, experimēto deprehēduntur. siquidem effectus, uiriū huiusce medicamenti fidē faciūt quare non alienū fuerit scriptis mandare, quonā modo is excipiat succus. Alii quī capita ipsa & folia tundunt, & praelo exprimūt, terentesq; in mortario, digerunt in pastillos, id meconīū uocāt, multū opio ignauius. Porro opij faciūdi ratio hęc est. Cū ros in eo exaruerit, cultro decussatū in stellas, ne penitus adigatur, ex obliquo in rectum summam cutem incidere oportet, lachrymam exeuntē digito in concham abstergere, nec multō post redire, ut concreta inueniatur, etenim quē tū, aut postero die etiā offenditur, in uetere pila teri, debet, & in pastillos cogi. Cū tamen inciditur, retrocedendum est, ne uestibus succus deradatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcē Μῦνον κινναῖος. Latine Papauer satium. Officinis Papauer.

Germanis Magsamen/moen/olmag. Gallis dupaut dicitur.

Plura Papaueris genera hoc capite Dioscorides recenset, sed quo clarius horū generū discrimen habeatur, sciendū est papauer prima sui diuisione secerni in satium & agrestia. Et satium iterum tria genera esse; unū propriē, per se & uerē satium appellatū, quod Dioscorides ab utrisq; formatylacite, id est utriculariū, Plinius candidū, Apuleius usuale & folliculosum uocat, cuius semē in sanitatis usu panis inspersum cōpimēbatur, & cū melle in secunda mensa apud antiquos edebatur, Dioscoride tesie et Plinio: quē causa etiā est, ut usuale sit uocatū ab Apuleio, quemadmodū a uasculi ipsius in follis sine utris modū formati effigie, folliculosum. Alterū genus est quod Dioscorides syluestre et a dolij forma pithite, id est, doliare et rhœada. Plin. nigrū, Apuleius agreste, syluaticū & rhœada uocat, & ex hoc opion fiebat et meconū. Tertiū genus est hys syluestrius & medicamentosus, quod Plinius contrā quā Dioscorides & Apuleius tradiderunt, rhœada a Græcis, a nostris erraticū uocari dicit. Et hęc duo posteriora genera, natura quidē agrestia sunt, humano tamen opere, studio & usu tantū satia fiunt, quale est ceratites, id est corniculare, & aphrodes, id est spumeū beracleūq; uocatū. Inter quē tamē omnia satia, et agrestia mediū genus est, ut tradit li. 20 Plin. quod nisi in aruis esset, spōte nasceretur. Rhœa uocauimus & erraticū, quod quidā excerptum protinus cū toto calice mandunt. Et hoc est quod inter satia tertio loco numeratū est, ceu ex descriptione & historia ipsius apud authores manifestū patet, omnibus in hoc concordantibus & de ipsa consimiliter tradentib; Diosc. cap. precedentiē antequā hoc loco de satino ageret. quare inter satia non opus erat Diosc. descriptionē ipsius repetere. Theophrasto quidē li. 9. de plantarū historia. Itē Plinio naturalis historie li. 19. cap. 8. & Apuleio cap. 53. Qui uolet habet loca unde illa requirat. Sed de his nunc satia.

Opium est lachryma ex inciso papauere nigro defluens, hodiē etiā ex albo distillat. Ex Apulia defertur: refrigerat, siccāt, inspissat. Dioscori. incidendi & colligendi modum docet hoc loco. Praefertur Thebaicum, Hispanicum opium usurpatur lib. 7. comp. ph. particul. Opium calidis dispositionibus medetur, ut alterum et similia; medicamentis additur ad sedandum dolorem, somnū conciliandum, siccandū.



Opium etiā stomachicis miscetur ad sensum stomachi hebetandū, & somnum conciliandū. Vebemēti autem refrigeratio ex opio, corrigitur castoreo, pipere, et similib. Opij drachmas duas arteriaca 144 miscet Andromachus. Cū multi sunt ὀπιοί, id est, liquores, solus papaueris ὀπός, neutro genere ὀπός a medicis propriē nominari solet. Opū omnū quæ sensum stupefaciunt, & somnū torpidū inducunt, ualētissimū est, lib. cod. Μυκόνιον & μύκωνος ὀπός, succus ex folijs & calyce papaueris tussis expulsiuus, pro Opio a multis supponitur, alia eius adulterina hoc loco Dioscorides, Μύκωνος ὀπός, & μύκωνιον diuersa facit Aesclepiades apud Galenum lib. 2. antid.

## Corniculatum papauer.

## Cap. LVI.



**P**apauer ceratites, id est, corniculatum, folia habet candida, hirsuta, uerbasco similia, in ambitu syluestris papaueris more ferrata: caule non dissimili: flore pallido: calyculo foenigraei, in corniculorū modum inflexo, unde nomen mutuatur. semine papaueris, pusillo, nigroq; radice per summa cespitū nigra, crassa, nascitur in maritimis & asperis. Radici ea uis inest, ut in aqua decocta ad dimidias coxēdi cū et iecinoris affectus potu sanct, prodest his qui crassa quēdam, aspera, aut arenosa cum lotio reddunt. Aluum leniter purgat semē, acetabulo in aqua mulsa potu. Cruistas emarginant, illita ex oleo folia, floresq; argēma ac nubes iumentorum peruncias abstergūt. Sunt qui glaucium, hoc papaueris genere facitari existimarunt, falsi quādam foliorum cognatione.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Μύκων κερατίτης. Latine Papauer corniculatum.

Officinis Papauer cornutum.

Germanis Gel maggsamen / gel smagen / oder moen.

Herbarij quidam haud propriē memitham uocant, quidam glaucion, alij paralion, sed perperam.

Papauer corniculatū nominatū quidē est à fructu leuem inuersionē habente, ueluti et foenum graecū, ut bouis cornu simile esse uideatur, habet uim incidendi & abstergendi. Dioscorides in maritimis, & asperis locis prouenire ait. In Germania passim in hortis seritur, cum tamen etiam citra culturam in monte prope oppidum Oppenheim uocato, ad Rhēnū sito, Germanis Der rotberg, copiose proueniat. Vidimus etiam papauer cornutum proferre flores rubros aut puniceos.

## Spumeum papauer.

## Cap. LVII.

**A**liud papaueris genus aphrodes, id est, spumeū uocatur, ab alijs heracleū, caule dodrantali. folijs admodum paruis, radicle similib. fructu inter eacandido. Nam herbula alba est, & spumea tota: radice in summo cespite. Legitur estate semen, cū integrē adoleuit, decidiitq; exiccātū. Datū acetabuli mensura in aqua mulsa, uomitione expurgat, priuatim huiusodi purgatio comitialibus pdest. Hæc herba hodie incognita est.

Hypocum.



## Hypecoum.

## Cap. LVIII.

**H**ypecoon, aliqui hypopheon uocant, nascitur in segetibus aruisq; folijs ru-  
ta, exilibus ramis. Natura eadem quæ papaueris succo,  
Et hoc quod sciam, hodie nemini cognitum.

## Appollinaris, siue hyoscyamus.

## Cap. LIX.



**H**yoſcyamus, frutex eſt caules emittens craſ-  
ſos, folia lata, oblonga, diuiſa, nigra, hirsuta,  
flores è latere caulis ordine prodeunt, tan-  
quam puniceorum cytini, ſcutulis ſepti ſeminum  
plenis, ut papaueris. Tres eius differentiæ: una ſe-  
mine nigro, floribus penè purpureis, ſimilacis fo-  
lijs, cytiniſ præduris & ſpinofiſ. alterius ſemē ſub  
flauum, ut irionis. flores lutei. folia & ſiliquæ ſim-  
plicioreſ. ambo infantiam gignunt & ſoporem, i-  
deo in communi uſu damnantur. tertium genus,  
ut quod mitiſſimū eſſet, medici recepere, pingue,  
lanuginofum, molle, candidi floris ſeminisq; in ma-  
ritimis ruderibusq; naſcens. cuius occaſio ſi nō ad  
ſit, ruſum uſurpari oportet. niger, ut deterrimus,  
improbatur. Recent ſemine, caulibus folijsq; tu-  
ſis, ſuccus in ſole exprimitur, & exiccato humore,

uſus ad annum uſq; prorogatur: nam facile corruptionem ſentit. Extrahitur et-  
iam ex ſicco ſemine ſeparatim in aqua calida tuſo, & expreſſo. liquamentum au-  
tem ſucco lacteo præſtantius eſt, & magis dolores finit. Contuſa herba recens, ad  
dita trimēſtri farina, digeritur in paſtillos, & reconditur. Liqumētum primum,  
et quod à ſicco ſemine exemptum eſt, collyrijs quæ doloris ſenſum auſei unt, com-  
modiſſimè inſeri ſolent. contra acutas calidasq; fluxiones, dolores aurium, atque  
uulſæ mala, proſunt, cum farina autem aut polenta, oculorum, pedum, cætera-  
rumq; partium inflammationes placant. Semen eadem præbet, tuſſi, deſtillatione  
nibus, oculorum fluxioni, & doloribus, efficaci, contra menſium abundantiam, &  
erumpentem aliunde ſanguinem, oboli pondere cum papaueris ſemine, & aqua  
muſſa, bibitur. podagris ſubuenit, teſtibus inflatis, mammisq; uumentibus à par-  
tu, tritum ex uino illinitur. alijs quoq; cataplaſmatis, quæ doloris leuamentum præ-  
ſtant, amiſceri ſolet. Folia omnibus medicamentis dolorem ſe dātibus, per ſefe,  
& ex polenta, utiliſſimè imponuntur. recentia ad mitigandos omne genus dolo-  
res oblinuntur, cum uino terna, quaternaue pota, ſanant algidas febres, quas epia-  
los uocant, cocta olerum modò folia, ſi acetabulī menſura manduntur, medio-  
crem infantiam gignunt. idem efficere tradunt, ſi colo ulcus ſentiente inſundantur.  
Radice in aceto decocta, dentes in dolore colluuntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *ὑοσκόμαρος*. Latine Hyoscyamus Apollinaris, Plinius Altercum uocari teſtatur.

Officina corrupte luſquiamum. Germanicè Wilsen, & Wilsenſtaut.

Gallicè de la Hanebane appellatur.

Ceterum quod ad nominis Apollinaris rationem attinet, ſciendum hoc nomine inſignitam eſſe hanc  
herbam, ab Apolline Medicinæ deo facta nomenclatura, idq; ob eam cauſam, quod dolorib. mitigandis  
quaſi diuino beneficio & ab Apolline conceſſam uim habeat: quæ cauſa etiam fuit ut à quibuſdam Py-  
thionon à Pythio Apolline, & *ὑοσκόμαρος*, id eſt, *duos κόμαρος*, hoc eſt, Iouis ſaba, appellata ſit. Hyo-  
ſcyamus uero, id eſt, ſaba porcina dicta eſt ut Helianus reſert, quod paſtu eius cōuellatur ſues præſenti  
mortis periculo, niſi copioſa aqua ſtatim ſe foris & intus proluerint. Symphonica quoq; diſtione Græ-  
ca Latinis tamen uſitata quibuſdam appellatur, ceu Dioſcoridis interpres Marcellus Vergiliuſ ſuſpi-  
catur & credit, quod quemadmodum ad Muſicem, quæ ſymphonia cōſtat, & ſymphonia etiam dicitur  
in hydraulicis organis, quæ à Vitruuio, lib. 10. architecturæ deſcripta ſunt, regulæ duæ ſcalari formæ



creta cymbalia, quædam deinceps disposita sustinebant, quibus deinde spiritus & aqua impetu pulsus  
modulatio fiebat: sic in caulibus herba huius extur illi dispositi deinceps symphoniaci instrumenti illo  
lius imaginem aliquam ostenderent. Hyoscyamus Dioscoridi & Galeno triplex, primus flore purpureo  
rascens, semine nigro, uenenosissimus: alter flore & semine luteo, mitior, sed etiam deleterius: tertius  
flore & semine candido, ad sanationes aptissimus, frigidus ordine tertio, siccius primo.

## Psyllium.

## Cap. LX.



**P**syllion folijs coronopo nō  
dissimilibus, hirsutis, longi  
orib. sarmentosa scæni modo, in  
totum herbula: ramis dodran-  
talibus, coma à medio caule exo-  
ritur, duobus tribusue conuolu-  
tis in cacumine capitulis: in his  
semine duro, nigro, pulicum si-  
mili: unde & nomen. in aruis  
& incultis nascitur. Vis ei ad  
refrigerandum, inspissandum,  
& molliendum conueniens, ar-  
ticulorum morbis, parozidib.  
tuberculis, tumoribus, uulsi-  
\* illitum auxiliatur. imponitur  
in dolore capitis, cum rosaceo,  
aqua, aut aceto. enterocelis in-  
fantium, & prominenti umbi-  
lico, illitum ex aceto medetur.  
teritur acetabuli mensura, & in  
aquæ sextario madefactum, ubi  
concreuit aqua, illinitur si-  
quidem uehementer refrige-  
rat, & in feruentem aquam de-  
iectum calorem reprimat, con-  
tra ignes sacros efficax est. Fa-  
ma est, si uiuens domum impor-  
tetur, nō sinere in ea pulices ge-  
gni, cum adipe tusum, sordida  
ulcera, & quæ cacoëthe uocan-  
tur, expurgat. Succus uermicu-  
loso auribus, aut fluxione lae-  
borantibus, ex melle prodest.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *Ψύλλιον*. Latine Psyllium. Officinis nomen retinuit.  
Germanis *Welscher flöhe saamen*. Gallis *L herbe à pulce*.

Psyllium dictum, ut Dioscorides tradit, quod semē habeat effigie pulicis, humido sicco temperatum.  
frigidum ordine secundo: ne putes cum Arabibus corticem frigidum gradu quarto, medullam gradu  
quarto calidam.

Hæc herba olim Germaniæ peregrina, hodie in hortis sæta passim copiose prouenit.

Hortense




## Hortense solanum:

## Cap. LXI.



Morion Theophrasti.



Halicacabus.



**H**ortense sola-  
num, frutex  
cibis idoneus, exi-  
lis, pusillus, mul-  
tis concavus alis:  
folio nigro, maio-  
re quam ocini, et  
latiore, fructu ro-  
tundo, viridi, qui  
post maturi. acem  
nigricat, aut fulue-  
scit. herba innocē-  
tis gustus. Natu-  
ra ei refrigeradi,  
quare folia ulceri-  
bus qua serpunt,  
& ignibus sacris,  
conuenienter cū  
polline polente il-  
linuntur. ægilo-  
pia, capitisq; dolo-  
res, trita & imposi-  
ta per se sanant. æ-  
stuantī stomacho  
auxiliantur, paro-  
tidias, cum sale de-  
trita, illitu discuti-  
unt. Valet succus

eius aduersus ignem sacrum atq; ulcera qua ser-  
punt. cum cerussa, rosaceo & argenti spuma, ad  
ægilopas. cum pane, infantium adustioni, quam  
syriāsin uocant, cum rosaceo perfusus proficit.  
in collyrijs, aque uel oui uicem exhibet, contra  
acutas fluxiones illitus. aurīū dolori instillatus  
prodest. Mensium abundantiam sistit, in uelle  
re subditus. succus fuluo gallinarum corallium  
fimo subactus, & linteo appositus, ægilopis præ-  
sentaneo est remedio. Est & aliud solanū, quod  
peculiari nomine halicacabon, id est, uescariam,  
aut physalida uocant, folijs antedicto latioribus.  
cuius caules, posteaquam adoleuerunt, prona  
terram spectant folliculis orbiculatis, fuluo in-  
tus acino, uesiculis simili, rotundo, laui, quo co-  
ronarij utuntur, & corallas faciunt. Vim u-  
sumq; hortensis solani habet, uerum cibis ne-  
quaquam expetitur, regium morbum purgat,  
semine poro. & urinam pellit. Ex utraq; herba  
succus extrahitur, qui siccatus in umbra, recon-  
ditur, ad eadem ualens.

NOMINA



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Solanum hortense, siue satium & urbanum, Græcè Στόνχυν & κηπὸν. Officinis corruptè solatrum. Germanis *Wils chyschad*. Gallis *morella* dicitur.

Aliud solanum quod peculiari nomine Græcis Στόνχυνος & λινδναβος, Latinis *Vesicariū*, seu *Vesicaria*, Officinis *Mauritanos* sequuntur *Alcaqueng* dicitur, corrupto nimirum Græco uocabulo, Germanis *Juden Firssen* / *Juden töckle* / *Schlotten* / & *Boberellen* / Gallis *Concret* dicitur.

Hortense solanum uulgo cognatum in hortis & satis omnibus prouenit, acinis racematim coeuntibus, rotundis, primum uiridibus, à maturitate nigris aut rubris. A multis nationibus estur in holere. Sullatitius eius liquor, hodie nullam non incandescens ardentibus inflammationem restinguit. Aliqui uesicariam dici putant, quòd folliculi speciem uesicarum imitentur, uel quòd uesicæ calculi medeantur. Calculosi enim cum uuis maturis acinos miscent, ut uinum habeant acinatitium. Germanis cum *Rappis* oder *beerwein*, contrarium & uesicæ mala. Hoc propinatum magnam arenularum uim deturbat.

## Solanum somniferum.

## Cap. LXII.

Solanum somniferum, aliqui etiam *halicacabon* appellant, fructu multo raris, densis, caudicosis, fractu contumacibus, pinguium foliorum cotoneæq; mali similibus, flore grandi, rubro, fructu in folliculis crocato, radice longa, subrubro cortice uestita, nascitur in saxis, non procul à mari. Radicis cortex, in uino drachmæ pondere potus, somnificam uim habet, opio mitiorem. Semen uelementer urinam cit. Corymbi duodecim hydropicis dantur, si quid numero adijciatur, alienationem mentis faciunt. Remedio est aqua copiosa mulsa, potui data. Succus pastillis inferitur, & medicamentis quæ doloris leuamentum præbent, decoctus in uino, si in ore contineatur, dentium doloribus auxiliatur. Radicis succus cum melle illitus, oculorum hebetudines tollit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Στόνχυνος ὕπνωτικός, id est, Solanum soporiferum, id dormitorium uel marinum cognominant Germani *Schlaffwurt* uocant, ea non est quam *Fuchs* hoc nomine depinxit, folio iuglandis, caule scipionis crassitudine, procero, grandioribus ramis brachiato, flore inferius herbaceo, labris suæ per nê purpureis, bacca primum uiridi, loculosa, per maturitatem nigra, quæ dehiscens, uel sponte dissiliens ostendit acinosum semen, uix modo aceruatim collectum, quibus myrri foliolis, stellatim decussatis, baccam fulicemibus, huius genuinam nomenclationem & picturam quare cap. de mandragora.

## Manicum solanum.

## Cap. LXIII.

Solanum manicum, aliqui *perison*, alij *thryon* appellauere. huic folium eruce simile, maius aliquanto, satis acantho, quem *pederota* uocant, accedens. caules à radice proceros emittit decem aut duodecim, ulnæ altitudine adulescentes: caput in cacumine oliuæ figura, sed ut platani pilulæ, hirsutius, uerum maius, latiusq; florem nigrum, postquam eo exiit, racemus exit rotundus, niger, denis aut duodenis actinis constans, similibus hæderæ corymbis, ut uuæ mollibus, radice firmatur candida, crassa, caua, cubitali, gignitur in montibus, uento perflatis, & planetis. Radix drachmæ unius pondere pota ex uino, facit species uanas, imaginesq; non inuicundas obuersari, sed duplicatus hic modus, ad treis usque dies mentis alienationem affert, quadruplicatus, interimit. Remedio est aqua mulsa copiosius pota, & uomitione reiecta.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

*Manicon* & *Manice* uocatum est quasi furiosum siue furiale, eo quòd furorem excitet & insaniam facit, paruo etiam succo: quanquam & Græci authores in iocum uertere, ut scribit *Plinius*, drachmæ enim pondere lufum pudoris gigni dixerunt, species uanas imaginesq; conspicuas obseruari demonstrantes. Duplicatum hunc modum legitimam insaniam facere. Quicquid uero adijciatur potendi, representari mortem. Et hoc de radice testantur *Dioscorides* & *Theophrastus*.

## Dorycnium.

## Cap. LXIII.

Dorycnion *Cratæus* *halicacabon*, aut *caleam* uocat. frutex oleæ nuper prodeuntis similis, nascitur in petris, non procul à mari, ramis cubito minoribus, folijs



folijs oleæ similibus colore, minusculis, firmioribus, præter modum scabris: flo-  
re can lido. filiquis in cacumine, ceu ciceris, densis, rotundis, quinis intus aut se-  
nis seminibus, exiguius magnitudine, leuibus, firmis, uersiculoribus, radix ad  
digni crassitudinem & cubiti longitudinem adolefcit, id somniferum esse cõstat.  
Copiosius haustu. n. mortem adfert. Nec defuere qui dicerent, semen in amato-  
ria experi.

NOMINA ET EXPLICATIO.

*Halicacabus peregrinus.*

*Stramonia.*



*Dorycnion* appella-  
ta est hæc herba ab in-  
fatione, quæ Græcis  
Κυῖος dicitur, et à fir-  
ratæ lancearum cuspi-  
dibus, quas iisdem dora-  
ta uocant, eo quod suc-  
co ipsius etiã cuspides  
in pralijs tingrentur,  
& inficrentur, non  
minus quàm alterius,  
quod furiosum pro-  
priè dicitur, & insani-  
am facit, solanum: de  
quo sic scribit Plinius:  
Hoc est uenenum quod  
innocentissimi auctores  
simpliciter dorycnion  
appellauere, ab eo quã  
cuspides in pralijs tin-  
geretur illo passim na-  
scente &c.

Cæterum plantatur hodie in Germaniæ hortis a-  
liæ duæ herbæ ex Italia allatæ, quarum nemo antiquo-  
rum scriptorum, quod e quidem sciam, mentionem fecit.  
primam Itali Stramoniam, & pomum spinosum appella-

lant, & inter Solani species numerant, non quod descriptioni respondeat, sed quod eius folia opij odo-  
rem referre uideantur. alterum planca est pergulis operiendis aptissima, lauis, enim suis clauiculis sese  
diffundit, folia habet oblonga, & laciniata. Flores candidos, uesiculas Halicacabo similes, in quibus se-  
men includitur pisitis aut ciceribus simile, in cuius medio effigies ueluti cordis insculpta & incisa ma-  
net: nos discriminis gratia Halicacabum peregrinum appellauimus, Welsch schlitten Germ.

Hoc loco harum picturam inferre libuit, ut alijs occasione daremur cogitandi de his plantis, ui-  
dentur enim uiribus parum à solani generibus distare.

*Mandragoras.*

Cap. LXV.



**M**andragoram aliqui antimalum, alij circæam  
uocant, quoniam uideatur radix ad amatoria  
conducere. duo eius genera: niger, quæ fœmina exi-  
stima tur, thridacias appellatus, angustioribus folijs,  
ac minoribus quàm lactuca, graueolentibus, in ter-  
ra sparsis, mala gerit forbis\* similia, pallida, odora-  
ta, in quibus semen ueluti pyrorum, radicibus inhæ-  
ret bene magnis, binis, ternisue, inter se conuolutis,  
nigris foris, intus albis, crasso cortice uestitis, ue-  
rum is mandragoras caule uiduus est.

Alter candidus, qui mas dicitur, nonnullis merion  
uocitatus, huius folia magna, alba, lata, læuia ut be-  
tæ; mala quàm alterius duplo maiora, colore in  
crocum

\*Otorum lu-  
teis.



Dollkraut / Schlaffkraut.



gmata sine exulceratione delent, si quibus senisue diebus sensim perfricentur. folia seruantur in murijs eodum ad usus. Trita radix ignibus sacris ex aceto, & ser-  
pentium ictibus ex melle aut oleo, medetur. strumas atq; tubercula, cum aqua dilu-  
sipat. articulorum cruciatus, cum polenta sedat. Fit citra coctionem uinum e cor-  
ticis radicis, ad hunc modum: Ternæ minæ in uini dulcis metretam coniiciuntur.  
Dantur ex eo ternicyathi, ijs qui secari aut amburi debent, ut antè dictum est: si  
quidem nullo tunc afficiuntur dolore, sed ueterno quodam pressu, torpescunt. Ma-  
la soporem afferunt olfactu, & etiam si mandantur. item expressus ex eis succus.  
nimio tamen odore percussus, obmutescunt. Semen malorum potum uulvas pur-  
gat: appositumq; cum sulphure ignem non experto, rubra foeminarum profusa  
uia sistit. Scarificata punctisq; multifariam\* aperta radice, erumpens lachryma ca-  
uo uase recipitur. liquamentum autem succo lacteo præstantius est: sed non ubi-  
que, ut experientia docet, radices lacteum succum delachrymant. Alium tradit  
esse mandragoram, nomine morion, in opacis iuxta specus enatum, folijs albi mā-  
dragoræ, minoribus, albis, dodrantalibus, radicem ambientibus: quæ mollis est  
& candida, paulo maior palmo, pollicemq; crassitudine æquat. Tradunt eam in  
pane,\* ossa obsoniue, drachmæ pondere deuorata, usum rationis interciperi.  
Obdormiscit enim homo, eo ferè quo comederit habitu, sensus impes, ternis qua-  
ternisue, ex quo data est, horis. Hac medici utuntur, cum scindendi, urendiq; ne-  
cessitas adest. Antidotum esse uolunt radicem, cum maniculo solano potam.

NOMINA

\*In testudi-  
nis morem.

\*Polenta.



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè μανδραγόρας. Latine Mandragoras.

Officinis mandragora. Germanis Allraun.

Gallis de la mandegloyre appellatur.

Duo Dioscoridi & Plinio, Mandragore sunt genera. Mas candida est. μῶριον Græci uocāt, huius hic effigiem damus, fœmina nigra, Græcis ἑπίδ' αἰτίας, à similitudine foliorum appellata. Theophrastus autem lib. 6. de historia plantarum capite secundo, tertium quoddam genus Mandragoræ constituit, cuius fructus sit μέλας, ὑγροῦ δ' ὄντος, καὶ οἰώδους τῷ χυμῷ, hoc est niger, ancinosus, & succo uinosus, huius picturam quoq; damus, Germani Dollkraut & Schlawber appellant.

Mandragoræ maris ceu præstantioris, cortex crassus. lino trahitur ad usum suspenditur, refrigerandi ualensissima, ut ordine tertio, & siccandi primo. Gal. lib 7. simp.

Mala insana.

Nec sunt hoc loco prætereunda silentio, mala insana uulgo uocitata, quæ Hermolaus Barbarus in suo Collario, Mandragoræ speciem quæ Morion uocāt, attribuantur &c. Quam tamen sententiam cur non probem facit, præcipue quod Morij fructus letalis sit, mala uero insana minime. de his pomis tam nihil ueteribus fuisse scriptum de sino mirari, quod multa huiusmodi reperio, sicut permulta quondā fuisse, quæ hodie uel ignorantur, uel certe non habentur. Galli amorum poma, Germani Melanzan nomināt. Mala ergo insana è frutice uulgari dependent, qui Perjonaccan. frondibus & caule prorsus æmularur, is passim nascitur folijs propè ficulneis, flore oblongo, specioso, candido, fructu pomi magnitudine, in orbem absolutū curuato, colore uel puniceo, uel niueo in quibus cartilago gravis interceppta, cucumeraceis conimetur quæ edendo fit. Estur uulgo pomum ex oleo, sale, pipere, fungorū modo coctum. Alij ubi paulum inferbuit igni in orbiculos uel taleolas digerunt, & in acetarijs ex oleo, uel pipere & aceti momento mandunt. Salgamarij in muria acida seruant, cibo per hyemem & uerori non ingrato, sed tamē qui ægrius concoquitur.

## Aconitum Caput LXVI.

Aconitum, aliqui pardalianches, alij cāmoron, alij thelyphonon, alij myocitonon, alij theriophonon uocant. folia habet cyclamini, aut cucumeris, tria aut quatuor, minora & subhirsuta. caulem palmo altum, radix scorpij caudam æmularur, & alabastrimodo splendet. Torpescunt, ut fa-

ma est, scorpiones admota radice, stupentq; qui rursum hellebori contactu exci-  
ratur. oculorū medicamentis leuādi doloris gratia adijcitur enecat pātheras, sues,  
lupos & feras omneis in carnibus obiectū. Est & alterū aconitū, quod aliqui  
cynoctonon alij lycocitonon appellāt. \*Huius genera sunt tria: unū quo utitur  
uenatores, alia duo in usum suum uertere medici è quibus tertium, quod Ponti  
cum nominatur, plurimū in Italia, montibus Iustinis exilit, à priore distans, quo-  
niam folia faciat effigie platani, crebriore diuisura, longiora, & multo nigriora:  
caulem filicis, leuem stylum, cubitali altitudine, aut ampliorem. semen in fili-  
quis oblongis recondit. radices in modum squillæ marinæ cirrorum nigrescunt,  
quibus ad uenationem luporum utuntur. insertæ siquidem crudis carnibus, &  
deuorata, lupos enecant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè παρδαλιανχὲς ἄκονιτον.

Ec





325  
p. 6

DIOSCORIDIS

*Lycostonon, Pardalianches.*

*Uu uersa, uulpina.*



Latine pardalianches, quod Pardi eo necentur, & Scorpiū, quod radicē Scorpioni similē habet. Officinē uuam uersam, & uulpinam. Germani Wolfeber & Dollwurz. Galli de ta lora appellant.

Alterum lycostonon Græcis dicitur, quoniam deuoratū lupos confestim interficit. Officinē Lu pariam. Germani Wulffswurz. Galli pate louine appellāt: hæc in Germania hortis duplex cō spicitur, una flore luteo, folijs latioribus, altera floribus cæruleis folijs subnigris: hæc à florū similin dine, qui galeum repræsentare uidentur Eysenhüttle & Mündskappen appellant. Erosione & putrefactione enecant, Aconita ideo toto genere letalia sunt.

Cicuta.

Caput LXVII.

Cicuta caulem ædit geniculatum, ut forniculi, grandem, in cacumine ramo sum: folia ferula, angustiora, graui odoratu. rami, mox umbellæ in summo prodeunt: flores quoq; albicantes, & semen aniso candidius: radice non alta, con caua. Cicuta letale uenenum est, suaq; ui refrigeratoria necat. Remedio est uini mera culi potus. Succus exprimitur contusis cacuminibus, priusquam semina & comæ siccescant: qui sole densatur in pastillos. multus ad medēdi rationem usus est aridi. commodè miscetur collyrijs quæ leuandi doloris gratia temperantur. ignes sacros, & ulcera quæ serpunt, illitu restinguit. Herba cum coma trita, & res tibus circumlita, libidinum imaginationes in somno compefcit: sed genitale re soluit. lac puerperarū māmīs apposita extinguit. in uirginitate māmās coërctet & incret



Cicutā.



& incrementum non patitur. pueris præstat, ut eorum testiculi cibum non sentientes, intabescant. Efficacissima uis Creticæ, Megarenfis, mox Atticæ, & in Chio & Cilicia nascenti.

NOMINA ET  
Explicatio.Græcè *ῥίον*.

Latine Cicutā.

Officina &amp; herbarij Latini nomen seruant.

Germani Syger Frauct / Schierling / Wütrich.

Galli Cigue, cue, segue appellant.

Dioscorides, Theophrastus, & Plinius uno cicuta sistit, quo sunt contenti. Recentiores faciunt duo genera, aquatica frigoris naturæ, terrestris calidæ: merum quoniam nullum idoneum præferunt autorem, uetere ne, ut ferè solent, hallucinemur. Cicutæ uis est, si Celso credimus excedendi corpora, ut forsitan seminibus & folijs frigida sit potestas, cauli feruida,

ceterum semini, & folijs refrigeratoria uis. Cicutā uenenum est, publica Atheniensium pœna misa, ad multa tamen usus non omittendus.

## Taxus.

## Caput LXVIII.



Smilax à Græcis, taxus à Latinis appellatur, arbor abietis magnitudine, & foliorum eiusdem figura, in Italia & Narbonensi Gallia Hispaniæ contermina nascens. Auiculæ quæ Italicæ taxi baccas deuorant, denigantur: & qui ederint easdem homines, alui pro fluuiio corripiuntur. Narbone tam præsentis est ueneni, ut si qui dormiant sub ea, aut in eius umbra subsideant, lædantur, & sæpè numero moriantur. quare de taxo hæc traduntur, ut ab ea caueamus.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *Σμίλαξ*.

Latine Taxus arbor.

Officinis inusitata.

Germanis Eybenbaum dicitur.

Gallis arbre qu'on appelle yf.

Taxus ad Herciniam syluam satis frequens perpetua fronde, abietis aspectu, sed humilior, alisque frequentioribus sinuosa, folio pinguiore sed molliore, baccis rufis, rotundis, mollibus, gustu non inusuui, radice breui, gracili per summā cespitum. In medicina nullum usum inuenio, præterquam ut suffitu

Ec 2



mures enecet. Sunt tamen qui tradant eius baccis aluum resolui, & altiles & corhortales gallinas sag-  
nari. Arcus apud nos elegantes, & pulchros puniceo ferè colore fabricant qui vulgo *Yben* bögen die-  
cuntur: inde & ea arbor, cuius picturam damus, passim in Germania, *Taxi* nomen sibi usurpat falsò,  
quòd ex hac quoq; tales fabricentur arcus.

## Apocynum.

## Caput LXIX.

\*longis.

**A** Pocynon, siue cynocrambe, brassica canina, frutex est paruis \*uiticulis cõ-  
stans, malè olentibus, lentis, uutiliumq; modo obsequiosis, fractu ferè inui-  
ctis: folio hederæ, molliore tamen, & per extremum acutiore, lento, graui odo-  
re: id luteo succo turget Siliquæ, cœu fabarum, folliculari specie, digiti longitu-  
dine protenduntur, semine intus albo, duro, paruo. Folia cum adipe in panes co-  
acta, canes, lupos, uulpes, & pantheras enecant, in cibo data, & protinus eorum  
coxendices resoluunt.

## EXPLICATIO.

Galeno quoq; Cynocrambe dicitur, Canes & omnes quadrupedes necat, si uestiatur, hodie incogni-  
tum: aliquibus Hippomanes dicitur, hanc, ut Hesiodus scribit, si cederint equi, in furorē aguntur &.

## Nerium, seu rhododendrum.

## Caput LXX.

\*Crassiori-  
bus.

**N** Erion aliqui rhododaphnen, alij rho-  
dodendron uocant, frutex est vulga-  
ris notitiæ, longioribus quàm amygdala fo-  
lijs, asperioribus\*: flore in rosam cõforma-  
to: fructu nuci Græcæ simili, corniculato,  
qui patefactus quandam lanosam naturam  
ostendit, spinarum pappos representantē:  
radice longa, acuta, lignosa, gustanti salsa.  
nascitur in amœnis, maritimis, & secus am-  
nes. Flores & folia mulis, canibus, asinis, &  
quadrupedum plurimis uenena sunt: homi-  
nibus uerò contra serpentium morsus præ-  
sidia, è uino pota: eò magis ruta addita, im-  
becillæ etiam animantes, ut pecus & capræ,  
si aquam bibant in qua folia ea maduerint,  
moriuntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Νύκτιον.

Latine nerium, rhododendrum, et ut Plinio placet,  
rhododaphne.

Officinis &amp; Barbaris Oleander.

Germanis Olander.

Gallis rosagine appellatur.

Nerium apud nos in hortis ex Italia aduectum plan-  
tatur, folijs lauri nunquā decidētibz, amaris, rosæ flo-  
re leuiter in puniceum uergente, sed modico, fructum  
amygdalæ similem, ueluti cornu, qui dehiscens lineæ  
natura semine plenus est, radice longa, gustu salsa. Si  
Luciano, & Apuleio credimus Huius & flores & fo-  
lia cunctis quadrupedibus perniciofa sunt. Emoriuntur  
autem ueluti comitali morbo corrupti, quod & Alex-  
xandro res in India gerente constitit. Mirum tamen fo-

lia eius quadrupedum uenenū esse, homini uerò contra serpentes præsidium, ruta addita & uino pota.

## Fungi.

## Caput LXXI.

**F**ungorum differentia duplex: aut enim māduntur, aut perniciales sunt. Mula-  
tis de causis uenenoſi gignuntur, ubi uidelicet clauus ferræus, in quo sit rubi-  
go, aut





suauem in iuribus gratiam habent. largius tamen sumpti nocent, & ægrius concocti strangulant, aut cholera morbi citat. Remedio est nitri potus, aut lixiuium cum acidamuria, aut feruifacta satureia, aut origani iusculum. debellatur etiam gallinaei fimi potu ex aceto, aut eiusdem delinctu cum mulle multo. Corpus alunt, sed ægrè dissoluntur, cum magna ex parte integri ipsi, cum recrementis alui reijciuntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *μυκός*. Latine *fungus*. officinae Latinum nomen seruauerunt. Germanis *Schwem*, *Pfifferling*, *reysken*. Gallis *ung champignon*, ou *potiron* dicitur. Aquitanis *ung Mousseron*. Fungi frigidi, pituitosi & mali succi sunt, si Paulo Aeg. credimus ex his boleti, innoceniores sunt, & manifeste qualitatis expertes, probè ad summum elixi. Qui uerò amanitæ dicuntur, secundum post boletos bonitatis locum obtinent. A cæteris abstinere conuenit. Plures enim eorum mortiferi, ut qui uulgo *Stiegen* *schwem* appellantur, ac ipsi quoque boleti, nisi percocti edantur, praesens periculum sepe minantur. Ceterum Præfetes ante omnes laudati, quod procul ab arboribus nati meliore ex terra succo, quam ex arborum pituita gignantur. Superius candidi, inferius nigricantes. De his Horatius in Sermonibus sic decernit: Præfensibus optima fungus Natura est: alijs malè creditur. Et hi boleti intelliguntur, qui inter fungorum genera præcipui habentur, & de quibus lib. 20. cap. numeri eiusdem Plinius tradit. Solum gulæ satisfaciât olim (quamquã hodie cæsulem sine) ob quam quanti olim æstimati fuerint indicat, uel illud Martialis:

Argentum atq; aurum facile est, lenamq; togamq;

Mittere boletos, mittere difficile est.

Plinius pediculos uocat, quibus corpus & caput insidet, & qui terere inhaerentes, boletum sustinent, alij coliculos & thyrso.

Colchicum.

Caput LXXII.

**C**olchicon, aliqui ephemerum, sunt qui agrestibus bulbis uocant, autumnu exitu florem addit croci, candidam: ab eo tempore folia bulbi, sed pinguiora: caulem palmo altum, ferentem rufum semen: radicem foris è nigra rufescentem, quæ delibrata, candida & mollis spectatur, lacteo succo madet, atq; gustatu dulcis inuenitur. bulbis eius mediam habet rimam, fissuramq; qua flos erumpit, plurimum in Messenia, & Colchis enascitur. Ea comesta, fungorum more, strangulando enecat. Hanc autem depinximus, ne à quoquam imprudenter pro bulbo deuoretur: mirum enim in modum saporis uoluptate imperitos allicit. Remedio sunt eadem quæ fungis. bubulum etiam lac potum auxiliatur. itaq; cum adfuerit, non aliud desideratur auxilium.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Serapio hermodactili nomine principio. Dioscoridis Colchicum repræsentat, deinde etiam Ephemerum. Colchicum Græci *Κολχικόν*. Officina

Ec 3





perperam Hermodactylum, Germani Deytloß / Herbstblumen / Zunds hoden / Wildsaffron  
Blüm. Galli Canineca appellant. De omni hoc genere plura in annotationibus, in caput proximē  
sequens, & Musa in examine, & Tagaultius suis in Mesue simplicia annotationibus doctis pariter ac  
luculentis plura.

## Ephemerum.

## Caput LXXIII.

**E**phemerum, aliqui sylvestrem irin appellant, folia habet lilij, sed tenuiora:  
caulem parem: florem candidum, amarum: semen molle: radicem unam, digi-  
tali crassitudine, longam, astringentem, odoratam. nascitur in sylvis & opacis.  
Huius radix dentibus præcipua, si decocto colluantur, folia in uino cocta, discu-  
tiunt tumores, & tubercula, quæ nihil adhuc humidi contraxerunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hermodactyli duo fastigia facit Mesues, unum radice digitali longitudine, quod Ephemerum esse  
videtur Dioscoridis, Galeni, & Pauli: radice oblonga, digitali crassitudine, odoratū, iris agrestis ap-  
pellatū, repellendi, & digrendi facultate præditū. Alterū radice rotunda, & ea foris uel nigra (quod  
Colchicum est ephemerum, & deleterium, prædictis autoribus passim frequens, flore croci per au-  
tumnū erumpente, de quo in capite proximē præcedente) uel rubente, uel alba, ut intus, quam eligit sola,

Hermodactylus officinarum.



Helxine.

si crassa sit, ac modicè dura, & ex loco edito lecta:  
calida sicca initio secundi gradus, stomacho aduer-  
sissima est. Pituitam crassam à iuncturis præsertim  
extrahit, ob id podagras, et ipsi arthritidi prodest,  
per se, uel decocto sumpta, aut etiam admota cū sibi  
na hordei, uittellis ouorum, mica parvis. Hec omni-  
no est quam Hermodactylum uocat, & ab utroque

Ephemerum eparat, ueteribus indicta radix, uti quæ rubens Mesue dicitur.  
An uerò quæ in officinis ostenditur.

Horum sit Hermodactylus, uel Colchicum, discernere nō est difficile his  
qui legunt, aut integras habent radices, nam delibratæ ad nos conuehuntur.  
Canis tamen largam eius capiam depastus innoxie, & multorum tutò hæc radice  
purgatorū experientia quotidiana facit, ut credam uel Hermodactylum  
hunc esse Mesue, & neotericorum, ueteribus indictum, uel saltem non esse  
Colchicum.

Actuariū miror inter purgantia simplicia hunc non descripsisse, cū to-  
ties eius meminerit in compositis medicamentis ἐρμὸς ἀκτυλὸς λευκὸν  
& λευκὸν alicubi appellans, Serapio Hermodactyli nomine principio Diosco-  
ridis Colchicum repræsentat, ut suprā monuimus &c.

## Halxine, id est, muralis herba, Cap. LXXIII.

**H**elxine nascitur in parietinis, sepibus & macerij, fo-  
lia ei mercurialis insunt, hirsuta: cauliculi subruben-  
tes, & circa eos ueluti semina aspera, adhærentia uestibus.  
folia refrigerandi spissandiq; naturam habent, quæ ex causa  
anant illitu sacrosignes, adusta, condylomata, panos inci-  
pientes, tumores, inflammationesq; Succus eius cum ceru-  
sta, ignibus sacris, & ulceribus quæ serpunt, commodè illin-  
tur, imponiturq; podagris cum hircino adipe aut cerato cy-  
prino ueterem tussim emendat instar cyathi haustus, tonsil-  
lis inflammationem sentientibus utiliter & gargarizatur, &  
oblinitur. aurium dolorem cum rosaceo instillatus leuat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἑλξίνη, ἢ περὶ τοῦ τοῦ. Latine helxine, urceolaris, perdicia.

Officinis parietaria.

Germanis S. peterskraut, Tag vnd nacht, quāuñ & alia herba, hoc  
nomine appellatur.

Gallis parietaire dicitur.





Qualis herba sit helxine satis ab hoc descriptum est. Helxine uero dicta est à uerbo Græco ἑλκω, quod est traho, eo quod asperitate sua tenaci nexu uestes quibus adhaerit ad se trahat: habet enim et caules et lappas in quibus semen continetur et folia aspera. Vrecolaria et uiriaria autem est nuncupata, quoniam urceolos et ultra ceteraque uasa pulchre mundat et purificat. Et Germani ob hanc causam à ueteris ipsam Glass Erant uocant. Perdiciam autem uocant à notissima aue perdice, eo quod illa semine eius præcipue uescatur, et herbam eruens in illa uoluitur. Muraris et parietaria Officinis et uulgo dicta à natalibus, eo quod in muris et parietibus nascitur frequens. Monendi sunt hoc loco Medici ut rectum Helxines usum discant nam plerique eam non recte frigidis morbis aut affectibus pro fomento usurparunt, cum refrigerandi constringendique facultate prædita sit. Ceterum cum abstergendi quoque illi facultas insit, potest etiam calculosis et ijs qui difficulter urinam reddant exhiberi potius, si aliquid consimilem facultatem obtinens ei admisceatur.

Alfine.

Cap. LXXV.



**A**lfinen, aliqui anthyllion, nonnulli myos ora uocant, quoniam musculorum aures folia imitantur. Lucis opacisque gaudet, unde alfine dicta est. Hæc erat eadem quæ helxine, nisi humilior esset, & folijs longioribus, nec hirsuta. cum teritur, odorem cucumis reddit. Vim refrigerandi adstringendique obtinet. oculorum inflammationibus cum polenta illinitur. Succus aurium doloribus infunditur. quia & emendat omnia quæ helxine, id est, muralis herba.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Eam esse hodie omnes uerè Eruditi esse arbitrantur, quam uernaculo sermone, Germani Röhrenkraut / Vogels Erant / Zänerserb. Galli mouronen quasi murærem, uel potius muris aurem appellant. Itali pærinam, quod anseribus gratum pabulum subministrat. Auiculas caucis inclusas, cum fastidiunt escæ, aucupes solent hoc cibo recreare, quandoquidè helxine similis est, minoribus tantum folijs minusque hirsutis. In hortis quoque prorepat, et maceris opacisque latatur. Vita semestri contenta. Herba cucumis cum teritur odorem remittit, sed non illam peponis maturi iucunditatem, sed herbaceum cucumeris uirus subolet, quanquam id quod de odore memorant, multis exemplaribus Dioscoridis non legitur.

Lens palustris.

Cap. LXXVI.



**L**ens palustris inuenitur in aqua non fluente, muscus lenticulæ similis, refrigeratoriæ naturæ. Propter quod conuenienter collectionibus, ignisacro, & podagris illinitur per se, & polenta. glutinat & procidentia puerorum interanea.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè φακὸς ὡς τὸ πτερύγεον.

Latine Lens uel lenticula palustris.

Officinis Lens aquatica.

Germanis Wasser linsen / Meer linsen:

Gallis lentille de mer.

Itali Zen appellant.

Lens palustris siue radice conspicitur, sine folijs, etiam si id quod in ea fructificat, sit simile folio, minus habili humore quam ut in eo folium constare possit. Quidam aliud genus, non in aqua, sed uliginosis dilutisque nascens, maius eo tradunt, carens folio, agryam phacam, hoc est syluaticam lentem uocantes,


Be 4



Maius.



Minus.



Medium.

**S**emperuium magnum ideo nominatur, quoniam perpetuò folia uireant. cuius caules cubiti altitudinem implent, interdum excedunt, pingues, crassitudine pollicari, uirentes, characiæ tithymali modo insecti: folia pinguia, carnosæ, longitudine pollicari, in cacumine linguæ similia, alia in terram conuexa, alia in capite stantia inuicem, ita ut ambitu effigiem imitentur oculi. nascitur in montibus, & testaceis. supra domicilia etiam feritur. Eius uis refrigerare, & astringere medentur igni sacro, nomis, ulceribus quæ serpunt, oculorum inflammationibus, ambustis igni, podagris per se, & cum polenta illita folia. Succus capiti, in doloribus, cum polenta aut rosaceo perfunditur. datur in potu contra phalangiorum ictus, dysenteriam, aluiq; profluvia. teretes tincas potus in uino excutit. subditus in uellere, mulierum abundantiam sistit. succus oculorum lippitudinibus, sanguinis uitio conceptis, inungitur. Semperuium paruum in petris, parietinis, & maceris, necnon scrobibus opacis nascitur, caulibus ab una radice multis, tenuibus, crebro foliatis: exilibus folijs, rotundis, pinguibus, mucronatis: caule à medio emicante, palmum alto, umbellam herbidosq; flores & tenues gerente. Folia eisdem cum priore uiribus prædita sunt. Tertium uidetur semperuii genus, quam aliqui andrachnen agriam, aut telephion uocauerunt, Romani illecebram, pusillis, crassibusq; folijs, hirsutis, portulacæ proximis. nascitur in saxis. Vis ei exalfactoria, acris, ex ulcerans. illita cum exungia strumas discutit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

*Sedum maius* Græcè ἀνδροειδές. Latine Semperuium æt enim semper ἀνδροειδές significat. Officinis Latinum nomen seruauit. Germanis Hauswurz. Gallis ioubarbe.

Dioscorides huius tria genera statuit primū cuius nomenclaturam indicauimus. Nascitur in montanis & scilicet. A quibusdam autem in testis domorum feritur. Alterum, in muris & petris, & sepibus, oppidorumq; fossis nascitur situ umbroso, cauliculis pluribus ab una radice, folio denso, minuto, pingui, longo, mucronato, in medio caulis altus palmo, umbellam & florem herbaceum sustinet tenuemq;. Huius folijs eadem quæ sedo maiori natura est. Germani uocant Klein hauswurz.

Tertium



Tertium genus capite de Telephio descripsimus, capite ultimo libri tertij.

Vmbilicus Veneris.

Cap. LXXVIII.

Cymbalaria.



**C**Otyledon, siue umbilicus Veneris, folio est in acetabuli formam tornato, in euidenter concauo, breui in medio cauliculo, in quo semen inest: radice oliuæ modo rotunda. Succus cum uino circumlitus, instillatusue, coniecta genitalia nudat, inflammatio-

nibus, sacris ignibus, strumis, pernionibus, illitu auxiliatur. stomachi ardorem refrigerat. Folia cum radice comesta, calculos frangunt. urinam cient. hydropicis ex melle dantur. Herba utuntur ad amatoria. Est & alterum genus eiusdem, cymbalion aliqui uocant, pinguibus folijs, latioribus, ligularum modo densis, circa radicem medium oculi ambitum describentibus, ut in maiore semperuiuo, adstringentis gustus: cauliculo tenui, in quo flores & semina hyperici: radice maiuscula. Facit eadem quæ semperuiuum.

Vrtica.



#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè κοτυλιδόν.

Latinis Cotyledon. Romanis umbilicus Veneris.

Officinis Vmbilicus Veneris & Cymbalaria.

Germanis Tadelkraut.

Gallis cymbalaris herba.

Folio tenui est, anguloso, hæderacco flore paruo, purpureo, in multis terris nascens, omnino eandem esse puto eam cuius picturâ domus cum & similitudo constuat, & folium hæderæ habuerit, nam ei tribuitur orbiculatum, in euidenter concauum, quod non longe abest ab hæderacco: reliqua paria fieri comperiuntur, nec radix oliuæ modo rotunda, nec natales dissentiant. Alterum genus eiusdem Fuscius falsò Telephium purpurascens facit. hoc Germani uocant Wundt Kraut weible folijs sordidis, latioribus, densis, densioribusque circa radicem uelut oculi cingentes, gustus asperi, in eo flos & semen hyperici à multis genus a'zoi reputatur. Huius usu Hippocrates in cibo femininum sexum concipi, sicut priore masculinum prodidit.

Vrtica.

Cap. LXXIX.

**D**uo urticæ genera: syluestris, asperior, latioribus, nigrioribusque folijs: semine limi, sed minore. altera non æquæ aspera, minuto semine. Folia utriusque illita, canis moribus, addito sale, medentur. gangranas, carceri nomata, sordida ulcera, & quæ cacoethe uocantur, item luxata, panos, tubercula, parotidas, suppurationesque sanant





Gallis del' ortie griesche, ou picquante.

Dioscorides Vrticæ duo genera facit. Vnam asperam, quam hodie Officinæ & Herbarij Romanæ.

Germani Römisch oder Welsch nessel appellant. Huius quidem semine in officinis utendum, non alterius quæ passim in sepibus ac dumetis nascitur. Alterum genus maius est minuto semine, sed ut Dioscorides tradit, non æquæ aspera, hæc nisi ea fuerit cuius picturâ damus, quâ Germani Brennen nessel & heyter nessel uocant, caule uidelicet glabro. aliam in Germania propius delineationi accedentem me uidisse non memini, præter hæc duo genera alia plura inueniuntur, uiribus tamen haud multum à Romana discrepantia, cum haud secus atque hæc pungere uideantur. Vrticæ fructus, id est, semen, et folia præcipue utilia sunt, nam uehementer calfaciunt, tenuium sunt partium, digerunt, phymata & parotidas crassis & lentis humoribus pulmones purgant.

### Galiopsis.

### Cap. LXXX.

**G**aliopsis frutex in totum caulem & folia habet urticæ, leuiora, & quæ grauiorem odorem trita reddant: flore purpureo, tenui nascitur circa sepem, & difficiliorum areas, ac semitas ubique. Folia, caules, semen, succusque, duritias & carcinomata dissipant: strumas, panos, & parotidas discutiunt. oportet bis die tepidum ex aceto caraplasma imponere, & eius decocto fouere, ad putrescentiam, gangranas, & nomas, cum sale effica ceter illinuntur.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè γαλιόψις. Latine Galeopsis urtica labeo, Lamium, anonium.

Officinis urtica alba, & mortua: archangelica.

Germanis taub nessel / weis nessel / Wylsaug.

Gallis Orties mortes appellantur.

Vrticæ quæ iners et mortua uulgo dicitur, herba cognita est, folijs non mordentibus folijs mordacis minoribus

fanant. lienosis cum cerato imponuntur. faciunt ad profusum uenarum, cum succo trita, & naribus indita. menses ciunt, eadem detrита cum myrrha, & imposita. procidentes uulvas, recentia contactu resiliere cogunt. Semen potum ex passo, uenerem stimulat. uuluaque ora patefacit. cum melle delinctum. orthopneæ, lateris & pulmonum inflammationibus prodest. thoracem expurgat. erodentibus medicamentis admiscetur. Cocta cum cochis folia, aluum emolliunt. urinas mouent. inflationes discutiunt. decocta cum ptisana, uitia pectoris extrahunt. mulierum menses euocant, cum myrrhæ modico pota. In inflammatione turgentem uiam, gargarizatus succus exprimit.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè κνίδιον, ακαλφον.

Latine urtica ab urendo dicta.

Officinis Latinum nomen seruauit.

Germanis Nessel.



Urtica mortua.



Senecio.



minoribus, candidioribus, tactu innocentibus, flore albo, luteo, aut purpureo, cauliculos coronante. A multis Galeopsis esse ea herba putatur quae officinis Scrophularia maior, Ficaria, Millemorbia & Castrangula.

Germanis Saw wurz / Däse wurz / Bieun wurz / grofs feygwar gen Erant dicitur. Gallis uero agri palma. namque frutex est thyrsosae fronde urtica leuioribus quae detritae grauem fundant odorem, flore purpureo, cacumine caulis aspero. nascitur propter uias in sepibus & ruderalis. Huic recentiores quoque facultatem tribuunt sanandi ulcera putrescentia, & mariscas. Succum eius mederi deformitati faciei iam ferè elephantica tradit. Semen in expellendis & enecandis lumbricis esse efficacius adiungunt, id quod ab eius amaritudine non abhorret. Non carent matrone in Gallia, uulvae uitio opportuna, namque suo graui odore reuocat, & uelut exanimis recolligit. an haec sit eadem cum Galeopsi peritioribus iudicandum relinquo.

Galion.



Galion. Cap. LXXXI. Galion nomen ex contrahendo lacte, coaguli uicem impleat. ramulum foliumque habet aparinae simillimum, rectum: florem in cacumine luteum, tenuem, densum, copiosum, odoratum. Flos igni ambustus illinitur, sanguinis profluvia sistit. Cerato rosaceo galion admiscetur, insolatum uel quodum albescat. lassitudines reficit, radix uenerem concitat. Nascitur in palustribus.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè γάλλιον.

Latine Gallium uel galium, alijs galerion, alijs galation.

Officinis neglecta & incognita.

Germanis Unser frawen bettstro / Meget Erant / Walsstro uocant. Nomen inuenit à lacte, cui additum pro coagulo est.

Galli petit muguet, hoc est, muschetum minus appellant, quod flos incundo placeat odore. Namque ramulum foliumque profert aparinae simillimum, rectum, florem in cacumine luteum, exilem, densum, frequentem, odore gratum. in aruis & humidis prouenit.

Senecio.

Cap. LXXXII.

Senecio caulicolo est cubitali, sub rubro, folijs continuis, diuisura erucæ, sed minoribus multo luteis floribus, qui celeriter dissecti uanescunt in pappos. nomen uero sibi uendicauit, quoniam flores capillorum ritu, uere canescant. radice superius



superuacua. nascitur maximè in maceris, & circum oppida. Folia cum floribus refrigerant. quare illita cum uini modico, uel per fese, tertium & sedis inflammationes sanant. quin & ex manna thuris medentur cum reliquis uulneribus, tum his quæ nerui acceperunt. Illiti per se cum aceto pappi, idem munus præstant: uerum recentes epoti strangulant. Totus caulis, si coctus in passo potui detur, stomachi dolores à bili contractos perfanat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *ἡγρέζωρ*. Latine Senecio. Officinis scutam cœli.  
Germanis Kreuz wurtz, quamuis & alia herba hoc nomine appellatur.  
Gallis du senecion appellatur.

Thalictrum.



Marinus muscus.



Nomen Græcum inuenit, quòd uere canescat. Callimachus æanthi da appellat, alij pappum. nascitur in tegulis & muris. Nec desicere, qui alterum genus faceret, nec quale esset demonstrarent, dantes contra serpentes bibendū. Sunt qui Senecionem intellexisse Nicandrum putant cum geraon pogenā dixit: quasi hirci barbam: cum uerissimilius sit herbam hirci barbule similem notari quæ uulgo bect's bart dicitur, de qua alio loco diximus.

## Thalictrum Cap. LXXXIII.

**T**halietron folia coriandri habet, pinguiora paulò: caulem rutæ, in quo folia. Quæ trita, illitu antiqua ulcera ad cicatricem perducunt. Nascitur maximè in campestribus.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *Θάλιτρον*. Latine Thalictrum.  
Officinis cotula foetida.  
Germanis Krotten dyll / Steinfend Camillen.  
Gallis l' herbe appellee, argentine dicitur.  
Itali Brisaculo, à sædo odore cognominant.

Nascitur ubique, præsertim in campestribus. Dioscorides rutæ caulem ei tribuit non papaueris, librarijs similitudine uocabulorum deceptis, in quos Plinius incidit. Medentur ulceribus folia cum melle.

## Marinus muscus. Cap. LXXXIII.

**M**arinus muscus nascitur in scopulis, testaceis quæ haud procul à mari, gracilis, capillaceus, caulis expers. præcipua ei spissandi uis. & colligationes cohibendi, & podagras, quas refrigerare opus sit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *Βένωσλαδάσιον*. Hodie uulgo Græci *Σχολεβότανον*. Latine Muscus marinus.

Officinis corallina: quia ut Corallus in aqua nascitur, & eodem cum corallis loco, unde forsitan aliqui falsi, & corallorum folia esse rati, nomen hoc indiderunt. Germani Meer moss uocant. Galli Coralline. plura uide in annotationibus nostris in Cap. XX. lib. primi.

## Fucus marinus. Cap. LXXXV.

**F**uci marini generibus, quoddam latum, & alterum sublongius, & rubens. tertium candidum, nascens in Creta, floridum ualde, quod nulla corruptionis labe polluitur. Omnia uim habent refrigeratioriam, non podagræ modo, sed etiam inflammationibus, in cataplasmatis efficaciter utilem. uerum his uti humidis cōuenit, priusquā exarescāt Nicander.





Nicæder puniceum aduersus serpentes dedit. Hoc fucus quidam putant mulieres fusi colorem mentiri, cum tamen sit radícula eiusdem nominis, qua sese fucant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè φῦκος θαλάσσιον.

Latine fucus marinus.

Officinis incognitum.

Germanis Meergras.

Gallis feullet de mer, appellatur.

Multa complectitur genera refrigerandi uim habet, ut Dioscoridi placet uiribusq; haud multum differunt à nostra palustri lenticula.

## Potamogeton.



## Cap. LXXXVI.

**P**otamogeton, folium beatæ simile, hirsutum, paululum supereminens extra aquam. Refrigerat & in pislis pruriginibus utile, et contra ueterum ulcerum nomas. Nomen ex eo inditum est, quod palustribus & aquis enascatur.

## NOMINA ET EX-

## PLICATIO.

Græcè ποταμόγετον ἢ σαχίτης

Latine potamogeton & Fontalis.

Officinis incognita.

Germanis See balden / Sam

Frant dicitur.

Potamogeton aut quasi fluminibus uicina dicta est: siquidem aquis & palustribus locis nasci amat. Stachyites uero quasi spicata, ob caulem quem ex se mittit floribus & semine spicatum. Astringit & refrigerat similiter Polygono, sed essentia eius crassior quam polygoni est.

## Stratiotes. Ca. LXXXVII.

**S**tratiotes in aquis nascens, hisdem supernatat, & sine radice uiuit: unde cognomen traxit. Herba semper uiuo similis, ni maiora haberet folia, quæ refrigerat. sanguinem qui defluit à renibus, pota sistunt. uulnera quæ inflammationem minantur, intumescere non sinunt. ignib. sacris & tumoribus ex aceto illinuntur.

## NOMINA ET EXPLICAT,

A Græcis celebratur stratiotes. Et ea ut Plinius auctor est, in Aegypto tantum et inundatione Nilî nascitur, atzoo similis, ni maiora haberet folia, hodie planè ignota herba est.

## Stratiotes millefolium.

## Cap. LXXXVIII.

**S**tratiotes millefolium exiguus frutex, palmi altitudine, aut amplius assurgit.


ff



Millefolium.

Digitalis.

Primula veris.



folijs auicularum pennas imitā-  
tibus, breui admodū dissectoq;  
foliorū exortu. folia syluestre  
cuminum simulant, præsertim  
breuitate atq; scabritia, breuiora  
paulò, densiore umbella, &  
pleniore. Surculos in cacumine  
gerit exiguos, & capitula in mo-  
dū anethi: flores paruos, candi-  
dos. Nascitur in asperis agris,  
præcipuè circa semitas. Eximiū  
usus ad ulcera uetera, recētiaq;  
profluentē sanguinē, & fistulas.

## NOMINA ET EXPLICAT.

Græcè Στρατιώτης χιλιόφυλλος.

Latine Stratiotes chiliophyllos.

Officinis Millefolium.

Germanis Garben / Schaffirp /

Schaffgarben / Er Gerwel.

Galli millefulle appellant.

Quibusdam tamen hodie cumini syl-

uaticum, alij anethum syluestre, alij asininum daucum uocant, sed falsū  
si uiro doctiss. Euerbio Cordo credimus qui Stratiote Chiliophyllon no-  
strū esse millefoliū in suo Botanologico clare demonstrat, recētiore quoq;  
ad eodē usū, ad quos ueteres. suum Chiliophyllum, adhibent, ad sanandā nimirum omnis generis  
uulnera, dissoluendū sanguinem concretum, & ad constringendos menses. Vnde à Stratiote millefo-  
lio non esse diuersum omnibus perspicuum sit.

## Verbaſcum.

## Cap. LXXXIX.

**V**erbaſcum differētias summas habet duas, hoc nigrum, illud album: in quo  
mas & fœmina intelligitur. Fœminæ igitur folia sunt brassicæ, pilosiora  
multò, & latiora, candida: caulis albus, cubitalis aut amplior, subhirsutus: flores  
albi, aut ex luteo pallescentes: semen nigrum: radix longa, gustu acerba, crassitu-  
dine digiti. nascitur in cæpestribus. Verbaſcum, qui mas appellatur, oblongius,  
albis folijs, & angustioribus, tenui caule. Sed nigrum prorsus albo simile esset,  
nisi nigriore latiorēq; constaret folio. Syluestre folia fert saluiaz, altas uirgas &  
lignosas, & circa eas ramulos quales marrubium; flores luteos, auri amulos.  
Sunt



Verbascum sylvestre.



Sunt & phlomidides duæ, hirsutæ, rotundis folijs, humiles. Tertia lychnitis appellatur, ab alijs autem thryallis, folijs ternis, aut quaternis, uel paulò pluribus, asperis, crassis, pinguibus, quæ apta ad lucernarum lumina. Radix priorum duarum astringit: quare quod magnitudine ludi crum talum æquet, in alui profluuium conuenienter ex uino datur. decoctum ruptis, conuulsis, fractis, antiquæ tussi, auxiliatur. Dentium dolorem collutione mitigat. Verbascum cui flos aureus, capillos tingit, & quæcunq; abijciatur blattas in se contrahit. Cocta in aqua folia, aduersus tumores, inflammationes oculorum, syderata ulcera, ex uino & melle illinuntur. cum aceto quoque uulneribus medentur. contra scorpionum ictus sunt auxilio. Syluestris folia ambustis igni sunt cataplasmata. Aiunt in folijs eius, quam feminam dicimus, aridos ficus omnino non putrescere.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè φλόμος.

Latine Verbasculum. Candelaria, Candela regis, Lanaria,

Officinis Tapsus barbatus.

Germanis Wull Kraut / Bergen Kraut / Vnholden Fern.

Gallis de Bouillon.

Verbascum omnium ueterum testimonio duo habet summa genera. Candidum enim folijs, alterum nigrum est. Candidum rursus in marem feminam digeritur. Præter tria hæc, & sylvestre habetur, Wilt wull Kraut Germani appellant. Galli de bouillon sauage. sicut etiam uerbascula duo, quæ à nostris Herbarijs herba paralysidis, & uulgo arthetica, Officinis primula ueris uocantur. Germanicè Schlüsselblumen. Gallicè Brachacuculi, & primueria. Horum unum est odoratum, alterum odoris expers. Est & tertium genus Verbasculum ueteribus, quod lychnitis alijs, autem Thryallida appellant. Germani Weys & brunn frauen rosin / & Marten rosin uocant. Hys uer-

basculi generibus annueramus nos ex Cordi sententia eas herbas quas Fuchsius tanquam sibi ignotas nomine digitalis pictas dedit, unam purpureis floribus, alteram luteis, prima digitalis purpurea. Germanicè Brauner finger hat / altera digitalis lutea Gelber finger hat, à florum similitudine appellatur. Omnia Verbasculi genera cum eiusdem sint effectus, Plinius ea distingui superuacuum putat. Priorum duorum radix gustu acerba est, & fluxionis affectibus prodest, folia digerendi uim habent. Sic etiam aliorum folia, potissimum autem eius quæ aureos flores obtinet. Verbasculo odorato (nam in odorum inuitale) recentiores hos effectus assignant. tritum imponitur efficaciter articulorum doloribus. Radicis decocto uescis, renumq; obstructiones soluantur. Ius herbe propinatur & illinitur aduersus rupta, luxata et tumentia. Præterea calidum & siccum esse constat. Lychnidis sup. mentionem fecimus.

## Aethiopsis.

Aethiopsis folia habet uerbasco similia, perquam hirsuta, densaque, in orbem circa radicem imam redacta: caulem quadrangulum, scabrum, similem apiastro, aut arctio, multis concauum alis: semen erui magnitudine, geminum, in uno conceptaculo: radices ab eodem cespite numerosas, longas, plenas, glutinosas gustu, quæ sicæ nigrescunt duranturq; ut cornua possint uideri. pluma nascitur in Ida monte Troadis, & in Messenia. Auxiliatur purulentis ex-

Ff 2



creationibus, ischiadicis, pleuriticis, arteriæ scabritijs, decocta radix & pota quin & cum melle. eclegmatis uicem præbet.

Herba est hodie Germanis incognita.

### Arction.

**A**rction, alij potius arction uocāt, similis est uerbasco folijs, nisi q̄ hirsutis ora & rotundiora sunt: caule longo, molli: semine cumini, paruo: radice tenera, alba, dulciq̄. Decocta cum semine radix in uino, dentium dolorem mulcet, si contineatur ore decoctum. ambusta perniolesq̄ fouentur eodem. bibitur aduersus coxendicum dolores, & stranguriam, è uino.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἀρκτηον. Latine Arction, prosopion mains uel arctum. Officinis Lappa siue Bardana maior. Germanis Klein Fletten. Gallis petite Bardane & gleteron appellatur.

Arction ab urso nomen habet. Hallucinantur qui ungulam Caballinam, Officinis dictam Arction esse sentiant, cū ut supra demonstrauimus, bechion sitet in tu silago quā ungula uocant caballinā.

Personata, siue Lappa.

### Cap. XCII.

**P**ersonata folia habet cucurbitæ, maiora & hirsutiora & crassiora: caulem albicantem, quanquā & interdum uidua (caule reperiatur: radice intus candida, foris nigra. Hæc drachmæ unius pōdere pota, cum pincis nucibus, purulenta & cruenta extulsientibus auxiliatur, trita dolores à contorsionibus artuum contractos, illitu sedat. Folia utiliter antiquis ulceribus illinuntur.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἀρκτηον, ἀρκτηον, πρὸς τὸ ἀρκῶν.

Latine personata, uel personata, arction, prosopion, Dioscoridi arction.

Officinis Bardana maior, Lappa maior in diffinitionem præcedentis quæ folijs est multo minoribus nec ita rotundis.

Germani Gros Fletten Frant / Bächelwe uocant.

Gallis Gloton, Bardane dicitur.

Herba cuius picturā damus folio constat omnium lapparum maximo, parte auersa herbido, aduerso cano, caule oblongo, interdum caule uidua, grandibus lappis quæ transeuntium uolubus adherescit, in quibus flos purpureus nascitur, non euidens, sed occultus intra se germinans, radice grandi, candida intus, foris atra. Digerit simul & desiccatur, sed & astringit nonnihil.

### Petasites.

### Cap. XCIII.

**P**etasites pediculus cubito maior, crassitudine pollicis, à quo prægrā de folium, galeri modo amplum, ceu fungus dependet. Contra phagedænas, & ulcera quæ cacoethe uocant, effica ceter illinitur.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè πετασίτης. Latine petasites herba. Officinis inusitata. Germani Pestilenz wurz appellatur. Petasites à petaso, piliū significante dicta est, q̄ foliū eius pediculo superpositū, petasii modo ampli, ut fungus dependeat. Germanicum nomen ab effectu sortita est experimento. n. comproubatum.





*Desfites, pestilenz wurzel.*



batū, ut uir doctiss. Hierony. Tragum afferit, radi  
cē hanc mirificē cōferre pestilentialibus febribus,  
quod sudorē uehementer moueat, si in puluerē rea  
lacta cū uino sumatur. Nec minori efficacia bia  
bitur à mulieribus quas uteri tormina et præfeca  
tiones exercent. Valet etiā unice ad euocandos lū  
bricos, Succurrit quoq; ijs qui spiritus difficultate  
laborāt. Ducit urinā et menses. Efficax est ad uul  
nera præhumi  
da, et ad relis  
quas cutis fox  
ditatis, hæc ue  
rō posse docet  
eius amaritudo  
cuius quidem  
hæ sine facul  
tates.

*Fumaria.*



*Gale. lib. 4.  
simpl.*

*Lotus Syben gezezt.*

*Epipactis.*

*Cap. XCIII.*

**E**pipactis, ab alijs helleborine, parua herba, frutico  
sa, exiguis folijs. Iecinoris uitijis utilis, et contra ue  
nena pota. Nulli hodie, quod sciam, herba hæc cognita.

*Capnos seu fumaria.*

*Cap. XCV.*

**F**umaria fruticosa herbula est, prætenuera, coriā dri si  
milis: folijs cādidioribus, undiq; numerosis, cinera  
cei coloris: flore purpureo. huius succus claritatem facit  
oculis, delachrymationemq; unde nomen traxit, illitus  
cum gummi, euulsas palpebras renasci prohibet. Com  
manducata herba biliosam urinam trahit.

**NOMINA ET EXPLICAT.**

Græcē καπνός, Latine capnos. Fumaria. Officinis fumus terre.

Germanis Erdtrauch/ tauben Fropf. Gal. Fume terre appellatur.

Fumaria acris, amara, subacerva, urinā biliosum et multā commū  
ducata aut pota prouocat, hepar obstructū purgat et roborat, scabiē  
et pruritū inde sanat: siccata uentriculū cū uino roborat, cū melicrat o  
culū subducit, succo suo oculorū claritatē, et delachrymationem fumi  
modo molitur, unde illi nomē officinis et uulgo, herba hodie usitatissima.

*Lotus urbana.*

*Cap. XCVI.*

**L**otum urbanā, alijs trifolium uocant, nascitur in hor  
tis. extraetus succus, addito melle, oculorum arge  
nia, nubeculas, cæterasq; caligines discutit.



*Ef 3*



# DIOSCORIDIS

Lotus sylvestris. Stein Flee.

Cytisus.



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè λωτός ἡνιοκός. Latine Lotus urbana et satius. Officinis trifolium odoratum. Germanis Syben ge syt, woltriedender Flee. Gallis du treffle odorifrant. Vide annot. nostras sup. in cap. de trifolio.

### Sylvestris lotus.

### Cap. XCVII.

Sylvestris lotus, quam trifolium minus appellant, plurimum in Lybia gignitur, caule bicubitali, & saepe maiore, alis multis: folijs trifolij pratensis: semine fœnigræci, multo minore, gustu medicato. Vim calfaciendi & leniter adstringendi obtinet, vitia cutis in facie, maculasq; cum melle peruncta expurgat. trita per sese aut cum malvæ semine, in uino aut passo bibitur aptissimè contra dolores qui vesicam malè habent.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè λωτός ἡνιοκός. Latine Lotus Sylvestris. Officina falsò pro melitoto utuntur. Germanis Stein Flee dicitur, et gulden Flee. Caulè fert bicubitalè et sepe maiore, folia fœnogræco similia, in quous pediculo tria: floribus pisi, multo tamen minoribus, luteis aut candidis, odoratis, deorsum nutantibus, semine per ramulos diffuso fœnigræci, sed multo minore, gustu medicato, radice subcædida, q notæ delineat: id Sylvestris lotæ ad amussim respõdent nulla penitus reclamante, ut eandè esse nemo sane mētis deinceps dubitari possit. Huic Euchsus falsò nomen saxifragæ luteæ attribuit errore nescio quo seductus.

### Cytisus.

### Cap. XCVIII.

Cytisus, frutex est albus in totum, ut rhamnus, ramos spargens cubito longiores, in quibus folia fœnigræci, aut loti trifoliæ, minora, dorso medio prominente. ea digitis trita erucam olent, gustataq; cicer sapiunt. Folia refrigerant, tumores inter initia discutunt, si cum pane trita illinantur. decoctum potu urinam ciet. Nonnulli, quòd apes alliciat, prope aluearia serunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Multi eruditi uiri cū fruticè qui hodie passim in Germania hortis scriitur, nomine sene æ crabû sed falsò, vulgo Verbeine Râchlin, ueterū esse Cytisum: siquidè foliū mittit fœnogræco nò absimile, ramis exilibus



exilibus, mēbrano folliculo, pellucēte, prætumido, & ueluti quodā spiritū distēdente, turgido, ita ut si digiti prematur, crepitās disiliat, in quo semē pullū, durū, latū, lētis magnitudine, cicēris gustū, quā uox omnes nō male cōueniunt, cū delineatione Cytisi: an idē sit, doctioribus iudicanū relinquo.

## Lotus Aegyptia.

## Caput XCIX.

**E**st & in Aegypto lotus, quā in campis flumine inundatis prouenit, caule fabae flore paruo, candido, hlio simili, quem tradunt occidente sole comprimi, occludiq; ad ortum autē aperiri: adduntq; caput ipsum uespera aquis condidi. & ad exortum solis emergere. Caput quale papaueris, maximum: & intus grana ceu milij, quā Aegyptij exiccant, & in panes cogunt. Radicem lotos hāc habet mali cotonei similitudine, quā cruda cocta; manditur: decocta; lutei oui qualitatem exhibet.

## EXPLICATIO.

Loti nomē uulgum est per herbas & arbores aliquot, quā uerō Aegyptia sit, apud Theophrastum, Athenicum, & Pausaniam, nam cum notis peregrina planta sit, non est cur frustra de hac plura uerba facere uelimus.

## Millefolium.

## Caput C.




**M**Yriophyllum, siue millefolium, caulis est tener, singularis, unica nixus radice: plurimis folijs, laeuius, sceniculo similibus: unde nomen accepit. caulis flauescit uariis, ac ueluti ex industria delinatus nascitur in palustribus. uulnera recētia ab inflammatione uindicat, si uel uiride, uel siccum ex aceto oblinatur. praecepitatis in potu cum aqua & sale datur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Millefolium seu millefolia. Hetruria hoc nomine appellat herbam in pratis tenuem, à lateribus cāpillamenti modo foliosam, eximij usus ad uulnera: boum neruos abscessos uomere solidari ea rursusq; iungit addita axungia affirmans. Aliacst millefolia. Graecis χιλιόφυλλον inter sideritides, Achillea etiā dicta. Est & stratiotes chilitophyllos: de quibus ordine suo diximus.

## Myrrhis.

## Cap. CI.



**M**Yrrhis simillima est cicuta, caule folijsq; radix ei oblonga, mollis, rotunda, cibo nō insuauis. Quā pota in uino, phalangiorū moribus auxiliatur. cir mēstrua, & partussecundos, purgatq; à puerperio feminas subuenit & phthificis cocta in sorbitione. Aiunt quoq; eandem bis die terue potam ex uino, in pestilentia salutarem esse, & nemorbi contagia sentiantur, obflare.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Graecē μύρρις. Latine Myrrhis. Officinis & herbarijs cicutaria. Germanis Wilder Kerffel.

Gallis persil dasne dicitur. Herba cuius picturā damus, omnino cum delineationi Dioscoridis quā myrrhē depingit, nulla reclamante nota, respondet, ut eandē esse nemo demceps dubitare possit, siquidem simillima est cicuta, caule & folijs, radice oblonga, molli, rotunda, cibo iucūda. Hanc Plinius smyrri: Zam, alij myrrham uocant. Falluntur qui cerephyllon, item qui Robertinam officinis dictam, Myrrhē esse rentur, cū & folijsimiles possint uideri, nō tamen caule ne floribus.

Ff 4



Myagrum

Caput CII.

**M**Yagron, aliqui melampyron uocant, herba est surculacea, folijs rubia, pal-  
lidis, tripedanea, semen oleosum, fœnograeco simile. Quod cōtusum igni  
torrent, perunctisq; uirgis ad lucernarum lumina utuntur. hoc pingui, scabritias  
corporis laugari, atq; expoliri constat.

Myagrum siue Melampyrum.

NOMINA ET EXPLICATIO.



Μελάνυρον uel Myagros officinis, &  
uulgo incognitum: Galli uocant du ble frime, &  
Carmeline: herba surculosa est, folijs rubea palli-  
dis, tripedanea, semē oleosum, fœnograeco simi-  
le, in utriculis conceptum. Hoc in arcis pauitis,  
erura flagris decutiunt, et uanis in aurā uento  
siliētē iactant, dū siliquarū recrementā uane-  
scant, tū trusatilibus molis subiiciūt, uersandoq;  
subinde oleū exprimunt, quo non ad lumina tan-  
tū lucernarū, sed et ciborū quoq; condimentū  
pauperes utantur: magno huius olei prouētū.  
sunt qui eā esse uolunt, quā nos uulgo Lindote-  
ter appellamus.

Onagra. Cap. CIII.

**O**Nagra, siue onothera, aut onu-  
ris, frutex est arboris instar, præ-  
grandis, amygdalino folio, sed latio-  
re, lilio nō dissimili: florerosaceo, ma-  
gno: radice candida, longa: cū siccata  
est, uinū olente. nascitur in montibus.  
Aqua in qua radix maduerit, in potu  
data, feras mitigat, & cicures facit. il-  
litu quoq; tetra ulcera mulcet.

Frutex est Germanis incognitus, Oenocha-  
ra Theophrasto dictus.

Cirsium. Cap. CIII.

**C**irsium, caulis est tener, duorū cu-  
bitorū, triangulo similis: ab imo  
foliola, rosæ speciem referētia: angu-  
li spinosi, per interualla molles: folia  
buglosso similia, maiora, subcādida,

modicè hirsuta, partibus extremis aculeata. cacumen caulis orbiculatum, hisp-  
idum, in quo capitula purpurea, quæ solūtur in lanugines. Radicem huius loco  
laboranti adalligatam, dolores uari cum sedare Andreas scripsit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Cirsii, si Ruellio credimus, ea est cuius picturam damus, scilicet ea quam nunc uulgo Buglossam dī-  
cunt Germani Ochsenzung: alia ab ea, quæ borago uocatur, de qua postea agetur cap. iiz. Est au-  
tem duplex Buglossa, unum Germanicum Echij species, alterum uerò Italicum in quo omnia sunt ma-  
iora, ea Cirsion est cum ei delimitationes totæ, paucis exceptis, subscribant, siquidem caulis ei tene-  
bicubitalis, folia buglosso similia, longiora tamē, subcādida, leniter hirsuta, in partibus extremis acu-  
leata, cacumen caulis circinatum, hirsutum, in quo capitula purpurea, quæ fatiscunt in lanugines, quæ  
oculata fide in herba dicta nobis buglossa maior deprehenduntur. Dicta est autem cirsion à uarici-  
bus, quos Græci Cirsos uocant, quoniam doloribus illorum medetur adalligata. Sunt autem uarices  
venarum dilatationes, quæ ex atra bilis materia fiunt, aliquando in temporibus, aliquando sub  
umbilico,



Cirsium,



umbilico, nonnunquam circa testes, se-  
pius autem in cruribus, sum q; pluri-  
mum in his, qui diutius stare, aut iter fa-  
cere consueverunt. altera sylvestris  
& domestica buglossa, species sunt  
hæc ij.

Aster Atticus, seu in-  
guinalis. Cap. CV.

**A**ster Atticus cauliculus  
lignosus, florem in cacu-  
mine habens purpureum, lu-  
teumue, & in ambitu diuisum.  
anthemidis modo, capitulum:  
sed ea quæ caulem ambiunt fo-  
lia, stellæ modo radiata, oblon-  
ga, hirsuta. Feruēt stomacho,  
oculorum inflammationibus,  
prociduæ sedi, ac inguinib. illi  
tu auxiliatur. Tradunt purpu-  
reum florē, si ex aqua bibatur,  
anginis, & pueris comitale  
malum sentiētibus, opipulari.  
inguinum inflammatiōi recen-  
tem illinire cōuenit. Si aridus  
flos sinistra dolentis manu de-

Aster Atticus.



Isopy-

terpatur, & inguibus adligetur, dolore liberat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἀσὴρ ἰνγινάλος. Βουβωνίον. Latine aster Atticus.  
Inguinalis. Officinis inusitata. Germanis Sternkraut/  
Hlein meger Kraut. Gallis Aspergoutte menue dicitur.

Asteris nomen non à foliorum in caulibus, sed in floribus  
potius figura & situ, accepit, siquidem foliorum in huius her-  
be flore numerus & forma, stellam præ se ferūt, uelut Plinius  
ait: capitula per ambitum diuisa folijs pusillis, stellæ modo ra-  
diata sunt. Errant itaq; qui singula folia in caulibus stellæ for-  
mam representare putant. Bubonium & inguinalis quod in  
guinum præsentaneum sit remedium dicta est. Germanis  
Drach Kraut, qui ad herniam puerorū utuntur. flores fert,  
aut luteos aut purpureos. nascitur in collibus, montibus, &  
altis syluis. Augusto mense ut plurimum floret. Mixta est po-  
tentia, uti rosa: refrigerat enim, nō tamen uehementer, & di-  
gredit atq; exiccat, quod illi scilicet amara insit qualitas.



## Isopyrum.

## CVI.

**I**sopyron aliqui phasiolon ob similitudinem uocant, quoniam folium, quod est aniso simile, in pampinos torquetur. capitula sunt in summo caule tenuia, plena seminibus, melanthij gustum imitantis. Contra rufum, & cætera pectoris uis, semen ex aqua mulsa bibitur, hepaticis, & sanguinem excreantibus utile.

## EXPLICATIO.

Isopyrum Plinius quoque describit folijs anisi, capitulis in summo tenuibus, plena seminibus melanthij, quæ uero, aut quo nomine hodie appelletur, ignotum est.

## Viola purpurea.

## Caput CVII.



**V**iola purpurea folium habet haud minus, tenuius ac nigrius, nec multò dissimile. cauliculus à radice medius prodit, in quo flosculus, suauiter olens, purpureus, opacis & asperis nascitur. Refrigerandi naturam habet. Folia per se & ex polenta illinuntur aptissimè stomacho æstuanti, & oculorum inflammationibus, sediq; pro-cidenti.

## NOMINA ET EXPLICATIO.


Id, id est, viola omnis, & præcipuè nigra, seu purpurea, quamuis in eodem genere est alba, etiã mulgo martia dicitur, & quadragesimalis, quòd Martio mense, & quadragesima floreant. Germanis Mergen violen / Viole / Blaw / Weiße violen. Gallis uiolettes, & uioles de martz ou care, me dicuntur. Est etiã multifolium, ob id Dasipodium Græcis. Germanis Gessilte violen / dißum, còcolor primæ, sed plenior: frigida est, & humida primo ordine. Syrupus ex multis floribus uiole nigre recentium, ut rosarum, flore Persici, infusionibus soluit aluum. Quin & semine uiole nigre album, rotundum, mi-lia multa aperte cholagogum est. Est quoque eius generis syluestrior toto habitu strigosior, magis serpens, flore purpureo, in album languescere, inodoro. hanc Germani Hunds violen / wild violen, Galli uiolette sauages uocant.

## Cacalia Italica.

## Cacalia.

## Cap. CVIII.

\*musco.



**C**acalia, quæ leōtice uocatur, folia fert magna, alba: è quibus medius caulis emicat, rectus, albus, florem ferens robori\* aut oleæ similem. nascitur in montibus. Radix in uino

Lilium conuallium.



madefacta, ut tragacantha, delin-ctu aut māducatu per se rufibus, scabritijs arteriæ, medetur. Gra-na quæ post excussum florem in-nascuntur trita, & cum cerato-illita, faciem erugāt, & cutem ex-tendunt.

NOMINA ET  
Explicatio.

Græcè λεωντίζα.

Latine Cacalia.

Officinis lilium conuallium.

Germanis Meyblüm lin / Mergen röß lin. Gallis du muguet, muschetum ma-ius appellant.


Sua sponte nascitur in opacis & lucis, unde nomen lilij conuallensis caule multo, tenuiore, flore candido, suauiter olente, unde Galli muschetum appellant, gustu subamaro



subamaro, semine molli, radice singulari, longa, adstringente, interdum caeruleo flore cōspicitur. Plurima profectò quin potius oēs Cacalia, à Dioscoride descripta nata, frè huic lilio conualliu respondere cognoscuntur, quapropter à Dioscoride Cacalia appellari putandum est. Falsus enim Fuchsius est, qui hanc esse Ephemeron non letale arbitrat, radice apertissime reclamante. nec hinc uita adeò breuis, ut ephemero, quod uno aut altero die commoritur, cū in tres septimanas etiam decerptum uitam humore resocillatam prorogare possit cacalia. Hanc Galenus Caucanon uocauit. Paulus cacaliā nō Caucanon, sed caucano similem esse tradit.

## Bunium.

## Caput CIX.



**B**unium caulem ædit quadrangulum, procerum, digiti crassitudine, in quo ramuli minutis folijs ac floribus scatent: folia proximè radicem, apio similia, longe tenuiora, coriandrinis proxima: flores anethi: semē odoratum, hyoscyamo minus. Vrinam ciet, ex calfa cit. secundas euocat, leni, uesicæ, renibus utile. tam humidi quàm sicci, expressiq; succi caulibus, folijs, radicibusq; usus inualuit ex aqua mulsa. Pseudobunium palmitudine fruticat in Creta, folia ramulosq; napi ferens, acrigustu. Tormina, arq; stranguriam, laterumq; dolores, sanant quaterni rami eius poti in aqua. illiti quoq; cum sale et uino, tepentes, strumas discutiunt.

Hedera terrestris.

NOMINA ET  
Explicatio.

Græcè Βούνιον. Latine Bunium. Officinis inusitata. Germanis S. Barbaren Kraut. Gallis Herbe au charpentier, dicitur.

Plura uide supra in annotationibus nostris in cap. 109. lib. 2.

## Chamæcissus. Caput CX.

**C**hamæcissos folio est hederæ, tenuiore longiusculo, ramulis à radice quinque senisue, dodrantalibus, foliosis. flore uiolæ albæ simili, candidiore, ac tenuiore, gustu supra modum amaro. radice tenui, candida, inutili. nascitur in cultis. Bibunt conuenientissime ischiadici folia, tribus obolis in aquæ cyathis tribus, tricenis quadragenisue diebus. eodem pota modo, senis aut septenis diebus, regium morbum purgant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè χαμαίσις. Latine Chamæcissus, hedera pluriatica. Officinis hedera terrestris. Germ. Grundtreben.

Gallis Lierre terrestre dicitur. Dubium est apud multos an hæc herba, cuius picturam damus, uera Chamæcissos sit, cū aliquot notis delineationi omnino non respōdeat, quare aliqui elimen maluerunt appellare, ut supra monuimus.



Chama



## Chamaeleuce.

## Caput CXI.

**C**hamaeleuce lumborum doloribus propitia est, herba uirens, in curuis solis, furculisq; flore rosaceo.

Vide annotationes nostras in caput 105. lib. 3.

## Buglossum, seu lingua bubula.

## Caput CXII.

\*Omnia hæc  
quidam non  
habent.

**B**uglossum (\* nascitur in cæpestribus, & sabulosis. Iulio mense colligitur. A-  
iunt eam quæ treis thyrsos emittit, cum semine & radice trita, potamq; co-  
tra tertianos horrores prodesse: quæ quatuor, ad quartanos. ea in uino de-  
coquitur. herbam abscessibus utilem esse uolunt.) Verba-  
sco simile est, folium in terra sparsum, nigrius, asperum,  
bubulas imitans linguas. Quod in uinum deiectum, ani-  
mi uoluptates auget.

Buglossum.



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Buglossus, bubula lingua Catoni dicta, Græcis ἡ Βούγλωσος. Germanis Borvetsch. Gallis borache appellatur: Calida humida, ob id uinis iniecta letitiæ ac hilaritatis causa esse creditur, unde euphrosinum quoq; Græcis uocatur. Officinis Corago, corruptè Borago, unde mutata littera.

## Cynoglossum. Caput CXIII.

**C**ynoglosson folia latifolia plantaginis habet, ar-  
ctiora, minora, lanuginosa: caule uacat, & humi ster-  
nitur: prouenit in sabuletis. Folia cum suillo adipe uete-  
ri, medentur moribus canum, alopecij, & ambustis. co-  
mollit aluum, decoctum herbarum ex uino potum.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Cynoglossum officinarum,

Cynoglossa uera.



Græcè Κυνόγλωσσον.  
Romani linguam caninam ap-  
pellant.

Officina Græcam nomen serua-  
runt.

Germani Zundszung.

Galli Herbe au chien uocant.

Cynoglossam non esse eam ca-  
nis linguam quam officina circumfe-  
runt, cuius picturam sub nomine Cy-  
noglossi officinarum damus, euiden-  
tius est, quam ut probari desideret,  
cum uidua caule proditur à Diosco-  
ride, humi strata, folio latifolia plan-  
taginis. Nam officinarum canis lin-  
gua, nec plantaginis effigie, sed an-  
gusta prælonga, subtus lanugine a-  
gerit.



folia, nec uenosa, molliaq; caule cubitali, surculofo, flore purpureo, semen in lappaceis umbilicis rufis, & exili. Altera, cuius pictura domus, nomine uera Cynoglossa, inuenitur in sabuleis, folio molli, uenoso, latiusculo, lanugine molli, canescens, primo anno sine caule, hanc omnino ueram Dioscoridis Cynoglossam esse putauimus, uulgo etiam ob similitudinem canis lingue, ac foetidum canis odorem hoc uomine cognita.

## Phyteuma.

## Caput CXIII.

**P**hyteuma folia habet radiculæ, minora: copiosum semen, perforatum: radicem paruum, tenuem, per summa terræ nitentem: quam ad amatoria conuenire, nonnulli scriptum reliquerunt.

Herba peregrina & incognita, quam Plinius describere superuacuum habuit, cum sit usus eius tantum ad amatoria.

## Leontopodium.

## Caput CXV.



**L**eontopodium duum digitorum herbula est, folia ferens angusta, longitudine ternum quaternumue digitorum, hirsuta, quæ iuxta radicem lanosiore floccosiora. \*  
canescunt, capitula in summo caule quasi perforata: flores nigri: semen usque adeo spissa lanugine inuolutum est, ut si pe fallat: radice parua cohaeret, quam tradunt apensam ad amatoria prodesse, & tubercula discutere.

NOMINA ET  
Explicatio.

Laurus Alexandrina.

Que Ruellio uideatur esse leontopodium, paucis aperiam. Ea est, in fallor, quæ cruciata dicitur herbarijs, & officinis Germanis Bleim vergiß mein nit / & Blacr augentrost. humi ferè seropit, digitali longitudine, folio angustissimo, longo ternos ferè digitos, hirsutissimo, ab radice lanoso, et canescente, in cauliculorum cacuminibus capitula tanquam pertusa, in quibus flosculi dehiscent, nigricantes, semen spissa occulitur lanugine, radice exili &c.

## Hippoglossum.

## Cap. CXVI.

**H**ippoglossum frutex est folia habens rusci tenuis figura, & spinosam comam, & in summo ceu linguas è folijs exeuntes. Capitis dolorem corona ex comis imposita minuit. malagmatis radix succusq; admiscetur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Grecè ἵππογλωσσον.

Latine Hippoglossum, Laurus Alexandrina.


Officinis uularia.

Germanis Zepflin Kraut.

Gallis lingua pagana.

Italidis bonifacia appellatur.

Vide plura in annotationibus nostris in cap. de lauro Alexandrina.





## Antirrhinum.

## Cap. CXVII.

**A**Ntirrhinon, alij anarrhinon uocāt, herbā caule & folijs anagallidi similem: flore albæ uiolæ, purpureo: ideoq; syluestris anagallis nominata est: semine uituli narium simili. Tradunt perunctos ea, cum oleo lilino, uenustiores fieri: nec ullo medicamento lædi posse, si quis appensum gesserit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Γαζέ αντρίπνον Latine Antirrhinum.

Officinis incognita. Germanis Orant/ Sterckkraut/ Streichkraut

Gallis Oculi catti, moron uiolat dicitur.

Galenus hanc & bucranion, hoc est, bubulum, uel uitulinum caput dici mentit. Florem uiolæ albæ ei contribuit Dioscorides, Plinius hyacinthi: nescio aut ianthina, hoc est, uiolaceo potius esset legendum nam ea quam rura nostra Orant uocant uiolacæ florem præ se fert herbula caule & folijs anagallidis, flore purpureo, paruo, semine uituli narium, nam fructus excusso flore uitulinarum, narium rudimenta quedam exprimit &c.

## Catanance.

## Cap. CXVIII.

**E**Xeo genere una, folia coronopi habet, longa, radicem iunci modo prætenuem: capitula sena, septenaue, in quibus ex ui semen inest. Arescens in terram flectitur, & se contrahit ad speciem unguium milui exanimati. Altera mali parua magnitudinem explet, radice exigua oliuæ magnitudine: folijs quoq; oliuæ colore, & figura, mollibus, diuiliis, humi inclinat: semen, ut cicer, minutum in uirgulis dependet, punice coloris, multis foraminibus pertusum. Vtramq; narrant in amatorum expeti. Thessalicæ mulieres his uti traduntur.

## EXPLICATIO.

Harum cognitio, ut herbarum paucius, ad amatoria & phyltra tantum expetitas plane desijt. Plinius quoq; qualis esset, à se describi superuacuum duxit. Illud non ab re est dixisse, ad detegendas magicas uanitates, electum ad humum coniectura, quoniam arescens, contraheret se ad speciem unguium milui exanimati.

## Tripolion.

## Caput CXIX.

**T**Ripolion in marinis nascitur locis, quæ allidit unda, recedensq; dimittit, neq; in mari, neq; in sicco: folio glasti crassiore: palmeo caule, in mucrone diuiso. Eius, ut tradunt, flores colorem ter die mutant, mane candidi, meridie purpurei, sero punicei conspiciuntur. radice alba, odorata, calidi gustus. Quæ drachmis duabus in uino pota, aquam, urinamq; per aluum extrahit, in medicamenta digeritur, quæ uenena arcent.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Dioscoridis Tripolium, Serapionis Turbith est. Tripolij nomen retulit, quod flores eius (Dioscoride teste) ter die mutantur, candidi mane, purpurei meridie, punicei in occasu. Nascitur in maritimis, ubi allidit unda, iterumq; retro comitat. hoc Arabum aliquos Turbith cognomasse constat. Anuario tamen duo à tripolio diuersa turpeta esse apparet, alterum uocari alypiam turpet alium exponit. Alibi uero pitusa radicem (quæ officinis dicitur Esula) turpeton cognominat, quasi alterius coloris. hodie peregrinæ, & incognitæ radices sunt, nec temere pharmacis commiscendæ.

## Adiantum.

## Caput CXX.

**A**Dianton, polytrichon, pusilla gerit folia, similia coriandri, in summo infusurum diuisa. cauliculi, quibus exoriuntur, nigro colore nitent, prætenuis, palmum alti: radice superuacua, neq; caulem, neq; fructum, neq; florem profert. Decoctum herbæ potum, prodest spirandi difficultati, suspiriosis, lieni, & felle suffusus, & urinæ difficili. calculos frangit. aluum sistit. serpentium moribus auxiliatio est. Contra stomachi fluxiones in uino bibitur. Secundas ciēt, & menstrua. sanguinia



*Adiantum album.*



guinis reiectiones inhibet. Contra serpentium morfus cruda herba illitur, alopecias defistumas discutit. furfures, & manātia capitis ulcera, ex lixiuio emendat, defluentes capillos cōtinet, cum ladano & myrtino, & sulfino, aut hyssopo, uinoq; decoctum eius cum lixiuio, & uino infusum, idem praestat. corturines & gallinaceos pugnaciones facit, in cibis eorū additum. Seritur gratia utilitatis pecorum, circa ouilia. Vmbrosus,

& palustribus, circa parietum aspergines, & fontium specus enascitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

NOMINA ET EXPLICATIONIO.

Græcè ἀλιον &c. Latine adiantum, quidam polytrichon, alij callitrichon appellant, ab esse dictus, ینگه enim capillum Duo genera eius, candidius, & nigrum, breuiusq; 1. theophrastus assignauit. Triplex Dioscoridi esse uidetur. Primum speciatim polytrichon uocat. Adiantum album Theophrastus, Gazacum uulgo, & officinis capillum Veneris, Germani Steintaut. Muscicaut. Alterum trichomanes, nigrum Theophrastus, uulgius, & officinis adiantum nigrum. Germani Srauenthar, frembder & Welscher steintaut. Tertium similitudine filicis, & folijs lemnicule, uulgo, & officinis Polutrichon, Germ. Rott Steynbrich &c. Quartū adit potest, quod Apuleij polytrichon appellabimus, ne quispiā Dioscoridis & aliorum Græcorum intelligeret, hoc Germanice à colore aureo, quoniam habet, & solimer widerthon appellatur. Galenus adiantum non diuisit, forte quod oreo, quoniam habet, & solimer widerthon appellatur. Galenus adiantum non diuisit, forte quod oreo, quoniam habet, & solimer widerthon appellatur. Galenus adiantum non diuisit, forte quod oreo, quoniam habet, & solimer widerthon appellatur.

Callitrichon à nonnullis trichomanes dicitur: etenim quide herbis scripserunt, adiantum uocant, callitrichon potius quidam trichomanes: Polytrichon autem, & callitrichon diuersa scilicet Gal. lib. 1. comp. phar. part. Recens melius, nisi cum sic eandem, & asirngendum uas.

Polytrichon Apuleij. lenius. Adianton seu polytrichon, calido, frigido temperatum, Veneris, & alia, &c. conferat. Iulide


Politrychon Apulsijs.

lentus. Adianton[?]seupolytrichon, calido, frigido temperatum,  
genu acrobo, flicat, tenuat, digerit, ob id strumis confert, lapides  
frangi in nobis, crassa & lenta ex pulmone educit, capillos reddit,  
praesertim ustum.

Fidicula, seu Trichomanes.

Caput CXXI.

Rottsteinbrech.



**T**Richomanes nascit̃ eis dē in locis quibus adian-  
ton, filicifimile, sed exilius: folijs lenticulæ, tenui

Gg 2



bus, in ordinē utrinq; digestis, aduersis in se, in ramulis tenuibus, acerbis, fusco colore splendidibus. Eadem quæ & adianton præstare posse constat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *πολυτρίχης*. Officinæ *polytrichum* uocant. Vide plura in annotationibus nostris in caput proxime præcedens.

*Xanthum*, siue *lappa*.



## Caput CXXII.

**X** Anthium nascitur læto & pingui solo, & lacubus exiccatis, caule cubitali, anguloso, pingui, prodeuntibus ex eo crebris alis folia triplicis habet, insecta, nasturtiū odore imitantia: fructum grandis oliuæ modo, rotundum, & ut platani pilula, spinosum, qui contactu uestibus adhærescit. Is antè collectus quàm perfectè siccescat, tunditur, & fictili uase reconditur. Flauos autem facit capillo, si acetabuli instar tepida aqua madescat, mox caput, nitro antè perfrictum, illinatur. Alij in uino tundunt, & ita asservant. Semen aptissimè tumoribus imponitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis *Ξανθίου*. Latine *xanthiū*, nomen ab effectu inditū, quod rufet capillum. Officinis & herbarijs hodie *lappa minor*, & *lappa maior* uersa. Germanis *Bettlerß leus*, / *Spiz Floet* ten. Gallis *Gloterō* dicitur. Cum discutiendi uires habeat, facile colligitur tēperamento esse calido & sicco præditū, id quod ex sapore etiam qui est amarus, & subacris, deprehendi potest.

*Aegilops*, siue *festuca*.

## Cap. CXXIII.

**A** Egilops herbula folia tritici habens, sed molliora, in summo capite semina bina ternaue rubra, quibus aristæ quasi capillaceæ exeunt. Illita cum farina herba egilopijs medetur. duritias discutit. Succus farinæ admixtus siccat, & eorūdem gratia reponitur. \**Bromus* herba egilopi similis, exiccatoriā uim habens, decoquitur cum sua radice in aqua ad tertias, & iuri colato par modus mellis adiicitur: rursus incoquitur, dum liquidum mellis crassitudo fiat. Lintheum eo humore imbutū, & naribus inditū, contra graueolentiam ulcerū efficax est. Aliqui tritā aloē addunt, & eo modo utuntur. Cum siccis rosīs cocta in uino grauem oris halitum emendat.

\*Hæc ad finem capitis usq; quidam non habent.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *αἰγίλος*, festuca, secundū genus auenæ, *Gaze festucago*, est autē auena sterilis, de quo plura in annotationibus nostris suprà lib. 2. in cap. de auena. hoc cap. uidetur in Diosc. omnino superfluum.

*Glaux*.

## CXXIII.

**G** laux cytiso & lenticulæ folijs similis, quæ supernè uirent, auersaq; candidiora spectantur. ramuli à terra exiliunt quini seniuē, tenues ab radice, dorantem alti. flores ceu uiolæ albæ, purpurei exeunt. minores tamen. nascitur in xamare. Coquitur cum hordeacea farina, sale & oleo in forbitione, ad reuocandum extincti lactis ubertatem.

## EXPLICATIO.

*Glaux*, ut Ruellio placet, frequens in Gallia iuxta specus aqueos, & in ueteribus foveis, sed adhuc nullum inuenit nomen.

*Polygala*



Klein bibenel.

## Polygala. Cap. CXXV.

**P**olygala palmi altitudinē petit: folijs lenticalæ, gustu adstricto. Quæ pota, lactis abundantiam facit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè πολύγαλον, quod lactis abundantiam faciat.

Germanis Bibenel die Kleiner / uel ut alijs placet, nangel Kraut.

## Osyris. Cap. CXXVI.

**O**syris frutex est niger, ramulos ferens tenues, lentos, fractuq; contumaces: & in his folia, quaterna, quina, senaue, ceu lini, nigra in initio, dein colore mutato rubescentia. Decoctum eius potum, iuuat arquatos.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Osyris, ut Plinius scriptum reliquit, ramulos fert nigros, tenues, lentos, & in ijs folia nigra ceu lini, semenq; in ramulis, nigrum initio, deinde colore mutato rubescens. Ea officinis hodie incognita, osyris nomine, namque à similitudine nouum cmen-

Smilax aspera.

dicarum nomen, linaria appellantes, quo nemini nō noscitur. Germani uocant Horn Kraut / Stachs Kraut / Lein-Kraut / Krottstachs / Tabell Stachs / Tabell Kraut / Scheiß Kraut. si multitudinem esule decepti.


## Aspera smilax.

## Ca. CXXVII.

**S**milax aspera, folia habet periclymeni: sarmenta tenuia, multa, rubi modo aut paliuri aculeata, arboreis scandit ab imo ad summa perreptas, se conuoluens eis. fert racemos exiles, qui maturi rubescunt, gustumq; leniter mordent. nascitur in palustribus & asperis: radice dura, crassaq;.



Osyris: Linaria.



lia & acini, & antè & post epoti, uenenorum antidota sunt. Tradit, si infantibus nuper in lucem æditis, quid ex his tritum propinetur, nulla postmodum uenena nocitura. Inciditur etiam ad alexipharmaca, id est, ad ea medicamenta quibus uenena arcentur.



## NOMINA ET EXPLICATIO.

*Smilax aspera* hodie Germaniæ peregrina & incognita, nam ea cuius picturam damus, à Fuchſio ſic appellata, delineationi non reſpondet. Germani inter genera uolubilis reſerunt, & *Stechen deſien* & *Scharpfe wunden* appellant.

Balsamine.

## Læuis ſmilax. Cap. CXXVIII.

**L**æuis ſmilacis folia hederæ ſimilitudinem habent, molliora, læuiora, tenuiora. huius ſarmenta nullis horrent ſpinis. cōuoluitur arboribus, ut prior. fructum parit lupini modo nigrum, exiguum, floribus in cacumine perpetuis, multis, rotundis. Hac ſmilace, quadam topiariorum arte, tentoria contra æſtus moleſtiam facti tantur. folia per autumnū decidua. Semine cū dorycnio pote, ternis ſingulorum obolis, uaria & tumultuoſa in ſomnis obuſari traduntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Læuem ſmilacem, cuius hoc nomine picturam falſo Fuchſius exhibet Dioſcoridis *Ciſſampelum* maiorem eſſe, ſuprà oſtendimus ſuo loco, quæ autem uera ſmilax læuis fuerit, hodie nemini quod equidē ſciam cognitū, niſi forte eaſuerit, quam Padani Ligures *Balsaminam*, Hieroſolymitanum pomum *Hetruria*, mirabile *Gallia*, uulguſ *garantiam*, quoniam ſepti modo in hortis ſenſtrisq; per cancellos opere topiario digeritur, de qua ne uerbum quidem priuatim apud ueteres habitum inuenio. Ea

Rufcus.



enubus præloſq; ſtagellis ultro citroq; reptantibus euagatur, folijs hederæ, molliora, læuiora, tenuiora, articulationibus, exilibus pampinis, ex alarū ſinu prodeuntibus, quibus illigantes ſeſe cancellatim uicinis implicant ſtaminibus, flore cucumeris, ex albo in luteū langueſcente, turbinato utrimq; fructu, carnoſa cute, et per uerſus uerrucoſa, ac rigidioribus bulbis intumeſcente, cucumeris puſilli, uel citrij ſimilitudine, malo uerius ac tubere quā grandi bacca, aut folliculo: aureus maturo color, cartilago intus punicea, uel lutea, ſanguineuſq; ſuccus. Pomum maturitate diſilit, inanitasq; conſcripto patet, ſemina intus aliquot lenticule ſigura continens, ruberrima, ex quibus oleum exprimitur, ad uulnera præcipuum &c.

## Rufcus. Caput CXXIX.

**S**ylueſtris myrtus, aliquibus oxymyrſine, aut myrtacanta, Latinis ruſcum appellatur. folium fert myrti, latius in formam lanceæ mucronatum. bacce per maturitatem rubefcunt, rotundæ, à medio folio dependentes, oſſeo intus nucleo. cubitales ramuli ab radice exeunt, uitilium modo lenti, fractu contumaces, folioſi: radice graminis ſimili, acerbæ, & ſubamara. Folia & bacce in uino potæ urinam cient. menſes





Ruscus arborescens.



Laurus Alexandrina.



menes pellunt. uesicæ calculos frangunt. stillicidio urinæ medentur. dolores capitis sanant, & regium morbum. In asperis & præcipitibus locis enascitur. Decoctum radices in uino potum, eosdem præbet effectus. Cauliculi recentes, asparagorum uice, in cibo sumuntur: amari autem sunt, sed urinam mouent.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ῥύσκιον. Latine Ruscus. Officinis corruptè Bruscus. Germanis Brösch dicitur.

Bruscum hodie, addita litera, licet corruptè, uocant officina, humilis herba est, fruticosa, folijs acutis, & mucrone rigentibus, dependentibus à medio baccis quæ per maturitatem rubescunt, osseo intus nucleo, ramulis cubitalibus, uittilium modo lentis, foliosis, fructu contumaciibus, radice graminis acerba, subamara. Alterum genus nonnulli faciunt: quod proceritatem arborum æquat, folio lato, duro, & per angulos aculeato, immortali quoque uirore, baccis rubenibus & racematim collectis, hanc

Germani Stechend palmen, Galli housson uocant. Scio rusci fructu, cubebas Mauricæ uocatas credi. Sed ab ijs dissentio qui hoc adfirmant, in testimonium citans Actuarius, Aetium et Galenum. Nam cubebas, nec oxymyrines seu myrti sylvestris fructus, nec cubas Galeni esse cum Serapione aperte harum descriptio ostendit, & conferenti patet.



Hæ enim sunt fructus tenues piper emulantes, sed minus acres et subamari, Galeni uero oxymyrines quorum picturæ danus, sunt æque (ita enim legendum censeo) ῥύσκιον. i. furculis cinamomi, similes odore uocati quod, sed ualentiore, & nonnihil aromatico, quem & gustatus deprehendit, facultate etiam pibis similia: sed quia sunt tenuiora, uiscerum obstructions potentius detergent, & urinam mouent, & renum calculos expurgant. Nō

adeo tamen sunt tenuium partium, ut Cinamomi loco usurpari possint, cum Quinto: cum multò sint deteriora optima casia. In Sidæ Pamphiliæ loco, quia luxuriat carpesium ibi est uilissimum.

Laurus Alexandrina.

Cap. CXXX.

**L**aurus Alexandrina folio est rusci maiore, molliore, & candidiore: semine inter folia rubro, ciceris magnitudine: ramos spargit in terra, dodrantales, interdum longiores: radice sylvestri myrtosimili, maiore, molliore, odorata inuenitur in montosis. Difficiles partus accelerat, radice pota sex drachmarum pondere in uino dulci. & stillicidio urinæ auxiliatur. sed sanguinem extrahit:



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hæc omnino eandem esse puto quæ superius Hypoglossum appellauit, quod mihi non credens, eius historia cõferat cū ipsa herba cuius picturā damus intelliget singulis notis ad amussim respondere nulla pro sua reclamante. Siquidem frutex est folijs oxymyrsinæ cõcauis, quibus foliū exit minutū, lingua formæ. Nec me fugit nullā in ea, quæ uia medicatur, familiaritatē inueniri, à quæ tamen hoc ei nomen inditū, ut hinc etiā Germanicè Sauct blatt/zapfen traüt, id est, uulua folium dicatur. imò ne aliquem foliorum quidem usum. Fuisse tamen olim non paruum illū ex hypoglotti & hypoglossidij nomenclatura cõstat, quæ hinc proculdubio facta illi est, quod sub lingua teneri solita sunt folia, ut uel hodie, non tamē apud Insulres, ut Vergilius Marcellus ait, aliasque alibi gentes, sed etiā in Germania nostra fit, quoties abundantem puerorū saluā et destillantē in fauces humiditatem, unde uel proluxa columella, id est, uulua, uel fauces balucie lingue impedimentū oritur, cohibere: & siccare opus est.

## Daphnoides.

## Cap. CXXXI.

**D**aphnoides cubiti altitudine fruticat, ramis flexilib. obsequiosisque, multis, inde sursum uersus foliosis. cortex supra modum uiscosus ramos uertit. folia lauri, graciliora, & molliora, fractu cõtumacia, quorum gustatu os & fauces incenduntur: flores candidi; bacca, cū ematu eruit, nigra, radix inutilis. nascitur in montosis. Pituitas extrahit folium recens uel aridum in potu. menses ciet & uomitus. caput inanit cõmanducatum. sternutamenta mouet. Bacca quindecim potæ aluum resoluunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Officina hanc laureolam uocat, siquidem laureola frutex nascitur ramosus, cubitalis, molliori angustiori que laurus folio, tristi aspectu, flexilibus uirgis, supra modū uiscosis uersus cacumē foliosis, flore, candido, bacca cū percoxit atrii coloris, fronde fractu contumaci, cuius gustatu mordetur os, incensumque guttur uellicatur, radice inutili &c.

Veratrum album.

## Chamædaphne. Cap. CXXXII.

**C**hamædaphne uirgas emittit cubitales, singulari ramulo cõtantes, rectas, tenues, leues: folia lauri similitudine, leuiora multo, ac uiridiora: semen rotundum, rubens, annexum folijs. Illinuntur capitis doloribus: trita folia, stomachi ardores mulcent ad sedanda tormina cum uino bibuntur. Potus cum uino succus, menses & urina ciet, idem facit pello appositus.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hanc ut priorē Officina et Herbarij uocant Laureolam. namque unico ramulo & cubitali, erecto folio, laureo, tenui, multo leuiore, acini rubentes, rotundi, folijs annexi quibus agnoscantur.

## Veratrum album. Cap. CXXXIII.

**H**elleborum album, Latini ueratrum album uocant, fert folia plātaginis aut betæ syluestris similia, sed breuiora, et nigriora, rubescentia: caulem cauum, quadratalem, tunicis cõuolutum cum arescere cœpit. radicibus nititur multis, tenuibus, ab oblongo & exiguo capite exeuntibus: ceptum modo fibratis. nascitur in montibus et asperis radices messibus colligendæ. Optimū habetur candidum, friabile, carnosum, modicē extensum, nec tamen huiusmodi mucronatū, quod frāgendō puluerem emittit, & tenuē habet medullā, gustu non admodū feruens. neque saluā subinde ciens huiusmodi autē strāgulat. Primatū Cyrenaicū tenet. Galaticum





Galaticum autem & Cappadocicum, candidiora, & puluere quodam obfita, ce-  
lerius strangulationis movent. Vomitione autem varios extrahit humores, colly-  
rijs admiscetur, quæ caliginem oculorum discutiunt. partus impositum necat.  
menfes pellit, sternutamenta excitat, mures interficit, cum melle & polenta sub-  
actum, absumit carnes, si coquatur unâ, datur per se ieiunis, & cum sesama, aut  
prisanæ succo, aut haliçæ, aut lentis cremore, cum aqua mullâ, aut pulte, aut qua-  
vis alia forbitione. Cogitur cum pane, & ita inassatur. Præparatio corporum, ac  
mixtus ratio, diligenter tradita est, cum ab his qui de medica eius potione scripti  
rarunt, tum maxime à Philonide Siculo Ennensi, cui nunc assentimur, quippe lō-  
gum nimis esset, in hac præsertim æditione de materia, simul medicam curandî  
ratione exponere. Dant nonnulli in pulvis forbitione, aut copioso haliçæ cre-  
more: aut paucum antea cibum dari præcipientes. statim ueratrum offerunt, ijs  
præsertim, quibus strangulationis suspicio imminet, aut si ualendo corpus infir-  
mat. hoc enim modo deiectio nihil periculi minatur, quod cibo munitis non in-  
tempestiuè medicamentum corporibus offeratur. Vomitiones concitant subdi-  
ta ex eo balani, cum aceto.

NOMINA ET EXPLICATIO.

NOMINA ET EXPLICATIO.  
*Græcè* ἑλεβορός λευκός. *Latine* Elleborus albus. *Officinis Latinum nomen servat.*

Germanus Meiss niefß wurg. Gallis du uirairc, uerarum dicitur.

Germanis Weiss nief wurts. Galis du uirairc, ueraturu dicitur.  
Elleborus olim terribilis fuit: postea tam promiscuus, ut plerique fludiorū gratia iumpferint: albus  
autē multo terribilior nigro. Radicē graciles, breues, et uelut decuratae ex cepto uelut capite pro  
cedentes in usum solae ueniūt Diof. nec ha totae, sed haū cortex deligendus, carnosus, speciosus, medu  
losam intus partem, quae eximenda est habens tenuē, gustu acer et feruidus, asperis tumulis et locis sicc  
is qualis Anticyra est, natus, in frangendo puluerem emittens Plin. Semen tamen a quibusdā purgatio  
nis, adhibetur: summa quoque radix, quae uelut cepe sanibus datur purgationis causa. Mestibus alba ra  
dices legūtur Diof. et Plin. Albus amior est, et minus acer nigro Gal. Albus eligendus gustu fruen  
tis, tamen uehementer, sed saluā amaritatem, non simul mouens, medioctur extensus, candidus, frag  
nō tam uehementer, sed saluā amaritatem, non simul mouens, medioctur extensus, candidus, frag  
nis, carnosus, non acuminatus aut iuncus, nec dum frangitur, puluerulentus, medullam interiorem ha  
bē, exilē, qualis Cyrenaeus. Improbatur Galaeus, Cappadocius, Italus, albi et magis puluerulētus.  
Pauli tēpore utebantur Elleborismo pro albū, et nunc quoque si, non bonus est, uenenosus non fuerit. Quin  
ellebori nomine apud Hipp. et Gal. albus uenit, ut Aph. i. lib. 5. Apud Arabes contra Ellebori nigri  
eum alijs mistus non est diffinitis, saepe magno successe in melancholia morbo usus est Iac. Syl ha  
tempestate docti, medicus Syropo saporis, largo satis elleboro nigro incocto. et Ioh. Mercurius non  
difficilem eius usum expertus est, et drachmā integrā solā potā parū profecisse. Paulus in fundit aqua  
dies quing. unc. duas: ergo multus satis manne, uel mell  
is, et diuinae. Siquidē, et Ioh. Mercurius in fundit aqua

*Veratrum nigrum.*

dies quinq; unc. duas: ergo multus satis manne, uel mel  
li, uel alij incoquatur. Si in radicē raphani immitatur  
albus elleborus, elleborismi modus simplicior est Paulo.



Veratrum nigrum. Cap. CXXXIII.

**H**elleborum nigrum appellatur melapodion, quoniam caprarum pastor, nomine Melampus, furentes in se Præteritas, primus purgasse. & fanasse fertur. folia ei uiridia, platani similia, minora, folijs sphondylii proxima, subaspera, nigriora, pluribus diuisuris incisa: caulis asper. flores purpurei. candidi, racematum coherentes: semen enici, quod in Anticyra sesamoides uocant, quo deiectiones molliuntur. radicibus coheret nigris, tenuibus, à capitulo cepe simili confibratis, quarum est ulus. in colibus, asperis, et stititibus locis enascitur. Optimum est quod ex huiusmodi petitur terris, ut ex Anticyra. Nigrum inibi probatissimum gignitur, Eligi debet corpusculum &



tum & plenum, in quo tenuis sit medulla, acre gustu, feruensque: cuiusmodi est in Helicone, Parnaso, & Aetolia natum. attamen Heliconium præcellit. Veratrum nigrum purgat uentrem, detrahit bilem pituitasque, datum per se, aut cum scamonia, & tribus obolis, siue drachma salis, decoquitur cum lente & in fculis, quæ purgationis causa sumptantur. prodest morbis comitialibus, melancholicis, infanientibus, articularijs doloribus, & resolutis. menses inditum trahit. partus necat. purgat fistulas impositum, & tertia die detractum. item contra grauitatem auditus in aurem demittitur, ibique in alterum aut etiam tertium diem esse finitur. scabiem sanat, illitum cum thure, aut cera, & pice, & cedrino oleo. uiriliginibus, lepris, impetiginibus, ex aceto medetur. dentium dolorem collutione mitigat. crodentibus medicamentis commiscetur. hydropicorum uentri utilissimè imponitur factum ex eo, farina hordeacea, et uino, cataplasma cõsutum proxime radices uitium, uinum purgandi facultate donat. Huius resparsu domos expiari arbitrantur: quare inter fodiendum stantes, Apollinem, Aesculapiumque precantur, ac uitant aquilæ uolatus: aduolare enim non sine periculo tradunt. nanque si auis effosionem hellebori conspexerit, moriturum qui succidit, augurium est. Celeriter effodiatur oportet, quoniam halitu caput aggrauat. quapropter, ad id arcendum, fossuri alium præsumere, & uinum bibere consueuerunt. nulli ita noxæ opportuni redduntur. Veratri albi modo emedullatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἐλλεβορός ὀκράς. Latine Veratrum nigrum. Officinis elleborus niger Germanis Christi wurts. Hanc Euchsus falso Helleborum nigrum adulterum hortensem uocat, cum uerus Elleborus niger sit, nulla prorsus reclamante nota, ut conferenti patebit. Elleborus niger coquitur cum leme, aut ture aliquo Diosc. albus autem datur per se, & cum sesamo, aut thapsie succo, aut alicæ, aut mulsæ, aut pulce, aut lenticulæ, aut sorbitione alia. Nigrum cum scamonio & sale dat idem. Album debilitus cum succo pituitæ, aut alicæ, aut alio simili. Paulus. Niger pituitam & bilem inferne purgat. Diosc. bilem maximè flauam, Pau. Albus autem uomitu purgat res uarij coloris, Diosc. Rem uisu terribilem in uarijs coloribus. nominatione, Plin. Elleborus bonus ad exanthemata, impetignes, lepras, herpetas, erysipelata, ischuræ, Pau. Albus oculorum collirij contra calignes imponitur, Diosc. Oculorum caliginem fetu discutit, Plin. Nigrum aurium inditur, et post biduum aut triduum eximitur in difficili auditu. Nigri obolos tres, aut drachmā unā dat Diosc. adiecto etiam scamonio. Manardus quoque drachmā unā dedit, cum granis duobus scamonij in mulo cydonio asini, minusque leuius purgat quā iusta dosis pilularum, quas aggregatiue uocant. Albi Themison dabit drach. duas, sequentes quatuor, antiquorum uitiū cognoscentes, qui ob metum parcius dabant, cum celerius erumpat, quo largius sumitur. Vetam tamen dari semib. et pueris, et mollibus, ac femineis corporibus. Paulus dat a drach. una ad drach. duas, debiliore in succo alicæ, aut pituitæ, fortioribus in aqua calida aut melicrato: sectius tamen non in puluere tritum, ut ante monuimus. A bono est usus Manardus. ex Italis tamen robustos ferre posse putat: non dandum tamen nisi in diuturnis et ualentibus morbis, per alia remedia non sanatis, ut hydropi, cachexia, elephanto, paralyti, epilepsia, podagra, morbo Gallico, qui pessimus et longissimus esse consuevit, et auxilia communia uel continere.

## Sesamoides magnum.

## Cap. CXXXV.

Sesamoides magnum, in Anticyra helleborum uocant, quoniam albo ueratro in purgationibus misceatur. simile est senecioni aut rutæ: longo folio: flore candido: radice gracili, ignaua: semen gustu amaro, cætera sesame simile. Ventrem detrahit. datur tritum ad bilis pituitæque deiectiones, quantum tribus digitis capitur, addito ueratri albi sesquiobolo, ex aqua mulsæ. Sesamoidi paruo cauliculi sunt dodrantales: folia coronopi, minora, hirsutiora: & in cauliculorum cacumine capitula, florum penè purpureorum, medio eorum albo: semen sesame, fuluum, amarum: radix tenuis. Detrahit bilem pituitasque: semen ex aqua mulsæ potum di midio acetabulo. illitum ex aqua, tumores ac tubercula discutit. Nasceitur in aspis.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sesamoides quidam elleborum nigrum ob similitudinem appellam huius speciei esse eam herbam cuius picuram damus, multi haud inuaditi uiri arbitratur, quæ eius delineationi ad omnino non respondere uideatur, uiribus autem parum differat: nigro ueratro omnino similis planta est nisi quia caule obtinet crassiores, foliaque minora. Florem etiam si herbaceum habet, tamen è medio eius folliculi aut silique duæ, aut tres, in



Sesamoides magnum.



Cucumer sylvestris.



tres, in quibus semen est, exeunt: floret uere & initio estatis, in montibus, asperis, lapidosis ac sublimibus nascens. Calidus atque siccus ordine tertio. quod pediculos enecat, Germani Leusj fructu uocant, purgat inferiorem uentrem uehementer, pituitam & flauam bilem ducens.

## Sylvestris cucumer. ca. CXXXVI.

Cum sylvestris fructu solo distat à satiuo cucumere, quem longè minorem parit, oblongis glandibus non dissimilem. folia atque sarmenta fatiui refert: radice candida, magna. nascitur in sabuletis, & ruderibus, frutice in totum amaro. Instillatus foliorum succus, aurium dolori conuenit. Illita ex polëta radix, ueterem omnem tumorem discutit. imposita cum resina terebinthina, tubercula rumpit. ischiadicis infunditur. podagras discutit, decocta ex aceto, & illita. eius decocto dentes in dolore colluuntur. arida farina impetiginem, lepras & uirilignes absterget. nigris cicatricibus colorem reddit, & in facie maculas expurgat. Radicis succus sesquioboli pondere, & item cortex, acetabuli quarta parte, bilem pituitamque deiciunt, præsertim in hydropicis. deiectiones autem citra stomachi iniuriam mouet. radicis se libra, in uini præsertim Libyci hemina conteritur, danturq; ex eo terni cyathi triduo, dum tumor abundè depri-mi cernatur. E fructu huiusce cucumeris, fit medicamentum quod Elaterium uocatur, ad hunc modum: Decerpti cucumeres, qui tacti protinus exiliunt, seruantur nocte una: postridie imposito supra craterem rariore cribro, utrisque manibus prehensi, sigillatim supino cultro, sursum uersus aciem habente, finduntur: atque per cribrum humor in subiectum uas exprimitur: simulque carnosum quod hæsit cribro, quò facilius excidat, eliditur. quod ita pressum est, residere sinitur, atque in uicinam peluim demittitur. coaceruata autem in cribro segmina, dulci aqua perfunduntur. & denuò pressa abiciuntur. humor in pelui agitur, & lintheo opertus, soli exponitur, dumque steterit, tota supernatans aqua cum humore cocreto, effunditur. hoc uero identidem fieri solet, donec existens aqua liqueat: qua stillatim exhausta, sedimentum

mortario



\* Alij colore  
medium.

mortario suscipitur, & conterendo cogitur in pastillos. Sunt qui ad hauriendam protinus succi abundantiam, cribratos cineres humi inspargant, & medium cauant, triplicatum linteum obtendant, per quod elaterium cum sua humilitate diffundunt, sic catumq; in pila, ut dictum est, conterunt. Aliqui pro dulci aqua marinam perfundentes, ita eluunt. Alij in nouissima lotionem mulsam aquam respergunt. Elaterium optimum esse constat, leue, non ponderosum, cum candore leniter humidum, gustu amarissimum, quodque luccernarum luminibus obiectum, facile flagret. Porraceum tamen scabrumque, si turbidum spectetur, atque erui cinerisq; plenum\* sit, graue & uitiosum esse solet. Nec desunt qui cucumis succo amyllum immisceant, ut candorem ipsum & leuitatem imitentur. Ab imatu ad decennium deiectionibus utile est. Integer modus, obolus est: minimus, semiobolus: pueris, chaldi duo: siquidem copiosius, periculum adfert. Bilem ac pituitam utrauis parte extrahit, optima suspiriosis est purgatio. quod si in animo sit deiectionem moliri, adiecto salis duplo, & stibij quod colorare sufficiat, ex aqua, erui magnitudine catapotia dato, postea cyathus unus aquæ tepidæ forbeatur. ad citandas tamen uomitiones aqua diluens elaterium, subiectas linguæ partes penitissimè pinna oblinito. quod si quisquam difficiliter euomat, oleo aut unguento irino resoluito. somnum inhibeto. porro his qui eximiè uacuantur, continuè uinum & oleum dari conuenit, etenim uomendo restituntur. quod si uomitiones non finiantur. aqua frigida, polenta, posca, poma, & quæ stomachum densando corroborant, offerenda sunt. Ciet elateriū menses. partus ene cat, in pello subditum. morbo regio medetur, cum lacte naribus infusum. diuturnis capitis dolorib. liberat. efficacissimè anginis illinitur, cū uetere oleo, melle, aut felle taurino.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Ζίνος ἄργεῖο. Latine cucumis sylvestris. Officinis asininus, anguinus, ceraticus.

Germanis Wild springende Furchslin / hundts Furchslin.

Gallis cocombre sauuge appellantur.

Germaniæ peregrina herba, ex Italia ad nos translata, hodie passim in hortis feritur. Elateriū succus ex huius fructu quomodo trahatur, Dioscorid. docet amarus extreme Gal. Paulus dicit uacuare

ut scammonium tribus obolis, tritum cum lactis cotyla. A trimatu incipere, & nullum ex medicamentis longiore uo durare, & quo uetustius eo melius, scribit Plinius, & ducentis annis seruatum testatur Theophrastus.

#### Staphis agria. Cap. CXXXVII.

Staphis agria, siue herba pedicularis, folia habet labruscæ, diuisa: & cauliculos rectos, molles nigrosq; fert florem glastii: & folliculos uirides, similes cicerci, & in his nucleum triangulum, scabrum, ex nigro subfuluescentem, intus album, gustu acrem. Grana quindecim\*, si trita in aqua mulsæ dentur, crassum humorem per uomitum purgant. sed qui hauserunt, ambulare debent. prudenter tamen attendere oportet, & aquam mulsam continuò potui dare: quoniā pericula strangulationis inferunt, & fauces adurunt. Trita, & ex oleo illita, phthiriasi prodest: item prurigini & psoriasis. cit plurimā pituitā cōmanducata, cocta in aceto, dentium dolori, colluto ore, subuenit. rheumatismum gingiuarum sistit. ulcera oris manantia, cum melle sanat. urentibus malagmatis imponitur.

NOMI



\*Decem aut  
quindecim.







Genistella.



Spartium:

Genista.



ga profert, sine folijs, ualidas, difficulter fragiles, quibus uites ligantur, cuius hoc loco Dioscoridis meminit, uirgas longas in ijs semina leuis formam habentia, florem luteum ueluti Leucoium, semen & flores cum aqua mulsa si bibuntur pondo obolorum quinq; per superna purgant, ut Elleborus albus, sine periculo. Semen autem per inferna purgat. Virga uero ischiadicis profunt: easdem uires Galenus quoq; tribuit genistae, unde per spicuum omnibus sit, Sparto & genistae, non obstante quod forma nonnihil discent, eandem blumen appellamus, astringentem cum amaritudine facultatem possidet, ac proinde ualenter simulq; circa mordacitatem exsiccatem.

## Silybum.

**S**ilybon lata spina est, folia ferens chamaeleonis albi. Haec recens cum sale oleoq; cocta estur. Radicis succus drachma pondere potus, uomitiones ciens.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Silybon nisi ea spina fuerit quam supra Chamaeleontem nigram appellauimus, Germanis Eberwurzel dicta, quod tamen uerisimile non uidetur, cum ut Plinius tradit, in medicina usum nullam habeat, hodie peregrina ac incognita est.

## Glans unguentaria.

**G**lans unguentaria, fructus est arboris myricae similis, magnitudine auellanae nucis, cuius nucleus graecarum nucum more tritus, humorem reddit, quo ad preciosa unguenta pro oleo utuntur, nascitur in Aethiopia, Aegypto, Arabia, & Petra oppido secus Iudaeam. Praefertur plena, recens, candida, quae facile delibretur. Ea drachma pondere pota, lienem absuit, cum lolij farina & aqua mulsa, podagricis illinitur, psoras leprasq; decocta in aceto, uuliginis & nigrae cicatrices cum nitro, emendat. & cum lorio lentiginis, uaros & papulas in facie, & cutis uitia tollit, uomitiones mouet, aluum cum hydromelite resoluit, stomacho aduersatur.

## Cap. CXXXIX.

**S**partion frutex est longus, srens uirgas, sine folijs, firmas, fractu contumaces, quibus uites uinciuntur: semen lentule, in folliculis phasiolorum modo nascens: florem, ut albae uiolae, luteum. Purgant per superna uehementer, hellebori uice, citra periculum flores & semina, quinis obolis in aqua mulsa pota. Semen deiectionem mouet. Ramis in aqua maceratis, mox tussis, extractus succus, ischiadicis & angina laborantibus auxiliatur, si cyathi modum ieiuni bibant. Quidam marina aqua macerare malunt, & infundere ischiadicis clystere. Strigmenta autem elicit cruenta.

## NOMINA ET EXPLICAT.

Graece Σπάρτιον. Latine Spartion uel spartos. Officinis Genista nomine saltem cognita. Ut Germanis et Gallis qui haec tria genera quorum picturam damus, confundunt, Pfeummen/Ginst/oder Genist appellantes.

Sparti uero quo uites ligantur, cuius hoc loco Dioscoridis meminit, uirgas longas

## Cap. CXL.

**S**ilybon lata spina est, folia ferens chamaeleonis albi. Haec recens cum sale oleoq; cocta estur. Radicis succus drachma pondere potus, uomitiones ciens.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Silybon nisi ea spina fuerit quam supra Chamaeleontem nigram appellauimus, Germanis Eberwurzel dicta, quod tamen uerisimile non uidetur, cum ut Plinius tradit, in medicina usum nullam habeat, hodie peregrina ac incognita est.

## Glans unguentaria.

**G**lans unguentaria, fructus est arboris myricae similis, magnitudine auellanae nucis, cuius nucleus graecarum nucum more tritus, humorem reddit, quo ad preciosa unguenta pro oleo utuntur, nascitur in Aethiopia, Aegypto, Arabia, & Petra oppido secus Iudaeam. Praefertur plena, recens, candida, quae facile delibretur. Ea drachma pondere pota, lienem absuit, cum lolij farina & aqua mulsa, podagricis illinitur, psoras leprasq; decocta in aceto, uuliginis & nigrae cicatrices cum nitro, emendat. & cum lorio lentiginis, uaros & papulas in facie, & cutis uitia tollit, uomitiones mouet, aluum cum hydromelite resoluit, stomacho aduersatur.

## Cap. CXLI.



aduerfatur. Oleum quod ea exprimitur, aluum potu ciet. Cortex eius magis adstringit, uerum tufa & expreffa succus abftergentibus medicamentis adijcitur, quæ aduerfus pruriginis & fcabritas idonea funt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Βαλανος μυρε-Ψιν, id est, glans unguentaria, Myrabolanus quoq; Plinio dicta, ex Barbarica regione allata, ben Arabibus dicta, hodie frequens, stomacho aduerfatur, cum hydromelite pota carnis huius drachma una est uomitoria: cum oxycrato autē iecur & lienem purgat, cum aceto autē m (quo maxime gaudet ad agendum) lepras, pforas, lenties, uirilignes, pruritum extergit, lienem & hepati indurato illinitur cum farina aliqua sicca, ut erui loli, lienem etiam prodesse scribit Gal. in theriaca ad Pisonem. Carnis huius succo facultate calido utuntur aromatarij: id enim inodorum cum sit, omnibus suscipiendis odoribus est aptissimum, ut inspidam saporibus, & coloris expers coloribus. Id oleum Balaninum Dioscoridi dicitur, ut supra suo loco ostendimus. Oleo expresso quod reliquum est magma terreum, & amarum, incidit, erget, contrahit, stipat, ad prædicta etiam efficax, sed minus, id autem uidetur esse μυροβαλάνου πικρῶς, id est, expresse, quod cataplasma misceat Gale. li. 11. & lib. 13. Meth. & huius lib. 9. comp. ph. partic. spleneticis remedijs, & ad scirrhusos lienis effectus adhiberi scribit Gal. Quo in loco μυροβαλάνου tantum, aliquando μυροβαλάνου σκενός, aliquando βαλάνου μυροψικρῶς leges, aliquando μυροβαλάνου ἀλευροῦ, id est, farina & pulvis, & μυροβαλάνου λεωοχάνου, id est, putamen & cortex, & μυροβαλάνου ὑλεπυρα κεκομμένα ἐν σιτισμένῳ, id est, myrabolani te sta & cortices incisi & tusi cribratiq;

Omnia hæc ad splenicos scribuntur, ut sit credibile maxime de fructu eodem, scilicet Balano myrepsica, & eius partibus, omnia hæc intelligi.

Quam uero myrabolani Arabiam intelligat Dioscorides, cui similem facit fructum palme Acroptie, de qua nunc dicam, planè ignoro.

Nam Arabum recentiorum Myrabolani quinque generibus distinctæ ueteribus indistincte putantur, & prout generi potius, quàm Balanorum, id est, glandium, assignandæ sunt. Sunt uero hæc.



Lutea seu citrina refrigerant cholagoga.

Inda & nigra, melancholiam purgat & exhilarat.


Cepula phlegmagoga, uisum illustrat, coctionem inuit, pectus purgat, hydropicis confert.

Empelutica (quæ Actuarius ἀμπελιζία & ἐμπεξί, quoq; dici uidetur) etiam phlegmagoga, uentriculum purgat & roborat, appetentiam reuocat, uomitum sistit.

Beleetzia empyos inuit, hemorrhoides & capilli defluuium. De his plura leges in Arabibus.

Hb 2





**N**arcissum sunt qui ut liliū, liliū appellā-  
rūt. folia porro similia, tenuia, multo mi-  
nora, et angustiora: caulis uacuis, et sine folijs,  
sup̄ deorsū attollit, flos albus, intus croceus,  
in quibz dā purpureus: radix intus alba, rotū-  
da, bulbosa: semen uelut in tunica, nigrū, len-  
gū, phatissimus nascitur in montibz, suauis odo-  
re, ceteri porro imitatur, atq; hec accū uirgō  
lēt. Radix cōcta, siue est iur, siue bibitur, uomi-  
torīa est, am̄ uisus igni prodest, cū exiguū mel-  
le trita, praecisos nervos illitu glutinat, luxatis  
mallocolis diuiniq; articuli doli ribz, trina  
ex melle & imposita, subuenit, uina cuius, r̄ sa-  
cie, qui intelligit q; cū semine urticae & aceto ma-  
culat, cū eruct melle, ulcers scides expungat.  
abscessus r̄pit cōcoctioni repugnātes. infusa  
corpori extrahit, illita cū lilij farina: & melle.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Dioscorides hoc loco, ut Plin. li. 21. ca. 5. & 10. Narcissū  
duo genera facit, licet à Theophrasto & Apuleio non nisi  
unū genus cōstituatur: nisi ex floris diuersitate duplex eius  
genus facere uoluerint. Est aut̄ Narcissus plāta congener  
aut salū similis lilio, quare quidā ipsum nō minus q̄ liliū, li-  
rion uocāt, ut tradit Diosc. Sum qui hermodactylū esse ue-  
lunt Narcissum, quorū opinio nō subscribimus, cū scia-  
mus uulgare hermodactylū esse hieronbulbū, qui et colchē  
cōdicitur de quo supra egimus.

Non



Non tamen omnino negamus ex hermodactylorum genere esse posse narcissum, cum & ipsorum plura genera hodie reperiuntur, ut supra depicta uides.

Ceterum dictus est Narcissus, autore Plinio, non à fabuloso puer, ut fingunt poëtae, sed à narce, quod torpor est, quoniam dolores & torpides capitis grauitates facit: idemq; testatur Sympolij lib. 3. cap. Plutarchus dicens: Et Narcissum appellauerunt quasi neruos hēbetantem, & torpides facientes grauitates, quapropter & Sophocles ipsum antiquum magnorum diuorum, id est, subterraneorum coronamentum uocauit.

## Hippophaës.

## Cap. CXLIII.

**H**ippophaës, quo fullōes uestes interpolāt, in fabulosis maritimisq; nascitur; surculaceo frutice, undiq; denso & largo, folijs oleæ, longioribus, mollioribusq; inter quæ candicantes spinæ emicant, siccae, angulosæ, interstitio quodā distantes, flores hædæ corymbis similes, racematim coherent, minusculi tamē, & molles, candidi, ex parte rubescētes, radix lacteo succo madet, crassa, mollis; amara gustanti, ex qua, perinde ac thapsia, succus eximitur, qui per se, & cum erui farina subactus, siccat, & ad usum reconditur. Syncerus pituitas, bilem, quasq; detrahit, oboli pondere: erui uerō farina subactus, quatuor obolis, cum aquæ mulsæ dimidia hemina tritus datur. Radice & herba liquamentum depro-  
mitur, uti in thapsia; huius in purgationibus modus est drachma.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

## Ricinus.

Hippophaës, aut Hippophyes, Lappago, Græci ἵπποφαῖς: qui dam Plinio asperuginem dictam putant. Theophrastus etiam ex thymallo hippophaës optimum apud Tegrane confici scribit. Debens accommodatæ esse eorum naturæ, neq; ex alijs causis nomen accepisse: quippe quædam animalium remedijs nascuntur locupletē diuitiæ ad gerenda præsidia: quæ hodie sit ignoratur.

## Hippophaëstum Cap. CXLIII.

**H**ippophaëstum, id quod aliqui hippophaës appellant, nascitur eisdem locis quibus Hippophaës, estq; spinæ fulloniæ genus, humilis herba, sine cauliculo, sine flore: inanibus tantum capitulis: folijs paruis, spinosis: radículas habens molles, crassas. Succus radice, folijs & capitulo exprimitur, & exiccatur. Datus, cui uoles, tribus obolis, in aqua mulsæ, aquam pituitasq; detrahit: priuatim comitialibus morbis, neruorum uitijs, & orthopnoxæ conuenit huiusmodi purgatio.

Et hæc hodie peregrina & exoleta.

## Ricinus.

## Cap. CXLV.

**R**icinus, aut croton, nomen accepit à ricini animalis similitudine: arbor prouenit paruæ ficus altitudine, folio platani, maiore, laxiore, & nigriore: ramis, caudicibusq; cauis, in arundinis morem: semine in uuis asperis, quod corticibus exutum, Ricinum animal repræsentat: ex quo oleum, nomine ricinum, exprimitur, cibus fœdum, lucernis emplastrisq; utile. Grana triginta numero purgata, trita potu, pituitas, bilem, aquæ quæ per aluum extrahunt, uomitiones mouent, sed in iucunda admodum est, & molesta purgatio: siquidem stomachum uehementer subuertit. Tusa & imposita, uitia cutis in facie, uarosq; expurgat. Folia cum polenta trita, inflammationes oculorum, tumoresq; leniunt, rigentes mēbras cohibent, eadem ex aceto illita, ignes sacros restinguunt.

Hb 3





D I O S C O R I D I S  
NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Κρότον. Latine Ricinus, Cici.  
Officinis Kerua, manus Christi, palma Christi, Cataputia maior.  
Germanis Wunderbaum, Creutzbaum, Teckenbomer.  
Gallis palma Christi appellatur.  
Itali uocant, Mirasole, & Girasole.

Ricinum à similitudine animalis sedis (uulgo ein Teck,) cum semine frictis huius, appellant Ricinos.

Nusquam non feritur: apud nos in hortis ad arcendam effodiendum talparum, ut uolunt iniuriam, inslar arboris parue profilit, folio platani maiore, uel uitium, ramis caudicibusq; cavis, & in arūdinis modum fistulosis, semine in uuis asperis, quod corticibus exutum Ricinum animalis, effigiem repræsentat tam proxime ut si uita adesse, plane Ricinus uideretur. de Ricino oleo lib. primo egimus.

Tithymali:

Platophyllos.



Cap. CXLVI.

Dendroides.



Tithymali



Helioscopius.



Cyparissus.



Nux uonica.



**T**ithymalli ge-  
nera septem,  
quorum masculus  
characias appella-  
tur, ab aliquib. a-  
mygdaloides: al-  
ter, myrtites, qui  
foemina existima-  
tur, eumq; myrsini  
tenaut caryitē uo-  
cant: tertius, para-  
lius, quē tithyma-  
lida appellant: a-  
lius, helioscopius:  
quintus, cyparissi-  
as: sextus, dendroi-

des: septimus, platyphy-  
los dicitur. Characie cau-  
les supra cubiti altitudi-  
nem attolluntur, rubri, la-  
cteō succo atque acrima-  
dentes. folijs olea circum-

ramos, angustioribus, & longioribus, radice crassa, lignosa, pendet in cacumini-  
bus caulium, coma iunci, sub qua caueola foliolis balnearum similes, in quibus  
femen cōtinetur. nascitur in asperis & montib. Succus aluū purgat, trahit pituitā  
bilem q; binis obolis in posca sumptis, et cū aqua mulsa, uomitiones mouet. Appe-  
tente uindemiarū tempore, succus congestis ramulis, mox dissectis, & uase cōclu-  
sis, excipitur. Aliqui adijciunt farinā erui, & in pastillos digerunt, qui erui magni-  
tudinē impleāt. Alij in aridas ficos, ternas quaternasue guttas instillāt, ut cū his  
inarefcāt: quas ad usum recōdunt. Per se etiā tufus in pila, & in pastillos coactus re-  
ponit. Porro cū extrahitur lac, neq; quo uētus aspiret, stare quenquā, neq; manus  
oculis ad mouere cōuenit: sed anteq; colligas, corpus, præsertim faciē, collum, scro-  
tumq; genitalis, adipe aut oleo cū uino perungere. Fauces aut exasperat, quapro-  
pter catapotia cera aut decocto melle oblini par est, & hoc modo dari, binas tamē  
ternasue ficos, purgationis gratia sumpsisse, satis est. Recēs lac ex oleo, perunctos  
in sole capillos euellit, renascētesq; flauos & exiles efficit. deniq; oēs perimit. Dē  
tū cauernis in lusu, leuat dolores. sed cera dētes oblinendi, ne suo delapsu, fau-  
ces & linguā uitiet: tollit illitu impetigines, formicantes uerrucas, pēfiles, & que  
thymiflorē representant. ualet aduersus prerygia, carbunculos, phagedenas ulce-  
rū, gangrenas, fistulasq;. Legit semen autūno, & siccātū sole leuiter tunditur, fer-  
uef. in q; loco mundo reponitur. Folia itē siccantur. Semen & folia lactei suc-  
ci effectū præbent, dimidio acetabulo pota. Sunt qui inueterant, admisto cū lacte  
lepidio, et caseo cōtuso. Radix drachmę pōdere in hydromelite pota, per inferna  
trahit. decocta cum aceto, dentiū dolori auxiliatur, colluto ore. Foemina, quam  
myrsyniten, aut caryiten uocant, similis suapte natura daphnoidi: folijs myrti  
sed maiorib. firmis, in cacumine acutis, & pungentibus: ramulos ab radice mittit  
dodrantales, fructū fert alternis annis, nuci similē, mordaci gustu. nascit in aspe-  
ris. Succus, radix, semē, folia, consimilē antedicto sortiuntur facultatē, sed ad citā  
das uomitiōes inualidior hęc est. Aliud tithymali genus dicitur paraliōs, quē ti-  
thymalida, aut mecona aliqui appellauere, nascitur in maritimis, ramis subrubēti-  
bus, palmum altis, quinis senisue à radice exeuntibus folijs lini, angustis, paruis



oblongis, in uersus quosdam digestis: capite in cacumine orbiculato, in quo semē uterum, uario colore emicat. Flos albus, frutex totus cum radice lacteo succo turgēt. Similes ad usus reconditur. Helioscopius dicitur, folijs portulacę, tenuioribus, rotundioribusq; ramulis prodeuntibus a radice, quatuor aut quinque, rubentibus, doctantali altitudine, tenuibus, lactis copiosi plenīs: capite anethi semine uelut in capitulis incluso. Helioscopij nomen accepit, quoniam comas cum sole circumagat: circa oppida nascitur, potissimum in ruderibus. Colligitur succus semēq; ut aliorum. Exdem quę superioribus uires, non tamen usque adeo ualidę. Cyparissias in caulem exit dodrantalem, uel maiorem, subrubrum: ex quo folia picę similitudine exoriuntur, molliora tamen, & tenuiora. & in totum nascentē picęam æmuletur, unde nomen traxit: candido succo madet, cui eadem uis quę superioribus. In petris nascens, dendroides cognominatur: ampliter opacat, in cacumine frondosam spargens comam, succo lacteo prægnans, cauliculis rubentibus. folijs myrti tenuioris: fructu characię. Eiusdem effectus, cuius superiores, similisq; modo reconditur. Platyphyllos, uerbasci similis est. Radix, succus, & folia, per inferna trahunt aquas. Pisces necat, tufus, & aquę insparfus. Reliqua tithymalorum genera quę supra scribuntur, idem efficiunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Septem statuuntur Dioscoride & alijs ueteribus testibus, Tithymalorum genera, prima Characię, hoc est, uallaris. Sic dicta quod uallis & septis muniendis apta sit, a uallo, quod Gręcis χάραι dicitur: quę sepium iungendarum idoneitas causa fuit, ut baltheum etiam, id est, cinctura sit dictam, fortę eam quam Germani uocant Beren milch. Secundus myrtites quasi myrtacea a foliorum myrti figura. Sicut a nucibus quibus similem fructum caryites & myrsites. Hunc fructum sunt qui nucem uomicam, Germanis Kionenglin uocatam esse putant. Tertius paralius, id est, maritimus dicitur, eo quod maritimis nascatur locis. Quartus Helioscopius, id est, solisequus appellatus est tithymallus, eo quod coma eius ad solis cursum circumagatur. hic Germanis quibusdam dicitur Sonnenwendende wolffsmilch. Quintus Cyparissias nuncupata est a foliorum cupressi similitudine. Germani imitatione latine Cypressene wolffsmilch appellant. Sexta dendritis siue dendroides, id est, arborescens, a ramorum copia, & quod ferę arborescat, Germanis Die grōß wolffsmilch dicitur. Septimus platophyllas, id est, laetifolius, a foliorum latitudine nominatur Breyt bletterte wolffsmilch.

Ex Tithymalorum generibus tria tantum depicta damus, proferent fortę alij longę plura, nam et si Dioscorides plures species descripserit nobis incognitas, habemus tamen nos uicissim alias multas quas ipse non descripsisse uidetur.

Turbith officinarum.



Turbith Mesue quibusdam uidetur secunda species tithymalli. Laudant Arabes eius corticem albū, gummosum, uacuum, arundinaceum, recentem, fragilem: corrigunt zinzibere, & formatis ex eo trochiscis.

Genera tithymalorum habent acrem calidamq; facultatem, inest uerō & amaritas, ex quarto itaq; calfacientia sunt ordine, & ualenter desiccant.

## Pityusa. Cap. CXLVII.

Pityusam specie a cyparissia differre constat, & si tithymalorum generi assignetur. caulis supra cubiti altitudinem assurgit, geniculatus: folijs picę, acutis, exilibus: flore paruo, uelut purpureo: semine instar lentiscalę, lato: radice crassa, candida, succo referta, quibusdam in locis frutex hic prægrandis inuenitur. Detrahit per alium radix, drachmis duabus data in aqua mulsa, item seminis drachma. Succus cum farina subacti cochlearium in catapotio datur, modus foliorum drachmę tres.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Πιτυουσα, hoc est pityusa hodie omnibus herbarijs officinisq; ac recentioribus medicis incognita, fruticosa est: caule supra cubiti altitudinem assurgente, geniculato, folijs picę acutis exilibusq; flore paruo.



paruo purpureo, semen latum forma lenticuli, radicem madidam succo, quam quidam r̄b̄zotomi circūlatores pro albi hellebori radicibus diuendunt. Scaphoni Germa. appellant. Aetharijs turpention no eant simpliciter. Pituisa bilem & pituitam per aluum detrahit, radix decocti hemina, aut seminis ligula in balanis &c.

## Lathyris.

## Cap. CXLVIII.



**L**athyris, quam aliqui tithymalum appellant, eamq; tithymalorum numero adscribunt, caulem emittit cubiti altitudine, & digitali crassitudine, inanem. gignuntur in cacumine alæ, & folia in caule oblonga, amygdalinis proxima, latiora, & læuiora. quæ autem in summis ramulis exierunt, minora conspiciuntur, aristolochiæ, aut oblongæ hæderæ figura. In cacumine fructum summis furculis gerit, triplici loculamento insignem, rotundum, ceu capparin, in quo grana\* intercurfantibus membranis inter se distincta continentur, eruis maiora, rotunda, quæ dum corticibus exuuntur, candida sunt, et gustu dulcia. Nullus radicis usus, totus frutex lacteo succo turget, uti tithymalus. Grana sex aut septem in catapotto, aut cum ficis aut palmulis deuorata, aluum purgant: sed aqua frigida postea sorbenda, trahunt autem bilem, pituitam, & aquas. Succus tithymali modo exceptus, eundem effectum præbet. Cum gallinaceo aut oleribus folia decoquuntur ad eisdem effectus.

\*Addetria.  
purpurea.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Λαθυρίς. Latine Lathyris. Officinis Cataputianorum.

Germanis Springkorn/crebtkorn

Gallis t̄spurge dicitur.

Sunt qui Lathyrin dicant Tithymali speciem esse, tum quod similiter illis succum habeat, tum quod eodem modo purget, uniuersæque illis facultate similis sit, nisi quod semen gustantibus uideatur dulce, quod sanè etiam maximam uim purgatoriam obtinet. Calidum in tertio, et in primo humidum statuit.

## Peplus.

## Cap. CXLIX.

**P**eplos frutex est lactei succi plenus, folijs paruis, ut rutæ, paulò latioribus rotunda coma, ferè dodrantali, humi resperfa: semine sub folijs rotundo, minore quam candidi papaueris, pluribus scaturit auxilijs, unicam radicem habet, superuacuum, ex qua fruticat. nascitur inter uites, & in hortis. colligitur messibus, siccatur in umbra, & continerè uersatur. fructus rufus & feruefactus reconditur. Bilsac pituita detrahitur, acetabulo eius in hydromelitis cyathopotio, obsonijs insperfa conturbat aluum, muria conditur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Peplum, Officinæ Esulam rotundam

Germani Runde wolffsmilch.

Galli Vineale reuelium uocant.

Græcis Ρεωλος dicitur: inter uites et in hortis inuenitur frutex lactei plenus succi, folijs rutæ paulò latioribus, circinata coma, palmati, humi procumbente, fructu sub folijs rotundo, tribus loculis discreto, in quibus semen nigrum, papaueris magnitudine continetur. Semine potio aluus soluitur, ac pituita detrahitur.

## Peplis.



## Peplis.

## Cap. CL.

**P**epelis, quam aliqui sylvestrem portulacam uocant, Hippocrates peplion, in maritimis maximè nascitur, latè opaco frutice, candidi succi pler. o: folijs sati uæ portulacæ, rotundis, inferne rubentibus: semine sub folijs rotundo, uti in peplo, feruente gustu: radice singulari, superuacua, tenui: Colligi, & reponi ac dari, uti peplos, & sale condiri solet. Eisdem habet uires.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci πεπλῖς. Latine Peplis herba maritima, quæ & peplion, & portulaca sylvestris, hodie planè incognita, nisi ea fuerit quam hodie officinæ omnes soldanellam appellant ut quidā arbitrantur.

## Chamæscice.

## Cap. CLI.

**C**hamæscicen aliqui sycen neminant, ramos emittit quaternum digitorum, teretes, succosos, in terram deiectos: folia lentis, parua, pepulum planè refo rentia, tenuia, quæ à terra non attolluntur. semine sub folijs rotundo, ut in peplo neque caulem, neque florem promit, radice firmatur tenui, superuacua. Ra mi ex uiuo triti uulug dolores sedant, in pello appositi. tollunt tumores ac uerru cas omnium generum illiti, decoctorum cibo aluus resoluitur. Succus simili ef fectu prodest. illitus contra scorpionis ictum auxiliatur. aduersus caligines oculo rum utilis, & hebetudines, incipientes suffusiones, nubeculas, cicatrices, cum melle inunctus. In squallidis petrosiscq nascitur.

De hac hodie nihil certi constat.

## Scammonia.

## Cap. CLII.

**S**cammonia ramos ab una radice emittit trium cubitorum, multos, pingues, & qui nonnihil crassitudinis præ se ferant. folijs helxinæ, aut hedei ac eis, mollioribus tamen, hirsutis, & triangulis: flore candido, rotundo, in calathi modum cauo, graueolente: radice prælonga, crassitudine cubitali, candida, graui odore, succo grauida. Legitur ad hunc modum succus. Capite exempto, radix in testudi nis speciem cultro excuatur, quo fit ut in cauum confluat succus, qui conchis de mum excipitur. Alij scrobes in terra cōcamerato sinu fodiunt, in quos, subiectis iuglandium folijs, profundunt succum, siccatumq extrahunt. Laudatur autem scammonium leue, nitidum, rarum, & colore quàm simillimum taurino glutini, fungosum, tenuibus fistulis, quale ex Mysia regione Asiæ deportatur. Nec atē dere solum par est, si linguae tactu albescat (hoc enim euenit adulterato, quod ad misto fit tithymalli lacte) sed longe magis antea narratis, item si non uehementer linguam exurat, id quod misti tithymalli argumentum est, natione autem Syriæ cum & Iudaicum deterrima habentur, graui, densa, erui farina & tithymalo uita ta. Succus drachmæ unius aut quaternum obolorum pōdere haustus, ex aqua pu ra uel mulsa, per interna bilem & pituitam extrahit. ad resoluēdam aluum binos obolos cum sesama, alioue semine, sumplisse satis est. dantur efficacioris purgatio nis causa, succi tres oboli, cum duobus ueratri nigri, & aloës drachma una. Fuit purgatorij sales, drachmis uiginti succi scammonia, in senos salis cyathos adie ctis: Horum modus proportionē uirium: integer quidem, tria cohlearia, medius duo, minimus unum. Radicis drachma una aut altera purgat, cum ijs quæ retulim us. Nonnulli decoctum radicis ebibunt. Coquitur in aceto, & cum hordeacea farina teritur, cataplasmate ischiadicis utili. Partus enecat succus, uulua in lana subditus, tubercula discutit cum melle aut oleo illitus. decocto in aceto peritur. & glepræ abiguntur. diuturni capitis dolores ex aceto & rosaceo perfunduntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Scammonium quoniam ceteris præstat, quod in Celophom (quæ insula est Ionia. Apollinis oraculo nobilis) gignitur, ideo & Colophonium nominatur. Itaq; eiusmodi succus, qui in quotidiano medicinae usu ad purgationes præstantem & maximam uim habet quatuor modis colligitur apud Mesuē, duobus tantum Die. Vn bimo nec antea nec postea Medicinas omnes exacuit, & stomacho (ut Gas lenus



tenuis scribit) inimicum est, atq; eius dissolutionem facit. Recentior autem Græcia & officina nostræ, lachrymā hanc, quo minus stomachū offendat, in cotoneo malo decoquunt, atq; tum illā Diacridion, quasi dicās, lachrymiā uocāt: hē uerō corrupto uocabulo diacridion appellant. Plinio præter Colophonium commendatur & Mysium, Pricænnse, specie nitidum, & quāsimillimum taurino glutini, fungosum, tenuissimis fistulis, citò liquecens, uirus re dolens, gummosum, linguae tactu lactescens, quāmlenissimum, cum diluitur albescens. Dosis ultima scammonij per se. Mesue sunt grana 12. Actio scrupuli duo, uel, ut inquit, pro uirtutis ratione maior aut minor. Galeno & Oribasio exhibetur pondere drachmæ unius. Dioscorides quoq; integram drachmam non ueretur offerre: sufficere tamen ad soluedum aliū dicit duos obolos. Quod si efficacius purgare, uel ut ipse inquit: quater ni oboli, cū ductis ueratri nigri, et Aloes drachma una, si ipsum Dioscoridē sequamur, dari possunt. Ego, inquit Manardus, licet nunquam sim ausus tantum dare, duo decim tamen grana transcendere non sum ueritus, scioque quosdam scrupulum integrum hausisse sine noxa.

## Chamelæa.

## Cap. CLIII.

**C**hamelæa surculosa fruticat, ramis dodrantalibus. folia oleæ similitudinem habent, tenuiora & amara, quæ gustata linguam mordent, & arteriā densa. <sup>\* Alij addunt densa.</sup> Detrahūt pituitam bilem; folijs præsertim in catapotia deuoratis: namq; duæ absinthij partes, adiecta chamelææ una, hydromelite excipiuntur, & in catapotia coguntur: ea autem in uentre nō liquecunt: siquidem quotquot fuerē deuorata, regeruntur. Folijs cum melle tritis fordida ulcera & crustosa repurgantur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Officinis & recentioribus Herbarijs Leo terre, aut linum syluestre, item oliuella.

Germanis Zylandt Gallis boys Gentil appellatur.

Plura uide in annotationibus nostris in caput proxime sequens.

## Thymelæa.

## Cap. CLIII.

**T**hymelæa est, qua granum gnidium, quod est semē ipsius, <sup>Euboeæ.</sup> colligitur, hoc Syriæ apolinum uocant, quoniam satiuilis ni fructus suapte natura similitudinem referat: uirgas ædit perpulchras, multas, tenues, tripedaneas: folijs chamelææ, angustioribus, & pinguioribus, uiscosis, gummosisq; si mordeantur: flore candido: fructu myrti in modum rotundo, qui inter initia uiret, et tandem rubescit. inuolucrum fructus durum, foris nigrū, intus albam. Hoc per inferna bilem, pituitam, aquasq; detrahīt, si uiginti granorum pars interna bibatur: uerum fauces adurit. Itaque cum farina aut polenta, aut in uiræ acino dari debet, aut melle cocto obductum deuorari, qui ægrē defudant, trito semine cum nitro & aceto, inunguntur. Folia quæ peculiariter encorum appellantur, per menses colligi debent, & siccata in umbra recondi. Quibus dare libeat, antea tundere, & nervos eximere conuenit, illitum acetabuli modo cum diluta uini portione, aquam extrahit, mediocrius purgat, addita lente cocta, aut cō tritis oleribus. Thymelææ farina uiræ acerbæ succo excipitur, & in pastillos diuiditur, herba stomacho infesta. partus impolita necat. Nasceitur in montibus & asperis. Hallucinantur qui coccon gnidium fructū esse chamelææ existimant, decepti quædam foliorum similitudine.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Thymelæa cuius mentionem hoc loco Dioscorides facit, est Mezereon Mesue & officinarum, ut patet conferenti fructum, myrti bacca æmulum utriq; quod Granum gnidium dicitur Dioscoridi, officinis Coccon gnidium. Germanis Kellers bals. Foliaq; oleæ similia faciunt ambo sed angustiora. Diosc. maiora, Mesue. ramos Mesue bicubitales, Dioscoridi tripedaneos, Cum hi Chamelææ (quam





(quam nonnulli Mezereon putant) sicut dodrantes et palmo tantum alii: unicam autem thymelaeam facit Dioscorides: multas Mezerei species facit Mesuet.

## Sambucus.

Ebulus. Xitich.

## Cap. CLV.

Sambucus. Zolder.



**S**ambuci duo genera. Vnum in arborem assurgit, surculos spargens arundinaceos, teretes, cauos, candicantes, proceros. folia iuglandis, terna quaternaque, ex interuallis circa ramos exeunt, graui odore, minutim in ambitu secta: & in ramulorum cacuminibus cauliculisque circinate umbellae, quae florem candidum pariunt, mox acinum terebintho similem, in nigredine suppurpureum, racemosum, succo madentem, uinosumque. Alterum genus, chamaeciae uocatur, Romanis ebulum, longe humilior est, magisque herbaceo generi assignandum, caule quadrangulo, geniculato, folijs amygdali, ex interuallo longioribus, geniculatim expansis, pinnatisque, graueolentibus, in ambitu serratis: muscario sambuci, flore & acino eiusdem: radice nititur longa, crassitudine digitali. Eadem utriusque uis, & usus exiccans, aluo detrahens aquam, stomacho inutilis. Folia olerum more coquantur, ad pituitam hilemque detrahendam. Caules teneri in patinis cocti, eadem efficiunt. Radix in uino decocta, et in cibis data, hydropicos adiuuat, prodest uiperarum moribus, eodem pota modo, uulvas emollit in fidentium decoctio: patefacit earum spiracula, & uitia corrigit. Acini in uiuo potu eodem funguntur munere, denigraunt capillos losilliti. Folia, si praetenera ac mollia ex polenta illinantur, inflammationem mitigant, ambustis & canis moribus illitu profunt, ulcera quae dehiscunt in fistulam, agglutinant, ijs qui podagra tentantur, cum seuo taurino aut hircino profunt illita folia.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sambucus uel sabucus Graeci Αμβρά. Officinis Latinum nomen seruauit.

Germanis Zolder, Glader. Gallis seu, suoisean dicitur. Ebulus Graeci χαμαίεχρον.

Officinis genuinum seruauit nomen. Germanis Xitich, Gallis Hieble appellatur.

Vtraque Sambucus, & arboreseens & herbacea, exiccandi, conglutinandi, modiceque digerendi facultatem obtinent. Paulus Aegineta haec adiecit. Potae & manducatae aquam per aluum educunt, propter quam causam quia purgatorijs uim habent de ipsis hoc libro agit Dioscorides, cum alioquin resenseri debuerant inter arbores.

Picnocnemon.



## Picnocomum.

## Cap. CLVI.

**P**icnocomon constat erucæ folijs, acrioribus, scabris & crassis: caule quadrangulo: flora ocimi: semine marrubij: radice nigra, aut pallida, rotunda, exigui mali figura, terram redolente. Inuenitur in saxolis locis. Semē grauiā somnia & tumultuosa facit, drachmę instar potū. tumores discutit, illitū cum polenta, spicula, adactosq; corpori aculeos, extrahit. Folia illitu tubercula, panosq; discutiunt. Radix eius in aqua mullā, duū drachmarū pondere, alui soluit & bilem extrahit.

*Picnocomon hodie planē neglectum & incognitum.*

## Apios.

## Cap. CLVII.



**A**pios iuncos duos siue tres spargit, rubros, tenues, qui à terra parum attoluntur: folijs rutæ, oblongioribus tamen, & angustioribus, herbaceis: semine paruo, radice hastulæ regię\* in formam pyri turbinata, \*spondilij. rotundiore tamen, succi fecunda, intus habet corpus candidum, extrā cortices nigros. Superior pars eius uomitione bilem pituitasq; extrahit: inferior per aluum, tota utrinque purgationes mouet. Succum si libet eximere, tula radix in fictili mergitur, & agita-

ta aqua, quod supernatat pinna selectum, exiccatur. Purgaturaq; parte is luecus, se sequi obolo potus.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Apion, cuius picturam damus, Fuchsio falsò Germ. Rosel Kern / erdnuß / seu brot / siue Schweins brot appellatur, nominibus scilicet rebus alijs dictis, ut Ciclamini & ornithogali, radice similitudine quadam deceptus, quo igitur nomine Germanico siue Gallico hodie appelletur scire nondum potui.

## Colocynthis.

## Cap. CLVIII.



**C**olocynthis sarmenta foliaq; satiuū cum cumeris emittit, per terram repētia, diuisa, fructum in speciem mediocris pilæ conglomeratū, uehementer amarum: quem lege re oportet, cū ceperit in pallidum colorē permutari. Medulla fructus purgatoriā uim habet, si quatuor oboli cum aqua mullā, melle cocto, myrrha & nitro excipiantur, & cogantur in catapotium. A refactæ pilę teruntur, & infusæ clysteribus profunt nei uorū resolutioni, coxendicū doloribus, & coli uitij, ut quæ bilem, pituitam & strigmenta, interdum etiam cruorem eliciant. fœtus admotæ enecant, dentium dolorē tollit, si una repurgetur, & luto oblita cū aceto & nitro inferuescat, hocq; iure decocti dentes colluā-

tur, si aqua mullā aut passum in eadem incoquatur, & sub diuo refrigescat, potu crassum humorem & strigmenta alui detrahet. stomacho supra modum aduersatur, subdita ex ea balano, alui excrementa eiiciuntur. Virentis succo utilissimè ischiadici perfricantur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Κολοκύνθις. Latine Colocynthis, cucurbita syluestris. Officinis corrupte Colocynthida. Germanis Coloquint. Gallis Corge sauage, coloquinte.



Mesue duplex genus Colocynthis constituit. Nempe marem & feminam, Mas gravis, durus, asper, nigricans, & lanuginosus est. Femina eidem autori presertim mari, presertim magna, siue ut dicunt, grossa, lenis, laxa, candida, leuis, & perfecti maturae: et cuius pars interior, siue medulla, pulposa, laxa, leuis, hoc est, non aspera & insigniter alba est. Optima Venetijs emitur Colocynthis, & quae ex orientalibus regionibus, ut pote calidioribus, ad nos aduehitur. Quae apud nos nascitur, inefficacior est, & aegre aluum soluit. Caterum probatissima syluestris huius Cucurbitae medulla, siue, ut loquuntur, pulpa, antequam in usum assumatur, primum incidenda est, deinde terenda diligenter, & saepius cribranda. At usus tempore rursus cum mulla mortario exquisitissime subigenda, id enim illi, inquit Aetius, peculiare est, ut trita antequam madescat, subtilissima appareat: sed post mullae infusionem ita intumescat, ut qui uideat, cribratam minime putet. Quoddam igitur frustulum eorum quae intumescunt, saepe uentri aut stomacho inhaeret, saepius tamen intestinorum anfractibus implicatur. Cumq; sit naturaliter acris & mordax, ulcerat intestina, parit & contractiones. Propterea exquisitissima diligentia ad ultimam minutiam redigenda est. Sed mullae prius aut rursus decoctio infunditur, tum excicata in puluerem redigitur. Paulus & Auicenna, quem est Mesue secutus, ipsam Colocynthida etiam plurimum teri uidetur. Serapion autem, sed male, contrarium asserit, eam uidelicet non multum esse terendam. Dosis pulpa colocynthidis ad summa est, decem ceratia, Mesue. Paulus drachmam integram dare non ueretur, quae eiusdem sententia pendet ceratia decem et octo. Datur Actio Colocynthidis: medulla scrupulorum duorum pondere, ex duobus mullae cyathis. Imbecillibus tamen inquit, scrupulus sufficit. Quatuor obolis sumptu purgat hoc loco Dioscoridi, melle cocto, myrrha & nitro excepta, atq; in catapotium coacta.

Pituitam, bilem, & strigmenta Dioscor. purgat: bilem uero & mucos, non a sanguine, ut elleborus scammonium, sed a neruis & neruosis partibus, Paulo. Danda quibus caput est laesum, & meningis, aut pericranion, uertiginosis, hemiplegicis epilepticis, apoplecticis, cymosis, asmatibus, & thopneicis. Paulo.

Cum oleo spinae affricatum lumborum & coxarum dolores sanat & alia multa potest Dioscor. Pli. Galen. Paul.

### Epithymum.

### Cap. CLIX.



**E**pithymon, flos est ethymo duriore, satureia similis, capitula habet tenuia, & leuia, & in eis caudiculas, quasi capillamenta. Potum cum melle detrahit pituitam, bilemque atram, per inferna. Priuatim prodest melancholicis, & inflatis, acetabuli mensura, ad quatuor drachmas, cum melle, sale, & aceti exiguo. Plurimum in Capadocia & Pamphylia gignitur.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Epithymum Graecorum est flos thymi satureia similis, calidus siccus gradu tertio, omnia potest quae thymus, sed efficacius, ob id illius per nuria hoc uti licet, mensura tamen maiore. Datur Epithymum drach. 4. cum sero lactis uel mulla, ad educendum humorem melancholicum. R. 1. oum loco si Arabum Epithymo, hoc est, cassuta thymo innata, ut satureia seu thymbræ Epithymum Aethiopiae dicitur, & hyssopo, & maiorana epysopu: & orobo orobache, & lino lianche, uti libet, quia uires cum thymi flore easdem illi Plinius ueterum solus tribuit: dabitur uero

Mesue ob imbecillitatem ad drach. quatuordecim ad drach. uiginti. Epithymus autem Arabum, ut thymus, est duplex, hortensis, & hoc calidior, siccior motanum.



### Alypum.

### Cap. CLX.

**A**LYPON surculosa herba est, subrua, gracilibus ramulis: tenuibus folijs: flore molli, leui, & copioso: radice betæ, tenui, referta, acris succo: semine Epithymi: gignitur in maritimis, maximè Lybiae, quam laragissima.



gissima: quanq̃ alibi quoq̃ plurima prouenit. Semen atram bilem deſcit, ſi mēſu  
ra epithymo pari cum ſale & aceto ſumatur. uerum interanea leuiter exulcerat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Alypon uel pituſani Dioſcoridis eſſe Turbith uel Turpetum Actuarij quidam arbitrantur, quam  
etiā Turpet & barbaris uocari ſcribit Dioſc. nec fortè uox ea cū Leoniceo & alijs quibuſdam expungē  
da ex Dioſcoride fuerit, quā alijs plerq̃q̃ appellationes barbaras interponat, Turbith autē Meſue, ut  
ſuprà monuimus, ab hoc diuerſum eſt, et quibuſdam uidetur ſecunda tithymali ſpecies. Alypion uel A-  
lypia alium ſoluit, in aqua mulſa, Plinio, addito ſale modico. Minima potio eſt duarum drachmarum:  
media quatuor: maxima ſex, ea purgatione, quibus datur ex gallinaceo iure. Depellitur atra bilis ſemi-  
ne, Dioſc. ſi meſura Epithymo pari, cum ſale & aceto ſumatur. purgat autem maximè bilem atram,  
qua purgata animi triſtitia in melancholicis pellitur à qua uſeu ſacultate potuit illi nomen fieri. Eſt  
enim Græcis Alypon, quod triſtitia doloreq̃ caret, aut liberat.

Empetrum ſeu calciſtaga.

Cap. CLXI.

EMpetron aliqui phacoides uocant, naſcitur in montibus et maritimis, ſalſo  
gultu, ſed quo propius terreno fuerit, amarius ſentitur. Trahit bilem, pi. ui.  
tam, & aquam, ſi bibatur in iure aliquo, aut hydromelite.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Quale fuerit huius herbe ſolum apud Dioſcoridem, annuaducri nullo modo potuit. quòd corroſi  
in hac parte Græci ſuere codices, ita ut in ipſo uerborum contextu ſpaciolum inane uacabat. ab alijs ue-  
rò deſcribitur herba ſesquipedalis, geniculatis cauliculis, ſucculenta, folio maris roris, niſi quòd mul-  
tò carnoſius & rariuſ, ſemine corymbis dependentibus, ſornculi effigie, ſuſcilo luteolo, ſingulari ra-  
dice, exili & breui, odore guſtuq̃ ſaliſ. Gallie uulguſ quòd medys erum  
pat ſaxis, perce, pierre, hoc eſt perſoripetram. Sanctones rumpe pure, id  
eſt, rumpi petram, multi marinam criſtam, quòd montium iuga & ſco-  
pulum crepidines ea uſtita criſtemur, aliā tamen omnino ab ea, quā  
cretam appellant morinam. Frequens eſt in Maſilienſi ora, neq̃ non in  
maritimo Sanctonum tractu. Germania uerò peregrina. Hallucinantur  
qui eam herbā officinæ ſaxifragam albā, Germani Deif & hoben ſeu  
biech appellant, Empetrum eſſe contendunt, notis omnibus ſupradictis  
apertiſ, reſtamanibus, nempe caulem habet lanuginoſum, ſubrubicu-  
dam, folia exigua, rotunda, in extremitatibus incifa, flores candidos, ra-  
dicem exilem, cui graniula Coriandri ſeminis quantitatem reſerentia ad-  
herent, partim alba, partim rubra, quibus officinæ pro ſemine eius utun-  
tur. hæc urinam mouet, calculoſos frangit & conerit. Stranguaria itaque  
conferat: abſtergit enim expurgatq̃, & que in ueris eſt craſſiciū, ſicut  
alia omnia, que amara ſunt, incidit. Menſes quoq̃ cit, craſſaq̃ ac glutin-  
oſa ex thorace eduiſit. hanc quidam arbitrantur pseudoburſon eſſe  
Dioſcoridis.

Saxifraga alba.



Vitis ſylueſtris.

Cap. CLXII

Vitis ſylueſtris farmenta uitis modo prælonga cimit  
tit, aſpera, lignoſa, rimoso cortice: folijs hortentiſ  
ſolani, longioribus ac latioribus: muſculoſo flore, & capilla-  
ceo: fructu exiguiſ uitis ſimili, poſt maturitatem rubente  
rotunda eſt acinorum facies. Perueſta radix in aqua  
& in cyathis duobus uini aqua marina diluti pota, humo-  
rem alui ciet. ideo hydropicis datur. Vuæ eius, uitia cu-  
tis in facie, & maculas omneis expurgant. Enaſcentes ui-  
ticulæ, ubi gratia, ſale condiuntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO

Sylueſtris uitis quibuſdam ea uidetur cuius picturam exhibemus ut  
delicet quam ſuprà eleminat alteram ſcimus, uulgo Tieleu / Lencu /



Gallis hardea & uioria appellata, quam Fuchsius falsò pro uite nigra definxit  
quid aut hac controuersia statuendū Doctiores iudicent



Bryonia.



Vitis alba. Cap. CLXIII.

**V**item albam aliqui bryoniam uocant. Folijs uiticulis, pampinisq̃, latiuā uitē imitatur, sed hirsutiora sunt oīa, ea quos ppe se nacta sit frutices, suis clauiculis cōplectitur. fructus rubēs in uua dependet, quo coria pilis spoliānt. Ex ea asparagi, qui primā germinatione exēit, decocti in cibo, aluū & urinā cient. Folia, fructus, radix, ac rē uim fortitūtur. itaq̃ ulcerū phagedenis, gāgrenis, chironijs, putrentium tibiārū tedio, efficaciter ex sale illinuntur. Radix corpus abstergit, & cutem erugat. uitia cutis in facie, uarosq̃, lentigines & cicatrices nigras emēdat, cū eruo, creta Chia, & fœnogræco, eodē effectu prodest decocta in oleo, usque dū lique scat. sugillata tollit, reduuias cōmittit, inflāmationes discutit illita ex uino. suppurations rūpit. medicamento aptē immisceat, quod carnē exest, infracta ossa extrahit, trita & imposita: datur comitialibus in potu drachmę pondere, quotidie, anno toto, pdest artionitis, & uertigine laborantibus, cōsimiliter assumpta. cōtra uiperarū ictus pota drach. duabus, auxiliat. paratus necat, mentē interdū subtrahit. fœminarū locis apposita, prius secundasq̃ morātes trahit. cit urina pota: eclegma ex ea fit cū melle, difficile spirantibus, strāgulatu oppressis, tussitibus, uulsis, ruptis,

& laterū doloribus lienē ternis obolis pota ex acetotriginta diebus, consumit. illinitur ad eadē cū fico. ad mulieres in scissus decoquit: siquidē uuluas purgat, sed abortum facit. Succus ē radice uerē exprimitur, quitrabit pituitam, cum aqua mulsa potus. Ad psoras & lepras semen efficaciter ilinitur. lactis abundantiam facit succus eius, si cum tifico decocto forbeat.

Γερὲ ἀμπελὸς λευκῆ. Latine Vitis alba. Officinis Bryonia.

Germanis Schmetzwurtz. Saun ruben / wilder zitwar. Gallis Colubrine, coleure, dicitur, forte quod in hac colubri sepe stabulantur.

Calctū multū Bryonia baccis rubentibus, quibus depilat. & ob id coria dēantib. est utilis, et quicquid attigerit, rubriscat ignis modo, unde Gallis quoque ignis ardens, eorū idiomate, du seu ardant, tota planta dicitur. Galeni: fructus eius maturitate ruber, racemosus, est Psilotrum ut planta ipsa. Nam ἀμπελὸς λευκῆς βρυωνίας καὶ ψιλοτροῦ καλῶσι. Gal. lib. simpl. tamen ἀμπελὸς λευκῆς & βρυωνίας separat lib. i. comp. ph. part. in pilos corripentibus medicamentis.

Vitis nigra.

Cap. CLXIII.

**N**igra uitis, quam alij nigram bryoniam uocant, folia fert hederæ, sed maiora, smilaceis proxima: caules etiam cognatos, capreolis suis arbores, quasi adminicula, comprehendit. fructus racematim coherent, qui inter principia uirent, & post maturitatem nigrescunt. radix foris nigra intus buxæ colore nitet, uiticulæ quæ primo germinum partur erumpunt, in olera recipiuntur. Menses pellūt, urinas cient



cient, lienē absument, uertiginosis, comitialib, neruorū resolutione tentatis, pro sunt. Radix eadē, quę uitis alba prestat, sed inefficacius. Folia cū uino exulceratis tumentorum, a ceruicibus commodissime illinuntur, luxatis itidem imponuntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Falluntur Euchsus & alij, qui nigram uitem aliam esse plantam ab alba differentem arbitrantur, cum eadem sit colore, in radices quę huic nigra alterius alba, & fructu tantum differunt, quem alba uitis rubrum, nigra uerō nigrum præfert: alba uitis rubro fructu in agro Argentinesis, nigra uerō radice & fructu nigro in Norico copiosiss, proueniunt, simul nascentes nusquam reperi.

Filix. Filix mas.

Filix foemina.

Cap. CLXV.



**F**ilix folia sine caule, sine fructu, sine flore, ex uno pediculo, cubitali longitudine, multifida, et lateribus pinnata, subgrauis odore. radice per summa cespitiū nigra, oblonga, filices multas fundente, subastringente gustu, nascitur in montibus & saxosis. Radix latus tinea excutitur, sumpta drachmis quatuor ex aqua multa, melius si cum scammonie aut ueratris nigri totidem obolis detur, sed qui sumunt, alia pregestare debent, laborantes lienis in cremento recreat, radix & potu et illitu cū axungia uulneribus sagitta arundinea factis, est auxilio. Cuius rei probatio talis fertur: Peribit filix, quā per ambitū lata copiosior arūdo coronet, & contrā, euanescent abibit arundō, quā obsepies multa filix in orbē cinxerit. Filix foemina folijs est filicis, surculosis, altioribusq, & quę nō singulari, ut illa, pediculo fulciant: radicib, longis, pluribus, obliquis, quę ex nigro in lutū statiescūt, aliquę etiānum rubrę inueniunt.

Pellunt lata interaneorum animalia cum melle eclegmate sumpto, pota cum uino drachmis tribus, teretes tineas efficiunt, datae foeminis, sterilitatem faciunt, & pregnantibus abortum, si supergrediātur. Farina humidis ulceribus et cicatrici repugnantibus inspargitur, tumentorū ceruicibus medetur, Folia recentia in oleribus cocta manduntur, ut uentrem emolliant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Filicis Plinio ut Dioscoridi duo genera nec florem habent, nec semen unum nō sēp Græcis, Latine filicem maiorem. Germani Sohefarn. Galli osmundā regalem uocant, cuius ex una radice complures exeunt filices, binæ etiam cubita excedentes, non graues odore. Alterum genus Græcis bna nō sēp, Latine, Filix foemina. Germani Widen farn. Gallis fugera, feuchiere, dicitur.

Nascuntur ubiq, maxime uerō frigido solo. Filicis radix maxime utilis, amara, subastrens, lubri cos latos necat, partum mortuum eiecit, ulcera ualenter sed sine morsu secat imposita, hepatis meatus probe terget sine manifesta calfactione aut refrigeratione.

Filicula, siue polypodium.

Cap. CLXVI.

**F**ilicula nascitur in montosis petris, & uetustis arborum caudicibus, præsertim quercuū, palmi altitudine, filici similis, subhirsuta, non tenui perinde diuisura, radix pilosa, in qua continentur cirri, seu polyporū, crassitudine digiti minimi, coloris intus herbaei, austera aliquantū, & gustu subdulcis. Purgandi uim habet, coquitur cum gallina, aut piscibus, aut beta, aut malua, ad aluū soluendam.



## Polypodium.



mulsa præterbuerint, exhibet. Oribasius drach. duas coquit in pisane succo, datq; bibendum succum. sunt qui unciam integram dederunt sine noxa. Polypodij radix dulcis, & austera, multum sicca, sed sine morfu, purgandi vim habet Gal. bilē, pituitamq; trahit, Dioscorid. in quo non bilem sed Melancholiam legit Serapio: sic & Mesues, & alij post eos pleriq; Melancholie purgatricem vim tribuunt. Sic crassum, solidum, cirrosum, ex rubro nigrescens, colore intus herbaceo, ut pistacum recens, quercibus innatum potius quam saxi & muris: alijs contrā uidetur, nisi astringendum sit.

Cnicus Carthamus.

Dryopteris.



## D I O S C O R I D I S

arida farina aque mulsa insparfa, detrahit bilem & pituitam, trita luxatis efficaciter illinitur, & aduersus riomas quæ inter digitos fiunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè πολυπόδιον. Latine Polypodium.

Genuinum nomen officinis retinait.

Germanis Engelstüß. Gallis Polypode dicitur.

Melius & efficacius est Polypodium quod in uetustis arboribus & maxime montanarum quercuum nascitur, quam quod in petris inuenitur de quo hoc loco Diosc. agit. Hoc enim superfluum habet humiditatem, et (ut inquit Mesues) indigestam, quæ flatum, nauseam & stomachi subuersionem excitat. illi autem quercu polypodio, de quo in capite mox sequenti, bonitatis netas octo Mesues attribuit, sed obscure multum, & non conformiter bonis auctoribus. Deligendum itaq; censemus Polypodium illud, quod eas habeat proprietates, quas alij iam assignauimus. Dosis Polypodij est Mesus à drachmis duabus usque ad aureos quatuor. Actus expurgatæ radicis scrupulos sex, qui in aqua

## Cap. CLXVII.

**D**Ryopteris nascit in ueterū roborum musco, filici similis, multo minore foliorū incisura, radicibus inuicem implexis, hirsutis, gustu acerbis, in dulcedine uergentibus. Psilothrū est cum radicibus trita: illinitur enim primum usquedum sudorē euocet, mox sudor abluitur, & recens imponitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hec omnino ea uideretur quæ hodie officina & Herbarij Polypodium quercinum, Germani eyckfaren appellant, nisi uiribus eam ab hac seiunxisset. Psilothrum enim non est nostrum Polypodium.

## Cnicus. Cap.

## CLXVIII.

**C**NICVS folijs constat oblongis, per ambitum diuisis, asperis, spinosis, caule sesquipedali: capitulo magnitudine grandis okiæ: flore croci: semine candido,



candido, alioqui rufo, longo, anguloso. Huius flore in obsonijs utuntur. Seminis tusi & expressi succus, cum aqua mulsa, uel iure gallinaei, aluum purgat: sed stomacho aduersatur, ex eo autem fiunt offusae, quas placentulas uocant, adiectis succo amygdalis, nitro, aniso, & melle decocto, quae aluum emolliunt. Haec in partes quatuor finduntur, quae nucis iuglandis magnitudinem impleant: è quibus ante coenam duas uel tres sumpsisse satis est. Ratio temperandi haec est: cnicus candidi sextarius, amygdalorum tostorum & delibratorum cyathi tres, anisi sextarius unus, aphronitri drachma una, cum carnibus triginta caricarum. Seminis succus lac cogit, & magis ipsum resoluendae alui facultate donat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Graeci *Κύνθρον*. Latine Cnecus uel Cnicus. Officinis Carthamus. Crocus hortensis.

Germanis wilder Safran / Veldsafran / Glor. Gallis Safran bastart appellatur.

Semen Carthami ex semine a Mesue eligendum est: candidum, planum, hoc est laeue, gradusculum, & plenum, cuius medulla est unctuosae & pinguis, cortice tenui. Paulus coquit drachmas quinque medullae Carthami, cum Ptisana, & paucis salibus, ut educata quam. Cnici semen calidum, ordine tertio, purgat pituitam, ut cap. 5. li. 2. sim. docet Gal. & li. 5. sanitatis tuendae: in diacrico compositione: nihil tamen aut minimum harum uirium in consueto nobis semine Cnici expertus, forte quod à regionibus calidioribus non sit allatum, sed in nostro agro natum, Carthamus Gazae cum uulgo appellatur.

Mercurialis: Fœmina.

Mac.

Cap. CLXIX.



**L**ynozotis, aliqui parthenion, alij hermu batonion appellant, folijs constat ocimi minoribus, helixinae cognatis: ramulis duplici geniculorum nodo cinctis, alarum cauis multis, fructu foeminae copioso, quandam racemorum speciem praebente: mari, è foliorum sinu dependente, paruo, rotundo, ceu binis testiculis una cohaerentibus, frutice dodrantali aut maiore. Vtrique in oleribus mandatur, ad aluum cibandam, cocta in aqua, esopoto iure, bilem a quamque detrahit. constat ut mares gignantur, hunc facere: ut foeminae, illam: si à purgatione bibantur, & trita folia genitalibus admoueantur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Duo mercurialis genera, masculus et foemina, quae efficaciae utriusque picturae datus: masq. Graec. ἐρμῶν ποδῶν ἡ δὲ θῆλυς ἀγγέλιος uocatur, huius, folio nigriore constat, foetu propter genicula rariore, breui, cotorio,



## Cynocrambe.



\* Caput hoc  
additum ui  
detur.

in binos ueluti testiculos coeunte, semina coma albat, fructu copioso, soluto & candido, quandam racemulorum imaginem praesentante, Graecis λυό λωσις ὄβληα dicitur. Vtraque officinis Latinum nomen seruauit. Germani Bingelstrant, Bengelstrant, & Scheystrant appellant. Mercuriali omnes duntaxat ad ueneris purgationes utuntur. Verum enim uero si quis eius facere periculum uolet in cataplasmate, sanè digremis admodum facultatis esse experietur.

## Cynocrambe.

## Cap. CLXX.

Cynia aut Cynocrambe, cauliculus binum dodrantum altitudine emittit, mollè, subalbidum. folia mercuriali aut hederæ similia, certis interstitijs subalbida, semen folijs adhaeret, paruum, rotundum. Folia cum caulibus, alium cient. oleribus commendantur. Ius decocti & pituitam & bilem aquamque detrahunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Officinis nostris nota syluestris atriplicis nomine, ea siquidem cauliculus habet duum palmorum, folia herbae mercurialis, aut hederæ, sub candida ex interuallis, semen prope folia paruum rotundum. Germani uocant Wilde milten, & Scheymilten. Aliqui existimant syluestris esse bliti genus, cum more illius seminosum sit, ceterum crenatum huic foliū, ut Mercuriali, aut hederæ modo in angulos exiit, quod nō in bliti syluestri reperitur.

## Heliotropium.

## Cap. CLXXI.

Heliotropio magno flos est effigie scorpionis caudæ, unde scorpiuro ei nomen. & quoniam folia cum sole circumagat, heliotropion dicitur. folia oculi mihi habet, hirsutiora, candidiora, \* & maiora. ramuli à radice terni, quaterni, aut sepe quini exiliunt, multis alis concavi: flos in cacumine candidus, aut subfuluus, incuruatur ut scorpionis cauda. radix tenuis est, & inutilis, nascitur in asperis. Decoctum herbae ex aqua, fasciculo manus plenæ, potu pituitam bilemque per aluum extrahit. contra scorpionum ictus ex uino potum & illitum prodest. ad alligatur ad conceptus arcendos. Aiunt per horam unam ante accessiones seminis grana quatuor cum uino quartanas finire: tria uerò, tertianas. illitum semen formicantes uerrucas pensilesque, & thymos, & epinyctidas exiccat. Folia infantum destillationibus, quas syriaseis uocant, podagris, luxatisque utilissime illinuntur. menses cient. partus trita & imposita pellunt. Heliotropion paruum nascitur in palustribus, iuxta lacus, folijs antedicto proximis, rotundioribus: semine, acrochordonum uerrucarum modo, pensili, rotundo. Herba cum suo semine pota, adiecto nitro, hyssopo, nasturtio, & aqua, latas tineas teretesque excutit. Pensiles uerrucas, quæ acrochordones uocantur, cum sale illita tollit. Scorpioides herbula est, folijs paucis, semine caule scorpionis effigie. Illita scorpionum ictibus praesentaneo est auxilio.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Dicta est heliotropium similiter & heliostrophon à Sole, qui helios, & ipsorum ad hunc conuersione & reuolutione, quæ τροπή & στρόφον, eo quod ad solem se uertat, & ad motum ipsius circumagatur herba. Scorpiuri uero nomen habet ab effigie scorpionis caudæ, à Celso Solaris herba dicitur, à paucis hodie ne medicis quidem, pace semper eruditorum dixerim, cognoscitur, nouo ab herbarijs indito nomine, uocant enim herbam cancri, quod flores in caudæ cancri similitudinem inflectantur, namque scorpionem nostri rarius uident, à re potius nota, cancro scilicet, potius quam Scorpione ignota, traxerunt appellationem. Namque herba cancri, ut singulas prosequar notas, fingui solo cultoque maxime nascitur. Florere incipit circa Solstitium. Folia abortu in occasum solem sequuntur, ita ut quæ uique cæli parte sedem teneat sydus, in eam conuersa spectent, eoque nubilo etiam cælo dirigantur. folia oculi mihi habet, hirsutiora, maiuscula, candidiora, ramuli à radice terni aut quaterni sepius exiliunt, multis alis concavi. Flores in cacumine candidi aut fuluolentes instar caudæ scorpionis incuruantur. Radix tenuis & superuacua. Floret medio Augusto in exitum autumnique: quæ depicta nunc effigie nusquam non in agris per



Finis libri quarti.

teria Liber Quintus, Ioanne Ruellio Sueffionensi interprete, cum figura-  
rum debita appositione, & annotationibus in singula capita. Per  
Gualtherum, H. Ryff, Argentinum, Medicum, ex doctissi-  
uorum lucubrationibus adiectis,

*Vitis uinifera*:

## Cap. I.

**F**olia uitium & triti capreoli, capitis dolores illitu mi  
tigant: & inflātionem stomachi ardoremq; cum  
polenta, folia etiam per se, ut quæ refrigerent & adstrin  
gant, imponi solent. Porus corū succus dysentericis, san  
guinem excreantib. stomachicis, & grauidarum malaciæ  
medetur. Eadem efficiunt made facti in aqua capreoli &  
pōti. Lachryma uitiiū, quæ ueluti gūmi in caudicib. con  
crescit, ex uino pota calculos pellit. illita lichenas & pſo  
ras lepraq; nitro prius perfrictas sanat: eadem cū oleo se  
pius pilis illitis, psilothri effectum habet: maximeq; ſa  
nies, quā accensa fermenta uitiiū uiridia exudant. quæ &  
peruncta uerrucarum in formationes extrahuntur. Ci  
nis sarmentorum & uinaceorum, detractis in sede condy  
lomatīs, et thymijs, illitus ex aceto medetur. prodest luxa  
tis & uiperarum morib. contra lienis inflātionem illi  
nitur, cum rosaceo & ruta & aceto. Labrusca duorū ge  
nerum est, alterius uita non matureſcit, sed flore tenuis œ  
nanthen nominatā perducit. altera ad frugem peruenit,  
paruis acinis, nigra, & adstringens. Folia, caules, & clauī

clæ quibus repunt, uim habent culturæ uitæ similem.

*Græcè* Ἀμπελος ἡμεῖρος, οἶνον, οἶνον, δινὸ φάρος. *Lat.* Vitis urbana, uinifera. *Germ.* Weinreben, Weinstock / Weintrauben. *Gallis* uigne appellatur.

Innumera vitium repeririunt genera, quæ singula persequi superuacaneum esset. Si quis tamen illa disquirere desiderat, reperiustica scriptores, Pliniumq; libro 13. natural. historie, qui diligentissime de ijs scripsit, legat. *Labrusca* Græci ἀμυελος αἰγία. Germanis wild vngespinnst Reb. n. Gallis Vigne sauvage dicitur. Vua. Cap. II.

## Cap. II.

**V**æ recentēs alium turbant, & stomachum inflant, inno-  
centiores, quæ decerpit diu pendere, ideo quod in eis  
copia humoris exsiccat. utilesq; sunt stomacho. ægrisq; atq;  
cibi auditatem excitant, in uinaceis & ollis seruata, ori & sto-  
macho gratæ sunt, aluum sistunt, sed uesciam & caput tentant,  
& sanguinem excreantibus conueniunt.

\*Plinius con-  
trà sentit li.  
23, 64, 1.

Similes



Similesq; quæ in musto fuere. Sapa aut passo condita, stomachum magis infestant. At quæ solem prius passæ in aqua cælesti conduntur, minus uinosa sunt, siticulosi, ardentibus & longis febribus salubres. Reconditi uinacei inflammationis mammarum, rigentibus ac præduris, cum sale illinuntur, decoctura eorum dysentericos, celiacos, & foeminas fluxione uulvæ laborantes iuuat infusa, ad delectationes, ac fetus assumitur. Nuclei acinorum adstringendi uim obtinent, stomacho utiles sunt, inspargitur farina tostorum, polenta modo, dysentericis, & celiacis, & solutis stomacho. Vua passa alba adstringentior est, prodest esitata caro earum tussis, faucibus, renibus, ac uescicæ. estur in dysenteria per se cum nucleis, & decocta in patinis cum melle, admista milij ac hordei farina & ouo, ualeat ad purgandum caput, eiusdem gratia cum pipere comanducatur. testium inflammationes sedat, illita cum lomento fabarum, aut cumini farina, fauos, epinyctidas, carbunculos, enatas in articulis putredines, & gangrænas, sine nucleis trita, & cum ruta imposita sanat, podagræ conuenienter cum panacis succo illinuntur. mobiles ungues illita, celerius extrahit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè σταφυλή. Latine Vua precipue in uite dicitur ab uuido, id est, liquore contenta.

Germanis Weinstaub / Weinbeer. Gallis Roisin appellatur.

Vuarum genera omnia explicari hoc loco nihil opus fuerit, cum pleraq; ex uitium generibus à Plinio & re rustice scriptoribus enarratis facile possint cognosci. Omnium partium uitis temperamentum ex facultatum enarratione apud eosdem patecet. Vua tamen immatura & acerba frigida & sicca sunt, matura uero calida & humida in primo gradu, auctore Simeone Sethi.

Vua satiuæ uitis coquit, astringit, leuiter digerit: Vua passæ, quam Germani Wirttreubel, & Roisin. Galli roisins en cabat, uocant, caro, tam uim astringit, quam uim eget hepar affectum. Habet præterea facultatem coquendi crudos humores, & euertiendi malignos: egre corrumpitur, tota substantia familiaris est hepatis, & usu crebro consueta est: ob id felicissime miscetur medicamentis hepaticis, sicut quod as κηκεδαισμενας, id est, exemplis uinaceis. Act.

## Oenanthe.

## Cap. III.

Oenanthe uocatur uitis syluestris fructus, cum floret. Recondi debet fictili non picato, collectaq; substrato linteo, in umbra siccat. Laudatissima in Syria & Cilicia & Phoenice. Vis ei adstrictoria, quare pota stomacho ac ciunda uirina utilis, alium sistit, ac sanguinis excreationes, contra fastidia & acorem stomachi, sicca & illita efficax est, capitis doloribus tam uiridis quam sicca, ex aceto et rosaceo perfunditur: sanguinolenta uulnera cataplasmate, & incipientes ægilopas, oris ulcera, & genitalium nomas, trita cum melle, croco, myrrha, & rosaceo, ab inflammatione uindicat, pessis miscetur, ad sistendum sanguinem, contra oculorum delachrymationem, & stomachi ardores, cum polline polentæ & uino illinitur. Cinis crematæ in testa, candentibus prunis, facit ad oculorum medicamenta, res duuias & pterygia, abscedentes gingiuas, cruentasq; cum melle sanat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè οἰνάνθη, αμωέλων ἄγριας ἄνθος. Latine Oenanthe, labruscæ, uitis syluestris fructus cum floret. Ger. Wild reben / Holztrauben blüet. Gallis Grappe de uigne sauvage dicitur.

Labruscæ alterum genus ut Dioscorides quoq; testatur, uuas ad maturitatem non perducit, sed ad florem tantum dictum Oenanthum promouet. Altera perficit paruis acinis. Vis huius eadem quæ satiuæ folio, capreolis & caulibus, sed nigra astringentioris est naturæ.

## Omphacium.

## Cap. IIII.

Omphacion succus est acerbæ uitæ, nondum maturescens, è Thasia uire aut Aminea. Oportet autem ante canis ortum, expressam melliginem in rubro ære, linteo cooperto, in solare, usquedum cogatur, semperq; quod cervici uasis concretum hæsit, reliquo humori permiscere: noctu à subdialibus locis in lectum referri, quandoquidem nocturni rorés ipsum concresecere non sinunt. Eligendum



gendum est flatum, friabile, uehe-  
menter astringentes, et linguam mordens. Sunt  
qui coquendo melliginem cogant, hoc est contra tonsillas, uiam, ulcera oris, hu-  
midam gingiuarum uitia, purulentas aureis, cum melle aut passo. item ad fistulas,  
uetera ulcera, nomasq; ex aceto: dysentericis, & mulieribus fluxione uulue labo-  
rantibus clystere infunditur. oculorum claritati, & scabritia, & erosionibus an-  
gorum conuenit. bibitur ad recentem sanguinis excreationem, etiam si rupta parte  
aliqua contingat: sed pauco, & a quatiore est utendum, ualde siquidem exurit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.


Græcè *ὀμφάκειον*. Latine *Omphacium*. Officinis *agresta*. Germanis *Nigrest*.

Gallis uerius dicitur.

Omphacium sic à uino differt, ut oleum omphacinum à dulci: siccato interdum utimur, ut Heracli-  
des apud Gal. lib. 6. com. ph. parti. id quia repellit, incipientibus phlegmonis est salubre.

## Vini natura.

## Cap. V.



Vino uetere nerui laxantur & reliqui sensus, quod  
tamen gustu suauis est, quare cauendum ijs qui in  
testina alicuius partis imbecillitatem sentient. a tamē  
in secunda ualitudine paucum, aqua dilutum, innoxie  
sumitur. Nouum inflat, ægrè coquitur, insomnia parit  
grauia. & urinam ciet. Aetate medium, utraq; uitia fu-  
git: quare ad uictus sanorum ægrotumq; usui patitur.  
Album, tenue, stomacho utile est, ac facile in membra  
distribuitur. Nigrum uerò, crassum est, & concoctum dif-  
ficile, carnem alit, & ebrietatem creat. Gislum, utpote quod medium est, medias  
inter utrumq; vires habet. In secunda tamen & sinistra ualitudine, cum primis  
laudatur album. Quin & uina sapore distant, siquidem dulce crassis partibus cō-  
stat, & difficiliter à corpore expirat. stomachum inflat, aluum & interanea, ut mu-  
stum, turbat: sed minus inebriat, renibus, & uesicæ aptissimum. Austerum, per u-  
rinam celerius transit: sed capita dolore tentat, & temulentiam gignit. Acerbum,  
ad ciborum per membra digestionem accommodatissimum, aluum, & cæteras flu-  
xiones cohibet, minusq; urinam expellit. Nouum neruos minus tentat. Vinum  
aqua marina factum, stomacho aduersatur, sitim stimulat, neruos infestat, aluo a-  
ptum, à ualitudine se recolligentibus inutile. Passum, quod uuis sole siccatis in a-  
rea, aut in sarmento torrefactis exprimitur, Creticum cognomine, aut pramnion,  
aut protropon, & sapa, quæ fit multo igni decocto, Græci sirion aut hepsima ap-  
pellant: nigra quidem, & quæ dicuntur melampsithia, crassa sunt, & corpora mul-  
tum alunt: candidum, tenuius: & heluola inter hæc media, medias sortiuntur vires.  
Omnia tamen adstringunt, & pulsus reuocant. faciunt aduersus uenena quæ ex  
ulcerando necant, ex oleo pota, & uomitionib. reddita, contra cicutas, meconium,  
pharicon, toxica, & concretum in grumos lac, item contra renum, ac uesicæ pru-  
ritus, rosiones, exulcerationesq; inflant tamen, & stomacho aduersantur. priua-  
tim prodest melapsinthium, si uenter rheumatissimum sentiat, album, magis cæte-  
ris emollit aluum. Gypso conditum neruis officit, caput aggrauat, & incendit, ac  
uesicæ aduersatur, contra uenena cæteris aptius. Picata, aut resinata, exalfaciunt,  
concoquant, sanguinem excreantibus inimica. Quæ uerò aparachyta uocant, ut  
quæ admixtam sapam recipiunt, caput implent, temulentiam gignunt, ægrius in  
halitum expirant, stomachum male habent. Inter Italica uina Falernum principē  
locum obtinet, quod in ueteratum perquam facile coquitur, pulsus exulscitat, al-  
uum adstringit, stomacho utile, sed uesicæ nocet, atq; ijs qui uisus hebetudinem  
sentiant: & ad potus crebros minime idoneum.

Albana crassioribus constant partibus, dulcia, stomachum inflant, uentrem emol-  
liunt: sed concoctionem non æque adiuuant, & neruosa minus infestant.  
ueritate,



uetustate, eadem austerum saporem concipiunt. Cecubum, cum sit dulce, est & Albano crassius, corpus & colorem alit: a grè tamen coquitur. Surrentini m, ualde austerum est: quare intestinorum & stomachi fluxiones cohibet. & cum tenue sit, caput minus tentat. inueteratum suauius redditur, & stomacho uile. Adriaticum & Mamertinum in Sicilia eque crassis partibus gignuntur, modicè acifringunt, & ocyssimè inueterantur, minusq; ob suam tenuitatem, nervos tentant. Paratypianum, quod ex Adriatico sinu defertur, odoratum ac tenuius est: quare liberaliter epotum fallit, diu seruat ebrietatem & soporem adfert. Istricum Paratypiano simile est, sed urinam uehementius pellit. Chium tamen antedictis mollius, & aptum potui est, bene alit, & minus inebriat, fluxiones cohibet, oculorum medicamentis utile, Lesbium facile membra subit, Chio leuius, & alio idoneum. Ephesium eandem uim habet, quod phygelites nominatur. uerum Asianum è Tmolo môte, Mesogites appellatum, capitis dolores ciet, & nervos ledit. Cuius uerò & Clazomenium, quoniam multam sibi maris aquam uendicant, facile corrumpuntur, flatus mouent, aluum turbant, nervis officiunt. Vinum omne (ut reliqua in commune dicantur) merum ac syncerum, & sua natura austerum, excofacit, facile in membra distribuitur, stomachum adiuuat, appetentiam ciborum inuitat, uires alit, ac robur auget, somnum conciliat, & commendat colorem. potum liberalius auxilio est contra assumptam cicutam, coriandrum, pharicum, ixiam, meconium, argenti spumam, taxum, aconita, fungosue, contra serpentium morsus, & omnium ictus quæ refrigerando necant, aut stomachum in uomitiones effundunt, facit ad longas inflationes, rosionesq; præcordiorum, ac distentiones, stomachi resolutionem, & si uenter aut interanea rheumatismum sentiant. Conueniunt sudatoribus, & quibus corpus immodico sudore digeritur, maxime alba, uetera, & odorata. Quæ tamen uetustate dulcescunt, renibus ac uesicæ accommodatiora redduntur. uulneribus, inflammationibusq; in succida lana imponuntur. tetra ulcera & phagedænica, & fluxionibus obnoxia, commodè perfunduntur. Quæ marinam non receperunt, austera & alba, ad sanorum uictus usurpantur. In his præstant Italica, Falernum, Surrentinum, Cecubum, Signinum, & per multa Campaniæ, & Paratypianum ab Adriatico sinu, & Siculum quod Mamertinum appellatur. Ex græcis Chium, Lesbium, & Phygelites ex Epheso. Crassa uerò & nigra, stomacho negocium exhibent, inflationem pariunt, corpus augent. Tenuia tamen & austera stomacho profunt, & minus carnes alunt. Vetera ualde tenuia, & candida uehementius urinam ciunt, & dolores capitis mouent, nervosq; largius pota tentant. In media ætate, ut à septimo anno, potui saluberrima sunt. Modus autem pro ætate, & tempore anni, & consuetudine, & qualitate uini definiatur. Non sitire, & modicè cibos proli, optimum est præceptum. Non cet ebrietas omnis, & maxime assidua, siquidem obfessos nervos quotidie remittit: largiorq; potus, acutorum morborum adfert initia. Mediocris tamen uinolentia, aliquot diebus, maxime post aquæ potus, utilis: namq; modo quodam ex alto euocat, sensilesq; expurgat excretus, & per cæca corporis ducit spiracula. sed aquam post uinolentiam bibere oportet: siquidem ualetudinis alicuius gratia facitæ temulentiaæ remedium affert frigida. Omphacites nomine, peculiariter sit in Lesbo, siccata sole acri uira, paulò ante maturitatem decerpta, triduo aut quadriduo, donec racemi in rugas contrahantur, expressumq; uinum cadis insolat. Vinum adstringendi habet, prodest dissolutis stomacho, & ilei dolore laborantibus, item prægnantium malaciæ, & crudis, in pestilentia quoq; sorptum auxiliari dicitur. Huiusmodi uina non nisi post multos annos bibi possunt. Lora, quam deuteriam, alij potimon appellant, fieri solet, adiectis metretis tribus aquæ, in uinacea, quibus triginta uini metretæ extractæ fuerint: calcatis uinaceis, expressoque decocto ad tertias parteis, additis in singulos congios modi eius quire.



qui remansit, binis salis sextarijs. post hyemem transfunditur in uasa. Lora intra annum utendum: etenim celeriter exolefcit. Conuenit egris quibus timemus noxam uini, coacti sæpe desiderijs eorum obtemperare. item à longa ualitudine se recolligentibus. Fit & uinum quod adynamon uocāt, loræ uires habens, hoc modo: Pares aquæ & musti mensuræ coquuntur molli igne, donec absumatur aqua. quod, ubi refrixerit, elutriatum, picato uase reconditur. Alij marinæ & cælestis aquæ, mellis & musti pares miscent portiones, decapulant, & quadraginta diebus insolant. quo ad annum utuntur ad omnia eadem. Vinum è syluestri uua nigra adstringit. prodest alui & stomachi fluxionibus, & cæteris quibus constrictione & contractione opus est. \* Post.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Vinum protropum, id est, quod ab uuis desuit, antequam calascetur. Germanis *Der vorschuss*. Gal. li. 8. cõp. Gallis la mere goutte, medium inter calidum & frigidum, hepaticis saluberrimum, præsertim cum hepate lupi: qui proprietate substantiæ hæc nutriunt, nec calfaciunt nec refrigerant. ph. part. lib. 8. simp.

Vinum musteum calidum primo ordine, uetus tertio, medium secundo, calori proportionè respondet siccitas. Ex musto cocto fit & uinum, id est, sapa. Germanis *Gesotten most*, lib. 7. comp. ph. part. Nescio quo modo neglectum est, quod à nostris Asia Græcis & uinum dicitur, ab his qui Attico sermone magis utuntur, origon, id est, sapa: quamuis etiam origon dicitur, quod pinguis siccis in aqua coctis efficitur. Officinis mel passulatum dictum, quod magis digerit & terget. Mustum uero coctum magis est emplasticum, non rodens, libro 7. comp. ph. part. Ex sapa dissolutum calidum cum opio, dolorem aurium inflammatarum magis sedat, quam uinum dulce, initio lib. 2. eiusdem. Facilitatem uini differentiæ sunt permultæ: à substantiæ tenui, crassa: colore albo, fuluo, rubro, nigro: odore imbecillo, ualenti, sapore uario, sumendæ: de quibus Galenus lib. de uinis: lib. 4. & magis quinto de sanitate tuenda. Aph. 17. 18. 21. lib. 2. lib. methodi. 7. maxime, 12. lib. 1. antidot. lib. 3. alim.

Vinum medicamentis stomachicis, caliacis, hepaticis, feliciter miscetur, si absit phlegmone, erysypelas, abscessus, intemperies calida. Nam totius substantiæ similitudine alit, coquit, roborat, putredinibus resistit, intemperiem frigidam uel humidam, si qua adsit, tuto per sanat, libro. 6. compo. ph. part.

## Vinum melitites.

## Cap. VI.

Melitites datur in longis febribus, quæ stomachum infirmarunt. namque aluum leuiter emollit. urinam ciet. stomachum expurgat. prodest articulo morbo, renum uitijs, imbecillo capiti, & mulieribus abstemijs odoratum siquidem est, & corpus alit. Distat à mulso quod fit è uino uetere, austero, & melle exiguo. Melitites autem adiecto ad quinque congios austeri musti, mellis cõgio, & salis cyatho, cortinis magnis, quod magis ad efferuescendum locus pateat, heri oportet, sensim asperso sale: cumque efferuere desierit, in alia uasa transfunditur.

Vinum hoc neglectum ac minime in usu est.

## Mulsum.

## Cap. VII.



Mulsum è uetere uino austeroque, & bono melle factum, præfertur. minus enim inflat, ac celeriter id genus in usum uenit. uetus corpus alit. media ætate, aluo prodest urinam pellit. à summo cibo sumptum non cet. & inter initia potum, implet. dein appetendi auiditatem reuocat. Fit mulsum duabus uini metretis, admixta una mellis. Aliqui, quo celerius præberi possit, mel cum uino coquunt, & ita transfundunt. Alij utilitatis gratia, ad sextarios sex musti feruentis,

unum mellis adijciunt, & ubi ferbuerit, uase recondunt. dulce autem permanet.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Oenomeli Gal. podagricis, arthriticis, nephriticis, & senibus, ex melle, & uino Sabino, aut simili, Gal. lib. 5. & petroselino componit, adiecta berthonice, & sarxiphago in nephritis. Qui uero curiosius componit, etiam spicæ nardi aliquod inijciunt: hodie uero eidem magnam aromatum miscellam immittunt. Olim fuit usu celebre ad cerberum, ueruorum, & aliarum partium affectus frigidos, sed id medicamentum osius.

Kk



quale à ueteribus, Mesue præsertim, scribitur: nunc magno harum frigidarum regionum incómodo, in usu esse desijt, præter quàm quòd circa natalem Christianum in Bachanalibus uulgi regalibus, plebecula ad palati gratiam, non ad intemperaturæ frigida propulsióem, etiam largius bibit, & Claretum uocat: magnates uerò præciosius, οὐόσσανχα, parciore tamen mensura, quod ferè ex sacch. uinc. quatuor, & Cinnamomi unc. dimidia in lib. uini singulas cōficitur, et Hippocraticum uinum appellant, tanquàm Hippocrate inuente dignum, ob uirium & saporis excellentiam: cui etiam mellis parum addunt quidam, præsertim si uinū austerius ad saporis gratiā, & coloris: clarius enim euadit colatū.

## Aqua mulsa.

## Cap. VIII.



**A**qua mulsa easdē quas mulsum uires possidet. Cruda utimur, cum molliri deiectionem, aut uomitionem incitare uolumus: ut ijs qui uenena hauserunt, ex oleo. Decocta datur imbecillis, & hominib. elanguescentis pulsus, quos illi dixeremicrosphyctos, tussientibus, peripneumoniciis, & ijs q immodico sudore digeruntur. Iam paratum condituumq; quod aliqui hydromeli propriè uocant, media ætate adynamo uino, aut loræ in recreandis uiribus respondet, & similem uim adipiscitur. quare inflammationibus alicuius membri plus quàm lora prodest. inueterati tamen usus damnatur inflammatis, aut constrictis. sed laboranti stomacho, aut cibum fastidienti, sudatoribusue conuenit. Fit, duabus pluuiæ aquæ ueteris ad unam mellis partem additis, & insolatis. Alij fontanam aquam adijciunt, & ad tertias parteis decoquunt, & ita recondunt. Nec defunt qui hydromeli appellant, quòd à melle elutis aqua fauis confici ac feruari soleat. sed meracius confieri\* conuenit. Aliqui id coquunt. ægrotantibus noxium est, quoniam plurimum ceraginis sibi uendicat.

\*Bibere.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Mελικρατὸρ recens, & οὐόσσανχα sepōsitum ut seruetur, Dioscoridi dicitur: alijs confunditur pro aqua mulsa, seu mellita, quam Germani Honig wasser, hydromeli uerò Medt uocant. Cruda mulsa inflationes & tormina maximè excitat, quoniam in aqua tamùm calfacta mel dissoluitur: qualem mulsam crudam Serapio uult dari dormituræ mulieri, quam concepisse suspicamur, nisi eius potuisset assueta. In arthritide calida, pro mulsa, aqua saccharata est præstantior. Quòd si uel à mulsa, uel saccharata aqua post usum septem dierum, aut uires nimis collabuntur, aut uentriculus malè coquat, ad uinum redeundum, uel potius uinum mellis transeundum. Secundum hydromelitis genus à Dioscoride descriptum, infinitis partibus ualentiùs & generosiùs est, & idem quod uinum mellis uocat Plinius. Colore enim & calore, & saporis gratia uinum exoticum, quod Bastardum uocant, menitur, hoc Germani uocant Medt, estq; efficacissimum in affectibus cerebri, & partium neruofarum frigidis, paralyti, apoplexia, epilepsia, lethargo, colicis item, & nephriticis, & uentris inferioris intemperie frigida, seruaturq; & ualentiùs euadit tempore & loco calido. Vires eius miraberis, si parum antè coxeris, & despumaueris: deinde dies quadraginta aut circiter, extra pluuiam sole uerno exposue acerrimum abit. si solem non habuerit liberum, nec post seruofactionem & insolationem fuerit operculatum. Fermentum non nascendum, ut hodie solem, ut nec Plinius, id tamen accelerare feruorem, & augere acrimoniam certum est, quam a uerò mensura sit nascendum ex Mesue corruptis codicibus difficile est coniectare: hi enim unc. tres in lib. centum aquæ & mellis expetunt: alij in singulas libras aquæ, & mellis simul mustarū uncias tres fermenti nascunt: alij ad mellis lib. unā, aquæ lib. octo fermenti unc. unā. Melicratū Hippocrati est noxiū biliosis, & quibus magna sunt uiscera. Gale. etiā febribus colliquantibus: aquosiùs urinas, et sputa magis promouet, minus aquosum aluum magis subducit.

## Aqua.

## Cap. IX.

**D**E aquis in uniuersum decernere, propter locorū proprietates, & peculiaris naturas, cælum, & alia pleraque, difficile est. Magna tamen ex parte optima est dulcis, sincera, nullius omnino qualitatis particeps, & quæ ne minimo quidem tempore in præcordijs commoratur. ad hæc, quæ & facili uia fertur, & citra molestiam, nec inflationes creat, & minimè computrescit. Aqua maris calida est, & acris. Stomacho aduersatur, aluum enim conturbat. pituitam expellit.





expellit si uero calida ad fotus adhibeatur, elicit & discutit. neruorum uitijis, & pernionibus, ante ulcera prodest. miscetur cataplasmatibus hordeacea farina, & emplastris, & discutientibus malagmatis. ad mouendas deiectiones tepesfacta infunditur: ad tormina, calida. pforas, pruritus, impetigines, lendes, & mammas rigentes, foueri utile est. liuores fotu discutit. ad uenenatos ictus, qui tremorem & refrigerationem adferunt, salutaris intelligitur, maxime scorpionum, phalangiorum, aspidumq; Etiam si quis in calidam descendat, auxiliatur. & malo habitu confectis iam diu corporibus, neruisque, balnea ex ea utiles. hydropicos, capitis dolores, aurium grauitates, feruentis uapor leuat. syncera, & sine potabilis aquae misitione reposita uirus deponit. Sunt qui etiam praecoquant, & ita recondant. Datur ad purganda corpora per sese, aut ex posca aut cum uino, aut melle. uerum post deiectionem, dant gallinae aut piscium iuscula, ad domandam morsus acrimoniam.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Aquarum bonitatem Galenus a tribus sensibus primo aestimat, nempe gustu, uisu, & odoratu. Cuius puram dicit, si nullam offerat qualitatem, sed ad unguem expers maneat singularis alicuius gustus. Visu quum syncera fuerit, ac plane perlucida. sic nec odoratu ullam praeseferre qualitatem debet, ut sunt quaedam extremae prauitatis, quae aut acidum, aut acre, aut falsum aliquid uel putridum, uel aliud quod aliud uitium uix effatu singulari nomine praeseferunt. Si a loco unde erumpant aquarum bonitatem uelimus cognoscere, Galenus & Hippocrates uolunt aquam potabilem exurgere a loco ad orientem spectante, quaeq; per meatum mundos celeriter currat, per terramq; puram coletur, & ita frigida, hyeme tepida, quaeq; eadem celeritate calefiat & refrigeretur. hanc omnibus aetatibus uolunt accommodare. De aquarum bonitate uide plura apud Palladium lib. 1. rei rusticae. C. Celsum lib. 2. cap. 17. Aeginetam lib. 1. cap. 50. Oribasium lib. 2. de sa. simpl. Hippo. de aere, aqua, & reg. Galen. lib. 7. de curand. morb. Aetia. li. 9. ca. 12. & Platonem lib. 5. de legibus. De marina aqua uide plura in annotationibus nostris in caput de muria.

## Thalassomeli.

## Cap. X.

Quod thalassomeli uocatur, uehementer purgare constat. Temperatur autem aequis portionibus, maris, mellis, & imbris ex alto, defaecatis, & picato uale per canis aestus insolatis. Alij ad binae marinae coctae singulas mellis adijciunt, & uase condunt. huiusmodi moderatius est aqua marina & mitius.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Graece θαλασσομελι, temperatur aequis portionibus, maris & mellis. Confectionem eius aliam legimus apud Plin. lib. 31. cap. 5.

## Accum.

## Cap. XI.



Aetum refrigerat, & adstringit stomacho utile. appetentiam excitat. erumpentem undecunque sanguinem, potu infessum sinit. prodest alui fluxionibus coctum cum cibus. cruentis uulneribus inditur. inflammationes arcet, in succidis lanis aut spongia impositum. reprimat procidentia sedis, uuluaq; item abscedentes gingiuas, & sanguine manantes. ad nomas, & ignem sacrum, ulcera quae serpunt, lepras, impetigines, pterygia, cum aliquo conuenienti efficax est. phagedaenas ulcerum, nomasq; fotu continuo cohibet. podagricis calido fotu, cum sulfure auxiliatur. sugillationes rapit, cum melle illitum. contra capitis ardores cum rosaceo in succidis uelleribus, aut spongia imponitur ad aquam inter cutem, grauitatem aurium, & sonitus, sibilosq; feruentis uapor proficit. instillatum quoque aurium uermes necat. panos cohercet tepidi foras, aut si imbuta aceto spongia admoueatur. pruritus permulcet. contra uenenatos serpentium ictus, qui refrigerando nocent, calidum com-



modè fouetur: & frigidum, ijs quæ exurens uirus ei aculantur. calidum potum, atque uomitionibus redditum, aduersus omnia uenena efficax est, præsertim contra meconium, & haustam cicutam, conglobatum in uentre sanguinem, lac coagulatum, fungos, ixiā, taxumq; cum sale. haustu uoratas hircudines, si sorbeatur, eijcit. tullim ueterem mitigat, & recentem laceffit. in orthopneæ calidum commodè sorbetur. gutturis fluxiones gargarizatum inhibet. anginis & uuæ procidenti conuenit. contra dentium dolorem, calidum collitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Gal. l. i. simp.

Acetum crassis partibus, scilicet, seu fici proportionem respondentibus calidum uidetur, non tamen causticum, tenuibus uerò partibus frigidum, idq; magis quam calidum, aut fortè frigidum per se, calidum per accidens. Nam spongia aceto madida, plebeiocuidam admodum in principio & post horam unam, duas, tres, frigus percipit: ablata deinde spongia, sensim nascentis in parte caloris phantasia & opinionem habet, acrimonia mordentis ratione. In ædematis uerò calorem inducit: omnino autem siccatur. idem purum, idem aquæ non mistum, & perlucidum maximè est partium tenuium, lib. i. comp.

Gal. l. i. et 2. cōp. ph. par.

ph. gen. Acetum incidit, tenuat, digerit, refrigerat, reprimat, ac repellit influxum. Nam substantia modicè calidum est, plurima parte frigidum, tenuium est partium, si est acre admodum, & nihil uini qualitatis representans. Idem solum ob suæ uirtutis uehementiam capitis affectibus non adhibetur, sed mistum alteri: album magis est tenuium partium, lib. 6. comp. ph. part.

Acetum atrum: bilem parit, & in massam attollit, biliosis salubre, Hipp. li. 3. rat. uict. acut. & ibidem Gal. tamen quartanis datur ad incidendum & tenuandum.

## Acetum mulsum.

## Cap. XII.

**A**cetum mulsum, quod oxymel uocant, hoc modo temperatur: Aceti heminas quinque, salis marini pondus, mellis minas decem, aquæ sextarios quinque pariter coquito, decies efferuescente cortina: atq; ubi refrigerit, diffundito. Sumptum crassos humores extrahere, & ischiadicis, comitialibus, & articulorum morbo conflictatis prodesse creditur. contra morsum eius uiperæ, quam sepa uouant, haustum meconium, ixiā, & auxilio est. anginis utiliter gargarizatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hipp. lib. 3. rat. uict. acut. morb.

Oxymeli Græci, nobis acetum mulsum, crassa in uentriculo, & uenis tenuat, lenta incilit, ac strepue terget, obstructa liberat, sine manifesto calore: ob id nec febres accendit, sputum euocat, sitim sedat, aliaq; permulta efficit. Hipp. li. 3. rat. uict. Si tamen immodice utatur, intestina rodit, nervosales dicit, tuissim exiccat, etiam in synochis tutò datur lib. ii. meth. Eius compositionem uide apud Galenum lib. 4. sanit. tuend. & Paul. lib. 7. Si diutius uis seruare, coque perfectius, donec aceti & mellis qualitates planè fuerint unite, nec acetum adhuc crudum gustanti appareat. In syrupi substantiam cum Mesuæ coquunt ea ratione nostri pharmacopole, cum liquore dissolucendum, ut potabile fiat. Quod autem cum Galeno, quadrisariam coquitur ad tertiam, uel etiam quartam partem, parum diu, ut dies octo, uel circiter, æstate præsertim, etiam si loco frigido condatur, seruatur integrum. Nam corruptione abit in acetum acerrimum, quod hydromeliti quoque calido aëre accidit, tamen longè est omnibus medicis potionibus idem iucundius, ut id etiam uino ægri plariq; præferant, præsertim si paulò est aquosius, quale æstate & in febribus coquere soleo, aut aqua costò mista parare, serè autem aquæ mensuras sex lib. ij mellis igni lento desumo, ut sit clarius, post aceti quartaria tria in coquo cetera, ut in libro nostro de componendis pharmacis in usum officinarum Germanicarum conscripto copiosius leges. Oxymeli aliter inquit Diosco. & post eum Plinius. Oxymeliti & hydromeliti incoquere potes, quæ eius actionem intendunt, tenuantia, incidencia, tergentia, ut hyssopum, thymum, saturiam, origanum, pulegium, calaminthem, & quæ ipsius uim ad partem affectam deducunt, ut asplenium, tamaricem, in obstructione lienis, eupatorium, cichorium, obstructio hepatis. Vnde Paulo est oxymeli splenicum, & oxymeli calculosis efficax. Quinetiam purgantia eidem incocta clementius & efficacius uacuant, ut minus, agaricus: pituitam, epithymus, polypodium, chamædrys, chamæpitrys, elleborus niger, melancholiam, rhabarbarum, scammonium: bilem flauant, cortex radice sambuci, colocynthis, aquas: ut id unum pro omnibus propè tum iulepis, tum syrupis esse possit, si quis cognouerit uti. Vnde & Mesuæ est oxymeli cholagogum, phlegmagogum duplex, & melancholiam uacans. Id oxymeli quæ ratione sit coquendum, lib. 4. sanit. tuend. docetur, quas uires habeat, ibidem, & locis alijs permultis, præsertim lib. 3. uict. ac.

Ut uerò mulsa multum cocta est calidior, magis incidens, tenuans, tergens, quia mel retinet largum aqua



aqua in uaporem magna parte solum: sic oxymeli, quod pharmacopole ad cōsistentiam syruporum coquunt, ut seruari possit, est potentius quā aquosum & minus coctum: sed hoc est gratius: & citius ob fluxibilem consistentiam penetrat, quā uim aceti tenuitas non minus quā aqua fluxibilis subfiantia iuuat, ut lib. 1. simp. Aquam uero, ut cetera humida iuuare distributionem, docet Hipp. aph. 1. lib. 2. & Gal. initio lib. 4. usus part. Illud autem uix potabile, nisi aqua, uel cruda, uel alia diluatur.

## Acida muria.

## Cap. XIII.

**A**cida muria, quam Græci oxalmen uocant, contra nomas fotu, putrida ulcera, canum morfus, & uenenatos ictus auxiliatur. sanguinis fluxiones post excisos calculos si sit, si statim calida in uulnus iniiciatur. proci duam sedem reprimat. dysentericis, si nomas sentiant, infunditur. oportet autem ex lacte instillare. hirudines forbitione aut gargarizatu necat. furfures & manantia capitis ulcera ex terget.

Oxalme olim fiebat ex aceto & muria mixtis, hodie exoletum ac planè mustatum.

## Thymoxalme.

## Cap. XIII.

**T**hymoxalme ueteres utebantur, dabantq; laborantibus imbecillitate stomachi, ternos quater nōsue cyathos, aqua calida dilutos, in articularibus morbis, & inflationibus. crassos humores, atrosq; trahit. Hoc modo facitatur: Thymi triti acerbulum, salis idem modus, rutæ, pulegij, polentæ, singulorum exiguæ portiones in uas coniunguntur, aquæ terni sextarij, & aceti terni cyathi infunduntur, & circumposito linteo sub dio madescunt.

Res peregrina & exoleta.

## Scillinum acetum.

## Cap. XV.

**S**cillinum acetum hoc modo fit: Scilla, quæ candida fuerit, expurgata conciditur, traiectaq; lino segmenta modicis interuallis, ne se contingant, sic cantur in umbra quadraginta diebus. mina eorum in aceti boni sextarijs duodecim immergitur, & uase diligenter operto septenis diebus in sole madescit. post eū numerum dierum scilla eximitur, & expressa abijcitur. defæcatum acetum trāsfunditur & reponitur. Aliqui scillæ minam, quinque aceti sextarijs miscent. Alij citra exiccationem repurgantes, parem mensuram adijciunt, & senis mensibus macerari patiuntur. Id multo magis humorum lentitias digerit gingiuas humore prægnantes collutione stringit firmatque, & motos dentes ita stabilit. putredines oris, & graues halitus tollit. durat fauces forbitione, & callosas facit. uocem expedit, & lymphidam canoramq; reddit. datur stomachicis, ægrè cibum concoquentibus, melancholicis, comitialibus, uertiginosis, mente captis item uuluarum strangulationibus, lienis incremento laborantibus, ischiadicisque. imbecillos admodum recreat. corpus sanum reddit, & bonum colorem præstat. oculorum aciem exacuit tarditatem quoque aurium infusione purgat. in summa, ad omnia effica. Cauendum tamen intestinis exulcerationibus, in capitis dolore, aut neruorum uitijs. Datur quotidie ieiunis forbendum, inter initia exiguum, paulatim adaugendo, ad cyathum usq; Nonnulli binos dant cyathos, aut largius.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Acetum scillites ueteribus frequens usus, hodie rarum per se, ob amaritudinem, & acrimoniā mordacē: idq; multi cum melle, & fit oxymeli scillitici: alij cū saccharo in syrupi formā perecoquūt. Id acetum incidit, tenuat, terget humores crassos, lentos, putres, quales pituitosi & melancholici in omnibus partibus corporis: ob id affectibus ab eorum copia excitatis, & diutinis conducit, epilepsia, uertigini, auditui obliuio, asthma, raucitati, familiarib. senectuti uitijs, & ceteris, ob hæc a morbis præcauet, & sanitatem tuetur, si per se sumatur: melius autem cum melle in syrup. datur a drachma una ad drach. octo. mane cum aquis aut decoctis aptis: in affectibus autem thoracis paulatim lambatur.

Si tamen æstas est, aut febris hectica, uel alia adest, absq; huius usu ob scillæ caliditatem, aqua ex aceto scillitico desillata est gratior, & efficacior. Vomitu etiam ualenter purgat humores in uentri culo crassos, lentos, putres, datum ad sefenciā cum mellis aut sacchari rub. uncijs tribus, aquæ horæi ciathis tribus.

Eodē propemodo quo ueteribus acetū scillites fiebat, hodie nobis sunt ex floribus siccatissimis.



saluæ, sambuci, lauendule, rorismarini &c. acetum rosatum, saluiatum sambucatum, lauendulatum, rorismarinatum dictum, & præter hæc uatum, ex uuis passis.

## Scillinum.

## Cap. XVI.

**S**cillinum uinum fit hoc modo: Dissectam, uti dictum est, scillam, & sole siccam contundito, minam eius tenui cribro in cernito, & linteo raro alligatam, in uicenos sextarios musti recentis ac boni demergito, ubi trimestri spacio maderit, elutriatum uinum, obstructo diligenter uale, recondito. Licet quoque sic humida scilla uti: In orbiculos, rapi modo, dissectam duplicato pondere, quadraginta diebus insolari oportet, & ualde inueterascere. Alia parandi ratio: Scillæ dissectæ & repurgatæ tres minas, in Italiam metretam musti demitto, & senos menses in uase obstructo macerari finito: post id tempus defæcatum & excolatum uinum recondito. Vtile est contra cruditates, & ciborum corruptiones, item ijs qui reuomunt cibum, & si pituita in uentre, aut stomacho coerit, prodest lie-nosis, malè habitis corporibus, aquæ inter cutem, regio morbo, difficili urinæ, torminosis, inflationibus, resolutioni neruorum, horroribus longis, uertiginosis, & uulsis. menses pellit. minimè neruos infestat. Hoc uinū uetustate fit melius. Cauendus in febre usus, aut si interanea ulcus sentiant.

## Marina.

## Cap. XVII.

**M**arina uariè factitantur. Aliqui enim statim quum decerpæ sunt uuas, aquam maris admiscunt. Alij in area uuas sole siccâr: quibus calcatis, marinam adijciunt. Alij passas prius uuas in dolijs marina aqua macerant, mox calcatas exprimunt. id magis passis generibus adscribitur. Quæ tamen austriore gustu temperantur, contra febrium aduentantium indicia ualent, si modo meliora non adsint, aluum subducunt, prosunt purulenta extusisientibus, aut si dura aluus exerceat. Quæ ex Aminæis uuis fiunt, caput tentant, stomacho aduersantur, flatu creant. Verū quo plenior habeatur historia, ijs qui huius studio teneantur, non inutile existimamus uarias uinorum compositiones adferre, non quod frequens eorum aut necessarius existat usus, sed ne quid omisisse uideamur, quod ad eorum rationem attineret. Sunt autem quædam ex ijs factitia, minoris curæ ac impendij, quæ cadunt in usus: uti quæ ex cottonis malis, pyris, siliquis, item myrti baccis componuntur.

## Cydonites.

## Cap. XVIII.



difficultati. Melomeli, quod & cydonomeli nominant, sic fit: Cottonia malia seminibus suis castrata, in quamplurimum mellis, quo penitus demersa contendantur, coniunguntur: id post annum mitescit, mulso non dissimile. Præstat eadem quæ superior compositio.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hodie deserunt esse in usu eorū loco parant Officinæ Syrupū de cydonijs, qui dysenteria hepaticā mirè sanat, modicè per castiam aut mannā uacuato corpore. Sed uelentior est ex succo cydoniorū par uorū, quæ mascula uocamus, & quæ acerbiora sunt, quàm ex succo strutorum seu prægrandium, quæ femine uulgo dicuntur. Hoc recentiores quidam *Μυλοξούλας*, & *λευδανίαν χυλίσμα* uocant. Alijs



*Alijs miua cydoniorum simplex dicitur. Paulus etiam hunc hydromelum uocat.*

## Hydromelum.

## Caput XIX.

**F**It hydromelon duabus mensuris aquæ coctæ, & sub caniculæ sydus insolatæ, additis ad unam melomelitis, facti ex cotoneis. Vis huius eadem est.

## Omphacomelites.

## Cap. XX.

**O**mphacomelitis faciendi ratio hæc est: Acerbæ uuæ adhuc immaturæ, & tribus diebus insolatæ exprimuntur, & ad ternas succi partes, mellis optimi despumati singulæ partes adijciuntur: & insolatur in uasa transfusum. Vim repri mediæ refrigerandi habet. Stomachicis cœliacisq; conuenit. usus post annū est.

## Apjites.

## Caput XXI.

**F**It & æ pyris, perinde atq; cotoneis, uinum, apjites nomine, sed ita ut pyra nō magnopere maturescant. Ex siliquis etiam, mespilis, forbis, simili modo temperatur. Omnia hæc genera acerbæ sunt, & adstringūt. Stomacho utilia sunt, atq; intestinas fluxiones cohibent.

## Oenanthinum.

## Cap. XXII.

**F**It è feraci uite syluestri, quod uocatur cœnāthinum: Sicci flores minis duabus musti cado macerati, post triginta dies mutātur, mox colatū uinū recōditur. Facit aduersus stomachi imbecillitatem, cibi fastidia, cœliacos & dysentericos.

## Rhoites.

## Caput XXIII.

**F**It è puniceis malis maturis quod rhoiten nominant, succo expresso ab aciniis eorū, quibus lignosus nucleus abest, apyrena uocant, ac decocto iad tertias. & ita reposito. Efficax est contra fluxiones internas, & febrim cum alui profluuiio exortam. Stomacho utile, adstringit aluum, & urinam mouet.

## Rhodites.

## Caput XXIII.

**R**hodites sic fit: Rosarū siccarū tufarumq; minā linteolo deligatā in sextarios octo musti demergito, & post tres menses, defecatū uinum transfundens recondito. Utile ijs qui febris carēt, & ad stomachi coctiones, & dolores à cibopotum, & contra humidas aluos, & dysenterias. Fit quoq; ex succo rosarū, addito melle, quod rhodomeli uocant, quod arteriæ scabritijs conuenit.

## Myrtites.

## Caput XXV.

**M**yrtites fit, baccis nigris, quæ maturitatem ex cesserint, tufis, & organo expressis. Aliqui ad tertias coquunt. Alij baccas prius sole torent, & quaternis sextarijs contularum, ternas aquæ heminas adijciunt, & uini ueteris parem modum postea exprimunt, & seruant. Magnopere astringit. Stomacho utile. Fluxionibus uentris ac stomachi prodest: & contra intestinas ulcerationes, & profluuiā. denigrat capillos.

## Myrsinities.

## Cap. XXVI.

**M**yrsinities sic temperatur: Rami nigræ myrti cum suis baccis & folijs tufis, decem minarum pondo, in tribus musti congijs feruescunt, donec duo super sint, aut certè dimidium. id uinum colatum ad usus reconditur. Contra furfures, ulcera in capite manantia, eruptiones papularum, gingiuas, tonsillas, & purulentas aureis efficax est. sudores sistit.

## Lentiscinum &amp; terebinthinum.

## Cap. XXVII.

**L**entiscinum similiter ut myrsinities tēperatur, nec secus terebinthinū. Namq; bacciferi eorum rami sumi debent. Similes insunt uires, adstringunt. Stomacho accommodantur, & defluxionibus intestinorum, uesicæ, & stomachi, & sanguinis profluuiio. ulcera omnia fluxionibus obnoxia, sotu ad cicatricem perducunt. fluxiones uulvæ ac sedis, in sessione cohibent.

## Palmeum.

## Caput XXVIII.

**P**almulas maturas, quas uocant chydaas, in urceolum imo pertusum, & obstructum picata arundine, demittit: lino foramen fit obturatum, & qua-



dragenis sextarijs ternos aquæ congios infundito. quod si ipsum ira dulce esse non libeat, quinque congios infudisse satis est. post decem dies detracto ab arundine linteo, assumito uinum crassum & dulce, & reponito. Suaue illud quidem, sed capiti noxium. contra fluxiones, propter adstrictoriam uim, efficax. stomachicis, celiacis, sanguinem expuentibus conuenit. Aliqui idem addita aqua iterum capiunt, & tertio, quarto, quinto, sexto uel faciunt, quod tandem acore uitiat. Picatum

## Catorchites.

## Caput XXIX.

**C**atorchites, aliquibus fycites uocatur, in Cypro fit, ita ut palmeum. sed hoc interest, quoniam pro aqua tantundem humoris adijciunt, in quo recenter pressa uinacea maduerint. Caricæ quæ chelidonæ aut phœnicæ appellantur, præsertim nigrae macerantur, uti diximus, & post decem dies humor excipitur, atque iterum aut tertio, idem modus aquæ in qua uinacea maduerint infunditur. simili modo intercedente spacio, quarto aut quinto assumitur. demaceratarum liquor non secus a corem contrahit, & a ceti usum præbet. Id tenue est. flatu gignit, stomacho aduersatur. fastidium parit. aluo tamen prodest. urinam cient. menses trahit. lactis ubertatem facit. uitiosum sanguinem creat, & elephantiasin adfert, ut potio quam zytho appellamus. Aliqui sex amphoris, decem salis sextarios adijciunt. Alij muria amphoræ. quod non facile uitiat, & aluo idoneum fore censent. Alij thymum & fœniculum imo subijciunt, & caricas superponunt: & ita uicissim, donec uas expleuerint. Fit & esycomoris eodem modo uinum, sed in acetum acre degenerat, quoniam non ita præualet uis eorum, ut fluentis liquoris dulcedinem retinere possit.

## Resinatum.

## Cap. XXX.

**R**esinatum uinum popularim facituri solet. copiosum in Galatia: quoniam uinum illic coalescat, uua non maturescit, ob cæli algorem, nisi picea resina temperetur. Resina autem cum cortice tunditur, & amphoræ dimidiata hermina permiscetur. Aliqui ubi effebuit, excolant, separantes resina: alij relinquunt. Hæc uina uetustate dulcescunt. Omnia capitis dolorem, & uertigines faciunt, concoctionem tamen adiuuant. urinam cient. tussientibus, ac destillatione uexatis conueniunt. item celiacis, dysentericis, & hydropicis, & fœminis fluxione uulua laborantibus. altis exulcerationibus infunditur. In hoc autem genere nigricans magis albo constringit.

## Strobilites.

## Cap. XXXI.

**S**trobilites fit maceratis in musto nucibus pineis, recentibus, fractisq; præbetq; resinati effectus. Si quis madefactas nuces pini musto decoquat, potum affatim conuenit ijs qui tabitudine conficiuntur.

## Cedrinum.

## Cap. XXXII.

**C**edrinum, iuniperinum, cupressinum, laurinum, pineum, aut abiegnum, simili ratione fiunt. Diuisos recenter ramos, cum fructu ædunt, aut soli, aut balneo, aut igni, ad mouere oportet, uti confudent, congiorq; uini minam unam permiscere, & post duos menses transfundere, & antequam recedant, insolare. Facitiorum uinorum uasa impleri debent: namq; non plenius uasis, uina in acorem corrumpuntur. Medicata autem uina, recte ualentibus insalubria. Omnia ex calfaciunt. urinam cient, & substringunt. Laurinum tamen uehementius ex calfacit. Fit quoq; ex fructu cedri maioris uinum, congio musti adiecta tusarum baccarum selibra diebus quadraginta insolari debet, & defœcatu in uasa transferri. Fit etiam uinum ex baccis iuniperi, non aliter quàm cedrites, & ad eadē ualens. Cedrites hoc modo fit: Cedria dulci aqua lauant, & singulas amphoras singulis cyathis diluunt, & ita musto replent. Hoc genus uini ex calfacit, extenuat. tussi antineorum ulceribus, purulentis excreationibus, mulieribus uulua causarijs, hydropticisq; facit aduersus uentris tineas & horrores. contra uenenatos ictus auxiliatur. serpentes necat. aurium doloribus instillatum medetur.

Picatum



Caput XXXIII.

**Absinthites.**

Cap. XXXIII.

Hvffopites.

Cap. XXXV.

Ex diuerſis plantis facta.

Caput XXXVI.

**S**imili modo chamædrites fieri solet. Excalcit, discutit. cōuulsis, regio morbo, uulsa inflationibus, tardè concoctioni, incipienti aquæ inter cutem, subuenit. Inueterascens melius redditur. Stœchadris non secus temperatur. Congijs sex stœchadris minam addere oportet. Cassitiem, inflationes, laterū, neruorumq; cruciatūs, & perfrictiones discutit. comitialibus cōmodè datur, cū pyrethro & sagapeno. Fit ad eadē acetū sitce chade herba, ut paulò antè diximus, aceto macerato, quod eisdem implet effectus. Fit uinum è betonica, quam cestron psychotrophon appellant, herbam semine maturo prægnantē, cum suis ramulis min⁹ pondo, congijs duobus uini macerāt, & post septimū mensem transfundunt, ad multa interaneorum uitia, ut frutex ipse, pollet. Erut in uniuersum dicatur, factitia uina sibi misturandū uires adsuscunt. quare nō difficile fuerit, ijs qui illarum naturas norint, uinorum uires cōiectura quadam consequi, uerū tamen uinorum usus febricitantibus abdicandus. Fit etiam uinum è betonica acetum ad eadem uitia utile. Tragoriganites fit quaternis tragorigani dra- chmis linteolo colligatis, in quaternos multi sextarios coctis, & post tertium mensem transfusis. Prodest torminibus, uulsis, ruptis, laterum doloribus, spiri- tum discursationi, egris cōcoctionibus. Enapis fit uinum, nomine bunites, drachm.



drachmis duabus tusi napi in sextarios duos musti additis, & ceteris eodem modo factis. Prodest stomachicis, & dimicatione, aut longo equitatu fatigatis. Di-  
 etamni drachmas quatuor macerato quaternis musti sextariis. Facit aduersus  
 stomachi fastidia, menses, & purgamentum à partu subducit. Marrubij adul-  
 ti folia tundito, & sextarios octo in musti metretam demittito, & reliqua consi-  
 militer facito. Conuenit hoc uinum pectoris uitij, & omnibus quibus marru-  
 bium. Thymi tusi & cribrati uncias centum linteo colligatas, in amphoram  
 musti adijcito. Valet contra ægras coctiones, fastidia, dysenteriam, neruorū &  
 præcordiorum dolores, hybernos algores, & uenenata animalia, quorum mor-  
 sus frigus insequitur, aut putrescit locus. Simili modo è satureia uinū fit, quod  
 eadem quæ thymites præstat. Sic quoq; origanites ex heracleotico origano con-  
 ficitur similiter cum supradicto. Facit eadem quæ thymites. E calamitha, pu-  
 legio, & abrotono uina fiunt eodem quo thymites modo, profunt stomachicis, ci-  
 bum fastidientibus, & regio morbo, quod urinam moucant. Fit item è cony-  
 za uinum, contra uenenata ante alia efficax.

## Aromatites.

## Cap. XXXVII.

\*choenicem.

**A**romatites ita fit: Palma, aspalathi, calami, nardi gallici, singulorum qua-  
 tuor sextarios sumito. postquam cōtriueris, passo subigito: coactis ingen-  
 tibus offis, & in sextarios duodecim austeri musti deiectis, operculato uase, qua-  
 draginta diebus quiescere finito: deinde ubi face expurgatum fuerit, recondito.  
 Alia eius ratio: Calami uncia, phu drachmæ septē, costi drachmæ duæ, nardi Sy-  
 riaci drachmæ sex, casia uncia, croci drachmæ quatuor, amomi drachmæ quinque,  
 asari drachmæ quatuor: omnia simul trita & linteo colligata in cadum musti de-  
 merguntur, & postquam uinum deferbuerit, transfunditur. Facit ad pectoris, &  
 lateris, & pulmonis dolores, difficili urinæ, horroribus, retardatis mēsis, atq;  
 ijs qui per frigora iter faciunt, potū conuenit. pituitæ crassitiē extenuat, colorem  
 alit, somnum conciliat, dolorem finit, renum & uesicę uitij auxiliatur.

## Ex diuersis odoramentis facta.

## Caput XXXVIII.

**F**it & uinū ad destillationes, cruditates, tussim, inflationes, & si humor nisto-  
 macho coijt. myrrhę duę drachmę, piperis candidi drachma una, iridis dra-  
 chmæ sex, anisi drachmę tres, omnia plenius tusa & linteolo inuoluta in sex uini  
 sextarios coniunguntur: uinum post triduum colatur, & in lagena reconditur. Da-  
 tur post deambulationem, meraculum, cyathi unius mensura. Fit quoq; nectari-  
 tes ex helenio herba radice sicca pondo quinq; drachmarum linteolo colligata,  
 & in congios sex musti addita, & post tres menses effusa. Facit ad stomachi & pe-  
 ctoris uitia, urinam pellit. E Syriaca nardo, & Celtica, malabathroq; uinū fa-  
 ctitur, hac ratione: Singulorum selibram in binos musti congios mittito, post  
 menses duos colato. datur cyathus unus cū tribus aquæ. Hoc uinum efficax est  
 contra uitia renum, hepaticos, regium morbum, & urinæ difficultatem. prodest  
 stomachicis, atq; ijs quos pallor decolorat. Alij unciam aut sextantem a cori, &  
 Celticæ nardi quadrantem, in musti amphoram adijciunt. Asari quadrantem  
 in senos musti sextarios itidē demittito: id uinigenus urinā ciet. hydropicis, &  
 regio morbo laborantibus, hepaticis, ischiadicisq; cōuenit. Radicis syluestris  
 nardi recentis & tritæ cribratęq; bessē in congiū musti coniungito, duos men-  
 ses quiescere finito. Vtile est hepaticis, difficili urinæ, inflationibus, stomachicis.

## Ex diuersis herbis facta.

## Caput XXXIX.

**R**adicis dauci contusę drachmas sex in musti amphoram imposito, & simi-  
 liter transfundito. Facit ad dolores thoracis, præcordiorum, & uulvæ. mē-  
 ses pellit, ructus ciet, & urinam. prodest tussi, ruptis, uulsisq;. Saluiæ unciam in  
 musti amphoram, quod idem cum ceramio est, mittito. Valet contra renum, ue-  
 sicę, & laterum dolores, reiectiones sanguinis, tussim, rupta, uulsa, & suppressos  
 menses. Panacis unciam in musti cōgiū mittito, & transfundito. Prodest ru-  
 pris, uulsis, cōtusis, orthopnææ, lienis crassitiem extenuat: cōtra tormina, coxæ  
 dicum dolores, efficax est. tardas concoctiones accelerat, menses & partus extra-  
 hit. quæ





hit, aq̄ inter cutem, & serpentium ictibus auxiliatur. Vina ex acoro & dulci radice consimili modo fiunt. Oportet enim singulorum uncias octo in feno congioſ mittere, tribus menſibus macerare, mox in uas transferre. Faciunt ad peſtus, & latera, & urinam mouent. Seminis apij recentis, maturi & cribrati uncia nouem in linteo colligata in muſti amphoram demittantur. Appetitum excitat. ſtomachicis, & difficili urinae auxiliatur. faciles ſpiritus facit. Ex ſceniculo, anetho, & petroſelinio, uina eodem modo fiunt, & ad eadem efficacia. Fit

& e flore ſalis uinum, multo ad purgandum efficacius, quam uinum aqua marina temperatum. Fauces, ueſicam, renes, & ſtomachum infeſtat: quare neq; in ſecunda, neq; aduerſa ualitudine prodeſt. Fit etiam uinum quod phthorū uocant, quoniam partus necat, & abortus facit, ueratro aut ſcammonia, aut ſylueſtri cucumere, iuxta radices uitium ſato: ſiquidem uites ſibi illorum uires adſciſcunt. Id uini partus enecat. datur ieiunis mulieribus, quae ante uomuerunt, cyathorum octo menſura, dilutum. Ramorum thymelae cum ſuis folijs & fructu triginta \*decem Her  
mol. chmas mittito in congioſ tres muſti, & leui igne coquito, donec coſgi duo ſuper ſint, defaecatumq; recondito. Aqua ſa purgat excrementa, & lienem abſumit.

Chamelæa dum floret, cum folijs tuſa & cribrata decem drachmarum pondere, in muſti congioſ additur. Poſt duos meſes uini in uas traſfertur. aqua inter cutem, hepaticis, & laſſitudine contractis, efficax eſt. item mulieribus, quae a partu agra purgantur. Chamæpitynum ſimili modo fit, ad eadem conueniens. urinā quoq; ciet. Librā radicis mandragorae concidito, ſegmenta lino traſcito, quod ſelibram equat in muſti cadū demittito, ibiq; eſſe finito ad meſes treis, deinde tranſfundito. Media potio, hemine dimidium. bibitur, paſſo in duplū ad dito. A iunthemina uini congioſ miſtam, potu ſaporē adferre. cyathus unus cū ſextario uini potus, enecat. mediocris uſus eius, doloris ſenſum aufert. fluxiones in craſſat. olfactu, potuq; & cū inditur, idem preſtat. In congioſ muſti aqua marina diluti, drachmas duodecim nigri ueratri triti in linteo mudo, mittito: dūq; efferbuerit, in marinæ aque congioſ quatuordecim aut quindecim, ubi pleniuscule fregeris, iniſcito. poſt aliquot dies colato, & utitor. Dato cyathum unum ex aqua balnei in potu, ad aluum ſoluendam, iſis qui euomuerunt a cena. Alia ratio: Veratri drachmas uiginti, iunci odorati uncias duodecim, ſpice Syriae uncias tredecim, cribratas & linteo colligatas in ſeptem uini Coi ſextarios diebus quadraginta macerandas indito, poſtmodum colato. dabis in potu ſequi heminam. Aliter: Decocta marinae aquae ex alto petita ſextarios duodecim. ueratri candi di libras ſex, in muſti amphora quadreſimo die quam mafeceſ, colato, & utitor. Alia ratio: Veratri drachmas duodecim, & aphronitri quaternas, in ſenis muſti ſextariis, diebus quiniſdenis macerato, mox colato: & ſeſteti exaſto, utitor. Id uini genus abortus facit, & partus necat. Aut uuas in ſole ſiccatas imponito in muſti metretam (implet autem metreta congioſ duodecim) & gypſum in uinum mittito pondo drachmarum uiginti, & biduo reſidere finito, conſcito ueratri nigri drachmas triginta, iunci odorati, calami, ſingulorū drachmas triginta, baccarum iuniperi ſextarios duos & trientem, myrrha & croci ſingulorum drachmam, in uoluens linteo diebus quadraginta appendito, poſtea colato, dabis heminas treis aut duas dilutas. Purgat a partu & abortu ſceminas. ſcetus extrahit. contra ſtrangulatus uuluae efficax. Scammonites ſit ſit: Radicis ſcammonie per meſes effoſa, trita, & linteo colligata drachmas quinq; in muſti congium mittito, ad dies triginta. Aluum purgat, bilem & pituitam extrahit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Aſtuario quoque uinorum uariæ conditurae, ut abſinthites, ſaluatium, & cæte. Sed hæc longius proſequi ſuperfluum uidetur, cum partim hodie negligantur, & de his omnibus diligentiſſimè ſcripſerit Arnoldus Nouicomienſis, cuius libellus de uinis medicatis propediem a nobis ſub incudem reuocatus, ac nouis ſcholijſ iſuſtratus repurgatuſq; in lucem prodibit.

Metallica



## Metallica omnia, &amp; primum cadmia. Cap. XL.



EX cadmiæ generibus optima est Cypria, botryitis nomine, densa, modicè grauis, & in leuitatem magis declinās, racemosa facie, colore spodij, quæ fracta cinerulenta est, & eruginosa. Proxima habetur foris cœrulea, intus candidior, internatis uenarum discursibus onychitæ lapidi similis, cuiusmodi sunt quæ è ueteribus metallis effodiuntur. Quædam etiam placodes, id est, crustosa, dicitur, segmentis quibusdam perinde quasi zonis cincta, ob quod eam zonitin appellauere. Alia ostracitis nominatur, gracilis, & magna ex parte nigra, sed quæ testaceam faciem habet, terram amplexa est. Improbatur candida. Oculorum medicamentis botryitis nomine,

& onychitis, utiles: reliquæ ad emplastra, & farinas quæ cicatricibus inducendis insparguntur, ad eadem Cypria prodest, ex Macedonia uero, Thracia & Hispania delatæ, improbantur. Cadmiæ effectus adstringere, caua explere, sordes expurgare, exiccare, corporis meatus infercire, ex crescentia in carne coërcere, crustas creare, & ulcera quæ cocoëthe uocantur, ad cicatricem perducere. Gignitur cadmia ex ære in fornacibus, candente, fuligine egesta statu, & lateribus camerisq; fornacum inhaerente. Prægrandes autem ac ferreæ sunt rudes, ab officinis appellatæ acestides, per summa fastigia cōnexæ & cōcameratæ, ut quæ ab ære iactantur sursum corpuscula cohæreant, & inibi detineant, quæ cū spissius insidēt, in corpus concrescunt, & modo genus unū eius, modo duo, modo omnia perficiūt. Extrahitur & cadmia in Cypro è monte qui Solis in cūbit, cremato lapide cui pyrite cognomen est, in quo etiam mōre quædam quasi uenæ chalcitis, misyos, foreos, melanteriæ, cærulei, chryso collæ, atramenti, sutorij, diphyrgisq; inueniuntur. Nec desunt qui cadmiam in lapidum fodinis inueniri tradant, falli quædam lapidum cognatione, qualis inuenitur & apud Cumas lapis, nullam sui uim ostendens, si eo deprehenduntur, quod sunt cadmia leuiore, nullumq; alienum mandentibus saporem exhibent, commāducatus item lapis, dentes offendit, cadmia, utpote cum cedat, esum non respuit. Alio autem discerni possunt argumento. Cadmia in farinam detrita, & aceto subacta, atq; in sole siccata, coit: quod in lapide non accidit. Item tritus & igni appositus lapis, profilit, & fumū igni similem emittitur, cadmia uerò quieta manet, fuliginemq; luteo colore aut æreo splendorem expuit, uario zonarum discursu. Insuper lapis ignem expertus, atq; refrigeratus, colorem mutabit, ac leuior multo fiet, sed cadmia nihil euariat, nisi quis eam multis diebus cremauerit. Fit & in argenti fornacibus candidior, ac minus ponderosa, sed uiribus nequaquam comparanda ærariæ. Vritur cadmia superior car bonibus obruta, donec translucida spectetur, & ferrei stercoreis modo bullet, mox extinguitur uino Aminæo, quæ ad emplastra præparatur: sed quæ ad psorum medicamenta præparatur, aceto. Alij hoc modo exustam conterunt in uino, rursumq; fictili crudo torrent, donec pumicosa uideatur: iterumq; trita ex uino, tertio urunt, donec prorsus in cinerē redigatur, nihil scabritiæ retinens, hac spodij uice utuntur. Lauatur autem in mortario trita, effusa subinde aqua, dum sordidum nihil emergat, dein coacta in pastillos reponitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Metallica (ut Iano Cornario medico doctissimo placet) appellantur medicis, quæ in metallis, aut sponte nature, aut per fornacem gignuntur. Itemq; ea quæ ex his ipsis ab hominibus per quencunq; modum fiunt, ut est cerusa, psoricon, sandix, fucus, autore Gal. lib. 9 de simpl. Videntur autem ipsa Metalla, ab inquirendo & perscrutando, hoc est, ἀπὸ τοῦ μεταλλᾶ, appellata esse. Eorū enim grauius in uiscera terræ imus, et in sede manium opes querimus, ut Plinius ait. Quanquā idem Plinius, non inde appellata metalla Græcis putare uideatur, uerum quod non solitariè, sed simul, & cum alijs co-



re uena reperiuntur, dicta q; ob id μεταλλα quod cū alijs, hoc est, μετα ἀλλω, uel μετα τὰ ἄλλα, id est, post alia reperiuntur. Plinij uerba lib. 33. cap. 6. hæc sunt. Et ubicunq; una inuenta uena est, non procul inuenitur alia, hoc quidem & in omni ferè materia, unde Metalla, Græci uidentur dixisse: Quamquam uideo ita accipi posse, ut metalla, ab inueniendo dicta doceat, quod perserutando & effodiendo aliorum uicinitate maximè coningit. Habent autem Metallica uim medicamentosam magna sui parte maximam, quædam etiam deleteriã, ut coniectura sit magna, ex his uapores caloris interni uel elatos plantarum uarietatem non parum iuuare. Ne putes massam tantam frustra à Deo Maximo conditam, & otiosam, in quibus facultates naturales etiam omnes inesse soli chimistæ testantur, nec meo iudicio malè sentiunt, quod oculus in multis aperit uidet: licet plumbo metallorum soli incrementum concedat Galenus.

Cadmia botryitis hodie dicitur Tutia, officinis. Germanis græwex augstem. quidam corruptè Cadmiam Climiam, & Catimiam uocant.

Naturalem Cadmiam hodie uocant, Lapidem Calaminarem. Germani Salincy, quo æs tinguit, ex rubido in albidum (Zupfer in messing) ex quo lebetes fiunt. In præseni capite uidentur quædam deesse, quæ ex Serapione restitui possunt.

## Pompholyx.

## Cap. XLI.

**P**ompholyx specie sola, non genere, à spodio distat. Siquidem spodos nigricat, & plerunq; ponderosior est, palcarum pilorumq; plena, quasi purgamentum quoddam, quod ab ærariarum officinarum pauimentis & fornacibus euerritur. pompholyx uerò pinguis est, & candida, usque adeo leuis, ut in auras euolare possit. Cuius duo fluxerunt genera: unum ad æris colorem uergens, subpingue: alterum magnopere candidum, summamq; leuitatem natum. Candida sit pompholyx, quoties in perficiundo ære, fabri præstantiorem facere uolentes, detritam cadmi æcumulati in sparserint: namq; tenuissima\* fauilla, quæ effertur, candidissima in pompholygem coit. Cæterum pompholyx non ex æris modo materia & fabrilis industria fabricatur, sed est cadmia quoq; ad gignendam ipsam, eximie foliibus profusa. Cuius faciundæ ratio hæc est: In domo gemina contignatione operata fornax extruitur, iuxta quam mediocris fenestra ad tabulatum à supernis partibus pateat. domicilij paries fornaci proximus, tenui foramine ad fornacem usque perforetur, ad excipiendam follis na rem. ostium mediocre habeat pro exitu ingressuq; artificis fabricatum. domuncula altera huic coniuncta sit, in qua & folles & flator suo munere fungantur. deinde carbonibus in camino succensis, assidens artifex cadmiam particulatim fractam inspargit, à locis supra infusum nubulum extructis. idem negotium obit infernè artificis minister, simulq; carbones adijcit, usque dum indita cadmiæ copia prorsus absumatur, itaque egesta fusa situ tenuis pars & leuis materiæ in summam domum euolat, & parietibus, tectis, fornicisq; adhærescit: conflatum autem inde corpus, inter initia erumpentibus aquarum bullis simile prodir, postea maius incrementum capeffens, glomusculis uellerum simile redditur ponderosius autem in ima loca se recipit sed hoc fornacibus offunditur, illud domus pauimento cohæret: quod tenuiore deterius existimandum est, ideo quod multum terræ collegerit, & spurcicia in aceruatione referciatur. Sunt qui hoc modo tantum fieri spodium arbitrantur, de qua antedictum est. Optima creditur Cypria, quæ accepto aceto halitum æris præstat, colore aliquantum piceo, sapore cœni horrido, & si fraudem non experta flagranti carbone inferuescit, æreum colorem contrahit. Antedictis autem notis diligenter attendendum est. Siquidem à nonnullis adulteratur taurino glutine, ouilo pulmone, aut marino, aut crematis grossis, & quibusdam consimilibus. quod facile cognitum fuerit: quippè nihil in ijs probandis inuenietur eorum quæ antedicta sunt. Pompholygem in commune ita lauare oportet: Ligatam linteo munda modiceq; raro, aut siccam, aut aqua respersam, in labellum demittito, quod imbrem contineat, & huc atq; illuc fasciculum deferens, immergito: ita enim limosa pars eius ac utilis effluet, & omne sedimentum in linteolo remanebit. postea residere sinens, aquam cum cinere colis in cernito, & nouam infundens, agitato, & effundito: mutata tantisper aqua, & colata, dum arenosi nihil fidat, demum à



\* Quidā hac  
non habent.

quam exprimito, & siccatum cinerem recondito. Alij, quantum maximè fieri potest, siccant, & manibus in aqua conterunt, dum mellis crassamentum imitetur, deinde linteo faucibus excepturi uasis obtento, aut laxius illigato, colant, & quo facilius transeat, infusa per linteum largiore aqua, cinerem cōturbant. mox spumofum, quod traiectum est, & supernatat uasis, concha excipiunt, & fictili uo ad usus recondunt. quod uerò refedit, sensim cribratum, in aliud uas transfundunt, relicto arenoso quod pessum ierat. rursus lapidosa fidere patiunt, & in uas aliud excolant. hoc identidem faciunt, donec cinis merus & arenæ expers inueniatur. Alij paulatim integram in aqua respergūt, arbitrati arenas lapillosq; suo pondusculo degrauiatos, pessum ire, pilos autem & paleas leuitate sua in sublimē attolli. cæterum cinerem medium separant, & in pilam coniectum, ut cadmiam, eluunt. Quinetiam lauatur uino Chio aqua marino diluto, modis quos supra diximus. & ita redditur adstringentior, quàm aquis elota. Vis pompholygis astringere, refrigerare, explere, purgare, obstruere, & aliquātum exiccare (\* inter medicamenta numeratur quæ leniter crustas obducunt.) Quod si spodon torrere libet, diligenter tritam & irrigatam aqua, colliges in pastillos, fictiliq; nouo, subiectis leuibus prunis, orbiculos continuo uersabis, dum assicati fuluescant. Neq; ignorandum, ex auro, argēto, plumboq; fieri spodion: uerum post Cypriū, plumbum maximè commendatur. Quoniam spodos sæpenumero desideratur, necesse est ostendere, quæ simili uirtute polleant, ut in spodiū locum suffici possint, antispoda uocant, quoq; modo sumi debeant. Folia itaq; myrti, cū floribus & bacis immaturis, in fictile crudum coniecta, indito operculo cōtinua foramina habente, uruntur fornacibus, donec figlinum percoquatur. iterū in fictile aliud crudum transferuntur: quod ubi perastatum fuerit, exempta lauantur ad usus. Idem quoq; fit è termitē syluestris oliuæ, si habeatur: sin secus, fatiuæ cum suis floribus, aut malis cotoneis dissectis, & detractis ossibus, aut gallis, aut laceratis linteolis: item ex moris immaturis, id est candidis, in sole prius arefactis, aut terebintho, aut lentisco, cenanthe, aut mollibus rubi folijs, uel è buxi coma, uel pseudocyparo cum flore. Alij ficulneas frondes in sole antea siccatas, eodem modo parant. alij taurinum gluten. alij succidas lanas asperas, pice aut melle irrigatas. quæ omnia in spodiū uicem usurpantur.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Quatenus Pompholyx à spodio seu spodo differat, hoc loco Dioscorides, Galenus & simp ph. docent: Vnus enim generis Dioscor. esse ait, specie tantum differre. Galenus autem neq; spodio neq; antispodio, quod eandem uim habeat, sensum esse dicit, propterea quod semper pompholyge abundat. Ocularij medici hodie uulgo Tutiam uocant, quanquam alij Cadmiam hac appellatione accipiant, ut supra diximus. Sed in pharmacopolijs Nihil appellatur, unde etiam dictum uulgatum: Nihil oculis cōmodissimum esse, quo ambigue cū pompholygem oculis utilem, tum oculos non multis medicamentis coningendos innuunt. Est q; nil album appellatum, uera pompholyx. Sicut gascum aut nigrum dictū. Verum spodium metallicum à Dioscoride & Galeno descriptum. Nam quod aliās hodie spodium officine uocant, anispodium est, uulgoq; ebur usum esse creditur. Auicēna radicem cannarum exustam cinerem spodium esse dicit. hic animaduertendum Dioscor. Spodium non ficticium, sed metallicum & fissile esse, nec intra corpus sumendum.

#### Aes ustum.

#### Cap. XLII.

**A**Es ustum probatur rubrum, & quod cōtritu colore cinnabarim imitetur. nigrum uerò plusquam deceat exustum est. Fit autem è clauis solutarum nauium, fictili crudo compositis: subsperso sulphure cum sale pari, omnibus uicissim insparsis, fictile, circumlito figulari creta spiramento, fornacibus inditur, donec figlinum percoquatur. Quidam pro sulphure & sale alumen inspargunt. Alij sine sulphure ac sale, fictili multos dies urunt. Alij sulphure solo utuntur, fuliginem tamen excutiunt. Alij oblitos scissili alumine clauos, cum sulphure & aceto, fictili crudo cremant. alij in ænea olla aceto resperfos urunt, & iterum ac tertio idem efficiunt, postea recondunt. Principem locum tenet, in Memphide combustum: proximū in Cypro. Adstringit, exiccat, reprimat, extenuat, attrahit, ulcera purgat



purgat, & ad cicatricem perducit. uitia oculorum emendat. excreſcentia in carne  
conſumit. nomas cohibet. uomitus ciet. cum hydromelite potum, aut cum melle  
delinſtiſ. illitumue. Lauatur ut caſſia. mutata quater die aqua, donec nulla pror  
fuſ fordes emergat\*. Aeris recremetur, ſi tueriſcquam ſcoriam uocāt. eodem  
modo lauatur, & candem uim, ſed imbecilliorē habet. \*ſp. lucen.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Aesustum Ruperstein / Gebrant ätz / astringit, reprimt, acre est: ob id tenuat, ulcera purgat,  
siccat, cicatricem inducit carni duræ, in molli lauandum &c.

Flos.

Cap. XLIII.

**F**los aris, quem nonnulli clauorum ueterū psegma, quasi sefegme aut segmen-  
tum, nominarunt, optimus est friabilis, in attritu fuluescens, milij effigie, &  
humero, breuis, ponderofus, modicè splendens, atq; confringens, qui delimatā  
aris fcohem non recipit, qua fape adulteratur. Sed id facile deprehenditur, in-  
dentium illius dilatanrunt ramenta. Fit autem, cum as fornacibus fufum, in rece-  
ptacula dilabitur, per cola fistularum ad ea pertinentiū, tū huic negocio additi  
miniftri, fordes expurgantes, aquā clariffimā infundunt, refrigerandi propofito.  
itaq; repētino cō cretu, ac addenfatione, uelut exurit & erūpant edictus flos.  
Adtingit, & excrefcencia cōrrecte, offufam oculis caliginē emendat, fed magno  
pere mordet, quaternū obolorum ponderē datus, erallum humorē extrahit, car-  
nofa narium, & fedis uitia abfumat. eruptiones popularū cum uino cohibet. Can-  
didus contra diuturnas aurium grauitates tritus, in eas per fistulam flatu impelli-  
tur, uuam, tonfillasq; reprimat, farina eius cum melle admota.

NOMINA ET EXPLICATIO.

NOMINA ET EXPLICATIONES.

Turpi errore quidam hodie arbitrantur æris florem esse, nostrum æs uiride, non animaduvertentes æris florem, ut hic Dioscorides scribit, eum æs in fornace suum in receptacula delabatur per canales, ministris aqua clarissima, ut refrigeretur affundebus, subito exilire, nilij effigie brevis, grauiusque descendens, cum nostrum æs uiride potius æris rubiggo sit, ut infra audies, Galeo aduicatur æris squama, ut limatura.

*Squamma aris.*

Cap. XLIII.

**S**quamma æris excussa ex Cyprii officinarum clauis, crassa quidem ipsa præstator quæ helitis, id est clauaris, nominatur. sed ex uili promiscuoq; ære, aut candido, uitiola intelligitur: quam, utpote tenuem & inualidam, damnamus. maxime approbrantes crassam, rufam, præsertim si aceti resperu æruginem contrahat. Vim habet adstrictoriam, extenuantem, reprimentem, & erodentem. noma, coërcet. ulcera ad cicatricem perducit. pota ex aqua multa, aquam trahit. aliqui farina subactam, dant in catapotio. additur ad oculorum medicamenta. genarum scabritiam absumit, & fluxiones excipiat. Lauatur hoc modo: Si crassa æris liquamur expurgatæ felibra, cum nitida aqua in mortario manu diligenter conturbatur, quousq; pessum ierit. abijciatur quod subsidit. & effusa aqua, hemina celestis imbris adijciatur, & distenta manu, squammas, quasi destringenda sit, uehementer fricatur, dumq; lentorem emittere cœperit, aqua sensim ad sex heminas usq; superinfunditur, terendo ualide. squamma ad latus mortarii colligitur, ibiq; apprimitur. quo facto, expressus humor pyxide ex ære rubro facta, excipitur. hoc est enim uelut flos squammarum, ualens uiribus, & ad ocularia medicamenta cum primis efficax, inutile imbecillumq; quod superest, lauatur donec nullam prorsus lentitiam ex cernat, & linteo apertum biduo conuiescere sinitur, effusaq; tante aqua, ubi ficcatum erit, reconditur pyxidicula. Alij ut cadmijs lauant, & reponunt. Squammarum ex acie aut mucronibus decussæ, quam uocant stomoma, eadem uis. Lauatur modo simili, & reconditur: sed ad moliendam alui diectio nem, inefficax est.

NOMINA ET EXPLICATIO.

*Squama aris, Germ. Samerschlag/er Kupfer schlag appellatur, differt ab aris flore, quòd hæc, ut arte excutitur, alter sponte cadat affusa aqua. Probatur crassa, ruffa, præsertim arguosa.*



## Aerugo rasilis.

## Caput XLV.

**A**erugo rasilis fit in modis. In cadum, aut aliud confimile uas acetum quam acerrimum infunditur, superponitur inde inuersum aeneum uas, praesertim con-  
cameratum: sin minus, planum, sitque obstructum, nullumque habeat spiramentum,  
exempto, quo doliolum obturaueris operculo. decimum post diem insidens aeru-  
go deraditur. Aut aeris lamina in cadis super acetum ita suspenditur, ne ipsum at-  
tingat, & totidem post dies raditur. Aut massula aeris, aut lamina una pluresue,  
uinaceis non recentibus, sed iam acescentibus conduntur, & simili modo uersan-  
tur. Quinetiam ex delinata aeris scobe aeruginem facere licet, necnon è laminis,  
quibus bractea auri conclusa malleo ducuntur, si quis eas aceto respargat, & ter  
aut quater uerset, donec aeruginem contrahant. Tradunt aeruginem in Cyprijs me-  
tallis gigni, lapidibus quibuldam nonnihil aeris habentibus, quibus aerugo efflo-  
rescit: adduntque per caniculam aërius est quodam specu manare: sed illam paucam &  
optimam esse: hanc speluncis effluentem, copiosam quidem, & boni coloris, sed uitio-  
sam, quod lapides multos collegerit. Pluribus autem modis adulteratur aliqui pumice  
admisto, alij marmore, alij atramento futorio. Sed deprehendimus pumicem  
aut marmor, dum pollice sinistrae manus madefacto, aeruginis portunculam alte-  
ro atterimus: si quidem eam diffundi constat, marmoris autem pumicisque partes  
coerunt non dissipatae, demumque tractatione crebra & humoris complexu dealbescunt,  
quin & dentium appressu: si quidem syncera cedit, laevis, & sine asperitate. Atra-  
mentum uero futorium igne coarguitur, namque si fictile, aut lamina adulterata aeru-  
gine illinatur, & feruente cinere aut carbonibus in calefaciat alterutrum, mutabitur,  
rubescetque id quod atramentum futorium acceperit, quod id uisum suapte naturata-  
lem sortitur colorem. Aeruginis quam uocant scoleciam, duo sunt genera, quae-  
dam fossilis est, altera factitia ad hunc modum: In mortario Cyprii aeris dimidia  
hemina acetum albi aerisque pistillo cupreo conterito, donec strigmenti crassitu-  
dinem imitetur: deinde aluminis rotundi drachma unam, cum salis fossilis, traslu-  
centis, aut marini quam albissimi, solidique, aut certe cum nitri pari pondere terito in  
sole, aëtuosissimis diebus, sub sydis caniculae, donec colorem aeruginis contrahat,  
& concretum strigmentosum fiat, ubi autem se in uermiculorum Rhodiacis similitudinem  
speciem coegerit, recodito. Efficax & ualde boni coloris redditur, si duas partes  
urinae ueteris cum una acetum adieceris, & alia quae dicta sunt peregeris. Sunt qui  
aeruginem rasilis quam in apparatu non respondit, gummi misto digerant in for-  
mas, & ita uendant, quod genus, ut uitiosum, improbatum. Fit & quaedam aerugo  
ab aurificibus, mortario & pistillo Cyprii aeris, cum urina pueri impubis, qua au-  
rum ferrum inant. Antedicta aeruginum genera, uisum aëri omnino respondent, sed  
magis effectu ualent. Sciendum fossilis scoleciam praestantissimam esse: de rasam  
sequi, postremo loco factitiam, mordacissima tamen est haec, & magis adstringens.  
aurificum autem aerugo rasilis respondet. Aerugines omnes adstringunt, extenuant,  
excalfaciunt, oculorum cicatrices emendant, lachrymas cient, nomas sistunt, uul-  
nera ab inflammatione tuentur, ulcera ex oleo ceraque ad cicatricem perducunt,  
callos & sordida ulcera purgant, cum melle cocta, callum fistularum erodunt,  
cum ammoniac, collyrii modo in eas adaptatae, ad gingiuarum autem excrescen-  
tias, & extuberationem utiles, magnopere extenuant genarum crassitiem, cum  
melle illita, uerum post illitionem spongia ex aqua calida locus fouendus est, re-  
sinaterebinthina excepta, cum aëre & nitro lepras abigunt. Vritur aerugo, quam-  
cumque uelis, minutissime fracta comminutaque, in fictili patina, flagrantibus pra-  
enis superposita: uersaturque, donec se mutet, & colorem cinereum concipiat, post  
ea refrigerata reponitur ad usum. Sunt qui cruda olla eam urant, uti dictum est  
sed non prorsus eundem colorem cremata reddit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Aerugo est aeris uelut rubigo in aëris uasis, laminis, squamis, scobibus, lapidibus concreta decem die-  
bus aceti acerrimi uapore, aut crescentium uinaceorum contactu, post decussam uel de rasam. Est aeris, mor-  
det, attrahit, liquet carnem, etiam duram, digerit, uehementer ficeat. Adulterandi & adulterata non  
scendi rationem sciens omitto, quod larga eius syncera copia toti Galliae & Germania à mulieribus  
Monsiellae



Montepessulanis suppeditatur. Germani Span grum. Galli uerdegris appellant.

Aerugo usta & lota neruo uulnerato prodest, non usta autem iusto & mordacior. Ceterum aerugo uermiculata à similitudine ad uermiculorum speciem, dicta est, quomodo etiam Græci σκῶληχος id est uocat, quem Plinius scoletiam dixit. Estq; duplex: altera naturalis, & fossilis, altera artificialis, uelut hoc loco Dioscor. & Plinius lib. 34. cap. 13. docent.

## Rubigo ferri.

## Caput XLVI.

**R**ubigo ferri restringit. sistit sceminarum profuua admota: potiusq; præstat ne concipiant. illita ex aceto, ignibus sacris, & papularum eruptionibus medetur. perquam utilis ad scabritias genarum, reduuias, & pterygia. condylomatis prodest. gingiuas firmet. podagras illita lenit. alopecias replet. Vinum aquaue, in qua cadens ferrum sit restinctum, potum coeliacis, dysentericis, lienosis, cholera laborantibus, & dissolutis stomacho auxiliatur. Stercus ferri, quam scoriam uocant, eadem potest quæ rubigo, sed inefficacius. a conito, ex aceto mulso potum, opitulatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Rubigo ferri cysen rost. Gallis rulleure de fer dicitur. Scoria est omnium metallorum spurcitia, recte nuncumq; & uelut stercus, Germanis Schläfen dicitur: siccatur, sed omnium maxime scoria ferri leuissimè trita.

## Plumbum elotum.

## Cap. XLVII.

**L**otura plumbi sic fit: In mortarium plumbeum aquam iniiciens, pistillo plumbeo terito, donec nigrescat aqua, & limi modo crassescat, aut lutulenta redatur. linteolo deinde colato, aquam superinfundens, quo facilius quicquid est resolutum incerni possit. hoc iterum facito, usque dum satis tibi habuisse uideatur. ubi confederit, priore aqua effusa, nouam adiciens, ut cadmiam lauato, donec nulla externigritia. postea in pistillos cogens reponito. Quidam scobem mundi plumbi lima quæ sitam, mortario pistilloq; lapideis terunt. aut manibus cum aqua paulatim adiecta fricant, donec nigrescat. mox ubi id pessum ierit, effusa aqua, colligunt in pastillos: nam tritum uehementer, cerusæ simile redditur. Alij elimatæ scobi modicam plumbaginem adijciunt, affirmantes ita elotum plumbum præstantius esse. Potest refrigerare, adstringere, inducere, mollire, explere cava, sistere oculorum fluxiones, & ulcerum excrecentia, sanguinem suppressit. prodest contra sedis ulcera, condylomata, & hæmorrhoidas, ex rosaceo. itæ, ad ea quæ cæcè ciatri cedunt: & in totum spodij effectus præbet, nisi quod non obducit crustas. Syn cerum plumbum affricatum, marini scorpionis draconisq; plagis auxiliatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Germanis pley. Gallis plomb. Frigidum humidum, ob id liquor quiuis frigidus (ut oleum omphacinum, rosaceum, melinum, myrtinum, semperuiui, coryledonis, intybi, lactucæ succus) in mortario plumbeo, pistillo plumbeo ductus dum crassescat, scipso frigidior euadit, optimumq; sit remedium phlegmonarum incipientium, & fluxionum aliarum, in inguina, pedes, articulos alios, & ulcerum rebellium, & canerorum. Lamina plumbi lumbis in strata ueneris insomnia sedat, ganglia dissecat illigata. Plumbum ustum & lotum ulceræ rebellis, chironia, canerosæ, carne implet, accicatrice tegit.

## Plumbum ustum.

## Caput XLVIII.

**V**ritur plumbum sic: Super quæ tenuissimas plumbi laminas, fictili nouo inditas, sulphur inspargito: additisq; alijs rursus laminis, interiecto semper sulphure, usque dum uas expleueris, succendito, flagrante autem plumbo, ferrea rude uersato, donec perfecte redigatur in cinerem, nihilq; de plumbo non ustum hæserit: tum demum obstructis naribus, eximito: alioquin halitus plumbi noxius sentitur. Aut elimatam plumbi scobem in olla sulphure urito. Alij laminas in fictili crudo, ut dictum est, imponunt fornaci, aut foco, & circumlinentes operculum, dato exili spiramento, urunt. Alij pro sulphure cerusam aut hordeum inspargunt. Alij integras laminas imponentes, acri igne utuntur, & rudicula ferrea continue <sup>\* Alij, imponentes aceto, igne utuntur.</sup> mouent, dum in cinerem soluantur. sed difficilis huiusmodi ustio, & si uehementius uratur, contrahit spumæ argenti colorem. magis tamen nobis placet prima uenior ratio. Plumbum ustum lauatur ut cadmia, & recoditur. Eosdem effectus habet.



quos plumbum elotum, sed multò acriores. Recrementum plumbi, quod scoriam uocant, optimum est, densum, fractu contumax, cerusam planè repræsentans, nihil plumbofi habens, quod ad luteum colorem accedit, & uitri splendorem imitatur. Eadem quæ plumbum exustum potest, sed magis adstringit. Lauatur in mortarijs infusa aqua, & refusa summa aquæ parte, quæ lutei colorem duxit: idq; sæpius, dum recrementum absumatur. dein ubi confed erit crassamentum, aqua effusa, digeritur in pastillos. Molybdoites lapis à plumbi similitudine dictus, respondentem recremento uim habet, & eodem modo lauatur.

## Stribium.

## Cap. XLIX.

**S**timmi optimum, quod splendidissimum est, modoq; nitedularum emicat, con fractu crustosum, nihil terre aut sordidi habens, friabile, quod sibi appellarunt, alij platyophthalmon. Vis eius astringere, meatu obstruere, refrigerare, ex crescentia in carne cohibere, ulcera ad cicatricem perducere, sordes & ulcera oculorum expurgare. sistit & sanguinem è cerebri membrana profluentem. & ut in uniuersum dicatur, uis usto plumbo similis est. priuatim, ambusta igni, in pustulas erumpere non patitur, cum adipe recenti illitum. crustosas exulcerationes ad cicatricem perducit, cum cera & exigua cerusa. Torretur pinfita farina circumlitum, & carbonibus obrutum, donec carbunculetur crusta, exemptumq; restinguitur mulieris lacte; quæ marem peperit, aut uetere uino. Vritur etiam carbonibus succensis efflatum, quoad igni deflagret. si enim paulò magis concremetur, plumbum fit. Lauatur, ut cadmia & æs. Sunt qui ut plumbi recrementum eluant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

*Stimmi, id est, Stribium, siccatur, astringit, oculorum collirijs liquidis & siccis miscetur, illotum ualenter astringit, lotum soluitur, & naturam assequitur propè rosionis expertem, fossilium melius. Quod enim ostendunt, igni coctum est, idq; purius, uel sæculentius & scoriosum. Oleum ex stribio præciosissimum. Mulieres oculis gratiam stribio conciliant, ipsum palpebris specillo inducentes quotidie, sic ne oculi membranam intus cõtingat. Stribium officinis Anthimonium. Germanis Spießglas dicitur, naturale; Roh spießglas, artificiale siue falsitium gelenter spießglas uocant.*

## Molybdæna, seu plumbago.

## Cap. L.

**M**olybdæna optima est flaua, argenteæ spumæ æmula, modicè splendens, cum teritur rufa. cocta cum oleo iecinoris colorem trahit. Vitiosa est, quæ aërem aut colorem plumbeum refert. Gignitur ex auro & argento. Est etiam quædam fossilis, ad Sebastiam & Coricum inuenta. Quo in genere probatur, quæ lapidosa non sit, aut recrementosa, sed nitens & flaua. Vim habet spumæ argenti, aut recremento plumbi similem. uritur lauaturq; eodem modo. miscetur conuenientissimè medicamentis, quæ liparas uocant, atq; emplastris minimè mordentibus. carnem recreat, & ulcera ad cicatricem perducit. glutinantibus tamen medicamentis, aut abstergentibus non conuenit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

*Molybdæna substantiæ est crassioris, & frigidioris, quàm Lithargyros, non terget tamen, cetera usum habet propè eundem in emplastris, licet uarium colorem afferat. Ambo liquantur tardius cum hydroleo, celerrimè oxaleo.*

*Molybdæna naturalis, German. Zwyttter dicitur: factura uero Dedh.*

## Argenti recrementum.

## Cap. LI.

**R**ecrementum argenti, quod scoriam uocant, aut helcysma, aut encauma, molybdæna uim habet. quare emplastris quas phæas appellant, additur, ac medicamentis quæ cicatricem obducunt, utpote cum adstringat, extrahatq;.

## Spuma argenti.

## Caput LII.

**S**puma argenti quædam gignitur ex arena, quæ molybditin uocant, in fornacibus cõflata, donec perfectè igni in cã defcat, altera ex argëto, tertia ex plumbo. Probatissima est Attica, secunda Hispaniensis, has sequitur quæ fit Dicæarchiæ, id est



id est Puteolis, Baijs, in Campania, & Sicilia: plurima enim hisce locis est flagrans  
 tibus laminis plumbeis gignitur. Quæ flauo colore splendet, chrysitis appella-  
 tur, omnium optima: quæ in Sicilia, argyritis: quæ ex argento, calabritis. Vis au-  
 tem adstringere, mollire, explere caua, ex crescentia in carne reprimere, ad cicat-  
 ricem ducere, refrigerare, & occludere. Vritur argenti spuma, confractis parti-  
 bus ad magnitudinem iuglandium, prunæ superpositis: ita accensa foliis, ut  
 conflagret, abstergitur infidens spurcitia, & reconditur. Aliqui ter a ceto aut ui-  
 no restinguentes, rursus urunt, & eadem prosequuti, reponunt. Lauatur ut cad-  
 mia. Ut argyritidi nominata, aut si desideretur, alteri candor detur, ea in parteis  
 magnitudine fabarum confracta, chæni cis atticæ mensura, fictili nouo superfu-  
 sa aqua, addito candidi tritici pari pondere, priuatimque pugillo hordei, linteo-  
 lo puro, raro, anfulis uasis alligato, coquitur, donec hordeum fractum dissiliat:  
 deinde omnia in nouum craterem oris ampli transfunduntur. triticum abijci-  
 tur, spuma argenti uehementer manibus affricando infusa aqua lauatur, assicca-  
 taque in Thebaico mortario teritur, affusa feruente aqua, donec soluta fatiscat.  
 excolata aqua, iterum tota die teritur, & uesperis infusa calida aqua finitur. mane  
 excolata aqua, iterum tota die teritur, atque ter die excolatur. id septem diebus fieri so-  
 let. postea additis ad singulas minas spumæ argenti, quinis salis fossilis drach-  
 mis, infusaque calida aqua, ter die teritur, & addita aqua excolatur: cumque in albu-  
 rit, calida infusa, idem facito, dum nullam prorsus falsedinem respiciat. demum ar-  
 dentissimo sole siccata, eiecto prius humore, reconditur. Sin minus, mina spumæ  
 argyritidis diligenter teritur, addito sale fossili trito, triplicato pondere, in ficti-  
 le nouum conijcitur, aqua infunditur, ita ut superemineat. mouetur quotidie ma-  
 ne & uesperis, aquaque superfunditur, priore nequaquam effusa. hoc fit triginta  
 diebus: namque nisi moueatur, crassescit, usque in duritiem testæ. Post hæc effusa  
 leniter muria, in Thebaico mortario spuma argenti teritur, coniectaque in ficti-  
 le aquam continens, manibus diligenter agitur, mutata subinde aqua, donec  
 nullum falsuginis indicium præbeat. deinde quod ex argenti spuma candidum  
 apparet, in uas aliud transfertur, & reductum in pastillos, plumbea pyxide con-  
 datur. Alij spumam argenti in fabarum magnitudines confractam, in uentre suil-  
 lo crudo ex aqua coquunt, dum uiscus eliquescens contabescat. exemptamque  
 cum sale pari terunt, & ut supra dictum est lauant. Sunt qui salis libram unam, &  
 spumæ argenti tantundem, in sole terant, aqua continuè mutata, dum candor ei  
 detur. Alia ratio: Sumito quantam uis argenti spumam: ubi lana candida inuo-  
 lueris, fictili nouo indita aqua cum pugillo fabarum recentium repurgatarum-  
 que decoquito. Cumque fabæ disruptæ dehiscant, lanaque non denigretur, exem-  
 ptam argenti spumam, & altera lana inuolutam, iterum coquito, cyathum aquæ  
 & parem fabarum modum adijciens. eadem tertio, quæ supra, facito, in funima,  
 tantisper, dum lana iam non inficiatur. Insuper transfundens in mortarium, ad  
 singulas salis fossilij libras, adijcito octogenas spumæ argenti drachmas Atti-  
 cas, & terito: intermittensque, nitri quam albisimi cum aqua diluti drachmas  
 quadraginta septem indito: iterum terito, donec satis candoris contraxisse ui-  
 deatur. ita autem fundens eam ex alto in fictile oris ampli, adiecta largiore a-  
 qua, ubi confidere defuerit, colato. tum nouam superadijciens aquam, manibus  
 probè uersatam, finito ut confidat, ac rursus per colum trajcito. alternis eadem  
 prosequere, dum pura aqua dulcisque effluat, & nullam falsedinem præ se ferat.  
 postremo in fictile nouum translata, colato sensim omni humore, soli quadra-  
 ginta diebus sub caniculæ sydu exponito, & siccata utitor. Elotam autem con-  
 stat ad oculorum collyria prodesse, & ad cicatricum fœditates tollendas, ad ru-  
 gofas facies, & cicatrici cosas, laceratasque, & macularum plenas.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Lithargyros est purgatissimæ igni materię uitii, siue fruescētis spuma, ut scoria iam purgat & fixa est, ex  
 plūbo Molybditis seu molybdena, ex argēto ærupōtis, ex auro xpuōtis oīm optima præparatiss-  
 sima est. Lithargyros moderatissimæ oīm terrarū siccatur sine manifesto calore aut frigore, & alioque

Locus ex Pl  
 nio restitutus



terget. Eius usus latissimè patet libris prope omnibus comp. phar. genere, maximè 2. et 3. Lithargyros manifestè nec calfacit, nec refrigerat, nec humectat, sed siccat primo absecssu à temperatis: nullam enim qualitatem manifestā gustatu exhibet: nec emplastica est, nec enphrastica, nec repellit quod influit, nec digerit quod parti inflammata est infixum, nec ulcera terget, nec expurgat euidenter, nec rodit, nec carne implet, nec eam supererescens absumit, parum tamen à medijs ad partium crassius recessit (licet sit tenuioris essentia quam molybdena) quàm coctione diuturna deponit fusa uigilis, & alterata. Ex his enim est medicamentis, quæ tota liquefiunt, ut resina, cera, sed non mox ubi ignem attigerit: quæ uerò multis imponit, etiam non fundi putantibus. Cum oxaleo autem cocta citius liquefct, & cum arugine quàm cū hydreleo uel æneleo, & quo plus liquoris ad coquendū habuit, eò glutinarius fit medicamentum. Melius enim fit ex Lithargyro medicamentum, quo magis coctum erit, quod ex liquidorum, quæ miscentur, copia contingit. Expers tamen pulchrarum harum uirium lithargyros, medicamentis miscetur, ut phœnicino, diachaleo uiribus eius nec commodans, nec incommodans, sed materiæ ad emplastri pharmaci compositionem idoneæ rationem obtinet. Cruda etiam per se seniorum ex itinere attritus iuuat parum fucando. Lithargyros absolutè, interdum tamen ut in melinis à colore cydonij emplastris Lithargyros χερσγος dicitur. lib. 2. comp. ph. gene. Lithargyros Germanis Glett. Gallis litharge dicitur.

## Cerusa.

## Cap. LIH.

Cerusa fit hoc modo: Infuso in urceum oris lati, aut fictile labellum quamacerrimo aceto, laminam plumbeā supra fictilis spiraculum, subiecta prius arundinea tegete, firmato: superiectisq; uel laminibus, ne halitum expiret acetum, ubi resoluta fuerit, defluensq; deciderit, humorem purum ad summa delatumcolato, crassamentumque transfundito. debet quoque siccat in sole, mox trusatili mola teri, aut aliàs tritum cribrari. postea qd superest duri, in tenues partes redigendū cribrandūq; uicissim eadem tertio quartoq; facienda. Melior, quæ primò cribrata est, & medicamentis oculorum assumenda, secundum locum tenet sequens, & reliquæ suo ordine. nec defunt qui ligneas rudes in medio uase appendant, & derafo ceu situ imposito, ita ut acetum non contingat, inditoq; operculo eircumlinentes dimittunt. post dies decem, laxato obturamento uisunt. cumq; resoluta materia fuerit, reliqua, ut supra diximus, exequuntur. Si autem quis in pastillos uelit digerere, aceto acri subacta, diuiditur in pastillos, qui in sole siccantur. Acstate tamen supradictum opus obeundum est, ita enim candida atque efficax rediditur. Quinetiam hyeme paratur, urceis supra furnos, balnea, aut fornaces impositis: ascendens enim calor, idem quod sol præstat. Laudatissimam fieri putant Rhodi & Corinthi, aut Lacedæmonæ, proximam Puteolis. Torretur hoc modo: Flagrantibus igni carbonibus, fictili nouo, maximè Attico tritam cerusam imposito, & assidue uersato, cumq; cinerum colorem traxit, eximens refrigerato, & utitor. Est & aliud urendi genus: Trita patinis nouis supra prunas imponitur, & ferula cea rude mouetur, donec colore similis sandarachæ fiat: extractaq; ad usus ministratur. quæ uerò ita parata est, sandyx: à quibusdam dicitur. Lauatur cerusa cadmiæ modo. uis ei refrigerare, occludere, emollire, explere, extenuareq; insuper ex crescentia leniter reprimere, & ad cicatricem perducere. miscetur ceratis, & emplastris quæ liparæ uocantur, pastillisq; est autem letalis eius potus.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Cerusa aceti acris uis ex plumbo soluta refrigerat, siccat, astringit, emplastica est, candefacit, hæc lota plumbo usto loto uiribus proxima: uita transit in Sandycæ, fitq; tenuior, nondum calfaciens. Phycos cerussæ frigidityte seruata tenuitatem assumpsit, quæ uis eius adiuta in profundum corporis penetrat. Cerussa Rhodiaca, uel illi similis ex ciuitate Dicearchia olim dicta, nunc Puteolis, præfertur, si emplastrum uis eximie candidum fieri, quia albidior, leuior, tenuiorum partium his, quæ alibina scuntur. Sal ex cerussa ad multa efficacissimus, & oleū ex Cerussa. Germa dicitur Bley weys. Gallis Ceruse.

## Chrysocolia.

## Cap. LIHI.

Chrysocolia laudatissima Armeniaca, colorem porri quamsimillimè reddens. secundum locum sibi uendicat Macedonica, & proximum Cypria, quo in genere præfertur pura, damnatur, quæ terrā aut calculos collegerit. Ratio lauandi



lauandi hæc est: Tusam infusa aqua, mortario expassa manu ad pilam uehementer fricato, & statim quam confederit, colato. alteram infundens aquam, rursum trito. hæc uicissim prosequere, donec pura sinceraq; spectetur. dein siccat in sole, & ad usum recondito. Quod si utere uolueris, ex ea terens quod satis esse uidebitur, patinis supra carbones adposito, & alia facito quæ supra diximus. Dos chryso collæ ad purgandas cicatrices. ex crescentem carnem coërcet. adstringit, purgat, ex calfacit, & modicè corpus mordendo exest. inter medicamenta intelligitur, quæ uomitiones concitant, & necem inferre possunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Chryso colla tam metallica q; factitia ualenter digerit, & siccat, carnē liquat sine ualenti morfu. Chryso colla, Spodium, Pompholyx, Pforicum, metallica sunt admodum tenuis essentia citra calorem. Naturalis & fossilis, Germanicè Schiffer grûn dicitur, factitia uerò, quæ auri ferrumini fundendo celeritatem addit, Bozafs appellatur.

## Lapis armenius.

## Cap. LV.

**A**rmenius lapis præfertur læuis, colore cœruleo, perquam æquabilis, caliculo carens, & friabilis. Eadem quæ chryso colla præstat, sed inefficacius. Quinetiam usum habet ad pilos in palpebris alendos.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Armenius lapis illotus supra & infra atram bilem uacuat, datus à drachma una ad scrupulos quatuor. lotus etiā quinquages tuior est, ac tantum infra uacuat, à scrupulis quinq; ad scrup. sex. Alexander Trallianus in melancholia, & post eum Mesues in simplicibus.

## Cœruleus.

## Caput LVI.

**C**œrulei origo ex ærarijs metallis in Cypro. copiosior ex arena littorali. secundum quosdam sub cauatos specus maris inuenitur, qui magis probatur. Eligi debet inebriatus. Vritur ut chalcitis. lauatur ut cadmia. Vinum habet reprimentem, & modicè erodentem. crustas gignit, & exulcerat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Cyanus siue Cœruleus, catharticus, id est, detrahens, digerit potentius quàm Cinnabaris, & subastringit. Vinum purgantē melancholiā supra & infra, ac melancholicum succum ipsi illoto præbet Mesues communem cū lapide Armenio, ob id ambos ualere censet aduersus omnes melancholicos affectus, mania, melancholiā, epilepsiam alterā, elephantiā, caneros, albos nigros, quartanas, hemorrhoidas. Sed & alias ei uires miras tribuit, uocatq; lapidem Lazuli & stellatum, quod uelut stelle quædam aureæ in eius fracturis cernuntur. Isurendo cœruleus magis euadit, si uerus est, malus uerum nigricat ustione. Tam hic quàm Armenus Medicis in usu, hodie sunt rarissimo. Germani Lasaur stein appellant.

## Indicum.

## Cap. LVII.

**I**ndici duo genera, unum sua sponte nascitur, tanquam spuma, germinatione Indicis arundinibus exiens. alterum insectoriæ dant officinæ: & est spuma purpurea innatans cortinis, quam detractam artifices siccant. Optimum existimatur quod cœrulei speciem præbet. succum suum sorbet, & leue. Inter medicamenta est quæ leuiter adstringunt, & inflammationes, tumoresq; rumpunt. purgat & reprimat ulcera.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Indicum fissile aliquando & hodie in aurifodinis inuenitur, Germani Stein berg bloe appellant, factitium uerò ex spuma Isatidis est, ut sup. suo loco diximus. Germani hoc Weid bloe & Judich bloe. Galli de l' inde fine, au grosse appellant, hodie in medicina nullius usus.

## Ochra.

## Cap. LVIII.

**O**chra leuissimam, & omnino luteam eligere oportet, saturatam, non lapidosam, friabilem, natione Atticam. Vritur hæc, & lauatur cadmiæ modo. Vis eius adstringere, erodere, collectiones & tubercula dissipare. ex crescentia in carne reprimat. caua cum cerato explet, & articulorum tofos comminuit.

Germanicè Oger & Berg gel appellant.

Cinnabaris.



## Cinnabaris.

## Cap. LIX.

**H**allucinantur qui cinnabarin minio eandem esse existimant. Minium enim in Hispanijs ex lapide quodam argenteæ arenæ permixto, temperari solet, alioqui non dignoscitur. fornacibus autem in florentissimum flagrantissimumque colorem permutatur. in metallis uero strangulatam halitum eructat. itaque facies in colæ uescicis obuelant, ut per illas spectent, nec respirando noxium aërem attrahant. eo pictores ad sumptuosa parietum ornamenta utuntur. Cinnabaris uero ex Africa deferitur, & magno constat. hactenus inuenitur, ut uix uersicoloribus pictorum lineis satisfaciât intento colore nec diluto præditum: quare quidam sanguinem esse draconis existimauerunt. Vim habet cinnabaris hæmatiz lapillo eandem. conuenit ad oculorum medicamenta, uerum efficacius, magis enim adstringit, & sanguinem cohibet. ambustis igni, & papularum eruptionibus. cerato excepta, medetur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sanguis draconis & Cinnabaris uera, hodie ignoratur ueterum si Iacobo Syluio medico doctissimo credimus. qui credit sanguinem draconis fictitium esse, qui hodie ostenditur ex bolo Armeno. sanguine hirci & succo sorborum, uel alijs. Cui tamen iste sanguis draconis quo uitrarum utuntur atque aurifabri, ruberrimi coloris gratia uel sit naturalis & fossilis quæ igne liqueatur, omnino Dioscoridis deinceps non respondens: quare hanc ueram esse ueterum Cinnabarum crediderim. Caterum loco huius ubi eius copia desit, rectius utemur fictitio quæ cinnabario neoteriorum, ex sulphure uino, & argemio uiuio simul uis.

## Argentum uiuum.

## Cap. LX.



**A**rgentum uiuum fit ex minio, quod abusuè cinnabaris dicitur. patinis fictilibus, imposita ferrea concha cinnabarin continente, & calice cooperta, argilla superlita, carbonibus succendunt. siquidem deterfa fuligo, quæ calici insidet, refrigerata in argentum uiuum coit. Quinetiam inuenitur in argenti fodinarum tectis, stillatim concretum. Alij per sese in metallis inueniri tradunt. Seruatur in uitreis, aut plumbeis, aut stagnis, aut argenteis uasis: siquidem aliam materiam omnem exedit, & defluere facit. Potum uim perniciosam habet: suo enim pondere interna exest. Remedio est lac multum subinde potum, & uomitionibus reiectum, aut uinum cum absinthio, aut apij decoctum, aut semen ormini, aut origanum, uel hyssopum cum uino, auri limati scobs, id est, ramentum quam tenuissimum eorum mirabili est auxilio.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Argentum à colore, uiuum à motu Latinis dicitur. Germanis Queck silber, à consistentia uero Græcis ὁ υἱὸς ἀργύρου, sed hanc arte fictam Gal. lib. 9. simpl. illud minerale uult Hermolaus: cum tam fictitium ex mineris, quæ minerale, seu argenti fodinarum tectis stillatim concretum, siue per se in metallis inueniunt, Dioscorides hoc loco hydrargyron appellat. Cui congener ex aqua fontibus uomens perpetua scatuerit Plinio. Argentum uiuum est metallorum omnium cum sulphure materia à calore temperatissimo, sic per minima unitum, ut sic cum humido, et humidum sicco æqualiter in eo temperetur. Unde opinor, chymistis calore & frigore temperatum quoque dicitur, non quarto gradu cum quibusdam frigidum, cum alijs calidum. Neque contra chymistarum placitum pugnare uidetur quod scribit Dioscorides, potum uim habere perniciosam, suo enim pondere interna erodere addit, non qualitate aliqua caustica. Neque uerba Galeni lib. 4. simp. cap. 8. quod scilicet calore nostro calidum adu reditum per erosionem interimit, & lib. 5. cap. 18. quod tota sua substantia nobis contrarium sit, & uinum si sumatur, neuter enim id aut calore immodico aut frigore deleterium dicit: sed ille pondere, hic tota substantia, ut scilicet omnino nos ledat necessario, quam diu paucum sit sumptum: cum deleteria calore aut frigore sine sola quantitate deleteria.

Ad hæc Galenus de sola hydrargyro fictitia loquitur, cuius quod interminat sumpta uel admota, se periculum fecisse negat, lib. 9. simp. Hodie uero uel pueris maxime perspicuum est, maximo mortaliū incommodo, quas vires sumptum uel admotum, uel suffum in scabie Hispana, siue Gallico morbo, (ut uocant) & eius Symptomatis, & multorum artificum usu uario, habent argenti hoc seminum, & erudum, quouis modo paratum & mixtum. Quod uero in metallis perfectius coctum est maxime, id longè omnium est efficacissimum, uti & præciosissimum, si quis secerneret et secreto nouerit uti.

Geberus chymista præclarus.



Ad essentia esset omnium tenuissima, indicant apertissime celerrima eius in uaporem præterueni-  
 abito, & in corpus quoduis etiam densissimum penetratio, ut etiã calculũ iactile affricu non ita mul-  
 to subeat, intrusq; dealbet, & fraglem maximè reddat. Ob id non probo ipsum enulato unguento, &  
 alijs quibusdã misceri. Argenti uiuum sublimatũ calore ignis erodente iã præditũ, fit eodem quoque  
 deleterium, ut calx & uini sex uista. Sublimandi autẽ (ut chymistæ loquuntur) modũ docet Geberus,  
 ex quo & alijs non contemnenda leges, quæ ad cognoscendam plenius argenti uiui naturam pertinet.

### Rubrica Sinopica.

### Cap. LXI.

**R**ubrica Sinopidis maximè probatur grauis, densa, ad iecinoris imaginem uer-  
 gens, calculorum expers, concolor, cum diluitur impendiõ fusilis. Effodi-  
 tur in Cappadocia, speluncis quibusdam, expurgataq; deferitur in Sinopem ur-  
 bem, in qua uenditur: unde cognomentum accepit. Vim habet exiccatoriam, qua  
 si inducendo obstruentem & adstrictoriam, quapropter uulnerarijs emplastris,  
 & pastillis exiccantibus, & adstrictorijs commisceri solet. alium sistit, in ouo  
 sumpta aut clystere infusa, datur iecinorit uitio laborantibus.

### Rubrica fabrilis.

### Caput LXII.

**R**ubrica fabrilis, ad omnia Sinopide inferior est. Optima Aegyptia & Car-  
 thaginensis, lapidum expers, friabilis. Gignitur etiam Iberia quæ ad occi-  
 dentem spectat, ochra exusta, & degenerante in rubricam.

*Hodie Germanis dicitur Rstelsstein.*

### Lemniaterra.

### Cap. LXIII.

**L**emniaterra, cuniculoso in specu nata, è Lemno insula, palustriloco defer-  
 tur, inibi electa, & caprino sanguini permista: quam incolæ cogunt in pastil-  
 los, & imagine capræ signant: unde & sphragida ægos, hoc est, sigillum capræ,  
 appellauerunt. Vim antidoti habet contra perniciofa uenena singularem. pota cum  
 uino, & præsumpta, euomi uenena cogit. contra ictus morsusq; animalium, quæ  
 exitiale uirus ei aculantur, prodest. antidotis familiaris. sunt qui hac ad sacrificia  
 utantur. est & dysenteria utilis.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

*Sigillum Lemnium efficacius sanguinis ex quauis parte eruptiones cohibet, quàm Samius Aster:  
 hic contra tenax & uiscosior, quàm Lemniaterra: ambo moderatè tergent. Lemniaterra etiam adstri-  
 ctio quædam inest. ualeros dyuicilib. 9. comp. ph. part. in arteriace Andromachi 14. Ea hodie uer-  
 ra Constantinopoli affertur. Officinarum falsa est.*

### Atramentum futorium.

### Cap. LXIII.

**A**tramentum futorium genere quidem unum & idem est, molle & concre-  
 tum: sed in specie differentias treis habet. unum namq; humoribus stilla-  
 tini in cuniculos quosdam colatis, concreuit: quare ab ijs qui Cypria metalla  
 perficiunt, stillatitiũ appellatur. Petesius ipsum pinarion uocat, alijs stalacticõ,  
 id est, stillatitium. alterum simplici ratione fit in speluncis: postea transfusum in  
 excavatos scrobes, concrementum capeffit, quod pecton, id est, concretitium,  
 propriè nominatur. tertium dicitur coctile, & in Hispania fieri solet: sed inutile  
 ac inualidissimum esse constat. Ratio parandi hæc est: Aqua madefactum deco-  
 quant, mox in piscinas transfundunt, & residere patiuntur. hoc certis diebus co-  
 lescent, in complureis formulas digestum, tesserarum speciem reddentes, quæ race-  
 matim inter se cohærescunt. Optimum esse creditur, cœruleum, graue, concre-  
 tum, translucens: cuiusmodi stillatitium est, ab alijs lonchoton nominatum. pro-  
 ximum, concretitium. coctile uerò ad infectus & denigrationes, aptius cæteris  
 esse compertum est. sed ad medicinæ usum inualidius esse, experimenta docent.  
 Valer adstringere, calfacere, & crustas inducere. latus uentris tineas necat, dra-  
 chmæ pondere deuoratum, aut cum melle linctum. uomitus ciet. aduersus hau-  
 sta fungorum uenena, ex aqua potum auxiliatur. purgat caput. aqua diluta, & in  
 uellere narib. instillata. Vritur ut paulò post in mentione chalcitis ostendemus.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

*Chalcanthum Romanũ atramentũ futorium, Germani Vitriol et Zupferwasser. Gallico perose.  
 Officina*



Officina utriusque Romanum uocant, essentia est eiusdem & naturae cum Chalciti: haec autem natura est & Genetel güt in argenti fodinis appellatur, illud ex hac fictitum & in hanc tandem per se rediens uehementissime astringit, & calfacit non instrenue, putridis ulceribus congruit, gargarconem etiam scirrhotentatum irritat. Ad haec quum medicamentum id est uehementissimum, ualidis uiribus astringendi & calfaciendi praeditum, uitanda eius per se uehementia, sed mitioribus multis obtundenda, vsum uero & lotum multo moderatius redditur.

## Chalcitis.

## Cap. LXV.

**C**halcitis praefertur similis aeri, friabilis, nec lapidosa, nec inueterata, inter cursantibus oblongis uenis, splendentibusque. Huic absterforia uis inest, ex calfaciens, & crustas ulceribus obducens. purgat quae oculis & eorundem angulis haerent, in genere leuiter exedentium est, ad ignem sacrum, & ulcera quae serpunt, efficax est. sanguinem è uulua & naribus erumpentem, cum succo porri fistit, gingiuarum uitia, depascentia ulcera, tonsillasque, eius farina compescit, uista, & cum melle trita, oculorum medicamentis longè utilior redditur. callum genarum & scabritiam absumit, abstergetque. fistulas tollit, collyrii modo in eas adacta. Fit ex chalcite medicamentum quod pforicon uocant, duabus eius partibus cum una cadmia additis, & ex aeto tritis, oportet autem in fictili obruere simo, diebus quadraginta, per caniculæ ardore: sic enim fit acrius. Idem quod chalcitis potest. Alij pares utriusque portiones in uino terunt, & eadem prosequuntur. Vritur chalcitis fictili nouo, uiuis carbonibus superposito. modus autem uisionis in humidioribus est, dum ipsa chalcitis bullas excitare desierit, & persectè inaruerit in reliquis uero, dum mutata in floridum colorem fuerit, & sanguinem aut spurcitiam flatu expellenda, tum demum eximenda est: in sindis aut carbonibus usquedum luteo colore pallescat: aut fictili subditis candentibus prunis, subinde uersata, donec igni conflagret, & colorem mutet.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sori, Chalcitis, Misy, acria, urendo escharas excitant, & nonnihil astringunt, essentiae consistentia & situ differunt. Nam sori in fodina infusum ac crassissimum: & quia lapidosius ac uehementius compactum, in humore non liquefit, friando nigrius ceu melanteria apparet, ac scintillat ut Misy, in multa foramina dehiscit, olfactu & gustatu uirus olet, suppingue est. Misy grumosum & frustulosum magis est durum, auro simile, quod friando auri colorem imitatur, & stella modo splendet, summum & tenuissimum, & a colore ingenito magis elaboratum, & siccius. Proinde acrius liquefit, & corpori duris ad motum ob tenuitatem minus ea mordet, quam Chalcitis, tamen si aequè calidum. Eadem ratione Chalcitis uista minus mordicat, & minus astringit, non minus tamen siccit. Chalcitis situ & essentia est media, eri similis, friabilis, non lapidosa, promptiss. liquefit, ea uista melior est quam non uista: quia tenuiore est substantia, ut alia omnia uista, non tamen acriore, quod alijs multis uistis accidit. Uista autem omnia lauando mitiora & minus mordacia euadunt.

Soreos pars extrema & summa in chalcitim, & chalciteos partes extremae in Misy tandem transferunt in metallicam fodina, & quo loco seruantur, quomodo aeri innascitur arugo. Haec Sori, Chalcitis, Misy ualenter tergent, Misy etiam modicè particeps est facultatis exedētis. Chalcitis cruda mordax est, uim autem eius urendo minuimus, idonea est Columella inflata, quando uehementer inueterauit, & curatu contumax est. Chalcitis uista est eligenda, quae urendo cineritia euaserit, non exposita uis, qualis uisione fit à multis. Chalcitis uista non minus efficax, sed minus mordax.

## Misy.

## Cap. LXVI.

**M**isy assumendum natione Cyprium, auri simile, durum, quod friando auri colorem imitatur, & stellæ modo splendet. Vim habet & uisionem cum chalcitide eandem, praeterquam quod pforicum ex eo non conficitur, ex cessus defectusque ratione tantum differens. Aegyptium autem ceteris praestat, utpote quod efficacius habeatur, sed ad ocularia medicamenta multo supradictorum inferius.

## Melanteria.

## Cap. LXVII.

**M**elanteria geminae est originis. quaedam in faucibus cuniculorum quibus aëseruitur, talis modo concrescit, alia uero in summa facie supradictorum locorum



**Iocorum** colit, quæ terrena est. quinetiam inuenitur in Cilicia & alijs quibusdam regionibus, fossilis quædam. Præstat, quæ sulphuris colorem trahit, leuis, purâ, æquabilis, & quæ contactu aquæ confestim nigrescit. Vim causticam tam obtinet, quam & misy.

*Melanteria Atramentum citrinum, Germanis Gelber berg schwefel dicitur.*

**Sory.**

**Cap. LXVIII.**

**S**ory existimantur aliqui melanteriam esse, aberrantes. siquidem sui generis est sory, ei non absumile. uerum fori uirus inest graue, & nauseam mouens. Inuenitur etiam in Aegypto & alijs quibusdam regionibus, ut in Libya, Hispania, & Cypro: Præfertur Aegyptium, quoq; frianti nigrius apparet, in multa foramina dehiscens, suppingue, insuper adstringens, & olfactu deuorationeq; magnum uirus olens, ita ut stomachus in uomitiones effundatur. quod autem friatum scintillas misyos modo non emittit, & alterius generis esse, & inualidum censendum est. Vim & uisionem supradictis similem habet. dolori dentium, cæuernis inditum medetur, eosque labantes firmat. ischiadicis ex uino infusum auxiliatur. illitum cum aqua, uaros extinguit. medicamentis admiscetur, quæ capillos denigrant. Hæc autem ferè omnia & alia quæ uisionem experta non sunt, perustis ualidiora esse existimantur, præter salem & uini fecem, nitrum, calcem, & consimilia, quæ cruda remissiora sunt\*. combusta enim, uiribus efficaciora redduntur.

*\* Dissoluitur*

*Sory Officinis Atramentum rubrum, Germanis Roter berg schwefel appellatur.*

**Diphryges.**

**Cap. LXIX.**

**D**iphrygis tria genera esse creduntur. Quoddam enim metallicum est, quod in Cypro sola gignitur, luto summanq; extrahitur, ex luto cuiusdam inibi specus: extractum, sole siccat, mox circumpositis sarmentis uritur. diphryges ideo uocatum est, quod & à sole & à sarmentis uratur, arefeat, & ferè torreatur. Alterum perfecti æris, quasi subsidens fex est, siquidem post frigida aquæ offusionem, ut suprà retulimus, cum de flore æris differeremus, sublato ære, forma cum ima parte coherens id genus inuenitur, & adstrictionem & gustum æris habens. Tertium sic fit: Lapidem pyriten, ut calcem multos dies cremant in camino: cumque colorem rubricæ contraxerit, eximentes recondunt. Quidam tradunt hoc ex sola materia quæ lapidem æris gignit fieri: quando in dictis æreis assata & in scrobes translata peruritur: tunc enim ambientem scrobis locum comprehendit, & exemptis lapidibus nihilominus inuenitur, præfertur, quod saporem æris reddit, æruginisq; adstringens, & uehementer exiccans linguâ. quod sibi exusta ochra non uendicat, quæ cremata, diphrygis uice uenit. Vis eius adstringere, perpurigare, extergere, siccare excrementa consumere, ulcera serpentia, & quæ cacoethe uocant, ad cicatricem perducere. suppuraciones terebinthina aut cerato exceptum discutit.

**NOMINA ET EXPLICATIO.**

Diphryges, quasi bis tostum, est perfecti æris uelut fex subsidens et coherens ima fornacum parti, tamquã ustori in foco lignorum cinis, ablato ære uisitur. Duobus alijs modis fit hoc loco Dioscoridæ & Plinio: modici & asstringit, & ære est, ut æs uisum, uehementer siccet, ulcera rebellia sanat, ochra uisita adulteratur. Germani uocant Berg grûn. unam diphrygis speciem.

**Auripigmentum.**

**Cap. LXX.**

**A**uripigmentum in eisdem metallis, quibus sandaracha, gignitur. Optimum existimatur crustosum, aureo colore micans, nulli materiæ permixtum, in squammas fissile: quale in Mysia Helleponti nascitur. Huius duo genera fluxerunt, unum supradictum est: alterum (\* glandis effigie pallidum) & colore sandaracham imitans, glebosum, ex Ponto & Cappadocia defertur: quod etiam secundū locū tenet. Torretur in testa noua uiuis carbonibus subiectis, assiduèq; uersatur, donec igne flagret. & mutet colorem: deinde refrigeratum, tritumq; reconditur. Vim habet adstrictoriam, & erodentem. crustas cum uehementi uredine, & uiolento morsu excitat, reprimat quæ excreuant, & capillos euellit.

*Am*

*\* Quid hæc non habent.*



Arrhenicon à uetustis Græcis, ab huius ætatis hominibus Arsenicum, Latinis auripigmentum: in iisdem metallis, ut auro, argento, quibus sandaracha gignitur: ob id eadem gleba ambo sæpe mista uidemus: optimum existimatur crustosum,  $\chi\epsilon\upsilon\sigma\iota\kappa\omicron\upsilon\upsilon$  (sic Galeno quoq; lib. 9. & 1. cōp. ph. part.) id est aureo colore micans, nulli materiæ commistum, in squammas tanquā bracteolas fissile: alterū globosum, pallidum, & colore sandarachō imitans. Vrendo multum sulphur exhalat, in argenti speciem sumum concreuit, sed intus rubet, causticum est nausæsq; cū uehementi uredine & uiolento morsu extat, hyper sarcosin absorbit, astringit & rodit, depilat tam non usum quā uisum: quod tenuiorum est partium muscetura digerentibus & tergemibus.

## Sandaracha.

## Cap. LXXI.

**S**andaracha probatur rufa, & saturatior, & aliena materia uacans, friabilis, Scinnabaris colore, sulphuris uirus redolens. Dos eadem & usio, quæ auripigmento. expler aliopecias, resina excepta. scabros ungues cum pice eximit. contra phthiriasin ex oleo efficax est. Tubercula cum adipe discutit. prodest ad narium orisq; ulcera, & cæteras papularum eruptiones cum rosaceo: item condylomata datur ex mulso, purulenta extussientibus. sufficit quoque cum resina, aduersus ueterem tussim, raptō per fistulam nidore. uocem expedit, cum melle delincta, suspiriosis cum resina in catapotio optimè datur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sandaracha Arsenico non solis natalibus, sed etiam tota natura affinis, ut coctione sola natura uideatur hæc Arsenicum uincere: id enim usione Sandaracha fit, ut Cerussa trita, mota, probè asta, in sandaracham pictoriam abit Vitruuius lib. 7. Ad hæc Sandaracha licet rubra sit, aqua tamen soluta luteum colorem intensum facit: floridum autem colorem luteum reddit Arsenicum. Dioscoridi probatur rufa, saturatior, cinnabaris colore, sulphur uiuum redolens: friabilis, materia uacans. Auripigmentum rubrum dicitur Serapioni. Eadem chymistis Arsenicum rubrum dicitur, ut Arsenicum erocum est auripigmentum. Arsenicum autem absolute his est album naturale & fossitum. Risagalum siue Realgar (quod uocant) in genere est Arsenici in iisdem fodinis inuentum. Exedunt sandarache. Petreæ Asiæ flos. Arsenicum & sandaracha & chalcitis usua, emplastra reddunt flaua uel rufa. Sandaracha drach. semissem, & alumen scissile & rotundum miscet Andromachus stomachicis, li. 6. cōp. ph. part. & muscos Ciprii drach. 8. apud quosdam legi scribit, ibidem. Vide ne cum Arabibus Sandarachē uoces gummi innuiperi, neue uires illius huic attribuas.

## Alumen.

## Cap. LXXII.

**O**mne aluminis genus ferè in Aegypto, & in eisdem metallis inuenitur. etenim scissile quoddam, quasi flos glebosi intelligitur. Gignitur & in alijs quibusdam locis, in Melo, in Macedonia, in Liparis, Sardinia, Hierapoli Phrygiæ, Aphrica, Armenia, & plerisque alijs regionibus, sicut & rubrica. Plurimæ eius species. uerum ad medendi usum, scissile, rotundum, & liquidum expetuntur. Optimū est scissile, præsertim recens, candidissimū, gustu perq; adstringens, graue olens, calculorum expers, nec glebulosè aut assulosè compactum, sed figillatim in capillamenta quædam canescentia dehiscens, quale est quod trichites, quasi capillare nominatur, in Aegypto natum. Reperitur quoque lapis huic alumini persimilis, qui gustus iudicio dignoscitur, quod non adstringat. Damnatur in rotundi genere, quod manu confectum est: sed ex figura deprehenditur. Assumendum autem suapte natura rotundum, bullis turgens, albo propius, atque ualidius adstringens, præterea nonnihil palloris cum quadam pinguitudine præferens, sine arenis, friabile, natione Aegyptium, aut ex insula Melo. Liquidū probatio, ut sit lympidum, lacteum, æquale, & semper succo madens, sine lapidibus, atque quandam coloris igniculum expirans. Vim habent ex calfaciendis, stringendis, & expurgandis, quæ caliginem pupillis oculorum offundunt. generum carnem, cæterasq; excrescentias extehuant. Scissile rotundo efficacius intelligitur. Vri & torrerī chalcitidis modo debent. Putrescentia ulcera compescunt, sanguinis fluxiones inhibent, gingiuas humore prægnantes comprimunt, motus dentium cum aceto & melle firmant, profunt cum melle ulceribus oris, eruptio




eruptionibus papularum, & fluxionibus aurium, cum sanguinalis herba succo. lepris conueniunt cum brassica folijs \* aut melle cocta. item pruritui, & ungui- \* *Succo.* am scabritijs, pterygijs, & perionibus, aspersa cum aqua. ualent cum aceti rece, & galla, paripondere cremata, ad phagedanas ulcerum, & cum salis duabus partibus, ad uitia quae pascunt. furfures cum eruo & pice illita abstergunt. ad lendes, pediculos, ambusta cum aqua illita auxilio sunt. contra tumores, & graue alarum inguinumque uirus, illinuntur. ex Melo autem aduectum, mulieribus praestat ne Alij, accom- concipiant, ante coitum ori uuluae inditum. partus quoque extrahit. gingiuis, si modatur, & caro excreuit, uuae ac tonsillis accommodantur. ori, auribus et uerendis cum illinuntur. melle illinuntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Alumen ab astrictione uehementissima Graecis *σύνσφις* dicitur. Germanis *Alun*, crassum est partium, maxime liquidum, & placites & pleurithes dictum, a crusta & lateris forma: minus stron gylon & astragalotes, id est, rotundum in astragali modum: minimum schistum, id est, scissile non in fila sed digitis friabile. Omne alumen in aqua soluitur, & igni liquefit, tardius scissile, quod sine bullis tandem mollescit, idem aqua innatat, linguae & cuti integra est mordacissimum, adulteratar segnentis lapidis amianthi: sed haec acrimonia carent, & ex pingui aliquo ardent re diuino corpore, aqua merguntur, & integra manent, in filaq; dissolunt. Alumen scissile colore candidum & praestantissimum, idem tenuius & utilius, lib. 6. comp. ph. part. Et quia rarum inuentu, carius: liquidum cono tris, crassum, & uilissimi precij, quia in omibus regionibus inuentu est facilissimum, lib. eodem sexto.

Sulphur.

Cap. LXXIII.



Sulphur optimum existimatur uiuum, quod apyron uocant, nitedula modo splendidum, perlucens, minime lapidosum. Probatur in genere sulphuris ignem experti. quod uir et, ac praepingue spectatur. Plurimum in Melo & Lipara gignitur. Supradictum sulphur calfacit, discit, & celeriter concoquit. prodest tussibus, suspiriosis, purulenta extussionibus, in ouo sumptum, aut suffitum. praeterea partus, usi nido- dore extrahit lepras, lichenas, scabros ungues cum resina terebinthina misti, au- fert cum aceto autem illitum, ad lepras efficax est. uutiligines tollit. scorpionis ictibus, addita resina, medetur. cum aceto uero, draconis marini scorpionisq; plagas sanat. pruritus toto corpore erumpentes, cum nitro deterfum, sedat. regium morbum emendat, in parsum fronti cochlearis mensura, aut in forbili ouo sumptum. facit ad grauedinem, & destillationes. sudores quoque conspersum in- hibet. podagricis, cum aqua & nitro illitum, conducit. grauitatem auditus, suffi- ti nido- dore raptim per fistulam hausto, sanat. lethargicos suffitu excitat. erumpen- tem undecunq; sanguinem sistit. corusis auribus, cum uino aut melle \* illitum medet. \* *Myrrha.*

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sulphur omne calidum, tenuis essentiae, trahit, terget: salina uel lotio, uel oleo ueteri, uel melle, uel terebinthina exceptum, uenenatis ictibus impositum sanat. Pforas, lepras, lichenas cum terebin- thina terendo & dissipando persanat. nobilissimum est *σύνσφις*, id est, uiuum & ignem nondum ex- pertum, Germanis *Lebendiger Schwebel*, ignem expertum quo uirentius, oleosius, pinguius co me- lius. Ex sulphure oleum chymistae efficacissimum, trahitur, fumo eius ardet in ca panā uitrea recepto, in oleum coëreto, et catinā subiectā destillante: sed quia ex multo sulphure paucū ascēdit, praeciosum est sit et aliter. Sulphur ijdem sublimādo (ut illi appellāt) purgatissimum & clementissimum efficiunt, etiā praeciosum eadem de causa. Cuius usum non est quod uerere quorundam imperitorum exemplo: Cum Galenus uiuum sulphur impurissimum diamoro stomachico medicamento ad digerendum misceat bis lib. 6. comp. ph. part. Nocet sulphur achoribus: quia plus quam par est eos calfacit atq; digerit.

Pumex.

Caput LXXIII.

Pumicis probatio, ut magnopere leuis, spōgius, scissilis, nec arenosus, item teri facilis, & candidus. Crematur flagrantissimis carbonibus obrutus: & ubi canduerit, extractus, uino restinguitur odorato: iterumq; in census extingui- tur: & tertia uestione exemptus & per se refrigeratus, ad usus conditur. Vis eius adstringere, gingiuas abstergere. purgat cum calfactione, quae caliginem pu-

Mm 4




pillis offundunt. explet ulcera, & ad cicatricem perducit. excreſcentia cohibet. fit ex farina eius dentiſtricum. corpori cruſtam obducit. auellendis capillis ap-  
tus. Theopraſtus autor eſt, ſi quiſquam in bullientem urceum uini pumi cem inie-  
cerit, feruorem ſtatim ſedari.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

*Pumex Germanis pymſen ſtein, ſarcoticis miſcetur, dentes polit, facultate deterſiora, & aſperi-  
tate ut ſmiris, teſtæ, cornua animalium uſta: uſtus tenuiorum ſit partium, & acrimoniam ſumit, quam  
lotione deponit. Nunc ſcriptoribus propè ſolū ad papyrum expoliendā cum gummi Iuniperi eſt uſui.*

Sal.

Cap. LXXV.



**S**al foſſilis efficacior eſt. comuniter, ſi eſt candi-  
dus, calculis uacans, & perſpicuus, denſus, equa-  
li compage. peculiariter ammoniacus natione lau-  
datur, ſi modò findi facilè poſſit, & in recta ſegmen-  
ta diduci. In marino ſale eligendus eſt candidus, æ-  
qualis, denſus. Probatiffimus in Cypro ſit, & Sala-  
mine Cypri, & Megaris, in Sicilia & Aphrica. Sed  
inter dicta ſalis genera lacuſtris præfertur: ſed mul-  
tò ualidiſſimus eſt Phrygius nomine tapeus, aut tri-

æus, aut ganæus. Salis natura in commune perquam utilis eſt. adſtringit, abſter-  
get, expurgat, diſſipat, reſprimit, extenuat, & cruſtas inducit. ſed hoc intereſt,  
quòd alius alio ſit præſtantior. quin & à putredine uindicat. admiſcetur medica-  
mentis pſoras abſtergentibus, excreſcentia in oculis reſprimit, & pterygia con-  
ſumit, cæterasq; carnis extuberationes tollit. clyſteribus infunditur. diſcutit laſi-  
ſtitudines ex oleo illitus. contra hydropicorum tumores auxiliatur. dolores in ſac-  
cis fori mitigat. & pruritus ſedat, ex oleo & aceto inſtriſtus ad ignem, donec fu-  
dent. item lichenas, lepras, pſorasq; anginam ex melle, aceto, & oleo illitus le-  
uat. tonſillis uuſq; cum melle toſtus: ulceribus in ore manantibus, gingiuis quas  
humor uexat, & phagadænis ulcerum, cum polenta crematus illinitur. aduerſus  
ſcorpionum iſtus, cum lini ſemine: contra ſerpentium \* morſus, cum origano,  
melle, hyſſopo: aduerſus ceraſten, cum pice, aut cedria, aut melle auxiliatur: con-  
tra ſcolopendræ morſus, cum melle & aceto: aduerſus ueſparum iſtus, & tereſti-  
nes\*, albidasq; capitis puſtulas, thymos & tubercula, cum ſeuo uitulino: furuncu-  
los cum uua paſſa, aut ſuillo adipe, aut melle diſcutit. teſtium tumores cum origa-  
no & fermento maturius cōcoquit. crocodilorum morſibus auxiliatur, tritus, in  
linteolo, & intinctus aceto, ita ut uinculis loca conſtringantur. Prodeſt ad beſtia-  
rum morſus, ſugillationes in facie, ex melle. Contra hauſtum opium & fungos,  
cum aceto mulſo bibitur. luxatis imponitur cum farina & melle. ambuſtis igni  
cum oleo impoſitus, puſtulas erumpere non patitur. podagricis itidem imponi-  
tur, & aurium doloribus cum aceto ignes ſacros & ulcera quæ ſerpunt cum ace-  
to aut hyſſopo illitus ſiſtit. Vritur fictili, diligenter opertus ne exiliat, cōdituſq;  
prunis, uſquedum efferueſcat. Aliqui foſſilem ſubactō polline obliniunt, & car-  
bonibus ſubijciunt, uſquedum eius cruſta exuratur. Solet & ſal communis hoc  
igne, moueturq; donec iam non exiliat.

Spuma ſalis, ſpumofi maris lanugo ſiue ramentum eſt, in exilibus petris inuen-  
tum, cui uis eadem quæ ſali.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sal tam foſſitius, uulgo ſal gemmæ, quàm marinus, terget, aſtringit modicè, ualide ſeccat, digerit,  
lib. 6. comp. ph. par. Per ſe & cum galla leui attactu gargareonem inflammatum non dureſcentem in  
ſcrrhum: non autem initio, neq; dū augeſcit, aut cū multo calore uiget: quod ſi corpus ſit plothoricū,  
aut ſaltem caput plenum, ſi initio adhibetur inflammato gargareoni, extrema laborant innoxia inſerunt.  
Sed aſtringit quum terget: ſeccat aut non minus quàm nitrū, aut nitrī ſpuma: ſed hæc nō aſtringunt,  
ob id ceratis mixta ulcerum ſordes tergem. Sal ob aſtriſtionem id nō præſtat. Sal Armeniacus terget,  
ſubacris eſt, leniſſimè aſtringit, humores acres in ſupercilijs inſperſus conſumit, à quibus pili male triti  
incidunt.



excidunt. Hāmoniacō salī similem forma schistum lapidem docet Dioscorides. Sal Hāmoniacū valen-  
ter digerit, lib. 6. comp. ph. part. noster tamen nigricans quā Officinā corruptē Sal armoniū. Ger-  
mani Salmar, tam nigricans, quā albicans factitius est.

## Muria.

## Cap. LXXVI.

**M**uria effectus salis præbet, abstergitq; dysentericis infunditur, etiamsi nō  
me intestina corripit. & ischiadicis ueteribus. ad fotus, aquæ marinæ u-  
sum præstat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Muria, quā Græci ἄλμυρ. Germani Salz, huius uocant, est aqua salsa, quæ si recoquitur, iterum  
ad naturam suam consumptio liquore redit, & sal fit, ut ex Catone liquet libri sui de re Rust. cap. 88.  
ubi candidū salē facere docet. Est autē nihil aliud muria quā aqua salsa, uelut etiā ipsum mare salsum ex-  
istit, sed hoc ex natura, illa arte paratur, prout usus ex postulat plus aut minus salis esse. Quare dis-  
fert etiā à falsugine uel falsilagine salinarū, quæ etiam ipsa natura salsa est, magis etiā quā marina, & ad  
hoc etiā liquida, quum muria citam durata fieri possit, certa quadā ratione prodita à Columella lib.  
12. cap. 6. quāquā non durā sed maturam legendum esse credere malim, nisi sepe & Columella, &  
Cornelius Celsus, & Scribonius, & Marcellus sic appellarent, ut uidelicet durā et maturā pro eadem  
accipiamus, cui cruda opponatur. Sic autē facere docet Columella. Quum salem per aliquot dies uide-  
bis in aqua tepefcere, ex eo intelliges nondum esse muriam maturā. itaq; subinde alium salem tam diu  
ingeres, donec in portā permancat integer, nec minuat: quod cum animaduertieris, scias habere mu-  
riam maturitatem suā. & paulo post. Est aliud murie mature experimentum. Nam ubi dulcem ca-  
seum dimiseris in eam, si pesum ibit, scies esse adhuc crudam: si innabit, maturam. Huic autē murie  
mature parandæ modum etiā Gal 4. simpl. prodit, sed eam tamen cui cuius innatat, ἐν κρητῶν ἄλμυρ,  
hoc est, temperatam & maturam ad salgama condienda appellat: eam uero quæ iniectum salem am-  
plius colliquefcere non permittit, uehementer salis, hoc est ὀξύς & ἄλμυρ uocat, quum Colomel-  
la hoc utrūq; experimentū murie mature esse dicit, nisi quod dulcem caseum oui loco demittendū trā-  
dit. Dura porro appellatio ex eo indita uidetur, quod aqua in ipsum salem uim suā exercere amplius  
non potest, quod liquida uti aqua & non indurata fieret, salemq; colliquaret. Plinius sanē durā non  
appellat, sed certam mensuram satis exprimit in aquam mergendi, quo dura aut moderata reddatur.  
31. cap. 6. Vsum autē murie dure præscribit Celsus lib. 4. 9. Edenda inquit sunt salsamenta, uel olea  
ex muria dura. & eiusdem libri cap. 15. Themison muria dura quā asperissima sit utendum memoria  
prodidit, & pluribus alijs locis Scribonius ca. 185. uulgatæ editionis ad coriandriū datū. Aduuari au-  
tem debent qui biberunt, ex uino mero atq; plurimo. uel aqua marina. uel muria dura pota. Constanti-  
nus Casar li. 20. de agricultura ultimo, eā ipsam muriam non durā, sed σακτὴν, id est, stillatitiā & liqui-  
dā siue percolatam appellat. At uero quā Galenus ἄλμυρ ὀξύς & ἄλμυρ dixit, eādem Archigines,  
citante Galeno lib. 1. cap. 7. comp. ph. part. ἀκρετοῦ appellat. Quare tres in uniuersum muriarum  
species existunt ὀμότεν uidelicet, quā Hippocrates ἰ. γυναικείων ὑλκεῖν appellasse uidetur  
ἐν κρητῶν & ἀκρετοῦ, hoc est cruda, matura siue temperata, & dura siue meraca &c.

## Flos salis.

## Cap. LXXVII.

**F**los salis flumine Nilo defluit. lacubus tamen quibusdā innatat. Assumen-  
dus q; crocei coloris est, odore ingrato, ceu gari. interdum longē magis uirus  
olet, gustuq; mordacior, & pinguius lentus. Fucatus autem rubrica, aut scrupu-  
losus, improbat. Preterea syncerus non nisi oleo resoluitur: adulteratus nō nul-  
la ex parte, etiā aqua, diluente factitiū colorem: ad ulcera quæ cacothe uocan-  
tur, & phagedænas, genitalium nomas, & purulentas aureis, efficax est. oculorū  
hebetudines, cicatrices, albuginesq; tollit. emplastris unguentisq; coloris causa,  
ut rosa ceo, miscetur. sudorem cit. aluum. urbat, in uino aut aqua sumptus. stoma-  
chum malè habet. additur acopis & smegmatis, quæ albandi capilli gratia\* com-  
ponuntur. & in uniuersum acris est, & feruentis naturæ, ut sal.

## Nitrum.

## Cap. LXXVIII.

**P**raefertur nitrum leue, roseo colore, aut candido, in foramina dehiscens, per  
inde quasi spongiosum quiddā, quale ex Bunis affertur. Humores euocat, q  
in alto concreuerūt. Spuma nitri optima esse putatur leuissima, glebosa, friabi-  
lis, colore penè purpureo, aut spumosa, & mordens, qualis ex Philadelphia Ly-  
diæ defertur: secunda est Aegyptia. quin & in Magnesia Cariæ gignitur. Vim &  
Min 3

\* alij, pilos ex  
palpebris ef-  
ficaciter de-  
trahit.



ustione salis habet. tam nitrum quàm spuma eius præterea nitrum tormina sedat, si tritum cum cumino bibatur, in hydromelite, aut sapa, aut aliquibus quæ inflationes discutere possunt, uti ruta, uel anetho, febrib. circuitu redeuntibus illinitur, ante suspectam accessionem. miscetur emplastris, quæ extrahunt, & discutunt, extenuant, & lepras abstergunt. Cum aqua aut calida, aut uino infusum, inflationes, purulentas aureis, & sonitus earundem sanat. sordes expurgat, cum aceto instillatum, canum moribus ex asinino adipe aut suillo medetur. resine terebinthinæ ad mistum furunculos aperit. aquæ inter cutem cum fico illinitur: oculis ad claritatem uisus, cum melle succurrit: & uenenis fungorū, ex posca potu: aut si buprestis mordiderit, ex aqua: ijs uerò qui taurinum sanguinem biberint, ex laserpitio: ijs qui cibum non sentiunt, utiliter obducitur: opisthotonis quæ iam remissioribus, & luxatis, cum cerato. in resolutione linguæ, pani commodè permiscetur. Aliqui supradicta carbonibus urunt, subiecta prius testa noua, donec incandescant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Nitrum, spuma nitri, aphronitrum, potenter tergent cuti affricata: sin autem nitrum ex tenuitate partibus constans lapidosum est, urendum ac diligenter leuigandum. ἀργός λιττόν, seu ὄψον, id est, spuma nitri ab Aphronitro differt, (sic χαλκός ἀνδρός χαλκάνθη, & ἀκάνθη λευκή ἀλευκάνθη, & multa alia similiter) illa enim alba est farina triticea similis, eiusdem cum nitro facultatis & naturæ, sed essentie tenuioris: hoc aut in glebas coactum & congelatum, amarum, in balneis sordes terget, & ichoras pruritum excitantes digerit. Nitrum præsertim bernicum si ueronicum potius lib. 8. metho. siccatur, digerit: sumptum autem in corpus incidit, tenuat crassos & lemos humores multo potenter quàm sal, amarum enim est, cap. i. lib. 4. simp. usum uerò tenuitatem substantiæ adeptum spuma nitri proximum est. Nitrum rubrum lib. 9. comp. ph. part. Aphronitrum magis quàm hæc incidit, stomacho miticum est, ob id non deuoratur, nisi grauis urgeat necessitas. Nitrum uerò sumitur, & alium subducit. Omnia hæc hodie desiderantur, quorum loco supponunt officinæ salem petra (quæ uulgo Salpeter & Saliter appellatur) purgatum, in panes coactum. id mentiri satius esset cineribus betæ, brassicæ & aliorum nitroforum.

## Fæx.

## Cap. LXXIX.

**E**Ligenda fæx maximè à uino uetere, Italico: sin minus, ab alio consimili Fæx aceri uiribus longè acrior est. crematur ut alcyonium, antè diligenter siccata. Sunt qui noua testa igni largo urant, usquedum penitus incendatur. Alij uiuis carbonibus facis glebam obruunt, & idem opus prosequuntur. Experimentum est legitimæ ustionis, ut aërio nitore in albescat, linguam quæ tactu urere uideatur. Eadem urendæ fæcis aceri ratio. Vis ei supra modum urens, & abstergens. ulcera ad cicatricem perducit adstringit. uehementer exest, siccaturque. Sed recenti urendum est, quoniam celeriter exanimatur. proinde non nisi in reconditorio, & uase aliquo reponi debet. Lauatur, ut pompholyx. Quæ ustionem experra non est, tumores & per sese, & cum myrto cohibet. uentris stomachique fluxiones illa sistit. multo liebre profluuiū, imo uentri aut genitalibus imposita, mitigat. panos discutit. non dum exulceratos, et tubercula. rigentes mammas, sui que lactis impatientes, cum aceto peruncta extinguit. Cremata uerò, unguis scabros cum resina aufert. addito lentiscino oleo, illita nocte tota, rufat capillum. Elota oculorum medicamentis, ut spodos, adijcitur. cicatrices eorum & caligines eadem abstergit.

## Calx uiua.

## Cap. LXXX.

**C**Alx uiua hoc modo fit: Marinarum buccinarum testas igni condito, aut feruenti clibano, nocte dimittito: postera die, si candidissimæ fuerint, extrahito: sin aliter, iterum urito, usquedum uehementer in aluerint. dein ubi in aquam frigidam immersæ fuerint, in fictile nouum conijcito, & exactè pannis operiens, noctem unam conquiescere finito, mane eam extrahens. ubi pfecto omni opere elaborata fuerit calx, recondito. Fit & è littoralibus calculis igne crematis, nec non è uili & fusaneo marmore, quæ cæteris præferitur. Vis omni calculo in commune ignea, mordens, adurens, & crustas inducens, quibusdam alijs immixta, ut adipi, oleo, cōcoquendi uim assumit, mollit & dissipat. ulcera ad cicatricem perducit. Efficacior existimatur recens, nec aspersa aquis.

NOM



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Calx uiua Germanis Vngelschter Faleß / uehementur urit, adeo ut crustas efficiat, & mox ubi est extincta, iam diu, non est caustica amplius, sed calida sicca: carnem tamen liquat: lota ter quater si ne morsu strenue siccat.

## Gypsum.

## Caput LXXXI.

**G**ypsum uim habet adstringendi, obstruendi, sanguinis eruptiones sudoresq; cohibet, sed potum, strangulationis modo iugulat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Gypsum, Germanis Gyps / siccat ut cætera terra, emplasticum est: cogitur enim, & lapide fit li quore aliquo, ut albumine maceratum, sanguinis eruptionem cohibet, cum tenui farina pilis leporum uel similiter mollibus exceptum: ustum minus est emplasticum, tenuium partium. siccus est, ex oxycrato repellit. Nostrum uero Gypsum, uti calx, urendo emplasticum magis euadit.

## Sarmentitius cinis.

## Cap. LXXXII.

**S**armentorum cinis urendi uim habet, cum axungia autem uel oleo illitus, fractis nervis, articulorum collisioibus, & neruorum nodis prodest. cum nitro & aceto, ex crescentias carnis in scroto reprimat. serpentium canumq; moribus illitus ex aceto medetur. crustas obducentibus medicamentis admiscetur. fit ex eo li xiuum contra præcipitationes, & fungorum uenena, cum aceto, sale & melle.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Latini cinerem Græci τρεφωσ. Germani Aschen. Galli cendre appellant. quicquid exustis corporibus relinquatur, siue hæc sint lapidum, siue arborum, siue animalium partes. Quare omne lixiuum eius cineris cuius lotura est, naturæ adipiscitur. Vnde sanè cum non unum temperamentum omnis cinis habeat, neq; etiam lixiuum habebit, ut merito è Galeno reprehensus Dioscor. uideatur, qui omni lixiuio assingentem naturam tribuit, cum non omnis cinis hanc naturam habeat, ut Gal. lib. 8. simpl. docet.

## Alcyonium.

## Caput LXXXIII.



**A**lcyonium quinque esse genera compertum est. unum enim spissum, acerbi laporis, spongiosa facie, item tetri odoris, ponderosum, & piscem olens, quod plurimum in littoribus inuenitur. alterum pinnularum oculorum aut spongiæ simile, fistulosum, & leue, odorem algæ referens. tertium uermiculi forma, & colore magis purpureum, quod Millefium quidam uocant. quartum succidis uelleribus non dissimile, multis inanitatibus hians, leue, quintum figura fungi, sine odore, asperum, parte interna quodam modo pumicosum, foris læue, acre, quod plurimum in Propontide iuxta insulam Belbicon appellatam gignitur, patrio nomine halos achæen uocant. Duo priora in feminarum smegmata assumuntur. contra lentigines, lichenas, lepras, uertigines, nigritias, & maculas in facie reliquosq; corpore. Tertium ijs qui difficili urina uexantur, aut arenulas in uesica colligunt, idoneum est. item renibus affectis, aquæ inter cutem, leni. ustum autem, & ex uino illitum alopecias replet. Postremum dealbandis dentibus aptum est. in alia smegmata, psilothracis assumitur, cum sale mistum. Si quisquam alcyonium cremare uelit, cum sale in crudum fictile mittat, & oblinens uasis spiraculum luto, ita fornaci mandet, & cum figlinum percoctum fuerit, extrahens ad usus recondat. Lauatur ut cadmia.



Officina spumam maris. Germani Meer schwamm appellat.

## Adarces.

## Cap. LXXXIII.

**E**st in Cappadocia\* quod adarces appellatur. \*Galatia. Est autem tanquam concreta salis lago, humidis & palustribus locis siccitate emergens, &



arundinibus ac herbis agglutinata, colore florilapidis Asij similis, & omni forma molli alcyonio, & aliquantum cauo proxima, ut uideri possit la cufre alcyoniū. Ad euellendas lepras, lentigines, lichenas, & uitia cutis in facie, & similia, ac commodatur. & in summa, uis ei a cris. humorem euocat qui in alto concreuit, & ischiadicis prodest.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Plinius ad arce meminit lib. 16. cap. 27. inter harū dines his uerbis Ad arcā numerans: Est & in Italia nascēs ad arca nomine palustris & lib. uerò 32. cap. 6. quasi antelatorū oblitus, inquit, inter aquatilia dici debet. Culamcochus Latine ad archa appellata, nascitur circa arū dines tenues. spuma aque dulces, & marinae, ubi se miscent. his uerbis penitus Plinius ad arches uidetur historiam cōfundere. Satisq; incuriosē de hac differuisse &c.

## Spongia.

## Cap. LXXXV.

**E** Spongijs alias mares appellauere, tenui fistula, spissas: quarū duriores tragos nominarūt. fœminas autē, quæ cōtrarias dotes habēt. Vruntur ex utroque cyoniū. Recētes sine pinguitudine, uulnerariæ sunt, & tumores reprimūt. recētia uulnera ex aqua poscaue cōglutinant. ueteres sinus ex decocto melle iungunt. Vultus autē inutiles. Aridæ ligatæ lino, si penicilli modo adigantur, oclusa ulcera, callosq; laxāt. siccæ recētes & uacua senilia ulcera, quæ fluxione laborant, aut cunicularim excedunt, impositu siccant. sanguinis profluuiū sistunt. Crematarū cinis ex aceto, aridæ lippitudini auxiliatur: & ubi quid abstergere, aut adstringere opus est. Vtriusq; in oculorū medicamētis lauare cinerē. Omniū cinis cū pice crematarū, profluente sanguinē sistit. Candida cura fiunt, ē mollissimis recentes, per æstus tinctæ salis spuma, quæ petris cohæret: infolantur in uersæ, hoc est, parte caua sursum spectāte, & qua abscissæ fuerūt, deorsum. si uerò æstua serenitate ad lunā sternantur, perfusæ salis spuma, aut maris aqua, maximū candorem referent.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Spongia Germanis eyn Badschwam. Gallis une espōge appellatur. Lapilli in his reperti, triti, ex uino poti lapides renumerum pun, non autem uesicæ, quia tenuioris sunt essentia, sine insigni calore. uesicæ tamen calculos rumpere hoc loco scribit Dioscor. si ex uino bibantur.

## Corallium.

## Caput LXXXVI.



**C**oralliū, quod aliqui lithodendron appellarūt, marinū esse fruticē constat, qui alto extractus, durat statim atq; emergit, tanquā offuso aëre protinus cōcrescat. Plurimū inuenit ad Syracusas, in promōtorio cui Pachyno nomē est. Laudatissimū, rubens, colore antherici aut sandycis saturatq; nec scus terētī facile cedens, æquabili usque quaq; cōcremento, rursus algæ aut fuci marini odore, quā ramosissimū, forma fruticis, cinnamomi æmulum. Quod autem in lapidis duritiā coit, scrupulosum, inane, & lacunosum, uitiosum existimatur. Adstringit, & refrigerat mediocriter. ex crescentia cōcrescit. oculorum cicatrices abstergit. ulcerum caua, & cicatrices explet. cōtra sanguinis reiectiones magnopere efficax est. urinæ difficultati auxiliatur, quin & potum ex aqua lienem absorbit. Quod antipates uocant, corallium esse arbitris. Vires supradicti habet.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Corallus lapis Actuarius dicitur, λιθόσπινος pop aliqui uocant, fruticis forma, cinnamomi æmulus crecit ad promōtoria in mari, astringit & refrigerat, cōtra sanguinis reiectiones magnopere efficax. Rubrū & nigrū tantū facit Dios. hoc loco. albisimū tamē hodie etiā uisitur naturalis, et citra uisionem.

## Phrygius lapis.

## Caput LXXXVII.



**P**hrygius lapis, quo infectiores in Phrygia utuntur, à quo nomen accepit, nascitur in Cappadacia. Optimus habetur pallidus, modicē grauis, nō solida corporis cōpage, inter cētibis albis segmentis, ut in cadmia. Vritur autem uino optimo perfusus, uiuisq; carbonib. obrutus: perflat assiduē follibus, donec murato colore



colore rufefcat. rursus extractus eodem uino restinguitur. hoc iterum & trinis uicibus faciendum. attendendum tamen, ne minutim confringatur, & in fuliginem euanescat. Vis crudo ustoq; adstrictoria, expurgans. ulceribus crustas quadam tenuis inducit. ambustis cum cerato medetur. Lauatur ut cadmia.

## EXPLICATIO.

*Phrygius lapis gleba pumicosa est, in medicina ut Plinius tradit nullius usus.*

Asius lapis.

Cap. LXXXVIII.

**A**sius lapis assumi debet pumicis colore, leuis, fungosus, item friabilis, scissiles uenas lutei coloris ad imum actas habens. Eius flos, falsugo subflaua est, summo lapide infidens, compage tenui, colore in aliquibus albo, in alijs pumici simili, ad luteum uergente. ad motus linguæ aliquantum mordet. Vim habet uterq; adstrictoriam, & modicè erodentem. admixtus liquidæ picis, aut terabinthinæ, tubercula discutit. Longè ualidior flos existimatur. De cætero siccatus flos, uetera ulcera & cicatrici repugnantia sanat, ex crescētia cohibet. tetra ulceræ & fungis similia, cum melle expurgat. ulcerū caua explet, & expurgat cū melle: depascētiaq; cū cerato sistit. fit cataplasma ex eo podagris, misto fabæ lomento: & lienosis, ex aceto & uiua calce. prodest flos ex melle phthysicis linctu. Podagrici iuuantur, pedibus in folio ex eo lapide excuato inditis. Funt quoq; pulueres, qui corpora erodunt, & luxuriantē carnem, & corporū crassitiem absumūt, cum uice nitri in balneo sparguntur. Si lauare libet, cadmiæ modo lauatur.

*Ex hoc lapide olim fiebant sarcophagi.*

Pyrites.

Caput LXXXIX.



**P**yrates lapidis genus est, à quo æs cōstat. Eligi debet æris similitudine, facile scintillas ædens. Vritur hic: Melle irrigatus molli pruna continuò flatur follibus, donec rufefcat. Alij in multis carbonibus igni candentes, lapidem copioso melle perfusum deiciunt, & ubi ad fuluum colorem uergere cœperit, extrahunt: efflatōq; cinere, rursus madefactum cremant, donec æquabiliter assiccatus, friabilis reddatur. siquidem sæpe facies summa solū uritur. ita crematus, siccatusq; recōdit. Si eloto opus sit, lauari debet ut cadmia. Tam crudi quàm usti uis est, ex calfacere, abstergere, offusam oculis caliginē expurgare, duritias cōcoquere, & cōcōctas discutere. resina exceptus ex crescētia in carne cohibet, sed calorē quendā & adstrictionē parit. Ita ustū nōnulli diphryges appellant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

*Pyrites lapis, de quo es pericitur, æris aspectu scintillas leui percussu edens: crudus & coctus calafacit, terget, digerit. Valida autem est facultatis, Galenus libro 9. simplic. Marcasita æris quibusdam dicta uidetur, & æg. stoff.*

Hæmatites.

Cap. XC.



**H**æmatites optimus habetur friabilis, saturato colore niger, durus & suo pte ingenio æqualis, nulla sorde admixta, nulloq; zonarum discursu. Vim habet adstringentem, & ex calfactoriam aliquantum, extenuantēq; oculorum cicatrices & scabritiam cū melle purgat. cum lacte autē muliebri, lippitudini, fractis, & oculis cruore suffusus conuenit. bibitur contra difficultatem urinæ, & fluxiones mulierum in uino. & ab ijs qui sanguinem reiecerunt, cum succo punici mali. sunt ex eo cocticulæ & collyria oculorum uitij apta. Vritur ut Phrygius, sine uino duntaxat. modus uestionis est, ut modicè leuis fiat, & bullis quibusdam intumescat. Sunt qui hæmatiten ita adulterant. Densam glebam rotundamq; schisti lapidis, cuius modi sunt quæ ejus radices uocantur, in urceum figlini operis, qui feruentem cinerem contineat, condunt, paucaq; interiecta morā eximunt, experiunturq; si trita ad cotem hæmatitæ colorem reddat. quod si ita res se habet, reponunt: sin minus, iterum obruunt, & subinde conspicientes, periculum faciunt. siquidem in cinere diu dimissus, colore murato diffunditur. coarguitur male confectus, primū scissilibus uenis: quippe in rectos uenarū discursus refringitur. at hæmatites longè



longè secus se in colore habet: namq; hic floridum reddit, hæmatites uerò saturatior, atq; cinnabarin imitatem. Inuenitur in Sinopica rubrica. Fit & è magnæ telapide, uehementer ambugo. in Aegypto sponte nature cū metallis enascitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Hæmatites à sanguinis colore, Germanis Blättstein dictus, frigidus astringens, excresecia reprimat, oculorū uulnera persanat, sanguinis expuitioni ualet, siccat humores, sed minus quam Cadmia. Nā ex humida substantia nō terrestri constat, & super cotem medicā cū liquore tritus, in succū soluitur: per se uerò in corpus simile minuitur, ut schistus lapis, non in fragmenta terrestria, ut cadmia.

Schistus lapis.

Caput XCI.

Schistos lapis in Iberia Hispaniæ gignitur. Probatur maximè qui croci colore æmulatur, friabilis, suapte natura fissilis, concremento & alterno coherentium uenarum discursu, pectinum modo, ammoniacoli similis. Vim exhibet hæmatitæ, sed ad omnia infirmior, quin & caua replet muliebri lacte perfusus. ad procidentia, rupta, item genarum crassitiem, & uuas oculorum, magno pereffica est.

Schistus lapis hæmatite uim habet per similem, sed infirmior.

Gagates.

Caput XCII.

In gagatarum lapidum genere, præferendus qui celeriter accenditur, & odorem bituminis reddit. niger est plerumq; & squalidus, crustosus, perquam leuis. Vis ei molliendi, & discutiendi. deprehendit fonticum morbum suffusus, re-creatq; uulnæ strangulationis. fugat serpentes nidore. podagricis medicaminibus, & acopis additur. In Cilicia nasci solet, qua influens amnis in mare effunditur, proximè oppidum quod Plagiopolis dicitur. uocatur autem & locus & amnis Gagates, in cuius faucibus ij lapides inueniuntur.

Gagates lapis colore atro, Germanis Schwarzer augstein, uoce parum deprauata, dicitur. odore dum uritur bituminis, siccat, glutinat, digerit admotus, in corollis præcarijs & salinis frequens.

Alij plures lapides.

Cap. XCIII.



Lapis thracicus dictus, nascitur in flumine quodam Scythiæ, cui Ponto nomen est. Vis ei gagatæ. Traditur aqua accendi, & oleo resisti: quod in bitumine accidit. Magnes lapis optimus est, qui ferum facile trahit, colore ad cæruleum uergente, densus, nec admodum grauis. Datur cum aqua mulsa, trium obolorū pondere, ut crassos humores eliciat. Sunt qui magnetem crematū pro hæmatite uendant. Arabicus lapis maculoso ebori similis. Is tritus illitu hæmorrhoidas exiccat. eius cinis dentifricio optimus. Galactites appellatur quod lacteum succum refudet. cinere tamen est coloris, ac gustu dulcis. Ad oculorū fluxiões & ulcera cōuenienter illinitur. Oportet autem in aqua tritum, pyxide plumbea recondere, propter uim glutini, quod ei obhæret. Melitites omnia galactitæ similis. hoc tantū interest, quod dulciore succū remittit. Eiusdem ut galactites effectus. Morochthus lapis quem aliqui galaxiam, aut leu cograpida uocauerunt, in Aegypto nascitur: quo, utpote molli, & facile liquefcente, linteones dealbandis uentibus utuntur. Spiracula corporis obstruere uidetur, cōueniens ijs qui sanguinem expuunt, cœliacis, & uesciæ doloribus, cu aqua potus. in idem fluxionibus uulnæ, & impositus uelleri. mollibus oculorum collyrijs misceatur. explet enim caua, atq; de la chrymationes sistit. idem cerato exceptus, ulceraque fiunt in teneris partibus corporis, ad cicatricem perducit. Alabastrites uoca-







est miraculum eo tanquam mundo aliquo polorum celi rationem inesse. Germanis Magnet & Segelstein appellatur. Plura de lapidibus & Gemmis, uide in annotationibus nostris in Theophrasti. lib. 1. de gemmis siue lapidibus.

## Terra.

## Cap. XCIII.

**O**Mnis terra ad medendi usum recepta, summam & primam uim habet refrigerandi, meatusque obducendi, ocludendique: sed specie distat, cum alia adiunctis quibusdam ad alia sit utilis. Eretriades due sunt, una uehementer alba est, altera cineritia. Optima habetur ad cinereum colorem uergens, per quam molis, quæ si per æramenta tractim ducatur, lineam violaceam refert. Lauatur ut cerusa, aut hunc in modum: Teritur seorsum\*, & cum aqua, & ubi pessum ierit, humor leuiter excolatur. siccata foliis, iterum teritur interdum, adiecta aqua, ut uespere confidat, antelucanis colo excernitur, & demum in sole trita, si fieri potest, digeritur in pastillos. Quod si tosta desideretur, pastilli magnitudine ciceris in fistile perforatum coniunguntur, oreque uasis diligenter obturato, supra carbones candentes continenter foliis perfiantur ubi uero cinis in fauillas se conuertit, aut æereum colorem contraxit, exempti reconduntur. Vim habet adstringentem, & refrigeratorem leuiter, mollientem. caua explet, & sanguinolenta conglutinat. Samia præfertur candida, leuis, tangenti linguæ glutinis modo adhærescens, mollis, succosa, friabilis, cuiusmodi est quam aliqui collyrion uocant. Duæ enim species eius, unam antè diximus, altera alter appellatur, crustacea, & cotis modo prædensa. Vritur ac lauatur ut eretria, uimque consimilem habet. sanguinis reiectiones sistit, foeminis fluxione uulvæ laborantibus, cum flore syluestris punice datur. testium & mammarum\* inflammationes, illita ex rosaceo & aqua, refrigerat. sudores arcet. contra serpentium morsus & uenena, pota ex aqua auxiliatur. Samius lapis, in Samia terra inuenitur, quo aurifices utitur poliendo auro, ut resplendeat. Probatur candore, & duritia. Vis ei adstrictoria, & refrigerans. prodest stomachicis potus. sensus hebetat. uerum ad fluxiones oculorum & ulcera, cum lacte efficax est. partus, ut tradunt, adligatus accelerat, & conceptus foeminarum custodit. Chia eligi debet candida, uergens ad cinereum, Samiæ similis. est autem crustosa, albaque, sed fictitij formis differens. Vis eademque & Samiæ. extendit faciem, & erugat, atque splendidam reddit. colorem in facie & corpore toto commendat. in balneis pro nitro deterget. Eadem præstat Selinusia. maximè laudatur, quæ uehementer resplendet, candida, friabilis, & humore dilui celerrima. Cimoliæ duo genera, candida, & ad purpureum inclinans. Optima existimatur quæ innatam habet pinguitudinē, tactuque frigida sentitur. Vtraque aceto diluta, parotidas, & alia tubercula discutit. ambusta igni, si statim cimolia oblinatur, pustulas non sentient. testium duritias, & totius corporis collectiones cohibet. igni sacro imponitur. in summa, utraq; multum in medicina commendatur, si incorruptæ originis, nec spuria assumatur. Quæ pinguis dicitur, colore ferè eretriæ similis est, grandioribus tantum glebis: manum si quis admo-ueat, refrigerabit. tactu linguæ usque adeo glutinosa, ut pensilis hæreat. cui effectus idem qui cimoliæ. paulò tamen infirmior. Hanc aliqui pro eretria de uendunt. Fornaceæ testæ uehementer tostæ, crustas ulceribus obducunt: quare prurigini & papularum eruptionibus medentur. podagricis profunt. strumas discutiunt, cerato exceptæ. Fornacum terra quæ retorrda fuluescit, eiusdem cum testa effectus. Melia colore cinereum eretriam imitatur, aspera tactu. ea digitis friata, derastrumicis modo crepitat. Vim habet aluminosam, sed remissiusculam, id quod gustu deprehenditur. modicè linguam siccatur, purum corpus reddit, & colorem commendat. pilos extenuat. uirilignes & lepras abstergit. pictoribus usum præbet ut colores diutius perennent. emplastris uiridibus, quæ chloræ dicuntur, efficaciter inseritur. Ex omni Melia terra & omni alia in uniuersum, eligi debet recens, mollis, non lapidosa, friabilis, quæ cum humorem attigerit, facile resoluatur. Ex amplitide terra, quæ pharmacitis nomine, in Seleucia Syriæ nascitur, laudatur in primis nigra, piceæ logos\* carbones referens, modicè assulosa, equa bili

\*interdin.

\*oculorum.

\*paruos.



bili splendore, quæ detrita, accepto oleo, statim liquefcit. Vitiofa cenfetur cã-  
dida, & cinerea, quæ in liquore nō refoluitur. Vim diffipandi & refrigerandi hæ-  
ber. ad calliblephara additur, tingendis capillis idonea, ufus eius ad illinēdas ui-  
tes fub germinationis tempus, utpote cum innafcentes uermiculos enecet.

Fuligo pictoria.

Caput XCV.

**F**uligo qua pictores utuntur, ex vitriarij officinis colligi folet: fiquidem ei pal-  
ma tribuitur. Vis eis ad adstringendū & erodendum efficax. fracta cum rofa  
cco cerato ad cicatricem perducit.

Atramentum librarium.

Cap. XCVI.

**A**tramentum quo fcribimus, fuligine è tedis coacta colligitur. in fmgulas li-  
bras gummis, ternæ fuliginis uncia adijciuntur. Fir etiam è refinarum &  
pictoria fuligine, de qua paulo antè diximus. Affumitur autè fuliginis mina, gū-  
mis fefquilibra, glutinis taurini, atramenti futorij, fingulorum fequuncia. Addi-  
tur conuenienter erodentibus medicamentis ambuftis, ex aqua commodè craf-  
fius illinitur: fed non antè foluatur, quàm cicatricem induxerit. fanatis fiquidem  
ulceribus, fua fponde decidit. Cæterum habes, amiciffime Areæ, ferè qua tra-  
denda duximus pro operis modo, quem deftinaueramus, & materiæ auxiliorūq;  
medicinalium copia.

LIBRI QVINTI FINIS.

## PEDANII DIOSCORI DIS ANAZARBEI DE VENENIS, QVO QUE MODO ARCEANTVR, VITEN- turq; Liber fextus.



**V**PERIORIBVS amiciffime Areæ libris, tradidimus de aromati-  
bus, oleis, unguētis, arboribus, & earundē fructibus, lachrymisq;  
item animalibus, melle, lacte, feuo, frumentis, oleribus, herbis, radi-  
cibus, liquamentis, uinis, metallisq;. In hoc uerò totius operis ulti-  
mo, facultates medicamentorum recensebimus, quæ prodeffe no-  
bis, aut officere poffunt. Vitata igitur orationis prolixitate, opus institutum pro-  
fequamur. Huiusmodi autem tractatus, cum bifariā distributus fit, in partem  
uenena præcauentem, ita ut ne fallant fumentes: aut fi quando per imprudentiā  
dentur, utrum quoq; innoxia fiant, irritaq; & in rationem ijs fuccurrēdi qui iam  
noxiam sentiunt: primum differam de præcauendi modo, quem effe difficillimū  
pleriq; maiorum arbitrantur, quòd dantes clām uenena, ita infidias temperāt, ut  
peritiffimū quenq; decipiant. Siquidem uenena fua amaritudine, permiftis dulci-  
bus, fpoliant, & graue odoris uirus miftura odoramentorū eximunt. aut medica-  
menta immifcent, quæ tuendæ fanitatis gratia dari putant: & præfertim in uale-  
tudine, ut abfinthium, tragoriganum, fatureiam, aut hyffopum, quinetiam thy-  
mum, irim, origanum, abrotonum, caftorium, aut fi quid medicamentis purgato-  
rij cognatam habere qualitatē uideatur. aut potionibus inferunt: ut uinis afpe-  
ris, iuribus, paffo, mulfæ aquæ, mufto, fuccis, ut in cremore lentis, polentis, aut me-  
dicaminibus, aut alijs quæ affumuntur, edulij fpeciem referentibus. Quare qui in  
ea fufpicionē funt, conditos cibos uitare debent, omniq; intēfo fapore, dulciū,  
aut falforum, aut acidorum, abftinere: nec fitibundi affatim bibere, aut efuriētes  
uoraciter comēffe, fēperq; ad faporē horum diligenter attendere, præfertimq;  
potu frigidā aquā præfumere. Satiatio enim appetitū, qualitates ægerimè poft  
ea concoquantur. In ægris quidem facile cauemus potiones auxilij prætextu da-  
ri folitas, quas offerunt improbi ueneficorū artifices: itaq; ob id laborantes mor-  
bo non perinde audentium iniurijs patent. Et hæc quidem ne facile incauti sedu-  
ctiq; homines capiantur dolis ueneficorum, ratio eft & facultas. Sed alia fupereft  
expeditior, ut fufpiciofi aliqua præfumāt, quæ uenenorum uires hebetent, & in-  
efficaces irritasq; reddant: cuiusmodi caricæ funt cum iuglandium nucibus man-

Nn



ducatæ, & quæ cedromela uocant; id est, citria, seminisq; napi drachma cū uino, item folia calaminthæ, aut creta, quæ Lemnia sphragis appellatur, pondere par cum uino, aut rutæ folia & nucis iuglandis nucleum, aut caricas duas, & salis calum ieiuni sumāt, & nullo ueneni genere læduntur. Antidota ex uino sumpta eundem effectum præbent: inter quæ intelligitur magnū Mithridatium, & quod scinco, & quod sanguine temperatur. Quin & sæpe uenenis obsistunt peculiare quidā corporum affectus certo quodā modo constitutorum cum quadā cibi potusq; qualitate, tum uini copia ita temperatorum, ut cum uenenis dissentiant. siquidem ingesti ueneni uires frangunt, atq; iam priore alimento factis præclusisq; meatibus, obstant ne membratim per digestionem insinuetur. Verumenimvero, quoniam fortunæ necessitas interdum similia discrimina peregrè agentibus avertit, absque ullis insidijs hominum, non nihil differendum mihi de hac re necessarium duco. Iam primum igitur culinam apparare loco subdiali conuenit, cibosq; & potus in huiusmodi loco struere. si id fieri commodè nequit, secunda erit conditio hæc, apparandi apponendiq; sub tecto. Sed tum diligenter laquearia animaduertenda, frequenter enim à superioribus contabulamentis animalia decidunt, exigua quidem, sed quæ non modicam perniciem moliuntur, ut phalangia, stelliones, & alia quædā reptilia. Porro uinaria uasa diligenter intueri oportet: namq; reptilia odore uini illiciuntur, quæ interdum sorbendo, noxium uirus eructarunt, interdum uerò delapsa immersaq; expirant, & exitij causas haurientibus attulerunt. Sed hæc hæcenus dicta sint, ne cauti & prouidi insidijs pateant. Quod si qui sua sponte, aut ex quorundam insidijs sumptum, auxiliari primo quoque tempore oportebit. siquidem dum comites singulorum uenenorum notæ expectantur, inmedicabile fit uenenum, & paulisper neglectum, medicamentis ægrè cedit. Quare si qui pro comperto se uirus sumpsisse intelligant, & fateantur, aut eorum qui aderāt testimonio constet, protinus ad idonea remedia transeunt, facile peculiari naturæq; constitutioni restituerunt. Neq; enim insasentimur, qui prorsus auxilia in huiusmodi frustra adhiberi contendunt. Quoniam enim modo morbi, quorum causæ cæcæ latentesq; corporibus insident, medicamnam admittunt, & quæ forinsecus incurrunt uenena, medendi rationē aspernantur? Acq; uerò omnes morbi pro causarum ingruentium magnitudine, proq; antecessitibus affectionib. qualitatibusq; quib. sit opportunū corpus, uel medicabiles sunt, uel nullis cedunt medicamentis. Quod si qui forsitan obmutescerent, aut temulenti, aut nolentes alioqui uenenū à se egeri, nullā nobis eius cognitionem præbeant, tū protinus accedendū ad ea quæ cōmuniter epotis quibusq; uenenis opitulari consueuerunt. Atqui nullū magis in omnia ualens auxiliū dari potest, quā ut proximo loco uirus foras exhauriatur, priusquam inualescat. Quare sine mora, calidum oleum ex aqua, aut seorsum, ut uomitare cogatur, dari conuenit. Aut si oleum natura loci negat, butyrū cum aqua calida, aut malua, aut lini semine, aut trago, urtica, scenograeco, aut halicæ decocto, uicē eius exhibebit. Hæc enim nō modo uomitionib. exigentui illa sua laxatrice, aut nauseam ciferet, sed aluum quoq; subducent, & corporū inanitione ita aduersabuntur, ut a criminas uenenorū hebetent. Id quod euidenter huiusmodi argumento deprehendere licet: Esto ut quisquā uiua calce uel sæce, aut cantharidibus, aut alio quouis acri, corpus exulcerare statuerit, is si ipsum oleo leniter illinat, exulcerationē nō accipiet. Atqui neq; uehementer adstringi corpus, neq; refrigerari poterit, si anteā perungatur. Quinetiā uomitus non ob id modò quod uacuet, et noxiū humorem excernat, iuuamentū adfert, sed quod assumptum uirus nonnunquā odore coagularis grumis aut colore, prodatur: quippe cum odore et amaritudine, meconium: colore, cerusam, gypsūm uel: grumis lac aut sanguinem animalis recens iugulati ostendat. Nam grauis odor regestorum, leporis marini, aut rubetæ ueneficia deprehendit, ita ut nonnulla ab his remedia peti possint, ad idonea singulorum auxilia transeuntibus. Oleo etiā maluæ decoctū admisceat, aut glauciū, aut adeps anserinus, aut pinguium carniū iura, lixiuū lignorū cinere factum. Vbi uerò uomitus diligenter citatus fuerit, ne quid in uentre coierit, quæ hæserunt intestinis



stinis reliquiæ, clystere acri deuocentur. Facit & nitrum tritum, & cum hydrome lite sumptum, uina uetera liberalius epota, gallinacea iura, præpingues pisces, uetustæ carnes pinguesq; & quæ adipe aut recenti butyro parantur: aluum nanq; subducunt, uti diximus. & stomachum resoluentia, prouocant ipsum ad uomitionem reddunt, & uenenorum acrimonias hebetantq; meatus obstruentia, celerem uirium penetrationem inhihent. Quinetiã medicamenta dantur, quæ cõmuni dote profunt: ut Lemnia terra, agaricum, abroronum, irio, radix eryngij, semen pastinacæ, & calaminthæ, nardum gallicum, castorium, ferulæ uiridis medulla, flos rhododædri, succus marrubij, laser aut laserpitium, sagapenũ, peucedani succus, aut panacis, & radix quam magadarim appellant, aristolochia lōga, syluestris rutæ semen, & betonica, quæ cestron nominant. folia singula cū uino, drachmæ pondo sumi debent. effectum præbet polij decoctũ, & feseli, & liquida pix linctæ. magnificè ferunt opem antidota, quæ in calce scripta operis reliquimus. Cõmunis ratio præstandi auxilij ira se habet. Cæterũ ab ijs quæ consueuerunt euenire, cõmunia remedia sumptuari possunt. Ferè enim uires uenenorum quàm plurimum, in affectus cõsimiles corpus tandem redigunt. Quam ob causam plerisq; cõmunia conducunt auxilia uaria etenim sunt uenenorum genera, cõmunes tamen nec multi iisdem affectus oriuntur. Neq; fieri potest, ut omnes concurrentesq; casus quæ symptomata uocant, unum uenenum sequantur: alioquin superuacanea fuisset uenenorum singulorum traditio cum suis remedijs ab autoribus descripta. Neq; uerò in uno eodemq; promptum est inuenire, ut quis stomachi, alui, intestinorum, iecoris, renum, & uesicæ dolore uehementer crucietur, ut singuliat, erodatur, contremiscat, refrigeretur, obmutescat, conuellatur, pulsus elanguescat, spiritus difficilis fiat, ueterno prematur, uertigo obuersetur, caligent sensus, stranguletur, sitiatur, sanguis erumpat, febre confluetur, ægrè loquũ reddat, torminibus uexetur, crebrò uomitet, nausea prematur, rubescat, liuore fugilletur, pallescat, desipiat, stertat, uiribus deficiat, et pleraq; alia faciat, patiatq; singula enim in generales affectus deducta, pauca numero & cõmunia ea demonstrant, quæ euenire consueuerunt. Quare in singulis quæ suprà diximus non facile fuerit deuoratum uirus cognoscere. Nam oris & linguæ erosio, stomachi, uentris, uesicæ ac renum inflamatio, uehemens urinæ difficultas, & interdum cruoris cum eo exitus lancinatio, & in plurimis partibus quidam adustionis sensus, non in cantharidibus modò potis reperiuntur, sed in erucis quoq; pinorum, & bupreste, & salamandra. Porro uon modò eos qui meconium hauserunt, ueterno aut sopore premi, stertere, liuore fugillari, torpere, refrigerari, stupescere. toto corpore pruritum sentire, sensu priuari cõstat, sed eos etiã qui munda dragoram aut cicutã deuorauerunt. Delirium non hyoscyamus tantũ infert, uerum etiã quæ toxica appellantur. itidem aconitũ, & mel quod in Heraclæa Pontica gignitur. Strangulatio nõ minus in fungis, quàm in sanguine taurino, lacte, aconito, cerusa, gypso conspicitur. In summa, difficile unũ uni ueneno propriũ inuenire signũ, quod haustum gustatumq; uirus prodere possit: maxime, quod hæc cæterorũ etiam uirtutũ, quæ in corpore exoriuntur, cõmunia sequi solent. Cæterũ in his quæ celeriter enecant, noxam signis forsitan indicare possis, si ad ea respexeris quæ sumus dicturi. Sed in ijs qui ad longas ægrotudines spectant, nihil ad medendi rationem difficile, dũtaxat quod pertineat ad indicia noxæ: utpote cum uenena statim atq; præsentaneam uim illã perdididerunt, transmutata in longos adfectus, cõmunia reliquorum uirtutũ remedia, cõpositionesq; flagitent, cū uenefica proprietas non amplius insit. Si uerò lōga sit affectio, in aliquod diuturnorũ morborum genus recidet, à quibus facillè fuerit medendi rationem assumere. Sed de ijs quæ generaliter auxiliantur, hæctenus. Consequenter quæ priuatim singulis profunt, scriptis mādabimus, si prius sigillatim exposuerimus, quæ ex singulis ordinibus exitialem aut maleficã uim sortiuntur, ut medicinæ studiosi ea cautè obseruent, quæ ad rationem salutis scripta inueniuntur, quòd nõnulla eorum quibus utuntur uenenis sint cõmixta. Incuria enim magnas adfert noxas. & sæpe cõtinuo usu eorũ, homo in perniciem agitur. Proinde animalia quæ exitiosam uim habent, hæc



sunt: cantharides, buprestis, salamandra, pinorum eruca, lepus marinus, rubeta, & rana palustris muta, deuoratae hircines. Semina sunt: hyoscyamus, coriandrum, cicuta, gith, psyllion. Liquamenta: meconiū, opocarpasōn, thapsig succus, elaterium, mandragoras. Radices, quas mittit chamæleo, aconitum, thapsia, uera trum, ixia, agaricū nigrum, ephemerum, quod aliqui Colchicum uocant, quod in Colchide nascitur. Herbæ oleraq: smilax, quam aliqui tithymalum appellāt, Romanitaxum: solanū manicū, quod & dorycnium dicitur: sardinia herba, quæ rannunculi genus est: corniculatum papauer, pharicum, toxicū, ruta syluestris, fungi ab animalibus. taurinus sanguis recens, coagulatum lac, mel Heracleæ in Ponto genitū, metalla, gypsum, cerusa, calx, auripigmentū, duo sandarachæ genera, spuma argenti, adarce, plumbum, & quod argentū uiuum dicitur. E liquoribus domesticis: uinū abunde post balneas potū, aut passum, & frigida aqua similiter.

In hunc sextum & ultimum libuit, Dioscoridis nihil annotare librum candide Lector, cum ea omnia quæ hic liber comprehendit fusius copiosiusq: testata sine a nobis in commentarijs nostris de uicetura animalium Latine et Germanice conscriptis, de uenenis porro atq: eorum Amidotis leges nostras annotationes in libellos de uenenis Arnoldi nouicomensis et Petri apponenfis. quos in hac re amplius consulere potes.

### Cantharides.

### Caput I.

**Q**uibus datae sunt cantharides, signa eueniunt grauissima. Ab ore enim ad uesciam usq: cuncta erodi sentiuntur. picem aut simile quiddam cedri respiunt. dextra præcordia inflammantur. urinam egrè reddunt, & subinde cum lorio sanguinem emittunt. strigmenta non secus atq: dysentericis, aluo deferunt. fastidia urgent, animo linquuntur, abortaq: uertigine concidunt. postremò mente abalienantur. Ergo antea quàm tale non nihil accidat, dato oleo, aut supradictorum aliquo, uomere cogantur. mox ubi uomitione plurima reiecerunt, halicæ aut orizæ, tragi aut ptisanæ cremor, ad decoctū malucæ, aut seminis lini, aut scenigregæ, aut radicū althææ, quam latinus sermo ibiscum appellat, clystere infundatur. præterea nitrum eisdem dandum, ex hydromelite, ut quæ stomacho adhuc aut in testinis adhærent, eluendo excernantur, ac descendant. Quæ nisi sic discutiantur, ingesta in aluū ex nitro aqua mulsa, uacuari debēt. detur deinde uinū aut passum, in quo pineoli nucleī, aut cucumeris femina contrita sint, aut ex lacte, aut mulsa, aut anterinus adeps in passo liquefactus. inflammata autē partes, hordei farina cum mulsa decocta perungantur. Ab initio admota cataplasmata nocent, quòd citatus ab eis calor, illapsum uirus ita remoratur, ut in principes se parteis infinuēt. ipsa tamen interiecto tempore, molestissimis inflammationibus opitulatur, utpote quæ dolores & permulceant & leniant. tum ubi corpus calfaciente oleo inunctum fuerit, in folium descendere oportet, ac lauare, ut per cutem summam quæ corpori noxia inhæserunt, etiam excernantur. & deiectiones multarum moliri oportet, ne affectus infigatur, & stabilitatem capestat. Gallinaceis carnibus & hædinis, aut suillis catulis maximè pinguibus & tenerimis, ac cum lini semine coctis uesci debent: siquidem aluum cient, atq: uenenorum a crimonias hebetat. Vinum dulceliberalius ebibatur. Prodest thuris cortex, & Samia terra, quæ aster appellatur, si quaternæ singulorum drachmæ cū passo\* sumantur. item pulegium ex aqua tritum. irinum aut rosaceum, cum rutæ decocto: recentes uitis ramuli, cum passo detriti. Longè omnium potentissimè antidota auxiliantur, cum aqua mulsa, drachmis quatuor pota.

\*Passi drachma.

### Pinorum eruca.

### Caput II.

**I**s qui erucas pinorū hauserunt, illico dolor in ore & palato exoritur. uehementi alui, linguæ ac stomachi inflammatio torquet. intestina dolor excruciat, ita ut pruriginem sentire uideatur. corpus totum exaestuat. fastidium urget. Quibus est succurrendum remedijs quæ deuoratis cantharidibus dantur. Peculiariter tamen pro simplici oleo & irino, melinum, quod è cotoneis pomis & oleo temperatur, accipiemus.

Bupreo



## Buprestis:

## Cap. III.

**Q**ui buprestin biberunt, non dissimile nitro uirus sapiunt. stomachi uentrisque uehemens dolor insequitur. tam uenter quam stomachus mirum in modum, ut in aqua inter cutem, diffusus inturgescit. Vniuersa corporis facies contenditur, urina supprimitur. Quibus eadem quæ potis cantharidibus auxiliatur. Priuatim post uomitus & uacuationes quas clysteribus molimur, aridæ ficus profunt. item earum decoctum, ex uino, ubi uerò iam ferè pericula inclinantur, Thebaicarum palmularum cibo, aut earundem tritatum in mulso aut lactis potu, iuuantur. pyrorum etiam omne genus esse, & lac humanum bibere, cõuenit.

## Salamandra.

## Caput III.

**S**i Salamandram hauserunt, linguæ inflammatio consequitur. mens & sermo spræditur. tremor cum torpore aut horrore quodam ac exolutiõe accedit. partes nonnullæ corporis liuoribus circumquaq; lugillantur: sæpeq; diutius in morante ueneno putrescentes destuunt. Quibus præstabimus cuncta quæ potis cantharidibus. Pecuiliaria uerò remedia, resina pinus, aut galbanum ex melle liquidum, & aiugæ decoctum, in quo nuclei pinei conterantur: urtica quoq; folia, cum lilijs & oleo decocta. profunt etiam oua testudinis marinæ aut terræstris, coctat item ranarum ius, cum quibus eryngij radix incocta sit.

## Ephemerum.

## Caput V.

**S**umpto ephemero, quod aliqui Colchicon, aut syluestrem bulbum appellant, spruritus in toto corpore excitatur, nō secus atq; ijs qui urtica aut scilla lacerantur. interna rosionem sentiunt. stomachus cum ingenti grauitate exastuat. cæterum inualecente morbo, cruor strigmentis admixtus, per aluum exigitur. Quibus, ut ijs qui salamandram hauserunt, uomitione aut clysteribus auxiliari cõuenit. sed antea quàm uenenum inualescat, dandum est decoctum frondium querqus, aut glandiũ, aut malicorij. lac bibere prodest, in quo serpyllum sit decoctum. item succum sanguinalis herbæ, aut ramorum uitis, aut rubi, aut medullæ recentis ferulæ, aut myrti cū uino: bacca autem myrti tussæ tritaq; & aqua macerata, ut liquor inde sumatur, opem ferunt. media castanearum tunica, similem effectum præbet, si cruda in aliquo supra dictorũ succo sumptitetur. organum quoq; cum lixiuio epotum, eximie iuuantur asinini lactis aut bubuli calidi potu, etiam si in ore contineant: ita ut quibus copia lactis huius adsit, non aliud desideretur.

## Dorycnium.

## Caput VI.

**D**orycnion, quod aliqui manicõ solanum appellant, epotum, lactis saporem in gustu refert. continentes singultus ciet, humor linguam uexat, sanguis confertim rejicitur. multa quædam perinde quasi dysentericis, aluo egeruntur. Itaq; antequàm aliquid ex ijs eueniat, auxilio sunt antedicta, uomitus, clyster, & quæcunq; potum uenenum expellere possunt. Priuatim ijs opitulatur aqua mulsa, lac caprillum, aut asininum, dulce uinum, quod tepidum cum aniso bibatur, amygdalæ amaræ, gallinacea pectora decocta. quin etiam conchyliæ omniæ, tam cruda quàm tosta esse salutare est. conueniunt & locustæ marinæ, & gammari, & pota eorundem iuscula.

## Aconitum.

## Cap. VII.

**A**conitum statim in lingua inter bibendum, cum astrictione quadam dulcescit: & subinde, potissimum cum exurgere conantur, uertigines offundit. lachrymas ciet. grauitatem pectori, & præcordijs adfert, simulq; crebri spiritus deflantur. Quare uenenum uomitiõe abigi aut clystere per aluum egeri opus est. utimur inter propinandum, origano, ruta, marrubio, uel absinthij decocto, cum uino absinthite, uel semper uiuo, uel abrotono, uel chamelcæ, aut aiugæ. prodest etiamnum opobalsami drachma, cum melle aut lacte, cum castorio, pipere, & ruta, & quis ponderibus ex uino, coagulum hædi, leporis, aut hinnuli, cū aceto. ferri quoq; sterces, item uinum in quo aurum, ferrum, argentumue candens restinguatur, potum, lixiuiq; cum gallina & uino decocta, aut carniū bubularum præ-

Nn



iura, cum uino sumpta fertur & aiuga priuatim ipsis subuenire,

Mel Heraclia.

Cap. VIII.

**M**el in Heraclia Ponti, ubi aconitum gigni solet, inuenitur, quod qui edunt bibuntque, non secus affliguntur, quam qui aconitum ebiberunt. lis eadem quæ potio aconito conueniunt. adiuuantur in primis continuo uini mulsi potu, cui rutæ folia sint adiecta.

Coriandrum.

Cap. IX.

**C**oriandrum ob odorem laterenō potest. epotum autem uocem exasperat, infaniam adfert à temulentis non abhorrentem. qui sumpsit, pudenda dictu blaterant, totiusque corporis odore, uenenum fatentur. Quibus post uomitionem irino oleo cōcitata, uti retulimus, merum & per sese, & ex absinthio potum, auxiliatur. item oleum. nec secus oua in eodē exinanita, si liquefacta \* in muria sorbeantur. & epota muria, & ius falsum ex gallina & anse, passum quoque cum lixiua sumptum.

Plyllium.

Caput X.

**P**syllion epotum, corpori toti frigus & torporem cum exolutione & mero re quodam affert, ita ut animus respondeant. Cui omnia quæ ex hausto coriano auxiliantur.

Cicuta.

Cap. XI.

**C**icuta pota uertiginem excitat, oculisque caliginē offundit, ita ut ne minimum cernatur. singulus ciet, mentem turbat. extremi artus gelantur. denique conuulsi, suppresso arteriæ spiritu, strangulantur. Quare inter initia, uti in reliquis, cicutam uomitu excutimus. postmodum deiectionem moliemur, ut quod ad intestina prolapsum sit, excernamus. tum demum in meracam potionem, quæ maximo est auxilio, deuenimus. repetendum per interualla, in quibus proderit lacæ finium, aut bubulum potui datū, aut absinthium cum pipere & uino, castorio, ruta, mentha cum uino, aut amomi, cardamomi, aut styracis uncia, \* aut piperis cum semine urticæ & uino, aut lauri folia. item laser ex oleo & passo, & passum per sese largius potum proficit.

Taxus.

Caput XII.

**S**milax, à quibusdam tithymalum, à Latinis taxus appellatur: frigus uniuersæ corpori, stragulat, & celerē interitū infert. Cui eadē quæ cicutæ conueniunt.

Carpasi succus.

Caput XIII.

**E**potus carpasi succus soporem, citamque strangulationem adducit. Adiuuantur autem qui hauserunt, epotæ cicutæ remedijs.

Sardonía herba.

Cap. XIII.

**S**ardonía ranunculi herbæ generi assignatur, quæ uescientibus mentem adimit, & quadam neruorum distentione labia in rictum contrahit, ut risus spectem præbeant. à qua quidem affectione, de Sardonio risu adagiū in uulgus infansito omine manauit. Post uomitum peculiariter conuenit aqua mulsa & lac, liberius epota, irrigatio, perunctioque à pinguibus medicamentis, totum corpus exalfacientibus. in calidam aquam oleumque descendant. sed tum multū perfricare & inungere expedit. & in summa, curam omnem, quæ conuulsioni neruorum adhibetur, exequi oportet.

Hyoscyamus.

Caput XV.

**H**ioscyamus potum aut comesum, similem ebrijs ab alienationem mouet, sed facile medicamentis cedit. Auxiliatur aqua mulsa copiose data, lacque, præsertim asininum. si id desideratur, caprillū, uel bubulum, uel aridarū ficum decoctum. faciunt ad id etiam nuclei pinei, aut cucumis semē ex passo sumptum. & uinum falsum cum adipe suilla recenti, passoque: itidem urticæ semen, aut nitrum ex aqua, & intubus erraticus, & sinapis, & nasturtium, radix, cepa, & allium.

& hæc



& hæc singula cum uino sumantur: \*postea finendi quiescere, quemadmodum  
qui uinum biberunt, ut excoquant,

\* Alij, post  
quiescant, u.  
uinum conco-  
quantur.

## Mandragora.

## Cap. XVI.

**M**andragora si bibatur, confestim sopor insequitur, exolutio, ac uehemens  
ueternus, nihil temerè distans à lethargo. Cui, antequam aliquid ex ijs a-  
cidat, uomitus & aqua mulsa proderit. postea nitrum & absinthiū, ex uino dulci  
aut passo sumatur. caput rosaceo & aceto pfundatur. proficit excitatio, & motus  
corporis, & olfactus eupatorii, & piperis, sinapis, castorii, & rutæ, tritorū in ace-  
to: & liquidæ picis, & odor è lucernarum exustione & extinctu. quod si aggrè ij  
reuocentur, sternutamenta mouere, alijsq; communibus auxilijs ut conueniet.

## Meconium.

## Cap. XVII.

**E**Poto papaueris succo, quæ meconion uocant, consequitur ueternus cum per  
frictione & pruritu uehementi, ita ut sepe inualecente ueneno, tanta eripac  
prurigo, ut hominem excitet. corpus id medicamentum olet. Post citatam oleo  
uomitionem, acres clysteres auxiliantur, acetumq; mulsum cum sale potum, aut  
mel cum rosaceo calido, merum cum absinthio aut cinnamomo copiosum, aut  
calidum per sese acetum, nitrum ex aqua, & origanum cum lixiua aut passo, &  
rutæ syluestris semen cum pipere, uino, & panace; piperq; cum castorio & ace-  
to mulso, uel cum satureiæ aut origani decocto cum uino. hi olfactilibus exci-  
tandi. ob enatam pruriginem in balneas descendant, & foueantur. post laua-  
crum prodest iurium pinguium usus, cum uino aut passo. medulla etiam ex oleo  
pota.

## Corniculatum papauer.

## Cap. XVIII.

**Q**uod corniculatum papauer appellant, & potu & cibo eadem inferrecō  
suevit, quæ papaueris succus: nec alijs expugnatur auxilijs.

## Pharicum.

## Cap. XIX.

**Q**uod Pharicon uocāt, sapore syluestre nardum imitatur. Resolutionem  
neruorum potum affert, cum conuulsione & delirio. Oportet autem post  
uacuationes uinum absinthiten potui dare, cum cinnamomo, aut myrrha, aut  
nardo gallico, quod serinen aliqui uocauerunt: aut spicæ nardi duas drachmas,  
& myrrhæ totidem obolos, cum passo, aut irim cum croco ex uino, derasumq;  
caput illinire hordeacea farina cum aceto, & trita ruta.

## Toxicum.

## Cap. XX.

**T**Oxicum ex eo nominari uidetur, quod barbarorum sagittæ eo illineban-  
tur. Qui biberint, labiorum & linguæ inflammatione torquentur. incoercē-  
tus furor uarias ijs imagines obuersat: quare uix medicinæ locus est: raroq; qui  
hauserunt, euadent. Vinculis ergo cohibendi, ut uinum dulce cum rosaceo bibe-  
re, & reuomere cogantur. rapi semen bibendum cum uino. Priuatim ijs conenit,  
quinquefolij radix, & hircinus sanguis, aut caprillus, eodem modo sumptus. ro-  
boris, fagi, aut ilicis cortex cum lacte tritus. malaq; trita esse, aut cum pulegio  
& aqua bibere, conueniet. amomum & balsami semen ex uino. Sed qui pericu-  
lis defuncti sunt, diu lecticis decumbunt, & ubi surrexere, stupidi reliquum  
tempus degunt.

## Ixia.

## Cap. XXI.

**I**Xia, quæ ulophonon appellatur, inter potā dum aliquid ocimo simile gustu, &  
odore redolet. uehementem linguæ inflammationem excitat, mentem mouet.  
omnes excrementorum exitus suppressit. strepitum cum animi deliquio ciet. ijs  
intestina latrāt, nec egeritur quicquā. Post uomitionē aluiq; resolutā, auxilium  
præstat aqua, in qua absinthium maduerit, ex uino largiore, aut aceto mulso  
pota. rutæq; syluestris semen, aut laseris radix. itē tragorigani decoctum, cū  
aliqua supradictorū, aut lacte, aut resina terebinthina\*, aut nardo, aut castorio,  
aut laserpitio, q̄rum singuli oboli conueniunt. quin & nuces iuglandes ex uino.



cū resina, castorio, & ruta trite, ita ut singula drachmę pōdus equent. itidem cha-  
melę aut thapsię aut absinthij succi sicilicus cū aqua mulsā. & acetū calidū potū.

Cerusa.

Cap. XXII.

**C**erusa suo colore proditur. sumpta enim. mox palatum, gingiuarum lingua, &  
commisurę dentium, candore quodam inficiuntur. singultus, tussim, ac lin-  
guę ariditatem excitat. ijs extrema frigescent, mens labat, membra torpescunt.  
Quibus dare conuenit aquam mulsam, aut ficuum aut maluarum decoctum, aut lac  
calidum, aut sesamam ex uino tritam, uel lixiuiam ex sarmentis factam. amaraci  
num oleum aut irinum. persicorum ossa cum hordei \* decocto. columbina oua  
cum thure, aut hordei decocto, aut prunis, aut gummi quod ulmus plorauit, aut  
humor quem ulmea folia reddiderunt, cum tepida aqua. sed tum quoq; uomant.  
conuenit etiam thapsię succus, aut scammoniarum, cum aqua mulsā potus.

\* Lilij.

Fungi.

Cap. XXIII.

**F**ungorum alij genere, alij copia lædunt. omnes tamen strangulatus suspen-  
dio similes cōcitant. Quibus confestim succurrendū. cōmuniter ex oleo uo-  
mere cogendi. mirificē iuuat lixiuia ex sarmentis aut pyrastrij furculis, epota cū  
sale, posca & nitro. fructus, aut folia pyrastrij cum fungis decocta, strangulantem  
illam uim auferunt, esitataque eisdem auxiliantur. aduersus fungos gallinacea  
oua cum posca proficiunt, adiecta aristolochiæ drachma. item absinthium cum  
uino melleq; sumptum, & ex aqua potum. apiastrum ex nitro. panacis radix & se-  
men in uino. fex uini cremata cum aqua. atramentum futorij ex aceto. radix,  
uel sinapis, aut nasturtium esu profunt.

Gypsum.

Cap. XXIII.

**L**apidescens gypsum strangulationem creat: quare eadem proferenda sunt,  
quæ manfis fungis, auxilia. ad hæc maluarum decoctum, quod etiam olei uicem  
pensat: utpote cum pingue sit, euomendūq; lubricas uias & faciles reddit, deradi-  
corpora non finit quod ubi duratur in lapidem, gypsum efficit. quinetiam pro-  
dest oleum ex aqua mulsā, aut ficorum decocta. lixiuia ē ficulneo cinere, aut sar-  
mentis facta, cum uino copiosiore pota. origanum aut thymum cum lixiuia, aut  
aceto, aut passo. hiq; decocto maluarum proluendi.

Sanguis taurinus.

Cap. XXV.

\* Conuulsioe

**T**auri recens iugulati sanguis, epotus, spiradi difficultatem strangulatumq;  
concitat. faucium tonsillarumq; meatus cum neruorum distentione \* præ-  
cludit. lingua rubescit. dentes inficiuntur. quædam concreti sanguinis uestigia,  
inter eorum cōmissuras restant. quare uomitum uitabimus. sanguinis enim glo-  
bi attractu illo in sublime relati, magis gulę inculcantur. Dari ergo opus est quæ  
concretum sanguinem discutiunt, aluum subducunt. grossi lacteo succo torgen-  
tes ex posca, & nitrum per sese, auxiliantur. necsecus coagulum omne cum ace-  
to & laserpitij radice, aut lasere. itidem & brassicę semen, ē cinere ficulneo lixi-  
uia. conyzę folia \* cum pipere, & rubi succus ex aceto. aluus resoluenda. ijs q fer-  
uantur, stercoreosa & fluida per sedem egeri consueuerunt. stomachum aluumq;  
hordeacea farina ex aqua mulsā perungere oportet.

\* Semina.

Lac coagulatum.

Cap. XXVI.

**E**os qui coagulatum lac hauserunt, frequens illico strangulatio inuadit,  
quod in globulos quosdam lac coalescat. Quibus iuandis pro antido-  
to, coagulum ex aceto damus, & bibere sæpius cogimus. damus & calaminthę  
folia arida, item succum. aut laserpitij radicem, aut laser cum posca. thymumq;  
ex uino \*, & cum luto suo lixiuiam. Sed nulla falsilago obijciatur, quoniam ma-  
gis lac coiret, & in caseum densaretur. Neq; illos uomere conuenit: siquidem con-  
cretum lac sese in gulę angustias insinuans, strangulat.

\* Aceto.

Argenti spuma.

Cap. XXVII.

**S**puma argenti pota, stomacho, uentri, & interaneis grauitatem cum magnis  
torminibus



terminibus adfert, & nonnunquam pondere suo intestina uulnerat. urinam super primit corpus intumet, plumbeamque deformitatem concipit. Quibus subuenit secundum uomitionem, potum syluestris homini semen, myrrhe drachma octo, absinthium, hyssopum, apij semen, aut piper, aut ligustri flos ex uino, aridum palumbis simum, cum nardo & uino.

Argentum uiuum.

Cap. XXVIII.

Argentum uiuum potum eadem quæ spuma argenti infert, eisdemque utendum auxilijs. lac copiose potum auxiliari constat, sed postea euomant, qui hauserunt.

Calx, sandaracha, auripigmentum.

Cap. XXIX.

Calx, sandaracha, & auripigmentum, pota aluum & intestina cum uehementi erosionem excruciant. Præbenda cuncta quæ suo admistu illorum acrimoniam hebetant, ac soluunt, & facilem lubricamque aluum reddunt, cuiusmodi ibisci & maluæ succus est. natura enim utrique perlubrica, dandum decoctum seminis lini, uel semen tragi herba, uel orizæ, lacque cum aqua multa copiosum, iura pinguis, & boni succi.

Lepus marinus.

Cap. XXX.

Qui leporem marinum biberunt, piscium uirus olent: procedente tempore, aluus dolore afficitur. urina sistitur. etsi quando eam reddere contingat, purpureum colorem referet. omne piscis genus auersantur & odio habent. fetido & graui sudore manant. biliosus uomitus, interdum sanguini promiscuus, subsequitur. His dandum lac asininum, uel passum continuè, aut radicis maluæ foliorumque decoctum, aut trita cyclamini radix cum uino, aut ueratri nigri, aut scammonij succi drachma, cum aqua multa, punicique mali acinis. cedria contrita cum uino efficax est. anserinus sanguis, ut tepet, potus, sed cum pisces omnes respuant, spernenturque, solis fluuiatilibus caneris uesci possunt, bibuntque eos admisso uino adiutisque ab his percoquunt: cumque appetere & comesse pisces ceperint, suæ salutis indicium habent.

Rubeta et palustris rana.

Cap. XXXI.

Rubeta aut rana palustris assumpta tumores ciet. pallor corpus uehementer decolorat, ut planè buccum spectetur. spirandi difficultas torquet, & grauis halitus oris, singultusque. inuita interdum genitura profusio consequitur. Adipuantur secundum uomitionem multo meri potu, & arundinis radicis binis drachmis, aut cyperi totidem. breuiter, cogendi sunt ut uehementi ambulationi & cursui se credant, ob torporem quo corripuntur, quinetiam quotidie lauari sunt.

Hirudo.

Cap. XXXII.



Deuorata cum aqua hirudines, si ori uentriculi adhærent, tractione partis nonnullam suctionis imaginem præbent: eo enim argumento hausta hirudo deprehenditur. Has muria sorbitione excutit, & Cyrenæicus succus, aut laferpici folia, aut betæ, cum aceto, aut pora niuis glebula, cum posca. nitrum ex aqua gargarizatur, aut atramentum sutorium aceto dilutum. Si faucibus hærent, ut extra lupinorum farina\*, aqua frigida ore contineatur, & ad eam hirudines exilient. Prouidenda etiam ijs quæ etsi ferendi auxilij gratia tradantur, non minora tamen cæteris uenenis pericula sepius adferant. Qualia sunt albi ueratri, anaplia, elaterium, agaricum nigrum: siquidem ea strangulatus concitant, aut immodicas

\* Alij, de fecen  
den dū est in  
soluone calidā  
Aum.



modicas deiectiones mouent. Quibus ea medentur quæ in fungorum mentione, & similibus retulimus. nimios autem deiectionum impetus, medicamentis quæ excrementa supprimunt coërcebimus. Neq; negligenda quæ parum quidem nocere uidentur, interim uerò uitam in discrimina agunt. Quo in numero sunt syluestris ruta, (nouæ glacies\*), pappi recentes: flores autem sunt eius spinæ quæ cactos dicitur. Eos qui sumplerint, sola uomitio recreat.

\*Addititia  
uerba.

Domestica nobis.

Cap. XXXIII.

**A**qua frigida abundè pota, aut meracum uinum liberalius epotum, aut passum, præsertim à balneo, aut cursu, aut uehementi exercitatione, strangulatus & dolores infert. In quibus sanguinis missio protinus, & uacuatio, imminetia soluunt pericula. Sed de notis ueneficiorum, ac remedijs, & cauendi modo, hætenus dicta sint. Subiungeremus etiam antidota necessaria quæ præclarè auxiliantur, quibus utimur, quale Mithridatium est præsertim, & quod sanguine, & quod scinco temperatur: uerum quoniam alijs in locis diligentissimè scripta sunt, hic ab eorum descriptione superfedemus.

Venena.

Cap. XXXIII.

**D**E bestijs quæ uirus ei aculantur, & exitiilibus uenenis, ideo scribere aggredimur, ut tota curationis remediorumq; ratio ad umbilicum perducatur. siquidem pars hæc non minus quam cæteræ aliæ, necessaria est ijs qui artem medicam exercent, utpote cum adminiculo eorum quæ inibi traduntur, doloribus, periculis, & cruciatibus, plurimisq; alijs malis homines liberari conueniat. Hæc autem in summa fastigia duo, sicuti ab initio relatum est, distribuitur. Nam qui de feris uirus inspuentibus sermo disserit, theriacus dici solet: qui uerò de animalibus ueneficjs, alexipharmacus: quo prius tradito, simul quæ sequi signa consueuerunt, præmonstrabimus: tum quæ nonnihil auxiliij ferunt. Omnia autem in promptu, & ad manum habere artificem oportet, propter urgentem sæpenumero necessitatem. siquidem pauca è uenenis & uirulentis animalibus, tarda & grassantia sensim pericula cient, ita ut dilationem admittant: pleraque uerò præsentaneam perniciem afferunt. Hominum autem partim male alijs cogitantes, ingenta prauitate maleficium ita temperant, ut spacium curationi liberum non relinquunt: partim sceleris admissi conscientia, aut tristitia aliquo euentu oppressi, hausto sponte ueneno mortem sibi consciscere conantur, qui postea deprehenfi, aut resipientes, & uitæ cupidi, præsentaneam opem poscunt. Non desunt q; hostiles sagittas illinentes, aut fontes aquasq; puteanas hac labe polluentes, certam & inuitabilem aduersarijs perniciem moluntur: in quibus ipsi etsi maleficium non subitò, sed aliquanto post grassari natura sua comparatè est, tamen nisi primo quoq; tempore coërceatur, & remedijs subinde excipiantur, frustra tandem succurritur, occupatis iam corporib. exitiali ui ueneni. Proinde non uulgari industria diligentiaq; in ea re utendum est, ut quod in alijs incommodis ars consueuit, in his quoq; salutem mortalibus præbeat. Quin & apud præfatos centiores id ipsum discreuerunt esse eius partis, quæ medicamentis pugnat: sed retem, salubris sanantisq; medium statuantes, parua & leui supra modum persuasione decepti. Siquidem treis in humanis corporibus constitutiones esse contendunt. unam, qua sani degimus: alteram, qua sinistra ualitudine corpora laborant: tertiam quæ medium inter utrasque locum sibi uendicat, in qua positi, sanitatē pertricem, quæ corporibus nostris incumbit, quemadmodum in ijs uidere licet, quos excandescens rabie canis momorderit, necdum tamen aquam horrent: in ijs quoq; qui cantharidas hauserunt, sed nondum urina tormento cruciantur. Tripartito igitur artem digeri, tripliciq; corporis constitutioni meritò respondere tradit. Salubre partē esse uolūt, quæ sanitatē tuetur præcauentē, eandēq; prohibentē, quæ obstat q̄ minus in morbos incidunt: et sanitatem, qua uitia discutimur. Quib. ita responderi potest, qd̄ primū ex ista ratiocinatione non treis corporis tantum



tantum, sed quatuor haberi constitutiones fatendum esset, quippe ut aliqui sunt, qui necdum morbo laborant, morbo tamen maxime ob impendentem causam sunt obnoxii: ita sunt, qui iam priore morbo defuncti, nondum tamen secundæ ualitudinis restituti sunt: id quod in ijs qui à morbo proximè sese recolligunt, cerne relinet, quod uirium recreationem & robur desiderant. Sed quemadmodum curandi ratio ad partem medicamentariâ pertinet, ita præcautionem eidem subijci par est. Ad arcendas. n. ualitudines uehementibus, utimur auxilijs, altiore sacrificatu, uisionibus, amputatione, derodontibus epithematis, potionibus. perniciem occurrentibus, & plerisque alijs. Verum enim uero sunt usque: eò rudes nonnulli, ut ne remedia quidam appellent, quæ morbos arceant. Cuius sententiæ inire rationem haud promptum est: etenim cum uerbum ipsum, præcauere, tum agendi modus, omnino auxiliari remediariâque uim præ se ferunt. Mirum uero nisi etiâ sua illa distributi de partium eos cõplectuntur, quod in pestilentis cœli statu morbo nondum correpti sunt, pesti tamen, propter obuersantis aeris occasionem, opportuni, & in morbum proini redduntur. Dicere forsitan quis posset, salubris institutionis præcepta non aliud esse, quàm arcendorum morborum rationem: quippe cum firma reddere corpora, & minus uitij obnoxia nitamur, ut inoffensa ualitudine degant, nec morbis confligentur. Neque id silentio prætereundum, quod maxime præcipuum, & tanquam caput rei est, non oportere medicinæ partium distributionem, totidem corporis constitutionibus, respondere, sed naturas singulorum suis notis seorsum scrutari ac explorare, ut suis locis ostendimus. Cum ijs igitur non pluribus agendum. Illud magis adnotare conuenit, affectus qui à uirulentis animalibus uenenisque contrahuntur, uocari cæcos, id est, quorum ratio minimè iniri potest. Quin & ea quæ eisdem auxiliantur, nulli pariter sunt addicta causæ: quapropter quæstionibus obseruatoriæ artis, & eius quæ ratione fulciatur, annumerari solent. Neque prorsus uerum deprehenditur, affectus huiusmodi cæcos esse. Nam quod semper se protrahit, et nullum in quibusdā necessarijs usum exhibet, haud facili coniectura colligi potest: etsi naturæ proprietate prorsus cæcos eos affectus concedimus, qui ab exitiabilibus uenenis, & animantibus quæ uirulento morsu uiuunt, contrahuntur. Nam quod ad opus uonnullum usum præbet, datque medendi occasionem, neque imperceptibile, neque cæcum, nullius causæ obnoxium reputatur: sed magis ab ipso quis impulsus, demonstrationem se habere, & opinionem de abditorum cognitione confirmare poterit. Nam etsi sepe minora sunt, quàm ut sensibus percipiatur, euidenter tamen ex ipsis inter se collatis deprehenduntur. Dioscles autem in eo cõmentario quem Plutarcho dicauit, satis modos perstrinxit, ad uerbum ita scribens: Nosse quod hoc potest cum in alijs non paucis, tum in uiperis & scorpionibus, & reliquis id genus, se cum animo reputans, ut quamuis exiguo sint corpore, uixque conspectui subijciantur, magnos tamen discriminum ac dolorum causas inferunt: quum nihil præter quandam corporis exiguitatem, uimque præ cæteris animantibus datam illis, facile fuerit spectare. quanta. n. ea moles corporis est, quæ à scorpionis ictu, & aliorum id genus uenenatorum quæ nos morsu cõticiunt, attingitur: quorum aliqua uehementes cruciatus excitant, alia erodunt, & putredines cient, nec defunt quæ præsentaneâ perniciem moliantur. aut quantum est quod à phalangij morsu ingeritur, & uniuersum corpus ex cruciatu neque enim quod magnitudinem ipsorum deprehendere posset, cum prorsus exigua mole contentent. Ergo quod hæc ad affectus referantur, constitit inter omnes, uerum quod exactè deprehensum sit, uim quandam ipsis inesse mortiferam, quæ in finuata corporibus molestiarum quæ exoriuntur nobis causa sit, in confesso est, & omnium consensu persuasum. Nec quisquam inuenietur usque adeo contentionis studio flagrans, qui aliunde exoriri molestias asseueret, quàm à materia mortifera partem corporis attingente. Porro id erat quod inter utilia artis opera in omni opere dicere oportuit, quænam res opus hoc efficiat, ut nihil prorsus nos lædat, incomprehensa communis causæ quæ proprijs inest ratio: quando quidem tum euidenter indicari possit, cum deprehensa est. Ideo Erasistratus empiricorum pertinaciam graui capillatione incessens, cæcis affectibus causas assignauit.



assignauit, inficiatus his cōmunem & supremā morborū causam in comprehensibilem esse: & hanc in eo quem de causis scripsit commentario aptissimē prodidit, candido signatam lapillo. Nec ferendos eos esse censuit, qui se dicant in quibusdam, ut in uenenis, serpentium ictibus, & ceteris id genus trita medendi ratione contentos esse. neq; satis facturam sibi obseruationem eam, quæ à causarum cōprehensione separata est. Primum. n. genere comprehendi faciliē possunt. Quod autem sit letifera uis, corporaq; permutans, ita ut perimat, ex ijs quæ per genus, non per speciem uagantur, curationem indicat, qua hæc hebetare, & prorsus ex pugnare liceat. Cum uerō subiungit: Ad aquam dulcem & potui idoneam uenit quis, & ante obseruationem ad uomitum, ad uulneris dilatationem, ad demorsus partis succum, eueuibitulas adfixit, partem incidit, urentia medicamenta, aut ea quæ uim eandem adipiscuntur admouit, postremo partem amputauit: secum reputauit medicamina, quæ per summam cutim ferre & applicari solita, immisere ad intima pernicipi repugnarent. Hæc itaq; quæ disseruit Erasistratus, ueritati consentanea sunt, nec arti refragantur. Sed methodicos demirari licet, qui mortiferam uim corporibus illapsam, negociorum, quæ ipsa facessit, esse causam diffiteantur uerū rudiuicūle nomini attendunt. Nā apud ipsos palām immissa uis φθγοποιός, id est, mortifera, nominatur: φθγοποιός autem nullius officij alius esse potest, quā causæ. Aiunt hæc nomina, μάρσιππος, & ἀνακαλύψις, esse reliquis omibus similia, in quibus partes quædam dictionum non pro uirtute, sed nuda enunciatione comprehenduntur. Enimuero quemadmodum in his uocibus μάρσιππος & ἀνακαλύψις, partes neq; certos neque principes retinent significatus: sic in hoc uerbo φθγοποιός partes productionis gratia, non pro uirtute coaluerunt. Hinc ad causarum differentias transeunt, affirmantq; causarum aliquas euidenter esse, quæ dum aduersam ualitudinem creant, separantur. cuiusmodi sunt frigus, labor, estus, & similia: quasdam continentes, quæ permanent postquā morbum excitant, hoc est, quibus præsentibus, & effectibus eorum adsunt. in crescentibus, affectus augentur: decrescentibus minuuntur: & cum desinunt, idem finitur: quibus solis ac per se manentibus, effectus quoq; ipsi manent. Talia quidem receptissima sunt causarum discrimina, quorum nulli phthoropœon subijci potest. Euidens enim causa non est, quoniam morbus ipse permanet, nec ipsa à corpore separatur. Nec continens causa dici potest, cum magna ex parte hic adsit quemadmodū accidit ijs, q̄ à rabioso cane sunt demorsi. Quod si neq; euidens à nulla causarum differentia phthoropœon deducere possumus, consequitur, ut neq; causam esse fateamur. Quod autem asserunt, uocabula quædam in se non habere partis rerum significatrices, sed nuda & simplici pronuntiatione ficta esse, fateri necesse est. Verū non omnia, sed per pauca talem nancisci conditionem existimandum est. neq; enim ποίς in hoc nomine φθγοποιός perinde atq; assumptitia profertur, sed longè principem obtinet significationem. Quemadmodum enim φθγός, id est corruptionis, nomen mutationem in peius significat, sic hoc uerbum ποίς sumi debet, ut nihil amplius ex eo qd hanc dictionem φθγός se cum habeat declaret. neq; prorsus id significat, quod omnes palām audiunt, & huic simile redditur, παρσι: ἔχει δὲ λόγος. Si dant à corruptione sanis, fieri morbum, concedunt utiq; uim in huiusmodi uerbo ποίς subesse, siquidem aliquid est quod corruptionem efficiat. Omne autem quod aliquid efficit, ostenditur per singulas causas quæ corporibus subijciuntur, idq; tam in letalibus uenenis, q̄ in ijs quæ corporibus ingeruntur. Verū non nihil subiacere causarum differentijs produnt. Quinetiam aberrarunt, nō exactam diuisionem assumentes. Qui uerō se dogmaticos profitentur, causam esse partim præparantem, partim continentem asserunt: ut inguinum ulcus, & inguinariam febrem, & quæ effectui tum assistat, tum etiam separatur, ut à fractis precipitatio. In summa, q̄tis quippiam suapte natura causa fuerit, nec ulla diuisione comprehenditur, uitiosum est, neq; causæ adscribitur, eorum quæ idem genus fortuantur. Sed quod phthoropœon, causa sit, nomen ipsum



ipsum argumento est, & in ijs quæ contingunt apertius ostenditur. Quid aliud causæ arbitrantur esse post impressum à serpentibus ictum, quàm ex animante uim, & illapsum in corpora uirus? Neq; enim frigus, neq; æstus, neq; sectionem corporis, neq; crudelitatem, neq; aliud quicquàm simile causari possunt. Verùm quoniam causarum differentijs gaudent, & aliquas continentes, alias euidentes appellant, ipsis dicendum, utroq; istorum modorum euidentem quidem causam esse, quod affectum præcedit, & quod corporis substantiam præoccupat: continentem uerò, quod morbis præsentibus adest, quæ separata recedunt, quæ cum ipsa euenerant. Sed de ijs hæcenus. Statuendum itaq; mortiferam uim intrinsecus manifestissimam esse causam, ipsamq; principem facere scopum oportet. Et antequam ad ima decumbant morbi, uarijs modis est certandum, donec uis tota corporibus excutiat. modò enim reuocari debet ea parte quæ pestis intrauerit, modò aliqua alia, præsertim principatum non obtinente. antè coercetur, quàm altius irrepens uiscera tagat, aut eius pernicies eluatur, retundaturq; cum iam membratim peruagatura est. Itaq; uenena si hausta sunt, crebris uomitionibus: si morfu impressa, i. carificatione, affixis cucurbitulis, exsectu, carnis circumscriptione, nonnunquam amputatione extremæ partis, euocantur: retinentur uerò infusione, & impostu medicamentorum acrium cohibentur. hæc simul utique arcere uirus & eluere possunt. Restinguuntur & euincuntur meraciore potu, aut passo nulla aqua diluto, uel contrariorum esu, quæ acrimonia sint prædicta. Postremo deiectione alui, euocatus sudor, & alia quædā in commune, quæ membratim demonstrabimus, auxiliantur. Verumenimvero non letiferam modò materiam, sed & magnitudinem, & tempus, pro scopo considerare oportet: etenim ab ijs remedia quæ plurimum discrimen capeffunt. A magnitudine quidem, cum nonnulla ex uenenis, & uirosis animalibus pericula minantur. alia putredines altas aut exteriores excitant: alia uehementissimos dolores aut æcos cient: alia uix medicamentis cedunt, & magis minusue molestias excitant. Oportet autem ea quæ pericula ferunt, per uicacioribus auxilijs expugnari: & minus infesta, mitioribus. Quippe absurdum fuerit in grauioribus, seignioribus medicamentis homines in discrimen adducere: in minoribus uerò, uehementium auxiliorum iniuria corpus lacescere. Finitio à temporibus in promptu est: hoc enim subito ini pericula & præsentis molestias adducit, illud uerò sensum & dilatas in diem longam aut breuiorem producit. Itaq; in acutis quidem confestim multa simul auxilia representari oportet: reliquis, paulatim. Hæc quædam artis formula breuiter definita sint. iam membratim rem prosequamur.

Signa rabiosi canis, & demorsorum ab eo. Cap. XXXV.

**D**E rabiosi canis morfu sermonem alijs præposuimus, quod id animal domesticum ac frequens esse consuevit, & in rabiẽ sæpius agitur, ac perit, ab eoq; cauere difficile. inde periculū inuitabile hominem manet, nisi multis utatur auxilijs. Canis plerunq; flagrantissimis æstibus in rabiem efferatur: interdū quoties frigora incesseuerunt. Rabiosus autem potum & escam auersatur. largam spumantemq; pituitam naribus & ore proijcit. toruẽ & solito tristius intuetur. in omnes passim sine latratu irruit. equè feras hominesq; tã familiares quàm ignotos mordet. nec protinus infestum quidquam insigit, nisi, ut uulnus, dolorẽ. exinde morbus ille, qui ab aquæ metu hydrophobicus graia est, uoce appellatus, contrahitur. Euenit autem cum distentione neruorum, totiusq; corporis rubore, præsertim faciei. cum sudore & languore quodam aliqui auræ splendorem fugiunt, alij sine ulla doloris intercapedine uexantur. Sunt etiam qui canū more latratus edant, & obuiam factos morfu adoriuntur, ac mordendo simili uitio labefactant. Proinde ex ijs qui hoc uitium senserint, neminem seruatum uidimus, nisi forsitan ex historia unum aut alterum euasisse audiamus. siquidem Eudemus superasse quemdam affirmat. Themisonem aliqui demorsum in hunc furorẽ incidisse & euasisse fatentur. Alij ipsum cum amico aquam expauescenti morem gereret, & officium exhiberet, quadam naturarum concordia similem contraxisse affectum:



sed post post multos tandem cruciatus seruatum extitisse. Molestissimum itaque genus morbi, à quo multos, antequam ipsam experirentur, uindicauimus, & complures ab alijs medicis seruatos nouimus.

Remedia demorsorum à cane rabioso Cap. XXXVI.

**R**atio medendi duplex, una cōmunis, qua utendum in omnes morsus, quos uirulentæ animantes impresserunt, alia peculiaris priuataq; eorum duntaxat, quos rabiosi canes momorderint: quæ nonnullis quidem summam opem ferre consuevit, alijs uerò inutilis, maximè qui ex multo iam tempore ictum acceperunt. Quæ ad hanc pertinent, primum exponemus, deinde cursim perstringemus, quæ ad communem medendi rationem pertinent. Cancros itaq; fluuiatiles in sarmentis albæ uitis cremare oportet, & cinerem eorum quam minutissimè tritum habere reconditum, itidem gentianæ radicem tusam cribratamq; reponere, quoties autem canis rabiosus morsum intulerit, in quaternos cyathos meraci uini, bina cineris cancrorum cochlearia, unumq; gentianæ conijciantur, hæc in polentæ dilutioris modum subacta, quatr duo bibantur. Inter principia medicamentum hoc modo detur, atqui si ab illato morsu bini terniue dies fluxerint, curationem auspicabimur à triplicato pondere, supra id quod ab initio retulimus. Optimum hoc aduersus rabiosorum morsus auxilium, quod & plerisq; nnum satis fecit, eoq; cum fiducia uti licet. Sed ut alijs etiamnum auxilijs contra ineuitabile periculum muniamur, nihil cæteris uti prohibet. Satiùs autem multò fuerit etiam si in unum recidat, medicamentorum inhumanos tolerare cruciatus, quàm per inertiam ac desidiū in discrimen adduci. Nec ita in demorsis à rabioso animali maiora uulnera uereri oportet, uti minora, & ulcusculis cutis similia quippe maiori uulnere confertim copiosus sanguis emanans, potest nonnihil uirulenti liquoris exhaurire: quod in minoribus non accidit: quin à maioribus abscedentes carnes hinc auferre, & labia à cie scalpelli circumscribere, & prehensam hamulo aut uulsella carnem amputare oportet. In utrisq; circumstantia loca altioribus ulcusculis scarificanda, ut copiosior sanguinis uacuatio arceat, ne uenæ uamenti præstant, ut ueneni uis extrahatur. Contra uirulentos ictus, uisio expeditissimum est auxilium, utpote cum ignis cætera uiribus præstet, simul quod uirus domet, & ferri penitus non patiatur: simul quod pars ignem experta, postea non uulgare fundamentum curationi futuræ præbeat, manente diutius exulceratione. Adinaduertendum ex eo tempore cum crustæ decident, ne ulceris oræ coalescant, & cicatrice induantur, sed si fieri potest, idq; præstitutum tempus, ulcerationes & sordidas adhuc & inflammationem minantes, prorogari conuenit. Quod inditum ijs salsamentum optimè præstabit, & syluestre allium detritum, item cepe, succusq; præsertim Cyrenæicus, aut qui Medicus, aut Parathicus appellatur, tritici grana tam mansa quàm non mansa imponantur, siquidem subacta pistaue à perfusione uulnera dilatant. Sunt qui à mandentium ieiunio, sibi aliquid asciscere arbitrentur, quod suapte natura resistat. Verum id certum non est: cæterum tempestius eorum usus minimè est contemnendus: Si uerò, quod persæpe accidit, ante dies præfinitos cicatrices coirent, committerenturq; manum postulabunt: namq; eas diducere, carnemq; scalpello circinare, aut iterum inurere, expedit. Vbi uerò propositum tempus præterijt, ulcus addendus, nec multo post sinapismo utendum.

Ratio uictus in morsu rabiosi canis. Cap. XXXVII.

**Q**uæ ad partem ictam pertinent præsidia, ita se habent. Cæterum uictus rationem ex ijs quæ ueneno aduersantur, coniectura quadam colligere oportet, simul ut ueneni uires hebetet restinguatq; simul ut arceat, quo minus ad intima perniciosè illabatur. Etenim assumpta perniciosarum uirium penetratio ni resistunt. Quorum utrunque præstare potest uini meracioris, passii, & lactis potus, quippe q hæc omnia capiunt ad curā, nonnihil ueneno obijciunt, qd omnia



omnem eius acrimoniam obtundat. Simili modo aliorum, porrorum, ceparum<sup>a</sup> que cibis, quod ea difficulter conficiantur, uixq; aboleantur. nam multos dies huius cibi qualitates remanent, quo tempore nec euincuntur, nec permittuntur à mortifera uis, sed contrarijs illa uis expugnatur. Cui rei antidotorum usus accommodatur, & theriaces, Mitridati, & eius quod eupatorio temperatur, deniq; omnium quæ magnum aromatum partem sibi uendicant. quippe aromata omnia uiribus & substantijs ægrè permittuntur: quare in corporibus euincunt. Victus ratio hoc modo se habet. Nosse conuenit, pauorem aquæ non statò definitoq; tempore exoriri, plurimum tamen ad quadragesimum usq; diem neglectis differri consuevit, post semestre etiam nonnullos inuadit, quendam post annum aquam horruisse constat, quæ nobis uisu comperta fuere. Narrant & aliquos post septennium aquæ metu fuisse tentatos. Inter principia demorsorum à carne rabioso curandi ratio talis est. Verumenimvero si ea quæ retulimus auxilia, primis diebus prætermissa fuerint, nec scalp pro carnem circinare, nec ustionem experiri oportet, præcipuum est. Non enim quod iam pertransijt, satis euocare possent. Nulla utiq; istius rei occasio aut utilitas, sed incassum corpora doloribus sternuntur. Alter uero curationis modus accedat. deiectione magnum præbet iuuamentum, ut pote cum mouendo, corporis habitum transmutet. & quæ colocynthidem recipit hiera, item lac schistum, quod simul deiectionem moueat, & uenenum domare possit. cibi cres, & meraculi potus, quibus uis ueneni uehementer retunditur, quotidie sumi debent. ceteri sudores ante cibos, & post etiam ciendi. dropacismi sinapismi; alternatim per corpus totum adijciendi. Sed longè omnium efficacissimum auxilium helleborismus cognoscitur, quo cum fiducia non semel atq; æquum, sed frequentius ante quadragesimam diem, uel post hoc tempus uti licet. Tantum enim uehementiâ hoc auxilium habere fertur, ut quidam qui iam aquæ metum sentirent, sumpto helleboro simul ac primum morbi impetum experirentur, fuerint seruati. Nā & iam uitio tentatos nemo unquā seruare potest. Itaq; primum curam contra rabiosi canis morsus breui sermone exposuimus. iam ad alia, quæ uenenatis morsibus scire consueuerunt, transeundum. notas uno contextu, deinde communem medendi modum, qui omnibus conuenire possit, explicabimus. cursum deinceps subiungemus ea, quæ sua proprietate nonnullis auxilium præstare possunt. Postremo subnectentur etiam uenenata, quæ nullis cedunt remedijs.

Notæ eorum qui à uenenatis demorsi sunt. Cap. XXXVIII.

**D**emorsis à phalangijs locus quidem ipse, quasi ab impacto aculeo ruber, non intumescens, nec per ambitum calidus est, sed medio ceterum humescit, <sup>\* Rubescit.</sup> ubi uero contrariorum occursum refrixit, consequitur corpore toto tremor, distentiones poplitum & inguinum, conuulsionibus non dissimiles. in lumbis collectio exoritur. perpetua urinæ libido la cessit, multaq; reddendis excrementis colluctatio. uniuersa cute frigidus sudor emanat. collachrymant oculi, offusisq; nebulis caligant. Si scolopendra aut dicta ophiostene, morsum intulit, locus per ambitum liuore suggillatur, & computrescit: interdumq; licet raro, faculentus atq; ruber cernitur. à morsu ipso exulcerari locus incipit. ulcus id negotium exhibet, ferè remedijs inuictum. præterea toto corpore prurigo sentitur. Scorpio nis morsu inflammari statim incipit locus, & indurescit, ac intentus rubet, uicissimq; dolore premitur. modò si quidem ex aestuat, modò frigore occupatur. labor repente fatigat. aliquando meliusculè habet, aliquando recrudescit. consequitur sudor, horrores sensus & tremor. extremæ corporis partes refrigescunt. inguina extolluntur. per sedem status exeunt. capilli eriguntur. pallor membra de colorat. dolor, tanquam ex pungente acu, per uniuersam cutem sentitur. Si marina pastinaca percussit, protinus accidunt molesti dolores, assidue conuulsionες, lassitudo, & imbecillitas. mens percussis labat: postea obmutescunt. oculi caligant. Percussus autem locus in ambitu cum uicinis partibus denigratur, & ita oblitescit, ut tangentem non sentiat. hunc si quis premat, atra sanies, crassa & malè



olens excernitur. Amure araneo percussis, circa morsum in orbem inflammatio exoritur, nigraque pustula, diluta sanie turgens, exurgit. proximæ partes liuent. rupta pustula, depascens ulcus, non ei dissimile quod serpit, occupat. intestinorum quoque tormina, difficultas urinæ, & frigide asperginis offusio consequuntur. Si uipera momordit, corpus intumet, uehementer arescit, subalbidumque colorem concipit. sanies à uulnere profunditur, primum subpinguis, mox cruenta. pustulæ adustis similes erumpunt: & antea depascens ulcus, quod in proximæ repens, non summa modò corporis, sed intima quoque corripit. gingiuarum cruore suffunduntur. inflammatio circa iecur erumpit. tormina & biliosi uomitus sequuntur. Sopor, tremor, & urinæ difficultas accedit, & frigidus sudor offunditur. Consimilia eueniunt ijs qui à cecilia nomine, aut amphibæna demorsi sunt, eademque ferè auxiliatur. quare hoc uenenum priuatam descriptionem sortitum non est, neque uisum est dignum quod alio genere comprehendatur. A dryino morsis pustulæ molestique dolores incidunt, præsertim quæ dilutæ saniei emissarium subest. quinetiam erosio, torminaque consequuntur. Ab hæmorrhoidis ictibus uehementes cruciatus accidunt, qui angusta contractaque corpora ex continuo dolore reddunt. ex plaga copiosus cruor effluit, & quacunque parte corporis cicatrix ulla fuerit, ea sanguine emanat. excrementa per aluum cruenta eiciuntur, profluensque sanguis in globo coit, à pulmone sanguinem extussiunt, & in uomitiones effusi sine remedio commoriuntur. Quos dipsas percussit, solutus ac non constrictus tumor premit, sitisque usque eò pertinax, ut satiari non possint, ac sine ulla interapedine excrucietur: & si potum pleno ore assatim trahant, illico in eandem sitim relabuntur. proinde toto habitu similes sunt ijs qui antea potus nihil hauserint. quare propter continuam sitim, & prester, & causer, aut dipsas appellatur. Ab natrice demorsis ulcus dilatur, & liuidum ac ingens euadit. sanies ex eo multa, & atra, & male olens, non secus atque ijs quæ serpunt ulceribus, expuitur. Cenchri morsum, qui uiperino ictui similis est, putridum ulcus sequitur. carnes antea, ut in aqua inter cutem, prætumidæ, defluunt. lethargo corpiuntur, & ueterno pressis somnos captant. Erasistratus eos iecinore, intestino\*, coloque constrictari auctor est. Quippe dissectis ipsis, omnes ferè partes corruptæ reperiuntur. A cerasæ percussis locus attollitur, cum duritia pustulosus. è plaga sanies profluit, modo atra, modo pallidior, sed toto concretu uaricosus intumescit. genitale intenditur. mens labat, oculorum caligo exoritur, denique rigore distenti commoriuntur. Ab aspide ictis, uulnus exiguum prorsus, quasi ab adacta acuta citra tumorem conspicitur. sanguis exiguus ille quidem, sed ater distillat. caligo uelox oculos obnubit. labor in totum corpus multiplex, omnino levis & non sine uoluptate consequitur. ideo Nicander perpulchrè cecinit: At uir perit absque labore uirens atque discolor. mediocris stomachi dolor afficit. frons perpetuò reuellitur. genæ contremiscunt, quasi sine sensu in somno uacillant: hos mors tollit, ad diei trientem non dilata. Erasistratus in libro quem de medicaminibus & uenenis condidit, de uocato basilisco scitè ita refert: Cum basiliscus morderit, uulnus ad auri colorem efflauescit. Itaque in plurimis quæ uirus ei acculantur, comites notæ ita se habent. Transeuntes utique ad medendi rationem, primum, ut fieri poterit, de communibus differemus.

\* Vesica:

Communis curatio in omnes ictus uirulentos. Cap. XXXIX.  
**A**Duersus quidem omnem animalis ictum, quod uenenum uiuat, oris sumptio conuenit. fugientem uerò oportet ieiunum non esse, sed & cibum sumpsisse, & uino os abluisse. postea exiguum olei in ore continens plagam exugat. locus ipse spongia fouendus, deinde scarificandus. sed ulcuscula altius imprimere expedit, quo uirosa materies profundo euocetur. Circinatio autem carnis, & sectio, scarificatione longè potèntius opitulantur. namque ab ijs duo peculiaria præsidia sunt. unum, quod uirus è loco tollitur: alterum quod eius ueneni pars quæ ad interiora grassatur, cum multo copiosoque sanguine excernitur. Quod si locus sectionem non admittat, cucurbitulæ cum largiori flamma adfigendæ sunt. Sed



Sed iam de uestione suprà in rabioforum morfu differuimus. Si uerò ista pars, utpote extrema, eam sectionem commodè non respuat, præsertim in omnibus serpentium ictibus, ut aspidis, cerastæ, similibusq; proculdubio amputanda est. Conuenientiora supradictis auxilia sunt, quæ epithemata uocant. Imponatur sarmentitius cinis, aut ficulus, cum lixiuio stillatitio subactus, garo, & acris fassamento. porri, cepæ. & allia modò minutissimè contrita illinuntur, modò cremata uulnibus injiciuntur. quinetiam dissecti gallinarum pulli, cum maximè tepent, percusso loco applicentur. Nec defunt qui hisce tanquam discordia quadam natura li pugnantibus utantur. uerum huius rationem inire facillimum fuerit. Gallinæ enim calida natura prædita sunt, argumēto, quod deuoratum insigne uirus conficiunt, & aridissima quæq; semina consumant. itē nonnunquā arenas lapillosq; ingluuie sua deuoratos, dissoluunt. Itaq; animantis ad moti calore adiutus spiritus, ab ista parte impetum capeffens exiliensq; secum uenenum exigit. Nec me fugit quid in Aegypto fieri soleat. Cum spicas Aegyptij metunt, ollam picis paratam habent, & appensam fasciam: tunc enim maximè serpentium iniurias expauescunt, tum propter spicilegij tempus tum quod opacis simul abdita speluncis & cauernis, densiq; aruorum cespite delitescunt. Molestissima enim animalia & uirus eructantia, Aegyptus in campis ferre consuevit. Vbi ergo aut in pedem, aut partem aliam, morsum intulerunt, qui ad sunt, fasciam in ollam picis coniiciunt, & semel aut iterum brachium aut crus paulum supra uulnus obligant, & arctissimè duo è præsentibus distringunt, locumq; secantes qua circumactus est laqueus, picem instillant, cumq; satis uulnus excepsisse uidetur, laqueum resoluunt, & cepis alijsq; suprà memoratis illiniunt. Præterea pix liquida cum sale trito & feruente illita, præsentaneo est auxilio, si iugiter innouetur. Conuenit & cedria, & fimum caprarum ex uino decoctum. locū aceto calido, calaminta in lotio, maris aqua, aut acida muria decocta, foveri salutare est. Quinetiam non defunt emplastra uementissima, & calidissima, quæ uenenum elicere, expugnare & discutere possunt. Cuiusmodi sunt quæ ex sale, aut nitro, sinapi, & cachrye cōponuntur, de quibus consequenter erit tractandum. Erasistratus autem non iniusta reprehensione eos incesit qui incognitas ad hunc usum facultates conscripserunt, ut elephanti fel, crocodili uē sanguinem ouaq; testudinis, & consimilia. Nam cum iuuantia quædam literis tradidisse uidentur, planè in hæc sola incidentib. imposuerunt. Quæ talia deuitanda sunt, cum difficile, nisi regia facultate, peruestigari possint: neq; quò nostra fides istis obstringatur, frequenti obseruatione, sufficiens experimentū præstiterint. Quæ autem ad cōmunem oīm usum pertinet, quæq; faciliè suppeditari, & omnibus à serpente percussis auxiliis ferre queunt, subiungenda uidentur. In tubus itaq; & erica, & astragalus, cū aceto pota, cōtra omnes serpētū morsus auxiliatur. itē bitumen, & uirentes platani pilulæ in uino diluto coctæ, & paliuri decoctū, radix aristolochiæ, & eryngij. decoctæ etiam lauri baccæ, & deuorata, piperq; largius esitatu, ruta, anethū, & cyclaminus. coma porrorū priuatim expauescit, aut alliū, aut cepe, fassamentaq; quæ acerrima, origani decoctū cū uino potū, fœniculi, pulegij, calamynthæ, porrorūq; succus, cū melle desorptus. hæc quidē à plantis conquiruntur. Ab animantibus uerò quædam utiliter peti solent. gallinaceorū cerebella in cibo, leporinum coagulū cum uino, iridem castorij sextans. testes marinæ testudinis sumpti multū prōdesse traduntur. mustela sale inueterata inter auxiliaria medicamenta est. Cōmēdatur in primis exenterata, quæ sale siccescēs inueteratur: ex qua binas drachmas cū uino bibisse satis est. Sed de simplicib. quæ dari solēt hætenus. Percussis à serpēte prodest alui deiectio, diffusus sudor, urina copiose reddita. Sunt & cōpositæ quædā potiones, quæ mira remedia polliceri traduntur, ut & opij & myrrhæ singuli oboli, piperis sicilicū. ea melle expiuntur, & instar Aegyptiæ fabæ dātur cū uino. iridē syluestris rutæ seminis, gith, cumini Aethiopici, aristolochiæ, galbani, singulorū pares portiones trite, & cū erucæ succo subactæ, digerūtur in pastillos, qui drachmæ pōdus æquēt, dātur ex istis terni cyathi cū uino. Hæc habui de cōmunib. auxilijs quæ dicerē. De peculiari



bus remedijs contra bestias quæ uenena uibrant, consequenter est dicendum.

Peculiaria remedia uirulentorum ictuum.

Caput XL.

**I**nter feriensium uenenatorum notas nihil de uespis & apibus articulatim digessimus, quod cōspiciat omnibus forent, & nihil excellēs aut notatu dignum in his obseruaretur: inter remedia tamen, earum meminisse non fuit alienum. Igitur aduersus utrarumq; ictus prodest illita malua, & hordeacea farina cum aceto, ficulneum lac in uulnus instillatum, à muria, aut maris aqua fotus. Phalangiorum ictibus ficulneum cinerem, adiecto sale trito & uino, imponere oportet, aut radicē syluestris puniceæ quam tenuissimè tritam, aut aristolochiā, cum hordei farina & aceto subactam. ulcera aqua maris proluenda, aut apiastri decocto. folio eiusdem illinenda. lauacris perpetim utendum, & propinadum abrotoni semen, anisum, aristolochiam, cicer syluestre, cuminum Aethiopicū, cedrides tritas, plantani corticem, & trifoliæ herbæ semen. priuatim autem, singulorum ex ijs binas drachmas dare cum uini hemina cōuenit. item myricę fructus, & chamępityos, & uiridium cupressi pilularum decoctum, admisto uino. Sunt qui fluuiatilis cancri expressi succum, cum lacte, \* assumpto apij semine, confestim molestijs liberare prodāt. Si scolopendra morsum infixit, sal quàm leuissimè tritus ex aceto uulnere inspargendus, aut ruta syluestris superponenda. locus acida muria fouendus, dàda in potu aristolochia cum uino, aut serpyllum, aut calamynthia, aut ruta syluestris. Percussus à scorpione, præsenti est auxilio ficulnum lac in uulnus instillatum. scorpis ipse qui ictum uibravit, tritus & percusso loco impositus, suæ plagę remedium est, ob cæcam quandam naturarum (ut constat) discordiam, quæ antipathia appellatur. præterea tritus & impositus cū sale, lini semine & althæa, scorpis conuenit sulphur ignem non expertum, resina terebinthina exceptū, & emplastrum modo adiectum auxiliatur, itidem galbanum ad splenij formam ductum, & calamintha, quæ trita illinatur, & farina hordei in uino parata, in decocto rutæ, semen trifoliæ herbæ tritum, & uulnere iniectum opitulatur. Hęc ad affectum locum pertinent. Post hæc quàm efficacissimis potionibus utendum. cuiusmodi sunt aristolochiæ, præsertim corticis binæ drachmæ uino, tusa gentiana, & pulegium decoctum, & baccæ lauri pauco numero tritæ, & calamintha cum posca, in qua magnopere discoqui debet. cupressus \* cum uino, et ruta, nec secus ficulneum lac, laserpitium, si adsit: sin desideretur, peucedani succo utendū. efficax est potus trifolię, & ocimi semen. horum autem omnium uicem pensat iugis lauacri usus, euocatus sudor, & diluta uini portiones. Eī qui marina pastinaca ictus, omnia quæ de uiperarum morsu paulò post referemus, simili modo cōueniunt. peculiariter autem (ictus à marino scorpione, & dracone inferuntur, qui molestos cruciatus cient: interdum autem, sed raro, nomas excirant, quibus) absinthij, saluie, aut sulphuris ex aceto triti potio subuenit. Pastinaca diuisa & uulnere imposita, sui ictus medela est. Si mus araneus momorderit, auxiliatur ex galbano splenium, per se uulnere exterius impositum, ut medicamenti modò aceto tritum, & hordeacea farina cum aceto mulso illita. quinetiam mus ipse qui morsum intulit, si dissectus apponatur, ictus sui ueneficia luit. resistunt quoq; acini dulcis punici decocti, & illiti. item porri, & allia contrita, necnon aquæ calidæ fotus. sed hæc præterea serpyllum, & galbanum, & eruca uino madefacta, recentes cupressi pilulæ cū aceto, & cyclaminus ex aceto mulso, & pyrethrū cum uino, & chamæleonis herbæ radix. Nec desunt qui literarum monumētis tradiderunt, tritū murem araneum contra suos ictus cōmodè bibi. Quam historiam apud alios inuentam, dignam duntaxat censuimus quæ ahñoraretur. Alij asserunt demorsum non alias exulcerari, nisi prægnans mus araneus fuerit, tum sanè auxiliari ferunt. Si uipera morsum impressit, simum caprinū cum uino, studiose impositū opitulatur: item laurus, & abrotonum, & galbanū splenij loco superiectum, organū uiride inditum

\* aqua aut lacte.

\* cyperis.  
\* paribico.

\* Hęc quidā habent.



Inditum. pulli gallinarum discepti, & confestim admoti. erui farina uino subacta. radice cortex usque tufus, ut in puluerem solutus abeat, & scilla tosta, detritum chamæmelum, hordeaceæ farina cataplasma in aceto mulso præparatum: sed locus ante eo calido foueatur. hæc loco imponuntur. Contra uiperinos ictus rubus cum uino prodest. aliqui anchusam tenui folio constantem auxiliari produnt. leporini coaguli in uino terni oboli bibuntur, & porracei succi hemina in mero, & foliorum apiastris succus, & syluestris ruta. hæc in uino potari debent. uinum frequenter bibendum, allia mandenda, & cepæ & porri recetes, salsamenta acerrima, & opipara. simplicia hæc sunt. Percussis à uipera præclare auxiliatur medicamentum, quod myrrhæ, piperis, castorei, floris portulacæ seminisque, dimidio acetabulo constat. hæc omnia in Cretico passo teruntur, aut in alio probato. Erasistratus in eo libro quod *περί δυνάμεως*, id est de uiribus inscribitur, pleraque alia tradidit, quæ ictis à uipera auxilium ferre possunt, inter quæ talia maxime laudantur: gallinacea cerebella cum uino pota, semen satiuæ brassicæ tritum, & acetabuli mensura cum uino potum. Quinetiam bonum est digitum in liquidam piceam intingere, deinde uinum, quo digitus fuerit elutus, bibere. Hæc sunt quæ contra uiperæ ictus auxiliantur. De amphibæna mentionem hoc loco fecimus, quoniam ferè remedijs ad uiperas scriptis, percussis ab ea adiuuari soleant. Amygdalino ictis conuenit aristolochia cum uino pota, trifolium herba, radix hastulæ regię similiter assumpta, & fructus ex omni quercus genere. usque ilicis radices, & illis parti ictæ auxiliantur. Hæmorrhoidi diptadisque morsus uelut immedicabiles à plerisque maiorum deplorati relinquebantur. quare si peculiaribus contra diptaden remedijs egeamus, communia experiri operæ precium erit, protinus autem scarificatione uti, uisionem facere, & si locus patiat, extremorum amputatione opus erit: cōsequenter quàm acerrima cataplasmata ad mouere, de quibus sæpenumero diximus. Nec me fugit, acres cibos, maxime à salsamentis, utiles esse. meracæ portiones & lauacra profunt, quæ subinde interiecto breui spacio assumenda sunt, priusquam morbi genus emerferit, quo semel irrumpente, opem ferre non potest ulla medici opera. In ictu hæmorrhoidi eadem profunt. insuper quæ in commune opitulantur, ut scarificationes, uisiones, acres cibi, meraci potus, & quæ nunc in diptade definiuimus. quinetiam decocta uitis folia, & cum melle trita. Si morsum natrix adegit, prodest origanum tritum, & aqua subactum, lixiuia cum oleo indita, aut aristolochiæ cortex, aut querna radix minutim contrita, & hordei farina cum aqua & melle colliquata. bibuntur etiam binæ aristolochiæ drachmæ in potione poscæ cyathis duobus, deinceps marubij succus, uel decoctum alterius cum uino. fauus recens datur in aceto. Morsus à cenchridio auxiliatur lactucæ fructus cum lini semine illitus, & satureia tri-  
ta, & syluestris ruta, & serpyllum cum duabus hastulæ regię drachmis, & tri-  
bus uini cyathis, aut aristolochiæ radix. item cardamomum & gentiana. Si ce-  
raustes percusserit, cita partis amputatio suffragatur. quare sine mora ictam par-  
tem amputare, aut scalpro confestim circūcidere, & ijs similia prosequi oportet.  
urentia insuper reliquijs ad mouenda, siquidem uirus hoc ueneno basiliscij simile  
est. his qui ab aspide feriuntur, quæ de ceraste scripta sunt auxilia dari debent. nam  
uenenum hoc, quemadmodum basiliscij, aut sanguis bubulus, celerrime in arte-  
rijs sanguinem cogit. Ad basiliscij morsum, ut Erasistratus auctor est, auxiliatur ca-  
storei drachma in uino pota. item papaueris succus. Ictuum remedia ita se ha-  
bent.

F I N I S.







